




къерг
Г1
С 88

К. Сулайманкулов, Б. Кособаева

ХИМИЯ



9

К. С. СУЛАЙМАНКУЛОВ, Б. М. КОСОБАЕВА

ХИМИЯ

Орто мектептердин 9-классы үчүн
окуу китеби

Толукталып, экинчи басылышы

*Кыргыз Республикасынын Билим берүү, илим жана
жаштар саясаты министрлиги бекиткен*

Бишкек «БИЛИМ» 2006

УДК 373.167.1
ББК 24.1 я 721
С 89

Бул окуу китебинин 1-басылышы Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги менен Кыргыз билим берүү институтунун ортосунда окуу китеpterин чыгаруу боюнча түзүлгөн № LC TPS1/52 келишмидин негизинде даярдалып, 2003-ж чыккан.

Башкы менеджери – И. Б. Бекбоев

Менеджери – Т. Р. Орускулов

Рецензенттери – Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Химия жана технология институтунун директору, химия илимдеринин доктору, академик Жоробекова Ш. Ж., №5 компьютердик гимназиянын химия мугалими Женалиева З. А.

Сулайманкулов К. С., Кособаева Б. М.

С 89 Химия: Орто мектептердин 9-кл. учүн окуу китеbi. 2-бас., толук. — Б.: «Билим», 2006. — 176 б., ил.


ISBN 9967-426-22-5

Бул окуу китеbi орто мектептердин 9-классынын окуучуларына арналат. 2000-жылы Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан жарыяланган Улуттук конкурста жактырылган бул окуу ките «Орто мектепте химиядан базалык билим берүү программасынын» негизинде даярдалып, 2003-жылы биринчи басылышы жарык көргөн. 2004-2005-окуу жылында Билим берүү жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан түзүлгөн экспертик комиссиянын экспертизасынан өткөрүлүп, толукталып экинчи басылышы даярдалды. Китеpte мектеп окуучулары милдеттүү түрдө өздөштүрө турган окуу материалдары камтылды. Китетин көлемү чектелүү болгондуктан, айрым ондоолор камтылбай калды. Кийинки басылышында толукталат.

Кыргыстандын мектептеринде химиядан билим берүүнүн мамлекеттик стандартына жана базалык билим берүү программасына ылайык организалык заттар боюнча алгачкы түшүнүктөр берилди.

Бул окуу китебинин мазмунун, түзүлүшүн талкуулоого катышкан КББАнын илимий кызметкерлерине, мектеп мугалимдерине, экспертик комиссиянын мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирибиз.

ШАРТТУУ БЕЛГИЛЕР:



● — аныктамалар

? — суроолор

◻ — өз алдынча иштөөгө же үйгө берилген тапшырмалар

УДК 373.167.1

ББК 24.1 я 721

С 4306021500-06

ISBN 9967-426-22-5

© Сулайманкулов К., Кособаева Б., 2006

© КР Билим берүү, илим жана жаштар саясаты министрлиги, 2006.

© КББА, «Билим», 2006

КИРИШ СӨЗ

Урматтуу окуучулар!

Буга чейин билим берүү программасынын негизинде 8-класстан силемер «Алгачкы химиялык түшүнүктөр», «Илимий методдор», «Заттар жана алардын айланыштары», «Химиядагы сандык катыштар», жаратылышта кенен таркалган кычкылтек, анын катышшуусу менен жүрүүчү реакциялар, «Суутек, Кислоталар, Туздар», «Органикалык эмес бирикмelerдин ортосундагы жүрүүчү реакциялар», «Мезгилдик закон жана заттардын түзүлүшү» менен таанышкансынар.

9-класста химияны окуп үйрөнүү 8-класста алган билиминдердин негизинде улантылат.

Базалык курс гуманитардык жана табигый, математикалык багыттагы массалык мектептердин окуучуларына арналат. Окуу материалдары негизинен дүйнөнү таанып-билиү мүнөзүн алыш жүрөт. Химиялык кубулуштарды үйрөнүү менен жаратылыш закондору, ошондой эле коом үчүн химиянын ролу жөнүндө түшүнүктөрдү калыптандыруучу, жокорку цивилизациялуу коомдо жашаган ар бир маданияттуу адамга зарыл болгон химиялык билимдер камтылды. Бул химия окуу китеbi буга чейин колдонулуп келген 9-класс үчүн окуу китеpterинен окуу материалдарынын мазмуну, жайгаштырылыши ирети, көлемү боюнча айырмаланат.

Окуу китеbi «Эритмелердин химиясы» менен башталат.

Өзгөчө көнүл бура турган негизги химиялык түшүнүктөр, жалпылоолор жана закондор текстте атайын белгилер менен берилди.

Окуу китебиндеги сүрөттөр жана таблицалар окуу материалдарын терең түшүнүүгө көмөк берет.

Окуу китеbi жаңы принциптердин негизинде түзүлдү. Жаңыдан киргизилүүчү түшүнүктөрдүн минималдуу саны колдонулду. Ар бир жаңы түшүнүк окуу материалын өздөштүрүүгө етө зарыл болгон учурда гана киргизилди. Ар бир түшүнүкту калыптандыруу аны улам кийинки темада колдонуу менен улантылат. Мисалы, «Химиялык реакция» түшүнүгүнүн калыптанышы химиялык тең салмактуулукту, химиялык реакциялардын ылдамдыгын, кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларын окүп-үйрөнүүдө дагы терендетилет. Бул билимдердин негизинде металл эместердин жана металлдардын айрым өкүлдөрүнүн касиеттери менен таанышшуу улантылат.

Буга чейин табият таануу, физика курстарында өздөштүрүлгөн билимдердин негизинде айрым окуу материалдарын алдынала эртелеп окутуу колдонулду. Мисалы, «Органикалык бирикмeler» 9-класстын химия курсунда жаңы бөлүм болуп саналат жана анын өзгөчөлүктөрү катары төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот:

- тема химия курсунун бир бөлүмү катары берилди, аны органикалык химиянын системалык курсу катары кароого болбайт;
- көмүртек элементинин өзгөчөлүгү, ал түзгөн органикалык эмес бирикмелерди окуп-үйрөнүү аркылуу органикалык бирикмелер менен таанышшууга өтүү;
- органикалык бирикмелердин айрым өкүлдөрү, алардын касиеттери жана колдонулуштары боюнча жалпы түшүнүк берүүгө багытталгандык.

Бул окуу китебинде химиянын адам турмушунда кененирээк колдонулуучу жактарына көнүл бурулду. Анткени ал органикалык эмес химиянын негиздеринен органикалык химия менен таанышшууга өтүүдө кездешүүчү кыйынчылыктарды жөнелдетет;

Органикалык бирикмелерди окуп-үйрөнүүдө алардын өзгөчөлүгүнө көбүрөөк көнүл бөлүнбөстөн, химиянын закондорунун бардык (органикалык же органикалык эмес) объектилерге жалпылыгы каралды.

Окуу материалдарынын мазмунуна камтылган химиянын теориялык жоболору, айлана-чейрөдө жүрүүчү, адамдын турмуш-тиричилигинде колдонулуучу химиялык процесстер учурдагы илимий денгээлден, ошол эле убакта окуучуларга жеткиликтүү денгээлде түшүндүрүүгө боло тургандай тандалды.

Химияны билүү сilerди химия жаатынан сабатсыз адамдар кабылуучу көптөгөн кырсыктардан, коркунучтардан сактайт. Химия предметин өздөштүрүү талыкпаган эмгекти талап кылат. Ар бир тема менен күнт коюп таанышып, түшүнбөй калган жерлерин кайталац окуп, параграфтын аягындағы суроолорго жооп берип, көнүгүүлөрдү калтыrbай иштөө зарыл. Химияны өздөштүрүү онай эмес, ошондуктан теориялык материалдарды күнт коюу менен өздөштүрө алсаңар, аларды бышыктоодо химиялык тажрыйба өткөре билсөнөр, турмуш-тиричиликтө колдонулуучу заттардын касиеттерин жакшы билесинөр, аларды сабаттуу колдонууга үйрөнөсүнөр.

Химия – өтө кызыктуу предмет. Химия боюнча билимге чоң маани берүү менен гана жакшы ийгиликтерге жетишүүгө болот.

I глава

ЭРИТМЕЛЕРДИН ХИМИЯСЫ

§ 1. Эритмелер

Эритмелер адамдардын иш-аракет тармактарында кенен колдонулат. Алардын тириү организмдер үчүн чон мааниси бар. Адамдар, жаныбарлар жана өсүмдүктөр тамак заттарын эритме түрүндө өздөштүрүшөт. Алардын организмдеринде татаал физикалык-химиялык процесстер эритмелерде жүрөт. Физиологиялык суюктуктар – кан плазмасы, лимфа, ашқазан суюктугу жана башкалар – эритмелер болуп саналат.

Кан плазмасына туура келген туз эритмелери медицинада колдонулат. Мындай эритмелер физиологиялык эритмелер деп аталат. Қөптөгөн медициналык дары-дармектер химиялык заттардын суудагы же спирттеги эритмелери болушат. Табигый суу да эритме болуп саналат. Минералдык сууларда көмүр кычкыл газы, күкүрттүү суутек, темирдин бирикмелери, бром, йод жана башка заттар эрип жүргөндүктөн, аларды түрдүү ооруларды дарылоодо колдонушат.


Кандай гана эритме болбосун, эриген заттардан жана эриткичин турат, б.а. эриткичин чөйрөсүндө эриген заттар молекулалар же иондор түрүндө бир калыпта таркалган. Эриткич таза түрүндө пайда кылган эритме менен эриткичин агрегаттык абалдары бирдей болот (мисалы, туздун эритмесинде эриткичи – суу, суунун да, эритменин да агрегаттык абалдары бирдей). Эгерде компоненттердин экөөнүн тең агрегаттык абалдары бирдей болсо (мисалы, спирт жана суу), анда алардын көлөмү көбүрөөгү эриткич болот.

Ар түрдүү өндүрүштүк жана биологиялык процесстерде электролиттердин эритмелери чон ролду ойнойт. Бул эритмелердин касиеттери электролиттик диссоциация теориясы аркылуу түшүндүрүлөт. Электролиттик диссоциация теориясын билүү органикалык жана органикалык эмес заттарды окуп-үйрөнүүдө электролиттердин эритмелеринде химиялык реакциялардын механизмдерин терең түшүнүүгө мүмкүндүк берет.

Эки же андан ашык компоненттерден турган, өзгөрүлмө курамдагы гомогендүү системалар эритмелер деп аталат.



Суюк эритмелер көбүрөөк таралган. Алар эриткичтен (суюктук) жана эриген заттардан (газ, суюк, катуу абалда) турат.



Суюк эритмелер суулуу жана суусуз болушат.

Суулуу эритмелерге эриткичи суу болгон эритмелер кирет. Эриткичтери башка суюктуктар (бензол, спирт, эфир ж.б.) болгон эритмелер суусуз эритмелер болушат.

Практикада суулуу эритмелер көбүрөөк колдонулат.

Өсүмдүктөр өсүшү үчүн зарыл болгон заттарды тамыры аркылуу эритме түрүндө гана алышат. Суунун топуракка өз убагында келип турушу жогорку түшүмдү алуунун зарыл шарты болуп саналат. Айрым жер семирткичтер жана айыл чарба зыянкечтерине каршы колдонулуучу каражаттар эритмелер түрүндө пайдаланылат. Адамдын жана жаныбарлардын азыгын синириши тамак синириүү органдарында тамак-аштын сууда эрүүчү бирикмелерге айлануусу жана бул бирикмелердин суу эритмелерине өтүшү менен ишке ашат.

Химиялык лабораторияларда таза заттардын ордуна алардын суудагы эритмелери көбүрөөк колдонулат. Анткени заттарды алдынала сууга эритүү алардын ортосундагы химиялык реакциялардын ылдам жүрүүсүн камсыз кылат. Ошондуктан химия өнөр жайында жана көпчүлүк химиялык эмес өндүрүштөрдө суу алдан көп жумшалат. Заттарды тазалоодо да суу колдонулат. Алды менен заттарды эритип, алынган эритмени чыпкалап, андан кийин кристаллдаштырат. Суудан башка эриткичтер да кенири колдонулат. Мисалы, кийимдерди химиялык тазалоодо, өсүмдүктөрдүн данынан майларды бөлүп алууда органикалык эриткичтер кенири пайдаланылат.

Эритмелер жаратылышта эң чоң мааниге ээ. Жаратылыштагы суу эритмелеринен тоо тектеринин катмарлары пайда болгон.

Суюк эритмелер накта, чаңгылт жана коллоиддик эритмелер болуп бир нече түргө бөлүнөт. Накта эритмеге мүнөздүү болгон өзгөчөлүк – **эриткичин атомдору, иондору же молекулалары** эриген заттын атомдорун, иондорун же молекулаларын текши курчап камтып тургандыгында. Башкача айтканда накта эритмелер бир фазалуу, эриткич менен эриген заттын ортосун бөлүп турган чек жок.

Чаңгылт эритмелерде заттын эрибей калган бөлүкчөлөрү көзгө көрүнөт, эритменин түбүнө чөгөт. Бул чопону, борду майдалап сууга салганда байкалат. Ал эми коллоиддик эритмеде эриген зат эриткичин бардык көлөмүндө бирдей таркайт. Мисалы, сүттү сууга куйганды, суунун бардык көлөмүнө таркоо менен суунун түсү бардык жеринде бирдей агыш болот.

Демек, кандай гана эритме болбосун эң аз болгондо эки башка заттан турат, алардын бири – эриген зат, экинчиси – эриткич. Мындай бөлүштүрүү шарттуу болуп саналат, ал эми калдыксыз өлчөмдө бири-бирине аралаша турган заттарга: суу – спирт, алтын – күмүш мисал боло алат.

Заттардын эритмелерди пайда кылуу касиети ар башкача. Айрым заттар бир бирине чексиз эришсе (суу жана спирт), башка бир заттар белгилүү өлчөмдө гана эришет (кайнатма туз сууда).


Булардын себептери менен кийинки параграфта таанышасынар.

- ?
- 1. Эритмелер деп эмнени айтабыз?
- 2. Агрегаттык абалдары боюнча эритмелер кандай классификацияланат?
- 3. Суюк эритмелер кандай компоненттерден турат?
- 4. Суулуу жана суусуз эритмелер кандай эритмелер болушат?

-  1. Суюк эриткичтерде заттарды эриткенде кандай процесстер жүрөт? Кошумча адабияттардан маалымат топтолп, баяндап жазгыла.
- 2. Кантты, кайнатма тузду жана өчүрүлгөн бир аз акиташты сууга эритип көргүлө. Кайсынысы жакшы эрийт? Үйүнерде тажрыйба түрүндө текшергиле.

§ 2. Эригичтик. Каныккан жана каныкпаган эритмелер

Эригичтик – татаал физикалык-химиялык процесс. Эрий турган заттын түзүлүшүнүн бузулушу жана анын бөлүкчөлөрүнүн эриткичин молекуларынын арасына таралышы физикалык про-



1-сүрөт. 100 г сууда катуу заттардын эригичтик ийри сыйыгы.

түрдүү температурадагы эригичтик $t_1^{\circ}\text{C}$ наан $t_2^{\circ}\text{C}$ на чейин муздатканда эриген заттын чөкмө болуп чөккөн массасын.

● Каныккан эритмени буулантуу менен затты бөлүп алуу кайрадан кристаллдаштыруу деп аталат.

Типтүү маселе иштөө

1000 мл сууну 60°C да калий нитраты KNO_3 менен каныктырышат. Эритмени 30°C на чейин муздатышат. Чөкмөгө канча массадагы туз чөгөт?

Берилди: $V(\text{H}_2\text{O}) = 1000 \text{ мл}$
 $t_1^{\circ} = 60^{\circ}\text{C}; t_2^{\circ} = 30^{\circ}\text{C}$

Табуу керек: $m(\text{KNO}_3)$

Чыгаруу: Эригичтиктин ийри сыйыгы боюнча (1-сүрөт) калий нитратынын KNO_3 60°C жана 30°C да эригичтигин табабыз.

60°C да KNO_3 түн 1000 мл сууда эригичтиги – 1200 г.

30°C да KNO_3 түн 1000 мл сууда эригичтиги – 700 г.

Чөкмөгө чөккөн туздун массасын эсептейбиз:

$$m(\text{KNO}_3) = 1200 \text{ г} - 700 \text{ г} = 500 \text{ г.}$$

Жооп: KNO_3 түн каныккан эритмесин 60°C наан 30°C на чейин муздатканда 500 г туз чөгөт.

лат. Демек белгилүү шартта 100 грамм эриткичте каныккан эритмени пайда кылганга чейин эриген заттын санын ошол заттын эригичтиги деп айтса болот. Эгерде 100 г сууда 10 г дан ашык зат эрисе ал жакшы эриген зат, 1 г дан азыраак эрисе, ал начар эриген зат, эгерде эритмеге 0,01 г зат өтсө, эрибеген зат деп атоого болот.

Катуу заттардын эригичтигинин температурага көзкарандылыгын эригичтиктин ийри сыйыктары көрсөтөт (1-сүрөт).

Көпчүлүк катуу заттардын эригичтиги температура жогорулаганда көбөйөт. Эригичтиктин ийри сыйыктары боюнча төмөнкүлөрдү аныктоого болот: 1) заттардын ар

- ? 1. Гидраттар жана сольваттар деп эмнелер аталаат?
 2. Гидратташуу жана сольваташуу деген эмнэ?
 3. Кандай эритмелер каныккан жана кандай эритмелер каныкпаган эритмелер деп аталаат?
 4. Эригичтиктин коэффициенти эмнени көрсөтөт?
 5. Эригичтиги боюнча заттар кандай бөлүнөт?
 6. Заттардын эригичтиги кандай факторлорго көзкаранды?
 7. Эригичтиктин ийри сыйыгы эмнени көрсөтөт?

- ⌂ 1. Аммоний хлоридинин NH_4Cl 20°C, 60°C, 90°C да эригичтигин аныкта-
 гыла.
 2. 0°C да күмүш нитратынын AgNO_3 , жез сульфатынын CuSO_4 , натрий
 хлоридинин NaCl эригичтигин тапкыла.
 3. 20°C да натрий бромидинин эригичтиги 47,5 г, 20°C да 900 г сууда бул
 туздун кандай массасын эритүүгө болот?
 4. 20°C да 200 г массага ээ болгон натрий хлоридинин каныккан эритме-
 син буулантканда 52,64 г туз алышат. 20°C да натрий хлоридинин суу-
 дагы эригичтигин табуу керек.

§ 3. Эритмелердин концентрациясы

Эритмелерди сапаттык жактан мүнөздөө үчүн «суюлтулган эритме» (эриген заты аз) жана «концентрацияланган эритме» (эриген заты көп) деген түшүнүктөр колдонулат.

Эритмелер менен иштөөдө алардын сандык курамын билүү керек.

● **Белгилүү өлчөмдөгү эритмедеги эрип жүргөн заттын саны ошол эритменин концентрациясы деп аталаат.**

Эритмелердин сандык курамдары түрдүү жолдор менен туунтулат. Биз алардын ичинен эриген заттын массалык үлүшү жана молярдык концентрация (молярдуулук) түшүнүктөрүн окуп үйрөнөбүз.

● **Эриген заттын массасынын эритменин массасына болгон катышы эриген заттын массалык үлүшү деп аталаат:**

$$\omega(\text{заттын}) = \frac{m(\text{заттын})}{m(\text{эрименин})}.$$


Мында ω – бирдиктүндөн үлүшү менен туунтулган эриген заттын массалык үлүшү;

$m(\text{заттын})$ – эриген заттын массасы, г;

$m(\text{эрименин})$ – эритменин массасы, г.

Массалык үлүштү % менен да туунтса болот:

$$\omega\%(\text{заттын}) = \frac{m(\text{заттын})}{m(\text{эрименин})} \cdot 100\%.$$



2-сүрөт. Эритменин тыгыздығын ареометр менен өлчөө.

- Эриген заттын процент менен туюнтулган массалық үлүшү проценттик концентрация деп аталат.

Тактап айтканда жұз грамм эритмеде эрип жүргөн заттын саны ошол эритменин проценттик концентрациясы деп аталат.

Мисалы, натрий хлоридинин суу эритмесинде анын массалық үлүшү 10% те 0,1. Бул 100 г массадагы эритмеде 10 г натрийдин хлориди жана 90 г суу бар дегенді билдирет.

$$m \text{ (эритменин)} = m \text{ (эриткичтин)} + m \text{ (эриген заттын)}:$$

$$(эритменин) m = \rho \cdot V.$$

Мында V – эритменин көлемү, мл;
 ρ – эритменин тыгыздығы, г/мл.

Эриген заттын массалық үлүшү ар түрдүү болгон суу эритмелеринин белгилүү бир температурадагы тыгыздығы ар кыл болот. Эритмелердин тыгыздығы ареометр менен өлчөнөт (2-сүрөт).

- Молярдык концентрация бир литр эритмедеги эриген заттын молдук санын көрсөтөт.

Молярдык концентрацияны төмөнкү формула боюнча аныктаса болот:

$$C = \frac{n}{V}.$$

Мында C – молярдык концентрация, моль/л;

n – эриген заттын саны, моль;

V – эритменин көлемү, л.

2-таблица

Молярдык концентрация C , моль/л	Молярдуулуктун белгиси	Эритменин аты
1	1 м	Бир молдук (молдук)
0,5	0,5 м	Жарым молдук
0,1	0,1 м	Децимолдук
0,01	0,01 м	Сантимолдук
0,001	0,001 м	Миллимолдук

Практикада $m = \rho \cdot V$ формуласын колдонуу менен эритменин белгилүү тыгыздығы боюнча концентрацияны туюнтуунун бир жолунан экинчисине өтүп турушат.

Типтүү маселелерди чыгаруу

1-маселе. Массасы 100 г эритмеде 20 г барий хлориди кармалып жүрөт. Эритмедеги барий хлоридинин массалык үлүшү кандай?

Берилди: m (эритменин)=100 г m (BaCl ₂)=20 г	ω (BaCl ₂) – ?
--	----------------------------

Чыгаруу: Барий хлоридинин массалык үлүшү, анын массасынын эритменин массасына болгон катышына барабар:

$$\omega(\text{BaCl}_2) = \frac{m(\text{BaCl}_2)}{m(\text{эрите})} = \frac{20\text{г}}{100\text{г}} = 0,2.$$

Жооп: ω (BaCl₂)=0,2 же 20%.

2-маселе. Массасы 20 г сууда 5 г кантты эритишкен. Эритмеги канттын массалык үлүшүн (%) эсептегиле.

$\omega\%(\text{канттын}) = \frac{m(\text{канттын})}{m(\text{эрите})} \cdot 100\%;$	$\omega\%(\text{канттын}) = \frac{5\text{ г} \cdot 100\%}{25\text{ г}} = 20\%.$
---	---

Жооп: ω% (канттын)=20%.

3-маселе. 500 мл көлөмдөгү эритмеде 5 г NaOH бар болсо, бул эритменин молярдык концентрациясын аныктоо керек.

Берилди: Эритменин (V)=500 мл=0,5 л m (NaOH)=5 г	C (NaOH) – ?
--	--------------

Чыгаруу: 5 г натрий гидроксидиндеги (NaOH) молдун санын (n) табуу керек:

$$n(\text{NaOH}) = \frac{m(\text{NaOH})}{M(\text{NaOH})}; \quad M(\text{NaOH})=40 \text{ г/моль};$$

$$n(\text{NaOH}) = \frac{5 \text{ г}}{40 \text{ г/моль}} = 0,125 \text{ моль.}$$

Эритменин молярдык концентрациясын аныктайбыз:

$$C = \frac{n}{V}; \quad C = \frac{0,125 \text{ моль}}{0,5 \text{ л}} = 0,25 \text{ моль/л.}$$

Жооп: Натрий гидроксидинин молярдык концентрациясы 0,25 моль/л ге барабар.

- ?
- Кандай эритмелер суюлтулган эритме жана концентрацияланган эритме деп аталат?
 - Эриген заттын массалык үлүшү деп эмнени айтабыз?
 - Эриген заттын массалык үлүшүн жана эритменин массасын кандай формулалар менен эсептөөгө болот?
 - Молярдык концентрация эмнени көрсөтөт?
 - Молярдык концентрацияны кандай формула аркылуу эсептесе болот?


- ?
- Йоддун массалык үлүшү 5% болгон 300 г эритме даярдоо үчүн йоддун жана спирттин канчадан массасы керек?
 - 0,5 кг кантты 3 л сууга эриткенде, эритмедеги канттын массалык үлүшү (%) канча болот?
 - Тыгыздыгы ($\rho=1,19$) жана массалык үлүшү 36% болгон хлордуу суутек кислотасынын молярдык концентрациясын тап.
 - Массалык үлүшү 14% болгон 120 г кайнатма туздун эритмесине 180 мл суу кошулган. Алынган эритмедеги кайнатма туздун массалык үлүшү (%) кандай?
 - Эгерде 200 мл эритмеде 12,6 г HNO_3 бар болсо, эритменин молярдык концентрациясы канча болот?

§ 4. Реакциянын продуктусун чөкмөгө айлантуу

Электролиттердин (кислоталардын, негиздердин, туздардын) сууда эригичтиги бирдей болбайт. Жакшы эрий турган эки башка электролиттердин эритмелерин аралаштырганда, начарыраак эрий турган зат эритмеде чөгүшү мүмкүн.


- Эриткичте аз эрий турган заттардын пайда болушу менен жүргөн иондук реакциялар чөкмө чөктүрүүчү реакциялар болуп саналат.

Пайда болгон заттын эригичтиги канчалык төмөн болсо, эритмеде ал заттын эркин иондору ошончолук аз болот, демек реакция оңой менен кайталанбайт, башкача айтканда кайра тескери жүрбейт. Мисалы,




Күмүш (I) хлоридинин эригичтиги $\approx 1 \cdot 10^{-5}$ моль/л. 0,01 М күмүш (I) нитратынын жана натрий хлоридинин эритмелерин аралаштыргандан кийинки эритмеде Ag^+ жана Cl^- иондорунун концентрациясы өтө төмөн болот, анткени ал иондордун көпчүлүк бөлүгү $\text{AgCl} \downarrow$ чөкмөсүнө өтөт.

Күмүш (I) хлоридин AgCl жакшы эрий турган башка реагенттерден да алса болот:




Аналитикалык химияда AgCl чөкмөсүнүн пайда болушу күмүштүн (I) катиондорун, ошондой эле хлордун иондорун аныктоодо колдонулат. Эритмеде Ag^+ катиондору бар экендигин аныкташ үчүн суюлтулган NaCl эритмесинен бир нече тамчы тамчылаттуу керек, эгерде эритмеде Cl^- иондору бар экенин аныктоо зарыл болсо, суюлтулган AgNO_3 эритмесинен бир нече тамчы кошушат.

Түк эрибей турган барий сульфатынын BaSO_4 пайда болушун (анын эригичтиги күмүш хлориди сыйктуу өтө төмөн) кенири таралган дагы бир сапаттык реакция деп эсептөөгө болот. Ал реакциянын төндемеси төмөнкүчө жазылат:



же кыскача иондук төндемеси:



BaSO_4 чөкмөсүн алуу реакциясы эритмедеги барийдин катионун, ошондой эле сульфат ионун аныктоо үчүн да колдонулат.

- ?
- 1. Кандай реакциялар чөкмө пайда кылуучу реакциялар деп аталат?
- 2. Чөкмө пайда кылуучу реакциялар химияда кандай максаттарда колдонулат?
- 3. Сапаттык реакциялар деп кандай реакциялар аталат?

§ 5. Эригичтиктин жылуулугу

1887-жылы Д. И. Менделеев эритмелердин химиялык (гидраттык) теориясын иштеп чыгуу менен, эрүү процессинин химиялык мүнөзү жөнүндөгү идеяны биринчи болуп айткан.

Эрүү процессинин физикалык-химиялык мүнөздөмөсү болуп, эрүү убагында бөлүнүп чыккан же синирилип алынган жылуулук эффекти саналат.

- Эрүүнүн жылуулук эффекти физикалык жана химиялык процесстердин жылуулук эффектилеринин суммасына барабар.

Эгерде гидратташуунун (солватташуунун) натыйжасында заттын структурасынын бузулушунан синирилип алынган жылуулуктан көбүрөөк жылуулук бөлүнсө, анда эрүү экзотермиялык процесс болот. Мисалы, төмөнкү заттар – NaOH , AgNO_3 , H_2SO_4 , ZnSO_4 ж.б. сууда эригенде жылуулук бөлүнүп чыгат.

Эгерде заттын структурасын бузууга гидратташуу учурунда пайда болгон жылуулуктан көп жылуулук сарпалса, анда

эрүү эндотермиялык процесс болот. Мындаид процес NaNO₃, KCl, K₂SO₄, KNO₃, NH₄Cl ж.б. заттар сууда эригенде байкалат.

Жогоруда айтылгандарды теренирээк өздөштүрүш үчүн төмөнкү мисалдарды каратыбыз.

Катуу натрий гидроксидин (NaOH) же концентрацияланган күкүрт кислотасын сууда эриткенде өтө көп жылуулук бөлүнүп чыгат (3-сүрөт).

Күкүрт кислотасын өтө чебердик менен ысытуу зарыл. Анткени, температура көтөрүлгөндүктөн, суунун бир бөлүгү бууга айланып, анын басымынын алдында кислота идиштен чачырап кетиши мүмкүн. Ошондуктан, күкүрт кислотасын сууга өтө ичке агым менен чубуртуп куюу зарыл, куюоп жатканда аралыштырып турруу керек. Тескерисинче кислотага сууну куюуга эч болбойт!


Эгерде, силерге биология курсунан жана жашоо-турмушта белгилүү болгон аммиак селитрасын (аммоний нитратын) сууда эритсе, өтө муздай тургандыгы байкалат, ал эле эмес, аммиак селитрасы эритилген стакан тонуп, тактайга жабышып калат (4-сүрөт).

Эмне үчүн заттар эригенде, айрым учурларда ысуу, ал эми башка учурларда муздоо пайда болот?


Катуу заттарды эриткенде алардын кристаллдык торчолору бузулат да, пайда болгон бөлүкчөлөр эриткичин молекуларынын арасында таралат. Бул учурда керектүү энергия сырттан сицирилип алынат да, муздоого алып келет. Бул белгиси боюнча эрүү процессин физикалык кубулуш катары эсептесе да болот.

Силерге белгилүү болгондой, жылуулуктун бөлүнүп чыгышы – химиялык реакциянын белгиси. Демек, эрүү убагында химиялык реакция да жүрөт.

Мисалы, күкүрт кислотасынын молекулалары суунун молекулалары менен



3-сүрөт. Күкүрт кислотасын сууда эриткенде ысып кетиши.



4-сүрөт. Айрым заттарды сууда эриткенде муздашы.

аракеттенишип, $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (күкүрт кислотасынын моногидраты) жана $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (күкүрт кислотасынын дигидраты) сыйктуу бирикмелерди пайда кылат, мындайча айтканда күкүрт кислотасынын молекуласы суунун бир же эки молекуласын кошуп алат.

• Күкүрт кислотасынын суу менен аракеттениши гидратташуу реакциясына кирет, ал эми бул учурда пайда болгон заттар гидраттар деп аталат.


Келтирилген мисалдарда көрүнгөндөй, катуу заттарды сууда эриткенде физикалык кубулуш менен катар химиялык процесс да жүрөт.

Демек, эрүү – бул физикалык-химикалык процесс.

- ? 1. Эрүү кандай кубулуш, физикалыкпыш же химиялыкпыш?
- 2. Эрүүнүн жылуулук эффекти эмнеге барабар?
- 3. Эрүү учурунда байкалуучу кандай кубулушту экзотермиялык, кандай кубулушту эндотермиялык процесс деп эсептөөгө болот?
- 4. Кандай заттар эригенде жылуулук бөлүнүп чыгат, кайсы учурда синирип алганы байкалат?
- 5. Күкүрт кислотасын сууда эритүүдө кандай кубулуш жүрөт? Кандай коопсуздук эрежесин колдонуу керек?
- 6. Эмне үчүн айрым катуу заттар эригенде муздоого алып келет?
- 7. Эмне үчүн айрым заттар эригенде ысууга алып келет?
- 8. Эрүү кандай процесс?


§ 6. Суу – эриткич. Иондордун гидратташуусу. Катиондор жана аниондор

Эмне үчүн суу эриткич экенин түшүнүү үчүн анын түзүлүшүн карайбыз. Суунун молекуласы кычкылтектин атомунун р-электрондорунун суутектин эки атомунун s-электрондору менен жупташуусунун эсебинен пайда болот. Эки атом суутек бир атом кычкылтек менен бурчу 105° ка барабар болгон уч бурчтукту пайда кылат. Ошентип, суунун молекуласында эки түрдүү заряддагы уюлдар болот. Алардын бири терс (анын себеби эркин электрондор жайгашкан жерде электрондук жыштыктын тыгыз болгондугу) жана экинчиси протондор жайгашкан жерде он заряддуу. Аны схема түрүндө төмөнкүчө көрсөтсө болот:



Суунун молекуласы жалпы жонунан нейтралдуу түзүлүшкө ээ жана 2 уюлдуу – терс жана он. Мындаи түзүлүштөгү молекулалар уюлдуу деп аталышат. Суунун молекуласында 2 жуп эркин электрондор болгондуктан, суу реакцияга жөндөмдүү.

Сууну эриткич катары караган убакта, суунун молекуласындағы суутектин жана қычкылтектин атомдорунун ортосунда коваленттүү күчтүү уюлдуу байланыштар бар экенин эске алуу керек. Ошол себептүү натрий хлоридинин молекулаларын сууда эриткенде суу өзүнүн терс уюлдары менен натрийдин он заряддалган иондоруна, ал эми он уюлдары менен терс заряддалган хлор иондоруна тартылышат. Натыйжада иондордун ортосундагы байланыш начарлайт жана кристаллдык торчо бузулат да, гидратталган иондор пайда болот (5-сүрөт).



5-сүрөт. Натрий хлоридинин сууда эрүү механизми.


а) – суунун уюлдуу молекулаларынын натрий хлоридинин кристаллдык торчосуна тартылыши жана таасир этиши.

б) – натрийдин жана хлордун гидратталган иондорунун пайда болушу.

Бул процесске суунун диэлектрик касиети түрткү болот, ал 20°C да 81ге барабар. Сууда иондордун арасындагы байланыш вакуумга салыштырмалуу 81 эсе начарлайт.


Коваленттүү күчтүү уюлдуу байланышы бар заттарды сууда эриткенде, мисалы, хлордуу суутекти (HCl), химиялык байланыштын мүнөзү өзгөрөт, мындаайча айтканда суунун уюлдуу молекулаларынын таасири менен бөлүкчөлөрдүн бөлүнүш процесси 6-сүрөттө көрсөтүлгөндөй өтөт.

- Иондор – заряддалган бөлүкчөлөр («ион» деген сөз грекчеден киторгондо «кыңдырып жүрүүчү» дегендиги билдириет).



6-сүрөт. Уюлдуу байланышы бар заттардын суу эритмесинде иондордун гидратталышы жана ажыраши.

Суутектин иону да гидратташат: ал суунун бир молекуласы менен гидроксонийдин гидратташкан ионун пайда кылат:



Демек, суу эритмелеринде суутектин бош иондору жок, гидроксоний иондору гана бар, бирок аны жөнөкөйлөтүп H^+ символу менен жазышат. Дээрлик бардык иондор өзгөрүлмөлүү куралдагы гидраттарды пайда кылат, бирок аларды суунун молекуласы жок эле символ менен белгилешет.

Электролиттердин эритмелеринде же балкып эриген эритмесинде иондор баш-аламан кыймылдашат. Эритме же балкып эриген зат аркылуу электр агымы өткөрүлсө, он заряддалган бөлүкчөлөр терс заряддалган электродду карай (катодду), ал эми терс заряддалган иондор он заряддалган электродду (анодду) карай жылышат.

● **Ошондуктан он заряддалган иондор катиондор деп, терс заряддалган иондор аниондор деп аталышат.**

Катиондорго төмөнкү иондор кирет: суутек иону H^+ , аммоний иону NH_4^+ , металлдардын иондору Na^+ , K^+ , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Al^{3+} , негиздик туздардын катиондору CuOH^+ , Al(OH)_2^+ , FeOH^{2+} ж.б.

Аниондорго төмөнкү иондор кирет: гидроксид иону (OH^-), кислота калдыктарынын иондору (Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$), кычкыл туздардын аниондору HCO_3^- , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} ж. б.

- ? 1. Кайсы касиети боюнча суу эриткич болуп саналат?
- 2. Кандай себептен натрий хлоридиндеги натрий менен хлордун ортосундагы байланыш начарлайт, кристаллдык торчо бузулат?
- 3. Гидратталган иондор кантит пайда болот?
- 4. Коваленттүү күчтүү уюлдуу байланыштагы заттарды сууда эриткенде химиялык байланыштын мүнөзү кандай өзгөрөт?
- 5. Иондор кандай бөлүкчөлөр?
- 6. Иондор эмне үчүн катиондор, аниондор деп аталышат?



Гидроксоний иону кантит пайда болот жана аны жөнөкөйлөтүп, кандай символ менен белгилешет?

§ 7. Электролиттер жана электролит эместер

Заттар сууда гана эрибестен, башка эриткичтерде – керосинде, бензинде, спиртте да эрийт. Органикалық әмес заттардын негизги класстарына кирген айрым заттардын (кислоталардын, же гичтердин, туздардын) суусуз эритмелеринин касиеттерин суу эритмелеринин касиеттерине салыштырганда айырма бар экендиги байкалат.

Жегичтердин суу эритмелеринин таасиринде фенолфталеин күлгүн кызыл түскө өтөт. Кислоталардын эритмелеринен металлдар суутекти сүрүп чыгарат. Туздардын эритмелеринде активдүү металлдар активсиз металлдардын ордун ээлейт. Заттардын негизги класстарына кирген заттарды суудан башка эриткичтерде эриткөндө жогорудагы касиеттерин көрсөтпөйт. Ақиташты керосиндин жана бензиндин аралашмасында эриткөндө фенолфталеин өзүнүн түсүн өзгөртпөйт. Эгерде ал эритмеге бир нече тамчы сууну тамыза күлгүн кызыл түс пайда болот.

Цинкти суусуз күкүрт кислотасына салганда суутек бөлүнбөйт, ал эми кислотанын суу эритмесине салганда суутек активдүү бөлүнөт. Эгерде жез хлоридин суусузданырса жана аны суусуз органикалық эриткичте (ацетондо) эритсе, эритме күрөң түскө боёлот. Бул эритмеге темир буюмду салганда анын бетинде жез бөлүнбөйт. Ушул эле эритмеге бир аз суу кошкондо темир буюм жез менен капитлат.


Бул заттардын суу эритмелери башка суусуз эритмелерден айырмаланып, электр ағымын өткөрүү касиетине ээ болушат.



- Суда эриген эритмелери же балкып эриген эритмелери электр ағымын өткөрүүчү заттар – электролиттер деп аталат.

Электролиттердин молекулаларында иондук же күчтүү уюлдуу химиялык байланыштар бар.

- Эритмелери же балкып эриген эритмелери электр ағымын өткөрбөгөн заттар электролит эместер деп аталат.


Заттардын суу эритмелеринин (электролиттердин) касиеттерин 1887-жылы швед окумуштуусу Сванте Аррениус түшүндүргөн, ал электролиттик диссоциация теориясын иштеп чыккан. Ал боюнча электролиттер суу эритмесинде суунун молекулаларынын таасири менен заряддалган бөлүкчөлөргө – иондорго ажырайт. Бул теория көптөгөн тажрыйбалар менен далилденген. Туздардын, кислоталардын, негиздердин суу эритмелеринде иондордун пайда болушу ушул заттардын суунун таасири менен ажырашына байланыштуу:






Органикалык эриткичтерде (бензинде, керосинде ж.б.) диссоциация жүрбөйт, анткени бул эриткичтердин молекулалары уюлдуу эмес – алар эрүүчү заттардын иондоруна таасир этпейт жана алар менен аракеттенишпейт.


Айрым заттардын суунун таасири менен иондорго ажырашы жөнүндө сөз болду. Ал эми ошол процесстерде суунун молекулалары кандай өзгөрүгө учурай тургандыгын карайлы. Мисалы, төмөнкү реакцияда суу кислотадан суутектин бир ионун кошуп алат:



Ушундай эле процесс суунун эки молекуласы кагылышканда да жүрүшү мүмкүн:



Бул жазууну жөнөкөйлөтүп, реакциянын тенденциинин он жана сол жагынан суунун бирден молекуласын кемитсек, суунун иондорун төмөнкүчө жазууга болот:




Бул реакцияларды кароодо эки суроо туулат: биринчи суроо – эгерде сууда иондор болсо, анда эмне үчүн суу электролит эмес?

Көрсө, суунун ар миллиард (1 000 000 000) молекуласынан эки гана молекула диссоциацияланат экен, ошондуктан эритмеде иондор өтө аз болот, алар электр агымын ташып жүрүүгө же-тишсиз. Суу – өтө начар электролит. Суунун бул касиети менен дагы көп жолу кездешебиз. Суунун ар бир молекуласы иондорго ажырашы мүмкүн. Бирок бул процесс чанда гана жүрөт, анткени процесстин кайталанма жүрүшү – иондордун жолугушуп, молекула түзүшү көбүрөөк болот:



Сууда тен салмактуулук пайда болот, ал төмөнкүчө жазылат:



Сууда иондорго караганда молекулалар көп, ошондуктан бул тен салмактуулук солду карай багытталгандыгы менен мунөздөлөт.

Мындай кайталануу, башкача айтканда бир эле мезгилде диссоциациянын жана ассоциациянын болушу амфолиттерге мунөздүү.

- Бир эле мезгилде эритмеге суутектин H^+ жана гидроксил OH^- иондорун берүү менен (реагентке жараша) кислоталардын жана негиздердин касиеттерин көрсөткөн химиялык бирикмелер амфолиттер деп аталат. Алардын жаратылышта мааниси чоң, мисалы, белокторду пайда кылуучу аминокислоталар амфолиттер болушат.
- Суу – начар электролит. Таза сууда тен салмактуулук болуп турат:



H_3O^+ ионунун пайда болушу суунун кислоталар классына, ал эми OH^- негиздер классына кире тургандыгын аныктайт. Демек, суу – амфолит.

- Бир эле мезгилде кислоталык жана негиздик топтору бар заттар (биполярдуу) амфолиттер деп аталат. Заттар pH чөйрөсүнө жараша же кислоталардын, же негиздердин касиеттерине ээ.


Начар электролиттин диссоциациясы – кайталанма процесс, карама-каршы жебе менен \rightleftharpoons белгиленет. Күчтүү электролиттер эритмеде толук диссоциациялангандаштын, алардын диссоциациясы кайталанбоочу болуп саналат.

- ? 1. Электролиттер деп кандай заттарды аташат?
- ? 2. Кандай заттар электролит эместер болушат?
- ▣ 3. Электролиттердин касиеттерин кайсы окумуштуу түшүндүргөн?
- ▣ 4. Кислоталардын, негиздердин, туздардын эритмелеринде иондордун пайда болушу эмнеге байланыштуу?
5. Электролиттер менен аракеттенишкөнде суунун молекулалары кандай өзгөрүүгө учуртайт?
6. Суунун эки молекуласы кагылышканда кандай процесс жүрөт?
7. Эмне үчүн суу электролит эмес?
8. Амфолиттер деп кандай заттар аталат?
9. Эмне үчүн суу амфолиттерге кирет?
10. Кандай процесс кайталанма процесс болот, кайсы белги менен белгilenет?


§ 8. Кристаллогидраттар

Эрүүнүн татаал физикалык жана химиялык процесс экендиgi, эриттүүчү заттардын эрүүчү заттар менен өзара аракеттениши жөнүндө жогорку темаларда каралды. Эгерде эриткич суу болсо, эрүүчү зат менен гидраттарды пайда кыларын билдик. Эми гидраттар боюнча түшүнүктөрүбүздү көнөйтебиз.


Айрым заттардын гидраттарын алардын эритмелерин буулантуу менен бөлүп алууга болот. Мисалы,



Бул көк түстөгү кристаллдык зат кандай зат жана кантип пайда болот? Жез сульфатын (II) сууда эриткенде ал иондорго ажырайт:



Пайда болгон иондор суунун молекулалары менен өзара аракеттенишет:



Эритмени буулантуунун натыйжасында жез (II) сульфатынын кристаллогидраты пайда болот – $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

- Курамында суунун молекулалары бар кристаллдык заттар кристаллогидраттар деп аталат.
- Кристаллогидраттын курамына кирген суу кристаллдашкан суу деп аталат.

Кристаллогидраттарга мисалдар:



7-сүрөт. Кристаллогидраттар.

- ? 1. Гидраттар (сольваттар) деген кандай заттар? Гидратташуу (сольваташуу) кандайча жүрөт?
 2. Кандай заттар кристаллогидраттар деп аталат? Мисал келтиргилем.
 3. Эритмелердин химиялык (гидраттык) теориясын ким жана качан ачкан?

1. Жез купоросундагы, глаубер тузундагы, англис тузундагы кристаллдашкан суунун массалык үлүшүн (%) аныктагыла.
 2. 6,44 г глаубер тузунан $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ канча массадагы суусуз натрий сульфатын алууга болот?
 3. 56,8 г суусуз натрий сульфаты менен канча массадагы суу кошулат?
 4. 80 г жез (II) сульфатын алуу үчүн канча массадагы жез купоросу керек?

§ 9. Суутектик көрсөткүч жөнүндө түшүнүк

Стакандардын бириндеги сууга бир аз сандагы күчтүү кислота, ал эми экинчисиндеги сууга жегич кошуп, суу диссоциацияланганда пайда болгон иондордун (H^+ жана OH^-) концентрацияларын карайбыз.

Таза суудагы H^+ жана OH^- иондорунун концентрациялары барабар. Эмне үчүн? Эске түшүргүлө. Кислотаны кошуу H^+ иондорунун концентрациясын жогорулатат. Бул учурда алар суудагы OH^- иондору менен байланышат да, сууну (H_2O) пайда кылат. Демек, гидроксид иондорунун концентрациясы өтө төмөндөйт. Бирок таптакыр жок калбайт. Суунун диссоциацияга учураган молекуласы болот.

Ушундай эле кубулуш сууга жегичти кошкондо да байкалат: гидроксид иондордун концентрациясы жогорулайт жана (таза сууга салыштырмалуу) суутек иондорунун концентрациясы төмөндөйт.

Кислота канчалык көп кошулса, эритменин кычкылдыгы канчалык жогору болсо, эритмеде H^+ иондору ошончолук көп болот жана OH^- иондору азаят. Тескериисинче, эритмеге жегичти кошкондо H^+ иондору аз болот да, OH^- иондору көбөйөт. Нейтралдуу эритмеде бул иондор бирине барабар болот.

Ошол эле убакта, ар кандай суу эритмесинде кислотанын же жегичтин бар же жок экендигине байланышсыз H^+ жана OH^- иондору бар; алардын саны (концентрациясы) боюнча эритменин кислоталуулугу же щелочтуулугу аныкталат.

Практикада эритмедеги суутектин иондорунун концентрациясы «суутектик көрсөткүч» менен бааланат. Ал pH (p-e-ash деп окулат) менен белгиленет.

З-таблицада практикада колдонулган эритмелердин суутектик көрсөткүчтөрүнүн мааниси көлтирилген.

3-т а б л и ц а

Айрым эритмелердин суутектик көрсөткүчтөрүнүн (pH) мааниси

Эритме	pH мааниси	Эритме	pH мааниси
1	2	3	4
Өндүрүштүк концентрацияланган туз кислотасы (37%)	-1,1	Кара кофе Заара Суу	5,0 6,0 7,0
Суюлтуулган туз кислотасы 1:10	0,0	Жаш Кан	7,0 7,4

3-таблица (уландысы)

1	2	3	4
Ашқазан ширеси	1,4	Ичеги ширеси	8,3
Лимон ширеси	2,1	Аш содасынын эритмеси (1% NaHCO ₃)	8,5
Тамак-аш уксусу (6%)	2,3	Соданын эритмеси (1% Na ₂ CO ₃)	11,6
Алма ширеси (антоновка)	2,5	Нашатырь спирти	11,9
Алма ширеси (коричный сорту)	3,7	Акиташ суусу	12,9
Козукулак ширеси	3,7	Натрий кычкылынын гидратынын сүолтүлгөн эритмеси (4%)	14,0
Көмүртек (IV) оксидинин каныккан эритмеси (P=1 атм)	3,7	Натрий гидроксидинин каныккан эритмеси (53%)	15
Томат ширеси	4,1		

● pH – чөйрөнүн кычкылдуулугун көрсөтө турган суутектика көрсөткүч.

4-таблицада топурактын айрым айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө зарыл болгон оптимальдуу кычкылдуулугу берилген. Таблицадан көрүнүп тургандай оптимальдуу pH 7ге жакын.

Күлдөнгөн кыртышта буудайга Караганда кара буудай жакшы өсөрү таблицадан көрүнүп турат.

4-таблица

Айрым маданий өсүмдүктөр үчүн топурактагы pH мааниси

Өсүмдүк	pH оптимальдуу мааниси	pH маанилеринин аралыгында өсөт жана өнүгтөт
Люпин	4–5	4–6
Картешкө	5	4–8
Сулуу	5–6	4–8
Кара буудай	5–6	4–7
Зыгыр	5–6	4–7
Буурчак	6–7	5–8
Буудай	6–7	5–8
Кызылча	7	6–8
Беде	7–8	6–8

pH тын мааниси, мындайча айтканда суутек иондорунун эритмелердеги концентрациясы химиялык (агрохимиялык, гидрохимиялык ж.б.) лабораторияларда pH-метр деп аталуучу куралдын жардамы менен аныкталат. Окуп үйрөнүү максатында жана жакындастылган баа берүү учун индикаторлор менен чектелсе болот. 5-таблицаны карагыла. Анда эритмелердин сiler аныктоого туура келген pH маанилерин баалоо учун жеткиликтүү маалымат бар.

5-таблица

Кислоталык-негиздик индикаторлордун түстөрү

Индикатор	Түстүн езгөрүүсү учун өтүү pH тын мааниси	Индикатордун чөйрөдөгү түсү		
		кычкыл	нейтралдуу	щелочтуу
Метилоранж	4	кызыл	сары кызыл	сары
Лакмус	7	кызыл	сыя көк	көк
Фенолфталеин	9	түссүз	түссүз	кулгүн кызыл

Булардан башка да индикаторлор бар. Практика жүзүндө кандай гана эритме болбосун анын pH маанисин аныктоого болот. Силерге берилген индикаторлордун жардамы менен төмөнкү заттардын суулуу эритмелеринин pH ын аныктагыла (баалагыла): туз, құқұрт, уксус, көмүр, лимон ж.б. кислоталардын, натрий, кальций, аммоний гидрокычкылдарынын, натрий хлоридинин, калий сульфатынын, натрий карбонатынын, темир (III) хлоридинин, жез (II) сульфатынын.

Аныктоонун натыйжаларын 6-таблицанын үлгүсүндө түзгүлө.

6-таблица

Түрдүү эритмелердин pH маанилери

Зат	Индикатордун түсү жана pH тын аныктоо			Эритменин pH мааниси
	Метилоранж	Лакмус	Фенолфталеин	
KCl	сары кызыл pH>4	сыя көк pH~7	түссүз pH<9	-7
H ₃ PO ₄	кызыл pH<4	кызыл pH<7	түссүз pH<9	<4

- ? 1. Кайсы эритмелердин суутектик көрсөткүчүн аныктоо мүмкүн болбоду? Эмне учун?
- 2. Кычкыл жана щелочтуу эритмелердин суутектик көрсөткүчү pH 7ден чонбу же кичинеби?

3. pH кислотанын же жегичтин концентрациясына көз карандыбы?
4. Кислоталар жана жегичтердин гана эритмелеринде pH≠7бы?
5. Туздардын эритмелеринин суутектик көрсөткүчтөрү эмнеге барабар:
а) 7ге; б) 7ден чон; в) 7ден кичине.
(Эгерде жооп бере албасаңар 26-беттеги 6-таблицаны көнүл коюп каратып, жооп бергиле).




Стакандагы чайдын pH ынын өзгөрүүсү менен түсү кандай өзгөрөт?
Кислота катары уксус, лимон кислоталарын, ал эми негиз катары нашпатыр спиртин же соданы алгыла. Кургак чайды аз салуу менен «коую» чай алса болобу? Чайды индикатор деп эсептесе болобу?

§ 10. Электролиттик диссоциация

Эритмелердин жана туздардын, кислоталардын жана негиздердин электр агымын өткөрүүсүн түшүндүрүү үчүн швед окумуштуусу С. Аррениус (1887-ж.) электролиттик диссоциация теориясын түзгөн.

Бул теориянын бириңчи жобосу: электролиттердин молекулалары эригенде же балкып эригенде иондорго ажырайт.


- Электролиттердин молекулаларынын эритмеде же балкып эригенде иондорго ажыроо процесси электролиттик диссоциация же иондошуу деп аталат.
- Иондор – он же терс зарядга ээ болгон атомдор же атомдордун тобу.



Экинчи жобосу менен § 6 да кездешкенсинар. Электролиттердин эритмелеринде же эритиндилиеринде иондор башаламан кыймылда болушат.

Үчүнчү жобосу: диссоциация – кайталанма процесс. Демек, эки карама-каршы процесс бир эле мезгилде жүрөт: молекулалардын иондорго ажырашы (иондошуу же диссоциация) жана иондордун молекулага биригиши (ассоциация же моляризация).

Электролиттердин молекулаларынын диссоциациясы тенде-ме түрүндө берилет, барабардыктын ордуна кайталанмалуулук белгиси \rightleftharpoons коюлат. Тенденциин сол жагына электролиттик диссоциация процессинде пайда болгон электролиттин молекуласынын формуласы, ал эми он жагына иондордун формулалары жазылат. Мисалы,



Магний нитратынын ар бир молекуласы магний ионуна жана эки нитрат ионуна диссоциацияланат. Демек, диссоциацияның на-тыйжасында $Mg(NO_3)_2$ нин бир молекуласынан үч ион пайда болот.

- Катиондордун заряддарынын жалпы суммасы аниондордун заряддарынын жалпы суммасына барабар жана белгилери буюнча карама-каршы (анткени электролиттердин эритмелири электр нейтралдуу).

С. Аррениустун электролиттик диссоциация теориясынын негизин түзгөн идеялары ошол мезгилдин ири окумуштуулары тарабынан туура кабыл алынган эмес. Мисалы, С. Аррениус диссертациялык ишин коргоп жатканда академик П. Т. Клеве төмөнкүчө каршы сүйлөгөн: «Бул таза фантазия! Калий эритмеси эркин болушу мүмкүнбү? Калий суу менен күчтүү реакцияга кире тургандыгын ар бир окуучу билет да...». Анын идеялары толук женгенге, таанылганга чейин көп жылдар өткөн. Электролиттер жаатындагы изилдөөлөрү үчүн С. Аррениус 1903-жылы Нобель сыйлыгына татыктуу болгон.

Электролиттик диссоциация механизми эрий турган заттардын молекулаларынын же кристаллдарынын эриткичин молекулаларынын таасири менен иондорго ажырашы – көптөгөн окумуштуулардын, алардын ичинен орус окумуштуулары В. А. Кистяковскийдин жана И. А. Каблуковдордун изилдөөлөрүнүн натыйжасында түшүндүрүлгөн.

§ 11. Кислоталардын, негиздердин, туздардын диссоциациясы

Кислоталар жана негиздер жөнүндө түшүнүктөр химияга, флогистон теориясы пайда болгонго чейин эле Р. Бойль тарабынан киргизилген. Ал мезгилде кислоталарга жана негиздерге алардын касиеттерине байкоо жүргүзүүнүн негизинде аныктама берилген. Суутекти карман жүргөн, металлдар менен өзара аракеттенишкенде суутекти белүп чыгарган, лакмусту кызарткан, кычкыл даамга ээ бирикмелер кислоталар деп аталган. Ал эми негиздерге кислоталарды нейтралдаштырган, лакмусту көк түскө келтирген, даамы ачуу, самындай илээшкек бирикмелерди киргизишкен.


Электролиттик диссоциация теориясынын ачылышы бул аныктамаларды кайрадан карап чыгууга алып келди.

Бирикмелердин эритмедеги электролиттик диссоциациясын эске алуу менен С. Аррениус кислоталарга жана негиздерге жаны аныктама берген.


- Кислота деп диссоциация учурунда эритмеде суутек иондорун пайда кылуучу зат аталат.

Бул аныктамага ылайык кислоталарга төмөнкү заттарды киргизсе болот: HCl , HNO_3 , H_2SO_4 , H_2CO_3 , H_3PO_4 ж.б.

Бардык эрий турган кислоталар суу эритмесинде суутек иондоруна жана кислота калдыктарына ажырайт:




Көп негиздүү кислоталар баскыч боюнча ажырашат:



HSO_4^- – иондору иондорго толук ажырабайт, ошондуктан кара-ма-каршы белги \rightleftharpoons коюлуп, ал белги H^+ жана SO_4^{2-} иондору биригип, кайра HSO_4^- ионун пайда кыла тургандыгын көрсөтөт. Мындай процесстерди кайталанма деп аташат. Эгерде иондорго ажыроо ылдамдыгы алгачкы ион пайда болуу ылдамдыгынан чоң болсо, анда диссоциация процесси онго карай жылды деп, ал эми тескериинче болсо солго карай жылды деп айтылат.

Бардык эрий турган негиздер суу эритмелеринде терс заряддалган гидроксид иондоруна жана металлдардын он заряддалган иондоруна ажырашат. Мисалы,




- Диссоциация учурунда суу эритмелеринде анион катары гидроксид иондору гана бөлүнгөн татаал заттар негиздер деп аталат.

Эритмелеринде гидроксид иондорунун болушу негиздердин жалпы касиеттерин мүнөздөйт.


Орто жана кычкыл туздар иондорго бирдей ажырабайт.

Орто туздар иондорго төмөнкүчө ажырашат:



- Суу эритмелеринде металлдардын он заряддалган иондоруна жана кислота калдыктарынын терс заряддалган иондоруна ажыраган татаал заттар орто туздар деп аталат.

Кычкыл туздардын диссоциациясы эки баскычта жүрөт:



- Сүү эритмелеринде металлдардын оң заряддалган иондоруна жана терс заряддалган кислота калдыктарына ажыраган татаал заттар кычкыл түздар деп аталат.
- Электролиттерге мұнәздүү болгон жалпы химиялық касиеттер 7-таблицада көрсөтүлгөн.

7-таблица

Электролиттик диссоциация теориясы боюнча кислоталардын, негиздердин жана түздардын касиеттері

Электролиттер	Мұнәздүү жалпы иондору	Мұнәздүү касиеттері
Кислоталар	H ⁺	Индикаторлорго таасир этишет жана OH ⁻ иондору менен аракеттенишип, сууну пайда кылат: H ⁺ +OH ⁻ →H ₂ O
Негиздер	OH ⁻	Индикаторлорго таасир этишет, H ⁺ иондору менен аракеттенишип, сууну пайда кылат: OH ⁻ +H ⁺ →H ₂ O
Түздар	Жалпы иондору жок	Жалпы иондору болбогондугуна байланыштуу жалпы касиеттери жок

- ? 1. Электролиттик диссоциация теориясынын негизги жоболору кандай? Аныктамаларын бергиле.
2. С. Аррениустун, И. А. Каблуковдун жана В. А. Кистяковскийдин изилдөөлөрүнө кыскача мұнәздемө бергиле.
3. Диссоциация, ассоциация деген әмне?
4. Әмне үчүн электролиттердин эритмелери электр нейтралдуу?
5. Электролиттик диссоциация көзкарашынан кислоталарга, негиздерге, орто жана кычкыл түздарга аныктама бергиле.
- ◻ 1. Жөнөкөй жана татаал иондорго мисалдар келтиргиле.
2. Гидроксоний иону кандай ион, ал кантит пайда болот?
3. Орто фосфор кислотасынын, калий гидроксидинин жана алюминий сульфатынын диссоциациясын жазыла.
4. Нобель сыйлыгы жөнүндө әмнелерди билесинер?

§ 12. Диссоциация даражасы. Күчтүү жана начар электролиттер

Айрым электролиттер суу эритмесинде иондорго ажырайт. Башка бирөөлөрү иондорго толук ажырабайт, алардын бир бөлүгү ажырабаган боюнча эритмеде калат.

- Иондорго ажыраган молекулалардын бөлүгүн көрсөтүүчү сан электролиттик диссоциация даражасы (иондошуу даражасы) деп аталат.

Электролиттик диссоциация даражасы иондорго ажыраган молекулалардын санынын эритмедеги жалпы молекулалардын санына болгон катышына барабар. Төмөнкү формула менен берилет:

$$a = \frac{n}{N} \cdot 100\%$$

Мында a – электролиттик диссоциация даражасы;

n – иондорго ажыраган молекулалардын саны;

N – эриген молекулалардын жалпы саны.

Мисалы, уксус кислотасынын CH_3COOH диссоциация даражасы (a) 0,1 М. Эритмеде 1,36% ке ээ. Демек, уксус кислотасындағы CH_3COOH 10000 молекуладан 136 молекула төмөнкү тенденце буюнча иондорго ажырайт:



Диссоциация даражасы эриткичин жана эриген заттын табиятына, концентрациясына, температурага жана башка факторлорго кезкаранды.

pH көрсөткүчү ар кыл заттар ар кандай даражада диссоциацияланат. Мисалы, бирдей шартта кумурска кислотасынын HCOOH диссоциация даражасы уксус кислотасынын CH_3COOH диссоциация даражасынан чоң.

Электролиттин концентрациясын төмөндөткөндө, мындаicha айтканда суюлтканда, диссоциация даражасы чоноёт, анткени эритмедеги иондордун аралыгы чоноёт да, алардын бири-бири менен молекуланы пайда кылуу мүмкүнчүлүгү төмөндөйт.

Температуралы жогорулатканда диссоциация даражасы адаттагыдан көбөйөт.

Диссоциация даражасына ылайык электролиттер күчтүү жана начар болуп бөлүнүштөт.

- Суу эритмесинде диссоциацияга толук ажыраган, мындаicha айтканда диссоциация даражасы 1ге (100%) барабар болгон электролиттер күчтүү электролиттер деп аталат.

Күчтүү электролиттерге төмөнкүлөр кирет:

- 1) туздар; 2) күчтүү кислоталар (HClO_4 , HClO_3 , HNO_3 , H_2SO_4 , HCl , HBr , HI ж.б.); 3) жегичтер (NaOH , KOH , CsOH , RbOH , Sr(OH)_2 , LiOH).

- Суу эритмелеринде диссоциацияга толук ажырабаган, мындаicha айтканда диссоциация даражасы бирден аз болгон электролиттер начар электролиттер болушат.

Начар электролиттерге төмөнкүлөр кирет: 1) начар кислоталар (HClO_2 , HClO , HNO_2 , H_2SO_3 , H_2CO_3 , H_2SiO_3 , H_3PO_4 , H_3PO_3 , H_3BO_3 , CH_3COOH , H_2S , HCN , HF ж.б.); 2) сууда эрибеген начар

негиздер (Fe(OH)_2 , Pb(OH)_2 , Cu(OH)_2 ж.б.); 3) аммоний гидроксиidi (NH_4OH); суу (H_2O).

- ? 1. Электролиттик диссоциация даражасы деген әмне? Ал әмнеге байланыштуу?
2. Кайсы учурда электролиттин электролиттик диссоциация даражасы чоноёт?
3. Құттық электролиттер деп кандай электролиттер аталат? Аларга кайсы заттар кирет?
4. Начар электролиттер деп кандай электролиттер аталат? Аларга кайсы заттар кирет?
-  1. Эмне үчүн құқырт кислотасынын суу эритмеси электр ағымын откөзөрүн, ал әми суусуз құқырт кислотасы откөзбей тургандыгын түшүндүргүлө.
2. Төмөнкү суюктуктардын кайсынысы электр ағымын откөрет, себебин түшүндүргүлө: этил спирти, глюказанын суу эритмеси, азоттун суу эритмеси, натрий сульфатынын суу эритмеси, кристаллдык жез (II) сульфаты, калий гидрокычкылынын эритиндиси?
3. Төмөнкү белүкчөлөрдүн окшоштуктары жана айырмачылыктары әмнеде: а) K^0 жана K^+ , б) Br^0 жана Br^- , в) S^0 жана S^{2-} , г) SO_3 жана SO_3^{2-} , д) NO_2 жана NO_2^- ? Бул белүкчөлөр кандай аталат?
4. Төмөнкү иондордун кайсылары катиондор жана кайсылары аниондор: Al^{3+} , Sr^{2+} , F^- , NO_3^- , Mn^{2+} , Pb^{2+} , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , Rb^+ ?
5. Фосфор кислотасын 3 эссе суюлтушкан. Кислотанын диссоциация даражасы азаябы же көбейөбү?
6. Калий фторидинин сууда эриткенде пайда болгон гидратташкан иондорунун схемасын түзгүлө.
7. Суу эритмесинде бромдуу суутектин гидратташкан иондорунун схемасын түзгүлө.
8. Суу эритмелеринде төмөнкү иондор кармалып жүргөн: а) Fe^{3+} жана SO_4^{2-} ; б) Mn^{2+} жана Cl^- ; в) Na^+ жана MnO_4^- ; г) K^+ жана CrO_4^{2-} ; д) Fe^{2+} жана NO_3^- ; е) Ba^{2+} жана OH^- ; ж) Na^+ жана CO_3^{2-} ; з) Ca^{2+} жана NO_3^- . Электролиттердин формулаларын жазгыла.

§ 13. Ион алмашуу реакциялары

Ион алмашуу реакцияларынын жүрүү шарттарын түшүнүү үчүн иондордун негизги касиеттери менен таанышабыз. Иондор атомдордон түзүлүшү жана касиеттери боюнча айырмалана тургандыгы силерге белгилүү. Айрым иондор түссүз, ал әми айрымдары белгилүү түскө ээ. Алардын ар бирине атайдын химиялык касиеттер мүнөздүү. 8-таблицада реактивдер жана иондорго мүнөздүү реакциялар берилген.

Суу эритмелеринде электролиттер белгилүү даражада иондорго ажырайт жана алардын ортосунда реакциялар жүрөт. Мындай реакциялардын жүрүү шарттары менен тажрыйба жүзүндө таанышса болот.

Иондорду аныктоо

Аныктауучу ион	Ион кармал жүрүүчү реагент	Реакциялардын натыйжалары
H^+	Индикаторлор	Түстүн өзгөрүшү
Ag^+	Cl^-	Ак чөкмө
Cu^{2+}	OH^- S^{2-}	Көк чөкмө Кара чөкмө. Жалынды көк жашыл түскө бөйт
Fe^{2+}	OH^-	Кар сымал ак чөкмө, абада жашыл түскө айланат
Fe^{3+}	OH^-	Күрөн түстөгү чөкмө
Zn^{2+}	OH^- S^{2-}	Ак чөкмө, OH^- ашыкча болгондо эрийт Ак чөкмө
Al^{3+}	OH^-	Ак чөкмө, OH^- ашыкча болгондо эрийт
NH_4^+	OH^-	Аммиактын жыты
Ba^{2+}	SO_4^{2-}	Ак чөкмө, жалынды сары жашыл түскө бөйт
Ca^{2+}	CO_3^{2-}	Ак чөкмө, жалынды бышкан кыштын еңүндөй түскө бөйт
Na^+		Жалындын түсү сары
K^+		Жалындын түсү сия (кобальт айнеги аркылуу караганда)
Cl^-	Ag^+ , H_2SO_4 (конц.)	Ак чөкмө. Түссүз кескин жыттуу HCl пайда болот
Br^-	Ag^+ , H_2SO_4	Сарғыч чөкмө SO_2 (кескин жыт) жана Br_2 (сия түс берет) белүнөт
SO_3^{2-}	H^+	Фуксинди жана сияларды түссүздөндүрүүчү кескин жыттуу SO_2 газынын белүнүшү байкалат
CO_3^{2-}	H^+	Акиташ суусун чангылттаандыруучу жытсыз газдын белүнүшү
CH_3COO^-	H_2SO_4	Уксус кислотасынын жытынын пайда болушу
NO_3^-	H_2SO_4 (конц.), Cu	Күрөн түстөгү газдын белүнүшү
SO_4^{2-}	Ba^{2+}	Ак чөкмө
PO_4^{3-}	Ag^+	Сары чөкмө
OH^-	Индикаторлор	Индикаторлордун түстөрүнүн өзгөрүшү

1-тажрыйба. Натрий хлоридинин эритмесине күмүш (I) нитратынын же коргошун (II) нитратынын эритмесин куюшат. Реакциянын натыйжасында чөкмө чөгөт.


2-тажрыйба. Натрий карбонатынын эритмесине туз кислотасын куюу керек. Реакциянын натыйжасында газ бөлүнүп чыгат.

3-тажрыйба. Азот кислотасынын эритмесине калий гидроксидин кошушат. Натыйжада жылуулук бөлүнүп чыгат.


* Галоген иондорун H_2SO_4 түн жардамы менен аныктоодо курсак туз колдонулат.

4-тажрыйба. Магний хлоридинин жана натрий сульфатынын эритмелерин аралаштырганда химиялык реакциянын эч кандай белгилери байкалбайт.


Мындай реакциялардын жүрүүсүндө кандай закон ченемдүүлүктөр бар? Аны түшүнүү үчүн жогорку тажрыйбаларда жүрүүчү реакциялардын молекулалык гана эмес, толук иондук жана кыскартылган иондук тенденмелерин да жазабыз:



Реакциянын натыйжасында чөкмө пайдала болот.



Реакциянын натыйжасында газ пайдала болот.



Реакциянын натыйжасында диссоциацияга аз ажыраган зат – суу пайдала болот.

Кыскартылган иондук тенденмелер кайсы иондордун ортосунда реакция жүрө тургандыгын көрсөтөт.

- ? 1. Төмөнкү реакциялардын толук жана кыскартылган иондук тенденмелерин жазыгла, тендергиле:
- $Ca(NO_3)_2 + K_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 + KNO_3$
 - $Na_2CO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$
 - $Na_2SiO_3 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaSiO_3 + NaOH$


- г) $\text{FeSO}_4 + \text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4$
 д) $\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$
 е) $\text{MgCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
 ж) $\text{AlCl}_3 + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Al}(\text{NO}_3)_3 + \text{AgCl}$

2. Төмөнкү заттардын ортосундагы химиялык реакциялардын молекулярдык, толук жана кыскартылган иондук тенденциелерин түзгүлө:
- | | |
|---|--|
| а) KOH жана MgCl_2 | д) RbOH жана HNO_3 |
| б) NaOH жана H_2SO_4 | е) Na_2SO_4 жана BaCl_2 |
| в) K_2S жана HCl | ж) Na_2CO_3 жана HCl |
| г) CH_3COONa жана H_2SO_4 | |
- Кайсы реакциялар кайталанма? Кайсы реакциялар кайталанбас?
3. Иондук тенденциелери көлтирилген төмөнкү реакциялардын молекулярдык тенденциелерин түзгүлө:
- | | |
|--|--|
| а) $\text{Zn}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{ZnS}$ | д) $\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- = \text{Fe}(\text{OH})_3$ |
| б) $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ = \text{CH}_3\text{COOH}$ | е) $\text{PbS} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{S} + \text{Pb}$ |
| в) $\text{Zn}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Zn}(\text{OH})_2$ | ж) $\text{H}^+ + \text{CN}^- = \text{HCN}$ |
| г) $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ | з) $\text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{H}^+ = \text{Mg}(\text{OH})^+ + \text{H}_2\text{O}$ |

§ 14. Туздардын гидролизи

Гидролиз (гректиң *hydor* – суу жана *lysis* – ажыроо, эрүү, айрылуу, суу менен биригүү деген сөздөрүнөн алынган) – алмашуу реакциясы (алмашуу аркылуу ажыроо). Гидролиз көптөгөн технологиялык жана жаратылыш процесстеринин негизи болуп саналат.

Эгерде алюминий хлоридинин AlCl_3 эритмесине индикатордун эритмесин кошсо, анда эритменин суутектик көрсөткүчү $\text{pH} < 7$ экендигин тактоого болот. Бул көрсөткүч эритмеде H^+ иондору OH^- иондорунан көбүрөөк дегенди билдирет. Аны төмөнкүчө жазса болот:



Чарчы кашаалар «концентрация» деген сөздү алмаштырат. Эмне үчүн мындай болорун тактайлы. Туздун диссоциациясы эритмедеги $[\text{H}^+]$ иондорунун концентрациясын өзгөрүүгө алыш келбейт:




Суутек иондору H^+ суунун диссоциациясынын натыйжаласында пайдала болот:



Эгерде эритмеде $[\text{H}^+] \neq [\text{OH}^-]$ болсо, анда туз суунун диссоциациясынын тен салмактуулугуна таасир этет. Туз таасир этпейт,


андан пайда болгон иондор таасир этет. Экөө бирдей таасир этибі? – деген суроо туулат.

Al^{3+} катиону OH^- аниону менен биригиши мүмкүн:



Биригишеби? Электролит эритмесинде реакцияның жүрүү шартын әске түшүрөлтү. Газ жок, чөкмө жок. Алюминий гидроксиди $\text{Al}(\text{OH})_3$ күчтүү электролитпи же начар электролитпи? Сөзсүз начар электролит. Күчтүү негиздерди – жегичтерди I жана II топтордун негизги топчолорунун элементтери пайда кылат. Ал эми алюминий кайсы топко кирет? $\text{Al}(\text{OH})_3$ – начар диссоциациялана турган зат. Ал эми $\text{Al}(\text{OH})_2^+$ жана AlOH^{2+} андан дагы начар диссоциацияланышат, ошондуктан ушул иондор эритмеде болушат, $\text{Al}(\text{OH})_3$ пайда болуу реакциясы ишке ашат. Анын натыйжасы болуп OH^- иондорунун концентрациясынын төмөндөшү эсептелет. Демек, суутектин иондорунун H^+ концентрациялары $[\text{OH}^-]$ иондорунукунан жогорулайт, андыктан $\text{pH} < 7$ болот.


Cl^- ионун әсиңерге салгыла. Анын суутек иону менен өзара аракеттенишин төмөнкүчө белгилейли:



Бирок HCl – күчтүү кислота, суу эритмесинде ал молекула түрүндө болбайт. Мындај реакция жүргөйт, ошондуктан реакциянын жазылышы тырмакчага алынган.

- Туздардын суу менен өзара аракеттенишип, чейрөнү өзгөртүү менен жүргөн реакциясы гидролиз реакциясы деп аталат.

Гидролиз реакциялары кайталанма, жогоруда каралган мисалдагы OH^- иону начар электролиттердин H_2O же AlOH^{2+} курмдарына кирет. Ошондуктан реакциянын төндемесин төмөнкүчө жазуу керек:




Демек, туздун катиону начар электролитти (начар негизди) пайда кылса, анда туздун эритмесинин суутектик көрсөткүчү $\text{pH} < 7$ болот, мындаайча айтканда кычкыл болот.

Башка бир учур. Туздун аниону начар электролитти (начар кислотаны) пайда кылат. Мисалы, натрий карбонатынын (содалынын) эритмесинде $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 2\text{Na}^+ + \text{CO}_3^{2-}$ болот.

Натрий иону Na^+ суу менен аракеттенишпейт, анткени NaOH^- жегич – күчтүү электролит.

Карбонат иону суу менен аракеттенишет, анткени көмүр кислотасы H_2CO_3 начар кислота, аз диссоциацияланат:



Соданын эритмесинде $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$ $\text{pH} > 7$. (Текшергиле!). Катиондун гидролизиндей эле аниондун гидролизи да кайталанма. Бул жерде начар электролиттер – суу жана кислота.

✳ Туздардын иондорунун суу менен өзара аракеттенишип, чейрөнү өзгөртүү менен жүргөн реакциясы туздардын гидролизи деп аталат.

Эгерде туз же начар негизден, же начар кислотадан, же начар негиз жана начар кислотадан (бир эле мезгилде) пайда болсо гидролизге учурайт.

- ? 1. Төмөнкү туздардын суу эритмелеринин суутектик көрсөткүчүн $\text{pH} (\geq)$ көрсөткүлө: FeCl_3 , FeCl_2 , CuSO_4 , CaCl_2 , Na_2S , K_2CO_3 , Na_2SO_4 .
- 2. Жыгачтын күлүн курамы поташтан жана калий карбонатынан турган калий жер семирткичи катары колдонууга болот. Аны кандай жер кыртышына (кычкылдуубу же щелочтуубу?) колдонуу керек?
- 3. ئىمدىكىردىز زىيانكەچىردىن ساڭتۇرىنىدا جەز كۈپۈرسۈنۈن (جەز سۇلىفەتىنىنى) эритмесى колдонулат. بىرۇق аны بۇйدۇن колдонуугا بولбойт. Алدى менен ага ئۇچۇرۇلگەن اكتاشتى $\text{Ca}(\text{OH})_2$ кошуп, «Бордосс суюктۇгу» داýрдалات. Эмне үчүн эритmedegi жەز سۇلىفەتى نېيىرىنىنى ئەرىدى?
- 4. Самын эн начар органикалык кислотанын натрий тuzu болуп саналат. Эгерде кислотаны RCOOH деп белгилесек, анда самындын формуласы RCOO^- . Самындын эритмесинде натрийдин гидроксиди бар делет. Ал кайдан келген?



Төмөнкү бирикмелердин электролиттеринин күчтөрүн (диссоциацияга жөндөмдүүлүгүн) салыштыргыла:
 AlOH^{2+} , $\text{Al}(\text{OH})_2^+$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, H_2CO_3 , HCO_3^- .

§ 15. Сапаттык реакциялар жөнүндө түшүнүктөр

✳ Заттардын же алардын аралашмаларынын сапаттык жана сандык курамын, башкача айтканда заттын (же заттардын аралашмаларынын) кандай элементтерден жана алардын ар биригинин, канча экендигин аныктоого мүмкүндүк берген химиялык процесс химиялык анализ деп аталат. Химиялык анализ эки түрдүү болот – сапаттык анализ жана сандык анализ. Сапаттык жана сандык анализ аналитикалык химиянын эки бөлүгү болуп саналат.

Сапаттык анализди – сапаттык реакция деп дагы атоого болот. Сапаттык анализ – аналитикалык химиянын изилденүүчү заттарда же алардын аралашмаларында кандай элементтер (ион-

өткөрүмдүүлүгүн сыноо. Кургак электроддорду ичинде ар кандай заттар бар идиштерге матыргыла: а) натрий хлоридинин кургак тузуна; б) кристаллдык натрий гидроксиди салынган фарфор идишке; в) балкыган натрий гидроксиди бар фарфор идишке.


3. Концентрацияланган жана суюлтулган эритмелердин электр өткөрүмдүүлүгүн сыноо. Куралдын электроддорун кезеги менен а) суусуз уксус кислотасы, б) суюлтулган уксус кислотасы бар идиштерге матыргыла.

1-тапшырма. Эмне үчүн дистирленген суу, кургак натрий хлориди жана кристаллдык натрий гидроксиди электр ағымын өткөрбөйт, ал эми бул заттардын эритмелери жана балкыган эритмелери электр ағымдарын өткөрүшшөт?

2-тапшырма. Эмне үчүн суусуз уксус кислотасы электр ағымын өткөрбөйт, ал эми суу менен суюлтканда өткөрөт?

II. Электр талаасында иондордун кыймылы.

Сүттек иондорунун H^+ жана гидроксил иондорунун OH^- электр талаасында жылышы. 10% натрий хлориди жана 4% желатини бар эритме даярдагыла. Желатин толук эрисин үчүн эритмени ысыткыла. Жылуу эритмеге бир нече тамчы лакмусту (же метилоранжды) кошуп, эритмени 9-сүрөттөгүдөй куралга идиштери белгилүү өлчөмдө толгудай куйгула.



9-сүрөт. Электр талаасында иондордун жылышын текшерүүчү курал.

түскө) өзгөртөт. Терс заряддалган гидроксил иондору анодго жылышы, жылган сайын эритмени көк түске боёт.

1-тапшырма. Бул тажрыйбанын негизинде сүттек H^+ жана гидроксил OH^- иондорунун жылышы боюнча кандай корутунду чыгарууга болот?

2-тапшырма. Эгерде эритмеге лакмустун ордуна метилоранжды кошсо эритменин түсү кандай өзгөрөт?

III. Электролиттердин эритмелеринин ортосундагы ион алмашуу реакциялары.

1. Чөкмө пайда болуу менен жүрүүчү реакциялар. Бир пробиркага 3–4 мл жез (II) сульфатынын, экинчисине ошончо эле кальций хлоридинин, үчүнчүсүнө алюминий сульфатынын эритмелерин куйгула. Бириң-

Муздатканда эритме килкилдеп калат. Андан кийин муздаган эритменин үстүнө 1-идишке натрий гидроксидин, ал эми 2-идишке – туз кислотасын куюу керек.

1-идишке турактуу ток булагынан терс электродду (катодду), ал эми 2-идишке он электродду (анодду) матыргыла.

Чынжырды туюктаганда сүүтектин он иондору H^+ катодду карай жылышы, жылган сайын лакмустун түсүн (кызыл

түскө) өзгөртөт. Терс заряддалган гидроксил иондору анодго жылышы, жылган сайын эритмени көк түске боёт.

1-тапшырма. Бул тажрыйбанын негизинде сүттек H^+ жана гидроксил OH^- иондорунун жылышы боюнча кандай корутунду чыгарууга болот?

2-тапшырма. Эгерде эритмеге лакмустун ордуна метилоранжды кошсо эритменин түсү кандай өзгөрөт?

III. Электролиттердин эритмелеринин ортосундагы ион алмашуу реакциялары.

1. Чөкмө пайда болуу менен жүрүүчү реакциялар. Бир пробиркага 3–4 мл жез (II) сульфатынын, экинчисине ошончо эле кальций хлоридинин, үчүнчүсүнө алюминий сульфатынын эритмелерин куйгула. Бириң-

чи пробиркага бир аз натрий гидроксидинин, экинчисине натрий ортофосфатынын эритмесин, ал эми үчүнчүсүнө барий нитратынын эритмесин кошкула. Бардык пробиркаларда чөкмө пайда болот.

1-тапшырма. Реакциялардын молекулалық, толук иондук жана кыскартылган иондук тенденмелерин түзгүлө. Эмне үчүн чөкмөлөр пайда болгондугун түшүндүргүлө. Дагы кайсы заттардын эритмелерин кошкондо чөкмөлөр пайда болот? Бул реакциялардын да молекулалық, толук иондук жана кыскартылган иондук тенденмелерин түзгүлө.

2. Газ белүнүп чыгуу менен журуучу реакциялар. Бир пробиркага 3–4 мл натрий сульфатынын эритмесин, экинчисине ошончо эле көлөмдөгү натрий карбонатын куйгула. Алардын ар бирине ошончо өлчөмдөгү күкүрт кислотасын кошкула. Биринчи пробиркадан кескин жыттуу газ белүнүп чыгат, экинчисинен жытсыз газ белүнөт.

2-тапшырма. Жүрө турган реакциялардын молекулалық, иондук, кыскартылган иондук тенденмелерин түзгүлө. Жогорку пробиркалардагы заттарга дагы кайсы кислоталардын эритмелери менен таасир эткенде ушундай эле натыйжалар алынат.

Бул реакциялардын да молекулалық, иондук жана кыскартылган иондук тенденмелерин түзгүлө.

3. Аз диссоциациялана турган зат пайда болуу менен жүргөн реакциялар. Бир пробиркага 3–4 мл натрий гидроксидин куюп, ага 2–3 тамчы фенолфталеин кошкула. Эритме күлгүн кызыл түскө келет. Андан кийин эритме түссүздөнгө чейин туз же күкүрт кислотасын кошуу керек.

Башка бир пробиркага болжол менен 10 мл жез (II) сульфатын куйгула жана бир аз натрий гидроксидин кошкула. Көк түстөгү жез (II) гидроксидинин чөкмөсү пайда болот. Чөкмө эригенче күкүрт кислотасын кошкула.

3-тапшырма. Жүрө турган реакциялардын молекулалық, иондук жана кыскартылган иондук тенденмелерин жазгыла. Эмне үчүн биринчи пробиркада түссүздөнүү, экинчисинде чөкмөнүн эриши жүргөнүн түшүндүргүлө. Эрий турган жана эрибей турган негиздердин кандай жалпы касиеттери бар?

4. Хлорид ионго сапаттык реакция. Бир пробиркага 1–2 мл суюлтулган туз кислотасын, экинчисине – ошончо эле натрий хлоридинин эритмесин, үчүнчүсүнө кальций хлоридин куйгула. Бардык пробиркаларга бир нече тамчы күмүш нитратын (AgNO_3) же коргошун (II) нитратын $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ кошкула. Пайда болгон чөкмө концентрацияланган азот кислотасында эрийби же эрибейби текшергиле.

4-тапшырма. Тийиштүү химиялык реакциялардын молекулалық, иондук, кыскартылган иондук тенденмелерин түзгүлө.

Кантип айырмaloого болот:

- туз кислотасын башка кислоталардан;
- хлориддерди башка туздардан;
- хлориддердин эритмелерин туз кислотасынан.

Эмне үчүн күмүш (I) нитратынын эритмесинин ордуна коргошун (II) нитратын колдонууга болот?

ПРАКТИКАЛЫК ИШ


Эксперименттик маселелерди иштөө

1. Пробиркага 1–2 мл концентрацияланган күкүрт кислотасын куюп, ага бир кесек цинкти салгыла. Реакциянын молекулалық, иондук жана кыскартылган иондук тенденмелерин жазғыла, электрондордун жылышиның көрсөткүлө жана бул реакцияда кычкылдандырыгыч әмне экендигин түшүндүргүлө.

2. Алты пробиркада магний хлориди берилген. Ар бир пробиркага акырындық менен төмөнкү эритмелерди куйгула: а) натрий гидроксидинин; б) калий сульфатынын; в) натрий карбонатынын; г) цинк нитратынын; д) калий ортофосфатынын, е) натрий сульфидинин. Аягына чейин жүргөн реакциялардын молекулалық, иондук жана кыскартылган иондук тенденмелерин түзгүлө.

3. Төмөнкү эритмелер берилген: а) калий карбонаты жана туз кислотасы; б) натрий сульфиidi жана күкүрт кислотасы; в) цинк хлориди жана азот кислотасы; г) натрий сульфиidi жана күкүрт кислотасы; д) жез (II) сульфаты жана азот кислотасы. Эки-экиден жубу менен берилген бул эритмелерди куюштургула, бир аз ысыткыла, өтө чебердик менен жыттап жана кайсы учурда реакция акырына чейин жүрөт, әмне үчүн жүрөт аныктагыла. Тийиштүү реакциялардын молекулалық, иондук жана кыскартылган иондук тенденмелерин түзгүлө.

4. Төмөнде схемалары берилген реакцияларды ишке ашыргыла:



5. Төмөнкү заттардын ортосунда реакцияларды жүргүзгүлө:

а) күкүрттүү суутектин жана хлор суусунун;

б) калий иодиди менен хлор суусунун;

в) туз кислотасы менен алюминийдин;

г) концентрацияланган күкүрт кислотасы менен жездин (ысытуу аркылуу).

Реакциялардын тенденмелерин түзгүлө, электрондордун өтүшүн көрсөткүлө. Эмне кычкылдандырыгыч, әмне калыбына келтиргич болот?

6. Столдо болгон эритмелерди пайдаланып, төмөнкүлөрдү алгыла: а) темир (III) гидроксидин; б) жез (II) сульфидин; в) күкүрт (IV) оксидин; г) магний карбонатын; д) коргошунду. Тийиштүү реакциялардын молекулалық, иондук жана кыскартылган иондук тенденмелерин түзгүлө.

§ 1. Заттардын концентрациялары жана молекулалардын кагылышуу мүмкүнчүлүктөрү

- Химиянын химиялык процесстердин ылдамдыгын жана аларга таасир этүүчү ар түрдүү факторлорду окуп-үйрөнүүчү бөлүгү химиялык кинетика деп аталат.

Айрым реакциялар, мисалы, суутек менен кычкылтек ысытууда же платинанын катышуусу менен көз ирмемде аракеттенишет. Башка реакциялар, мисалы, металлдардын коррозиясы өтө жай жүрөт. Аны изилдөө үчүн өзгөчө методдор, жогорку сезгичтиктеги аппараттар зарыл. Бир эле реакция, аны өткөрүү шарттарына байланыштуу түрдүүчө өтөт.

Температураны жогорулатуу менен көпчүлүк химиялык реакциялардын ылдамдыгы жогорулайт. Катуу заттардын катышуусу менен жүргөн реакциялардын ылдамдыгы алардын кристаллдык торчолоруна байланыштуу болот. Мисалы, никелдин монокристаллы өтө жай кычкылданат, ал эми оксалатты термиялык (ысытып) ажыратуудан алынган никелдин күкүмү (пирофорен) абада бөлмө температурасында күйөт:



Химиялык кинетикада реакциянын ылдамдыгы негизги түшүнүк болуп саналат жана ал убакыт бирдигинде өзара аракеттенишкен заттардын концентрациясынын өзгөрүшү менен аныкталат.

- Концентрация эритменин белгилүү көлөм бирдигиндеги молунун саны болуп эсептелет.

Эгерде химиялык реакцияны изилдөө процессинде 5 мүнөтте 0,1 моль зат реакцияга кире турган болсо, биз ылдамдыгын ченеген убакыттын ичинде реакциянын орточо ылдамдыгы 1 мүнөттө 0,02 моль же 10 мүнөттө 0,2 молго барабар болот.

Химиялык процесстерде реакцияга кирген баштапкы заттардын концентрациясы көбөйгөндө, ага жаразша процесстин ылдамдыгы жогорулагандыгы байкалган. Бардык заттар молеку-

ла, атом же иондордон турат. Реакцияга кирүү үчүн эки бөлүкчө жакындал, кагылышуусу керек. Муну түшүндүргөн теория кагылышуу теориясы деп аталат. Көлөм бирдигинде реакцияга киргөн бөлүкчөлөрдүн саны канчалык көп болсо, алардын ортосундагы кагылышуулардын саны да ошончолук көп болот.

Көп сандаган реакцияларды изилдөөнүн натыйжасында ачылган законченемдүүлүккө төмөнкүдөй аныктама берилген:

❶ Химиялык реакциялардын ылдамдыгы реакцияга катышкан заттардын концентрациясына пропорциялаш.

Газ абалындан дагы А жана В заттарынын ортосунда жүргөн реакцияны карап көрөлү: А жана В заттарын газдар деп эсептегилем. Эгерде химиялык реакция бирдей чөйрөнүн ортосунда өтсө, ал чайрө гомогендүү деп аталат.

❷ Гомогендүү реакциянын ылдамдыгы белгилүү убакыт жана көлөм бирдигинде өзара аракеттенишүүгө киргөн же анын натыйжасында пайда болгон заттардын саны менен өлчөнөт.

Математикалык формуланын жардамы менен жогорку аныктаманы төмөнкүчө жазууга болот:

$$v_{\text{гомог}} = \frac{\Delta v}{V \Delta t}$$

Мында $v_{\text{гомог}}$ – гомогендүү системадагы реакциянын ылдамдыгы;

v – реакцияга киргөн же пайда болгон заттардын биригинин саны;

V – көлөм;

t – убакыт.

$$\Delta v = v_2 - v_1; \quad \Delta t = t_2 - t_1$$

Химиялык реакциянын ылдамдыгынын бирдиктери: моль/см³ · мин же моль/л · с. Заттын санынын көлөмгө болгон катышы концентрацияны с билдириет, анда:

$$\frac{\Delta v}{V} = \Delta c$$

Демек,

$$v_{\text{гомог}} = -\frac{\Delta c}{\Delta t}$$

Реакцияга киргөн заттардын концентрациясын төмөндөтүү жөнүндө сөз болуп жаткандан кийин, $-\Delta c$ терс мааниси менен көрсөтүлөт. Гомогендүү реакциянын ылдамдыгы реакцияга киргөн же пайда болгон заттардын бирөөсүнүн концентрацияларын убакыт бирдигинде өзгөртүү менен аныкталат. Кагылышуу теориясына ылайык реакциянын жүрүү ылдамдыгы, биринчилен, убакыт бирдигинде кагылышкан молекулалардын, атомдордун же иондордун саны менен, экинчилен, химиялык айланышты ишке ашырган натыйжалуу кагылышуулардын үлүшү менен шартталат. Демек, өзара аракеттенишкен заттардын концентрациясы канчалык көп болсо, кагылышуулардын саны да ошончолук көп болот.

Көлөм бирдигинде А жана В заттарынын молекулаларынын саны бирдей болсо, молекулалык-кинетикалык теориянын негизинде убакыттын белгилүү бир аралыгында алардын канчасы кагылышарын эсептеп алууга болот. Реакцияга кирип жаткан А затынын молекулаларынын санын эки эсे көбөйтсөк, берилген убакыт бирдигинде А жана В заттарынын молекулаларынын кагылышы эки эсе көбейт. Тескерисинче, В затынын молекулаларын көбөйтүү дагы, А жана В заттарынын молекулаларынын кагылышуусунун көбөйшүнө алып келет.

Реакцияга катышкан заттардын концентрациясы чарчы кашаа менен белгиленерин билесинер.

M [A] – А затынын концентрациясы.

Эгерде зат газ абалында болсо, анын концентрациясын парциалдык басым (P_A) менен туюнтууга болот.

Газ абалындагы заттардын басымын жогорулатканда да реакция тездейт. Басым жогорулаганда көлөм бирдигиндеги молекулалардын саны көбейт, концентрациясы өсөт.

- ? 1. Химиянын кандай бөлүгү химиялык кинетика деп аталат?
- ? 2. Концентрация деген әмне?
- ? 3. Кагылышуу теориясы кандай теория?
- ? 4. А жана В газ абалындагы заттардын ортосундагы реакцияны кагылышуу теориясы боюнча түшүндүргүле.
- ? 5. Әмне үчүн басымды жогорулатканда газ абалындагы заттардын ортосунда реакция тез жүрөт? Түшүндүргүлө.

§ 2. Активдүү кагылышуулар

Газдардын жана суюктуктардын молекулалык-кинетикалык теориясы белгилүү шарттарда тигил же бул молекулалардын ортосундагы кагылышуу сандарын эсептөөгө мүмкүндүк берет. Мындаидай эсептөөлөрдүн натыйжаларын пайдалансак, кадимки шартта заттардын молекулаларынын ортосундагы кагылышуу сандары өтө чоң, ага ылайык бардык реакциялар көз ирмемде жүрүүсү керек эле. Бирок, бардык эле реакция мындаидай тез жүрбөйт. Өзара арақеттенишүүчү заттардын кагылышууларынын бардыгы эле реакциянын продуктусунун пайда болушуна алып келбейт деп божомолдоо менен гана бул карама-каршылыктарды түшүндүрүү мүмкүн. Реакция жүрсүн үчүн, мындаидайча айтканда, жаңы молекула пайда болуу үчүн, алды менен реакцияга кире турган заттардын молекулаларындагы атомдордун ортосундагы байланыштарды начарлатуу же үзүү зарыл. Ал үчүн белгилүү өл-

чөмдө энергия сарпталыш керек. Эгерде кагылышуучу молекулалар мындай энергияга ээ болбосо, анда кагылышуу натыйжа бербейт – жаңы молекула пайда болбойт. Эгерде кагылышуучу молекулалардын кинетикалык энергиясы байланыштарды начарлатууга же үзүүгө жетиштүү болсо, кагылышуу атомдордун кайрадан курулушуна жана жаңы заттын молекулаларынын пайда болушуна алыш келет.

- Газ үзгүлтүксүз кыймылда болгон абдан көп бөлүкчөлөрдүн топтолушуна окошо. Ошондуктан газдын мындай модели учун ар бир бөлүкчө белгилүү кыймыл энергиясына ээ болот деп кабыл алынган, ал кинетикалык энергия деп аталат.
 - Молекулалардын кагылышуусу жаңы заттын пайда болушуна алыш келүү учун зарыл болгон молекулалардын ашыкча энергиясы жүрүп жаткан реакциянын активдешүү энергиясы деп аталат. Активдешүү энергиясы $\text{kJ}/\text{моль}$ менен туюнтулат. Мындай энергияга ээ болгон молекулаларды активдүү молекулалар дешет.
 - Молекулалардын химиялык реакциянын жүрүшү учун активсиз абалдан жогорку энергиялуу абалга өтүүсү молекулалардын активдешүүсү деп аталат.
- ? 1. Реакция жүрүү учун, жаңы зат пайда болуу үчүн молекулалардагы атомдор арасында кандай өзгөрүүлөр жүрүүсү зарыл?
2. Кайсы учурда кагылышуу натыйжалуу өтөт?
3. Активдешүү энергиясы деп кандай энергияны айтышат?
4. Кандай молекулалар активдүү молекулалар деп аталат?



Гомогендүү реакцияларга мисалдарды келтирип, аларды баяндоого аракет жасагыла.

§ 3. Молекулалардын активдешүү энергиясы

Молекулалар реакцияны иш жүзүнө ашыруу жөндөмдүүлүгү боюнча экиге бөлүнөт:

- 1) активдүү молекулалар;
 - 2) активдүү эмес молекулалар.
- Энергиясы активдешүү энергиясынан жогору болгон молекулалар активдүү молекулалар деп аталат. $E_{\text{мол}} > E_{\text{акт.}}$.
 - Энергиясы активдешүү энергиясынан төмөн болгон молекулалар активдүү эмес молекулалар деп аталат. $E_{\text{мол}} < E_{\text{акт.}}$.
- Мында $E_{\text{мол}}$ – молекуланын энергиясы;
 $E_{\text{акт}}$ – активдешүү энергиясы.


Активдешүү энергиясы ($E_{\text{акт}}$) менен силер кийинки темада таанышсыңар.

Активдүү молекулалардын саны канчалык көп болсо, реакциянын ылдамдыгы ошончолук тез болот. Молекулаларды активдештируү үчүн ысытуу, нурлантуу, катализаторлоо ж.б. ыкмалар колдонулат.

- ? 1. Активдүү молекулалар деген эмне?
- 2. Активдүү эмес молекулалар деген эмне?
- 3. Молекулаларды активдештируүдө кандай ыкмалар колдонулат?

§ 4. Активдешүү энергиясы

Эгерде молекулалар кагылышар замат эле реакция жүрсө, анда атомдор дароо эле реакцияга кирген же пайда болгон заттарга караганда туруксузураак атомдордун кайра курулган тобун түзмөк. Бул молекулалардын кайра курулушу энергияяга бай болуу менен, реакцияга кирген жана пайда болгон заттардын ортосундагы энергиялык тоскоолдук болуп саналат. Реакцияга кире турган заттар кагылышууда энергиялык тоскоолдуктан өтүүгө жетиштүү болгондо гана реакция жүрөт. Ал тоскоолдук реакциянын жүрушүнө зарыл болгон минималдуу энергияны аныктайт. Ошол энергия активдешүү энергиясы деп аталат.



10-сүрөт. $\text{CO} + \text{NO}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{NO}$ реакциясы үчүн потенциалдык энергиянын диаграммасы.

Реакцияга киричүү заттар \rightarrow Активдештирилген комплекс \rightarrow Реакциянын продуктусу.

10-сүрөттөгү диаграммада горизонталдык оқ – реакциянын координатасы реакциянын жүрушүн чагылдырат. Реакциянын координатасы боюнча CO жана NO_2 молекулалары солдон онду карай жылуу менен, бири-бирине жакындашат, кагылышат да, реакциянын аралык баскычынан өтөт, ал CO_2 менен NO заттарынын пайда болуусунა, аягында акыркы эки молекулалын бөлүнүшүнө алыш келет. Вертикалдык оқ боюнча системанын жалпы потенциалдык энергиясы берилген. Ошентип, ийри сзызык, реак-

цияга алып келген кагылышуу учурундагы потенциалдык энергиянын өзгөрүсүн көрсөтөт.

Потенциалдык энергия – тынч абалда тургандағы энергия. Мисалы, учуп бараткан футбол тобунун энергиясы кинетикалык энергия, ал эми ал топтун учушунун эң бийик чекитидеги энергия – потенциалдык энергия. Бул энергиялар заттардын макроскоптук касиеттерин мұнәздөйт.

Демек макроскоптук чоңдукту өлчөөгө болот. Реакциянын жүрүшүн ишке ашыруу максатында потенциалдык энергиялык тоскоолдуктан өтүүдө кагылышуучу бөлүкчөлөрдүн кинетикалык энергиясы сарпталат. Ал температура менен аныкталат.

Ийри сызыкты бойлой солдон онду қарай ал сызыктын башынан аягына чейин эмне өзгөрүү болорун қарап көрөлү. Сол жагындағы горизонталдык бөлүгүндө CO жана NO₂ молекулалары жақындашат. Бул жерде молекулалар кинетикалык энергияга ээ болот жана алардын жалпы потенциалдык энергиясы өзгөрбөйт. Ийри сызыктын жогорулаган жери эки молекула бири-бирине таасир этүү үчүн жеткиликтүү жақындашкандастырын билгизет.

Молекулалар жақындашканда жайыраак кыймылда болот, анткени ал мезгилде алардын кинетикалык энергиясы потенциалдык энергияга өтүү менен, ийри сызыктын жогорулашына алып келет. Эгерде алардын кинетикалык энергиясы жетишерлик көп болсо, алар энергиялык тоскоолдуктур چокусуна чейинки аралыкты өтө алат. Ал эми эң жогорку чекитке жетүүнү төмөнкүчө түшүндүрүүгө болот: CO жана NO₂, алардын ядролорунун жана терс электрондук булутчаларынын өзара түртүлүү күчтөрүн жеңүүгө жетиштүү кинетикалык энергияга ээ болгондуктан, бири-бирине тыгыз жақындашат. Энергиялык тоскоолдуктур қылда چокусундагы молекулалык топтолуш туруктуу болбогондуктан, он реакция (CO₂ жана NO пайда болуучу), ошондой эле кайталаңма реакция (CO₂ жана NO пайда боло турган) жүрүшү мүмкүн. Бул пайда болгон аралык молекулалардын топтолушу чон мааниге ээ – анын потенциалдык энергиясы активдешүү энергиясын аныктайт жана активдештирилген комплекс деп аталаат.

Активдештирилген комплекстин ажырашынын эки мүмкүнчүлүгү бар: 1) реакцияга чейинки молекулалар CO жана NO₂ ийри сызыктын сол жагы боюнча өзүнүн жолун кайталоо мүмкүнчүлүгүн алышат, же CO₂ жана NO молекулаларына ажырайт; 2) ийри сызыктын он тарабы боюнча тоскоолдуктан төмөнду қарай кыймыл жасоо мүмкүнчүлүгү. Ийри сызыктын он жагынын бүткөн жеринде CO₂ менен NO молекулалары бири бирикен өтө алыш аралыкка алышташат да, өзара таасир этишпей калат, эми ак-

тивдештирилген потенциалдык энергия кайрадан кинетикалык энергияга өттү.

Эгерде, CO жана NO_2 молекулалары тоскоолдук чокусуна жетүү энергиясына ээ болбосо, алар тоскоолдукка жакын чекитке жакындашат. Өзара түртүлүшүүнүн натыйжасында алар бири-бирин алыстанап, ийри сзыяктын сол жагына кайрылышат.

Ошентип активдештирилген комплекстин жогорку потенциалдык энергиясы менен өзара аракеттенишүүчү заттардын төмөнкү энергиясынын айырмасы активдешүү энергиясы болот.

● Демек реакцияга кире турган заттардын активдештирилген комплекс абалына жетиштин зарыл болгон энергия активдешүү энергиясы болуп саналат. Бул процесс байланыштардын бошондошун же үзүлүшүн, аракеттениште турган заттардын молекулаларынын жакындашуусу түртүшүү күчүнө каршы аракет кылуу менен молекулаларда энергиянын топтолушун, ошону менен молекулалардын кагылышуудан реакцияга кирерин өзүнө камтыйт.

Температураны жогорулатканда активдештирилген комплексти түзүүгө жетиштүү болгон энергиясы бар молекулалардын кагылышуу сандарынын өсүшү менен реакциянын ылдамдыгы жогорулайт. Реакция үчүн активдешүү энергиясынын чондугу эксперимент жүзүндө температурага байланыштуу өзгөргөн реакциянын ылдамдыгын өлчөө менен аныкталат.

- ? 1. Температуранын өзгөрүүсү молекулалардын кагылышуусуна кандай таасир тийгизет?
- 2. Ар бир кагылышууну химиялык реакция жүрдү десе туурабы?
- 3. Энергиялык тоскоолдук деген кандай тоскоолдук?
- 4. Реакцияга жөндөмдүү молекулалар кандай молекулалар?
- 5. Реакциянын жүрүшүндө энергиялык тоскоолдуктан өтүү үчүн кандай энергия сарпталат?
- 6. Активдештирилген комплексти кандай түшүнөсүн?
- 7. Активдешүү энергиясы кайсы энергия?
- 8. Активдешүү энергиясынын чондугу кандайча аныкталат?




10-сүрөттөгү $\text{CO} + \text{NO} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{NO}$ реакциясы үчүн потенциалдык энергиянын диаграммасын чечмелеп, түшүндүрүүгө аракет жасагыла.

§ 5. Химиялык реакциянын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлор

Жогоруда айтылганда, химиялык реакциялар көптөгөн факторлорго, мисалы, аракеттенишүүчү заттардын концентрациясына жана температурага, катализатордун катышуусуна, реакцияга

кирүүчү катуу заттардын жана продуктулардын кристаллдык торчолоруна байланыштуу. Ушул факторлорго токтололу.

Аракеттенишүүчү заттардын табиятынын реакциянын ылдамдыгына таасирин төмөнкү эки реакцияны салыштыруунун мисалында көрсөтүүгө болот:



Биринчи реакция өтө тез жүрөт, ал эми экинчисинин ылдамдыгы төмөн. Биринчи реакцияда өзара аракеттенишүүгө эки гана ион катышат да, электрондорун алмашышат, ал эми экинчи реакцияда Fe^{2+} дун үч иону жана NO_3^- түн бир иону катышат, өзара аракеттенишүү NO_3^- ионундагы байланыштарды үзүүгө алыш келет.

Дагы бир мисалды карап көрөлү. Металлдар (калий, натрий) суу менен түрдүү ылдамдыкта аракеттенишет. Бул металлдардын суу менен аракеттенишүүсү металлдардын электрондорун беришинде, мындайча айтканда, кычкылдануусунда калийдин атомунун радиусу чоң, ошондуктан ал натрийге караганда электронун оной берет.

Эриген жана газ абалындагы заттардын химиялык реакцияларынын ылдамдыгы аракеттенишүүчү заттардын концентрациясына көзкаранды. Мисалы, заттардын күйүшү абадагыга караңда кычкылтекте активдүүрөөк жүрөт, анткени абада кычкылтектин концентрациясы 5 эсे төмөн. Реакция жүрсүн үчүн аракеттенишүүчү заттардын молекулаларынын кагылышуусу керек экендигин билебиз. Ал эми кагылышуу көлөм бирдигиндеги молекулалардын санына, мындайча айтканда концентрацияга байланыштуу.

Химиялык реакциянын ылдамдыгы температурага байланыштуу. Мисалы, көптөгөн заттар менен кычкылtek кадимки температурада эле аракеттенише баштайт, ал жай кычкылдануу деп аталат. Ал эми температураны жогорулатканда кычкылдануу ылдамдыгы кескин жогорулайт.

Молекулалардын кагылышуусу учурунда химиялык реакция жүрсүн үчүн, ал молекулар активдүү (кинетикалык энергиясы жетиштүү) болушу керек экендигин билдинер. Температураны жогорулатканда активдүү молекулалардын үлүшү да көбөйөт.

Температураны улам 10°C жогорулатканда, көпчүлүк реакциялардын ылдамдыгы 2–4 эсе жогорулайт. Аны математикалык түрдө төмөнкүчө туюнтууга болот:

$$v_{t_1} = v_{t_2} \sqrt{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

Мында v_{t_1} – реакцияның жогорку температурадагы ылдамдығы; v_{t_2} – баштапкы температурадагы ылдамдығы; v – температуралық коэффициент, анын сандық мааниси бөлчөктүү да болушу мүмкүн.

§ 6. Химиялық реакцияның ылдамдығына катализаторлордун тийгизген таасири. Катализ

Өзара аракеттенишүүчү заттарды жөн эле аралаштырып койгондо, реакция өтө жай жүрүшү мүмкүн. Айрым учурда дагы бир башка затты кошуу менен реакцияның ылдамдығын естүрүүгө болот. Ал заттар катализаторлор деп аталат. Реакция учурунда катализаторлор сарпталбайт. Катализаторлор аракеттенишүүчү заттар менен аралық продуктуларды пайда кылышы мүмкүн, бирок реакцияның акыркы продуктуларына кирбейт. Кенири колдонулуучу катализаторлор болуп металлдар (Pt , Pd , Ni , Co , Fe), оксиддер (V_2O_5 , MnO_2 , Cr_2O_3 , NiO), сульфиддер (MoS_2 , WS_2 , CoS) ж.б. заттар саналат.

Көпчүлүк учурда катализаторлор реакцияның жүрүшүн ылдамдатат, айрымдары тескерисинче процесстин жүрүшүн жайларатат.


- Катализатордун катышуусу менен химиялық реакцияның ылдам жүрүшү катализ деп аталат. Ал эми жай жүрүшү ингибирлештируү деп аталат.**

Катализ – химияның жана химиялық технологияның эн негизги бөлүгү. Гректин «*katalysis*» – «бузулуу» деген сөзүнөн алынган. Демек катализ – катализатордун катышуусу менен химиялық реакцияның ылдамдығының өзгөрүшү. Катализ он болушу мүмкүн (әгер реакцияның ылдамдығы жогоруласа) жана терс болушу да мүмкүн (әгерде химиялық реакцияның ылдамдығы төмөндөсө же таптакыр токтоп калса).

Катализ кубулушу жаратылышта кенен таркалган, техникада да колдонулат (мисалы, күкүрт кислотасын, аммиакты, азот кислотасын ж.б. продуктуларды өндүрүүдө).

Әгерде оозу ачык идиштеги концентрацияланган аммиактын суу әритмесине алдынала ысытылган платина зымын салса, ал андан дагы ысык болуп, көпкө чейин чоктой кызарып турат.

Платинаның жогорку температурасын кармап турган энергия кайдан алынат? деген суроо туулат. Платинаның катышуусу менен аммиак абадагы кычкылтектен өзара аракеттенишет да, күчтүү экзотермиялық реакция жүрөт.




Платинанын катышуусу менен реакция жүрүп жаткан учурда бөлүнгөн жылуулук катализатордун жогорку температурасын кармап турат.

Катализ теориясынын эң негизги маселелеринен болуп, катализдик таасирдин табияты жөнүндөгү маселе саналат. Ал таасир химиялық өзара аракеттенишүүдө катализатордун активдүү катышуусунда химиялық процесстин активдешүү энергиясынын төмөндөшүнө байланыштуу.

Энергиялык тоскоолдуук эң жогору болгондуктан, А жана В заттарынын ортосундагы реакция эң төмөнкү ылдамдыкта жүрөт деп эсептейли. Эгерде үчүнчү зат К (катализатор) табылса, анда ал реакцияга киришүү заттардын бирөө менен (мисалы А), аралык бирикме АКны пайда кылат. АК болсо В заты менен тез аракеттенишет да, керектүү зат АВ алынат, катализатор продуктудан ажырайт. Мындаайча айтканда түз жүрүүчү реакция (1) кийинки эки реакция (2), (3) менен алмашат:



(2), (3) реакциялар да энергиялык тоскоолдуктардан өтүшү керек (эсинерге түшүргүлө), бирок алар 1-энергиялык тоскоолдуктан азыраак. Химиялық реакциянын энергиясына катализатордун тийгизген таасири 11-сүрөттө көрсөтүлгөн.



11-сүрөт. Катализатордун катышуусундагы $\text{A} + \text{B} = \text{AB}$ реакциясынын энергиясы.

Катализдин гомогендүү жана гетерогендүү деп аталган эки түрү бар. Гомогендүү катализ учурунда реакцияга киришүү заттар, продуктулар, катализатор бирдей фазада (газ же суюктук) болушат.

Гетерогендик катализ учурунда катализаторлор катуу заттар болот, реакцияга кирүүчү заттар жана продуктулар башка ар түрдүү фазада болушат.

№	Катализ	Агрегаттык абалы
1	Гомогендүү	Реакцияга кирүүчү заттар менен катализатордун агрегаттык абалы бирдей болот. $2\text{SO}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} \xrightleftharpoons{\text{NO}_\text{г}} 2\text{SO}_{3(\text{г})}$
2	Гетерогендүү	Реакцияга кирүүчү заттар менен катализатордун абалдары ар башка болот. $2\text{NH}_{3(\text{г})} \xrightleftharpoons{\text{Pt}_\text{г}} \text{N}_{2(\text{г})} + 3\text{H}_{2(\text{г})}$

- ?
- Химиялык реакциялардын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлор кайсылар?
 - Активдүү молекулалардын үлүшү кайсы учурда көбейет?
 - Эриген жана газ абалындагы заттардын химиялык реакцияларынын ылдамдыгы эмнеге байланыштуу?
 - Кандай заттар катализатор деп аталат? Кайсы катализаторлорду билесинер?
 - Катализ кандай процесс?
 - Катализдин кандай түрлөрүн билесинер?


- 回家
- Молекулалардын кагылышуусу, активдүү молекулалар, энергиялык тоскоолдуктар жөнүндө маалыматтарды жыйнагыла, баяndoого аракет жасагыла.
 - Катализатордун катышуусунда реакциянын энергиясын түшүндүрүүгө даярдан. Кошумча адабияттарды окугула.

§ 7. Уланма реакциялар

- Тизмектешкен бир катар элементардык баскычтар аркылуу жүргөн процесстер уланма (чынжырлуу) реакциялар деп аталат.

Уланма реакцияларды «тизмектүү реакциялар» деп да айтып жүрөбүз.

Тизмектүү процесс активдүү бөлүкчөдөн башталат. Дүүлүккөн бөлүкчө (атом, радикал же ион) активдүү борбордун ролун аткаралат, б. а. тизмектүү реакциянын баштапкы звеносу болуп эсептөлөт. Мисалы, хлордун суутек менен өзара аракеттенишүү реакциясы төмөнкүдөй жазылат:



Бул тенденме реакциянын механизмин туюнтастан, баштапкы заттар менен реакциянын продуктусун гана көрсөтөт.


III глава

ХИМИЯЛЫК ТЕҢ САЛМАКТУУЛУК

§ 1. Кайталанма жана кайталанбоочу реакциялар

- Өзара карама-каршы багыттарда жүргөн реакциялар кайталанма реакциялар деп аталат. Бул реакцияларда реакцияга киргөн заттардан жаны продуктулар пайда болот, ал продуктулар өзара кайра аракеттенишип, кайрадан мурдагы реакцияга киргөн заттар пайда болот.

Кайталанма реакциялардын тенденциелери атайын белги \rightleftharpoons коюлуп жазылат. Мисалы,




Түздардын гидролизи да кайталанма реакцияга мисал боло алат.

Гидролиздин маңызын түшүнүү үчүн түздардын суу менен болгон аракеттенишүүсүн индикаторлордун катышуусу менен тажрийба жүзүндө текшерип көрүүгө болот.

Мисалы кайнатма туздун NaCl эритмеси индикаторлордун түсүн өзгөртпөйт. Анткени NaCl гидролизге учуррабайт. Анын негизги себеби кайнатма туз NaCl күчтүү негизден (NaOH) жана күчтүү кислотадан пайда болгон.

Кайнатма тузду сууда эриткенде: $\text{NaCl}=\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ иондорго ажырайт. Суу аз болсо дагы диссоциациялана тургандыгын билесинер: $\text{H}_2\text{O}=\text{H}^+ + \text{OH}^-$. Демек кайнатма тузду сууда эриткенде, суунун иондору менен байланыша турган иондор жок болгондуктан, чөйрө нейтралдуу болот.

Ал әми алюминий хлориди AlCl_3 күчсүз негиз жана күчтүү кислотадан пайда болгон:



Бул реакцияны кайталануучу десе болот. Анткени алюминий хлориди суу эритмесинде иондорго ажырайт:




Суунун диссоциациясы:




Мында эритмеги начар негизди пайда кыла турган Al^{3+} өзүнө OH^- ионун тартып алат, мындаайча айтканда, ал суу иондору ме-

нен аракеттенишет, натыйжада алюминий хлориди гидролизге учурайт.



Гидролиздин натыйжасында алюминийдин негиздик тузу AlOHCl_2 жана туз кислотасы HCl пайда болот, ошондуктан чөйрө күчкүл.



Натрий карбонатын сууда эритсе, ал дагы гидролизге учурайт:



Натыйжада NaHCO_3 жана NaOH пайда болот, чөйрө щелочтуу.

Гидролиз реакциясы айрым органикалык заттарга да мүнөз-дүү, мисалы, татаал эфирлерге.

Кайталанбоочу реакциялар бир гана тараапка – продуктулардын пайда болуу жагын карай жүрөт. Кайталанбоочу реакцияларга мисал – акиташ ташынын ажырашы. Газ абалындагы заттарды же оной менен эрибеген продуктуларды пайда кылуу менен жүргөн реакциялар кайталанбоочу болуп саналат:



- ?
- 1. Кандай реакциялар кайталануучу реакциялар деп аталат?
- 2. Эмне үчүн реакция эки тараапты карай жүрөт?
- 3. Кайталанбоочу реакциялар деп кандай реакциялар аталат? Аларда эмне үчүн карама-каршы жебелер коюлбайт?
- 4. Эмне үчүн туздардын гидролизи да кайталануучу реакцияларга кирет?

-  1. Кандай туздар суу менен аракеттенишип, гидролизге учурайт. Механизмин түшүндүргүлө.
- 2. Кандай туздар гидролизге учурабайт, мындайча айтканда суу менен аракеттенишлейт, эмне үчүн?
- 3. Эгерде кайнатма туз NaCl гидролизге учураса эмне болмок? Эмне үчүн кайнатма тузду кошпосо тамак ичилбейт, желбейт, жообунарды негиздегиле.

§ 2. Химиялык төң салмақтуулук

Аракеттенишүүчү заттардын концентрациясынын химиялык реакциялардын ылдамдыгына тийгизген таасири жөнүндө химиялык кинетиканын негизги законунун аныктамасы төмөнкүчө.

● Бирдей чөйрөдө өткөн химиялык реакциялардын ылдамдыгы стехиометриялык коэффициенттеринин даражасына көтөрүлгөн аракеттенишүүчү заттардын концентрациясынын туундусуна пропорционалдуу.


Математикалык жол менен аны төмөнкүчө берүүгө болот:

$$aA + bB = dD \quad v = k C_A^a \cdot C_B^b$$

Мында k -константа, ылдамдыктын константасы. Бул тенде-
ме реакциянын кинетикалык тенденции деп аталат.

Эгерде $CA=CB=1$ моль/л деп эсептелсе, ылдамдыктын констан-
тасынын физикалык маанисин аныктоого болот. Анда $k=v$, мын-
дайча айтканда ылдамдыктын константасынын саны сан жагы-
нан бирге барабар болгон белгилүү концентрациядагы заттардын
аракеттенишүү ылдамдыгына барабар.

Кайталанма процесске кененирээк токтолуу зарыл. Мисал
катары, кандайдыр бир шарттуу реакцияны карап көрөлү:



Эгерде система өзара аракеттенүүчүү таза заттардан турса, анда
химиялык кинетиканын негизги закону боюнча аракеттенишүүнүн
ылдамдыгы төмөндөгүдөй туюнтулат:

$$v = k_1 C_A^a \cdot C_B^b$$

Химиялык айлануунун негизинде, А жана В заттарынын кон-
центрациясы төмөндөйт, натыйжада онду карай жүргөн реак-
циянын ылдамдыгы да басандайт. Ошону менен бирге эле систе-
мада продуктулардын пайда болушу кайталанма реакциянын
жүрүү мүмкүнчүлүгүн белгилейт, анын ылдамдыгы $v_2 = k_2 C_C^c \cdot C_D^d$
үзгүлтүксүз жогорулайт.

Акыры барып он жакты карай жүрө турган реакциянын ыл-
дамдыгы кайталанма реакциянын ылдамдыгына барабар болуп
калган абал пайда болот.

- Системадагы онду карай жүргөн реакциянын ылдамдыгы кай-
таланма реакциянын ылдамдыгына барабар болуп калган
абал химиялык төң салмактуулук деп аталат. Аракеттенүүчүү
заттардын жана продуктулардын төң салмактуулук абалына
жооп берген концентрациялары төң салмактуулук деп аталат
жана төмөнкү символдор менен белгilenет:



Төң салмактуулук абалында $v_1 = v_2$ болгондуктан,

$$k_1 [A]^a [B]^b = k_2 [C]^c [D]^d$$

болот, мындан $K_p = \frac{k_1}{k_2} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$ келип чыгат.

- Онго жана солго карай жүргөн реакциялардын ылдамдык
константасынын катышы туруктуу чондук болот да, химия-
лык төң салмактуулук константасы деп аталат. Онду жана
солду карай жүргөн реакциялардын ылдамдыгынын констан-
тасы сыйктуу эле, химиялык төң салмактуулук константасы
да температурага көзкаранды.

Акыркы тенденме химиялык тен салмактуулук учурундагы массанын аракеттенишүү законунун математикалык туюнтулушу болуп саналат.

Мисалы, $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ процесси үчүн тен салмактуулук константасы:

$$K_p = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{NO}]^2[\text{O}_2]} \text{ болот.}$$

- ? 1. Химиялык кинетиканын негизги законунун аныктамасы кандай окулат?
- 2. Реакциянын кинетикалык тенденмеси деп кайсы тенденме аталат?
- 3. Кайталанма процесстин кандай өзгөчөлүктөрү бар?
- 4. Эгерде система таза заттардан турса, химиялык кинетиканын закону боюнча аракеттенишүүнүн ылдамдыгы кантит туюнтулат?
- 5. Кайсы учурда он жакты карай жүргөн реакциянын ылдамдыгы кайталанма реакциянын ылдамдыгына барабар болуп калат?
- 6. Химиялык тен салмактуулук деп эмнени айтабыз?
- 7. Химиялык тен салмактуулук константасына аныктама бергиле.

§ 3. Химиялык тен салмактуулукту жылдыруунун шарттары

Химиялык тен салмактуулукту динамикалык деп аташат, себеби тен салмактуулук абалында түз жана кайталанма реакциялар токтолбойт.

Сырткы шарттар өзгөрүсүз турганда, системанын тен салмактуулук абалы узакка чейин сакталат.

Аракеттенүүчү заттардын концентрацияларынын, температураларынын, басымдын (эгерде заттар газ абалында болсо) өзгөрүшү тен салмактуулуктун бузулушуна алыш келет. Тен салмактуулук бузулганды, аракеттенишүүчү заттардын концентрациялары система жаңы тен салмактуулук абалга келгенге чейин өзгөрүсүн улантат. Тен салмактуулуктун бир абалдан экинчи абалга өтүүсү тен салмактуулуктун жылышы деп аталат. Бул убакта продуктунун пайда болуусу көбөйсө, анда тен салмактуулук онду карай, эгерде ал азайса, солду карай жылат.

- Тен салмактуу системанын сырттан болгон таасирдин натыйжасында өзгөрүсү аракеттүү тен салмактуулук принциби (Ле Шателье принциби) деп аталат.
- Тен салмактуулуктагы системага сырттан болгон таасир тен салмактуулукту иштелип чыккан таасирдин натыйжалуулугу азайган тараапты карай жылдырат.

Ошентип, системага сырттан болгон таасир түз жана кайталанма процесстин ылдамдыктарынын катышына таасир этет. Сырттан болгон таасирге каршы процесске көрсөтүлгөн көмөк сыйктуу.

Ле Шателье принциби универсалдуу, анткени ал химиялык процесске гана колдонулбастан, физикалык химиянын кристаллдашуу, эрүү, кайноо, катуу телолордо фазалык өтүш кубулушта-рына да колдонулат.

Ле Шателье принцибинин түрдүү таасирлердин типтерине кол-донулушу төмөндө келтирилген.

Температуранын өзгөрүшүнүн таасири. Температураны жо-горулатканда түз реакция кандай тездесе, кайталанма реакция дагы ошондой эле тез жүрөт, бирок түрдүү даражада. Экзотермиялык процесске караганда эндотермиялык процесс тез жүрөт. Тем-ператураны төмөндөткөндө системадагы эки реакциянын экзо-термиялык реакциясы тезирээк жүрөт. Демек, химиялык тен салмактуулукка температуранын таасирин такташ үчүн реак-циянын энтальпиясынын өзгөрүшүн билүү зарыл.

Силерге белгилүү болгондой химиялык реакциялар энергия-ны бөлүү же сицирип алуу менен жүрөт. Реакциянын натыйжа-сында бөлүнүп чыккан же сицирип алынган жылуулук реак-циянын жылуулук эффекти деп аталаат. Ал эми реакциянын жы-луулук эффекти көрсөтүлүп жазылган тенденмелер термохимия-лык тенденмелер деп аталаат.

- Заттын пайда болуусунда сарпталган же бөлүнүп чыккан жылуулук энергиясын ошол реакциянын энтальпиясы деп аташат жана Н тамгасы менен белгилешет.

Туруктуу басым убагында ΔH акыркы продуктудардын ($H_{акыркы}$) жана алгачкы аракеттенишүүчү заттардын ($H_{алгачкы}$) эн-тальпияларынын айырмасы болуп саналат:



$$\Delta H = H_{акыркы} - H_{алгачкы}$$

Басымдын өзгөрүшүнүн таасири. Басымды жогорулатканда реакциянын тен салмактуулугу аз көлөмдүү ээлей турган заттын пайда болуу тарабын карай жүрөт, тескерисинче, басымды төмөн-дөткөндө көлөмдүн жогорулаш процессине көмөк берет.

Концентрацияны өзгөртүүнүн таасири. Тен салмактуу абал-дагы системага реакцияга кириүүчү заттардын бирөөнөн кошум-чаласак, анда түз жана кайталанма процесстердин ылдамдыгы өзгөрөт, бирок система кайрадан тен салмактуулукка келет. Мын-дай жаңы абалда бардык заттардын концентрациялары алгачкы абалдагыдан айырмаланат, бирок тен салмактуулуктун констан-тасы менен аныктала турган алардын ортосундагы катыш мур-дагыдай эле калат. Башкача айтканда, тен салмактуу системада калган заттардын концентрациясын өзгөрүүгө алып келбегендей кылып, бирөөнүн гана концентрациясын өзгөртүүгө болбойт. Ле Шателье принциби боюнча кошумчаланган заттын концентра-циясынын төмөндөшүнө алып келүүчү процесс өөрчүйт.

- ?
- Кандай себептен химиялык тен салмактуулук динамикалык деп аталаат?
 - Кайсы учурда химиялык тен салмактуулук көлкө чейин сакталат?
 - Тен салмактуулуктун жылышына эмнелер себеп болот?
 - Тен салмактуу системадагы өзгөрүү эмне менен аныкталат?
 - Ле Шателье принциби эмнени түшүндүрөт?
 - Температураның өзгөрүшүнүн химиялык тен салмактуулукка тийгизген таасири кандай?
 - Басымдын өзгөрүшүнүн таасири кандай?
 - Концентрациянын таасири кандай?

Төмөнкү реакцияларды тен салмактуулук абалында карап көргүлө:



- Кайсы учурда басымдын өзгөрүшү тен салмактуулукка таасирин тийгизбейт?
- Ысытканда тен салмактуулук кайсы тарапты карай жылат?


ПРАКТИКАЛЫК ИШ

Кайталаңма реакцияны көмүртек (IV) диоксиди CO_2 менен суунун өзара аракеттенишинде үйрөнүү.

Стакандагы суу сары кызыл түскө метил кызыллын (метиловый красный) тамчылатып кошуп, андан кийин стакандын ичине түтүк аркылуу көмүртек (IV) диоксидин жибергенде, эритме кызыл түскө келет. Суу менен көмүртек (IV) диоксиди аракеттенишип, көмүр кислотасы пайда болот: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$






Суга кошулган метил кызыллына кислота таасир этип, кызыл түстү берет. Ал эритмени ысытууда кызыл түс мала түскө өтүп, кийин түссүздөнэт, анткени химиялык реакция алгачкы заттарды карай жүрөт, башкача айтканда көмүр кислотасы ажырайт: $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Демек, бул реакция кайталаңма, ошондуктан анын теңдемесин төмөнкүчө жазууга болот:



Кайталаңма реакциялардын теңдемелерин түзүү боюнча көнүгүүлөр иштөө.

Төмөнкү реакциялардын теңдемелерин аягына чейин жазғыла жана теңдегиле:



IV глава

КЫЧКЫЛДАНУУ-КАЛЫБЫНА КЕЛҮҮ РЕАКЦИЯЛАРЫ

§ 1. Кычкылдануу даражасы

Элементтер эркин абалында жөнөкөй заттарды пайда кылат. Ал жөнөкөй заттардын атомдорунун тегерегиндеги электрондордун кыймылдары бирдей болот. Бул жөнөкөй заттардын түзүлүшүнө байланышсыз, бардыгына тиешелүү. Мисалы, суутектин молекуласында электрондор атомдордун экөөнүн тен айланасында бирдей айланат, суутектин H_2 молекуласы уюлдуу эмес. Атомдорунун ортосунда коваленттик байланыш болгон кристаллдарда да химиялык байланыштар симметриялуу. Металлдарда байланышкан жана эркин электрондор да атомдор арасында бирдей бөлүштүрүлгөн.

Ал эми татаал заттарда башкача. Түрдүү элементтердин атомдорунун ортосундагы химиялык байланыштар симметриялуу эмес; татаал заттардын молекулаларында уюлдуу коваленттик байланыштар түзүлгөн. Иондук бирикмелердеги электрондордун бирдей бөлүштүрүлбөгөндүгү максималдуу. Иондук байланышы бар заттар пайда болгондо валенттик электрондор элементтердин атомдорунун бирөөнөн экинчисине биротоло, толук өтөт.

Бирикмелердеги атомдордун арасындагы электрондордун бирдей тен бөлүштүрүлбөгөндүгү кычкылдануу деп аталат. Электрондору башка элементтин атомдоруна (иондук байланыш учурунда толук бойдон же уюлдуу байланыш учурунда бөлүгү) жылышкан (өткөн) учурда он кычкылданууга ээ болот. Башка элементтин атомунун электрондору өткөн (кабыл алган) элементтин атому терс кычкылданууну көрсөтөт.

- **Татаал заттагы атомдордун биринен экинчисине канча электрон өткөндүгүн көрсөткөн сан кычкылдануу даражасы же кычкылдануу саны деп аталат.**

Жөнөкөй заттарда атомдордун кайсынысынан болбосун электрондор жылышпайт, ошондуктан элементтин кычкылдануу даражасы нөлгө барабар. Бирикмелерде айрым элементтер бир эле кычкылдануу даражасын көрсөтөт, бирок көпчүлүк элементтер

түрдүү бирикмелерде ар түрдүү кычкылдануу даражаларын көрсөтөт.

Жегич металлдар (+1), жегич жер металлдар (+2), фтор (-1) түрүктуу кычкылдануу даражасына ээ.

Суутек үчүн көпчүлүк бирикмелерде +1, ал эми металлдардын гидриддеринде жана айрым бирикмелерде ал -1ге барабар. Кычкылтектин кычкылдануу даражасы -2ге барабар, өтө кычкылдуу бирикмелерде -1, жана кычкылtek фторидинде OF_2 +2ге барабар. Бирикменин формуласын билүү жана молекуладагы атомдордун бардыгынын кычкылдануу даражаларынын суммасы нелгө барабар экендигин эске алуу менен, кычкылдануу даражасы түрүктуу эмес элементтер үчүн анын маанисин аныктап алууга болот.

Мисал катары CO , CO_2 , CH_4 , C_2H_6 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ заттарында көмүртектин кычкылдануу даражасын аныктайбыз. Аны х аркылуу белгилейбиз. Суутектин кычкылдануу даражасы +1, ал эми кычкылтектики -2 экендигин билүү менен төмөнкүнү алабыз:

CO	$x+(-2)=0$	$x=+2$
CO_2	$x+2(-2)=0$	$x=+4$
CH_4 ,	$x+4(+1)=0$	$x=-4$
C_2H_6	$2x+6(+1)=0$	$x=-3$
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$2x+6(+1)+(-2)=0$	$x=-2$

Бирикмелердеги элементтердин кычкылдануу даражаларын аныктоо үчүн элементтердин терс электрлүүлүгүнүн таблицасын (8-таблица) колдонуу керек.

8-таблица

Атомдордун салыштырмалуу терс электрлүүлүгү

H 2,1							
Li 0,98	Be 1,5	B 2,0	C 2,5	N 3,07	O 3,50	F 4,0	
Na 0,93	Mg 1,2	Al 1,6	Si 1,8	P 2,2	S 2,6	Cl 3,0	
K 0,91	Ca 1,04	Ga 1,8	Ge 1,8	As 2,1	Se 2,5	Br 2,8	
Rb 0,89	Sr 0,99	In 1,5	Sn 1,8	Sb 1,8	Te 2,1	I 2,6	


Химиялык байланыш пайда болгон учурда электрондор терс электрлүүлүгү жогору элементтин атомун карай жылышат.

Мисалы, фосфордун терс электрлүүлүгү 2,2; йоддуку 2,6. Ошондуктан PI_3 бирикмесинде жалпы электрондор йодду карай

Кычкылдануу-калыбына келүү процесстеринин теориясын иштеп чыгууда жана практикада колдонулушу боюнча, орчуундуу салым кошкон окумуштуу Л. В. Писаржевский болуп саналат.


Жогоруда белгилегендай, кычкылдануу (ага барабар калыбына келүү) процессине иондор, ошондой эле нейтралдуу атомдор катыша алат.

1. Алды менен *нейтралдуу атомдордун кычкылдануусун* кайлы. Эгерде кычкылдануу реакциясына нейтралдуу атом катышса, электрондорду берүү кычкылдануу даражасынын жогорулашина алыш келет, башкача айтканда атом он заряддалган ионго – катионго айланат. Анын заряды, ал берген электрондордун санына барабар болот:



Жөнөкөй заттардын молекулалары (мисалы N_2 , Cl_2 ж. б.) кычкылданган мезгилде, ал атомдордун санын, ошондой эле мисалдарда көрсөтүлгөндөй берилген электрондордун санын эске алуу зарыл.

2. *Иондордун* (татаал заттардын курамына кирген атомдордун) *кычкылданышы*. Иондор кычкылданганда алардын он кычкылдануу даражасы ошол электрондордун санына жараша көбөйөт.



3. *Нейтралдуу атомдордуу калыбына келтирүү*. Калыбына келүү процессинде электрондордуу кошуп алуу менен он кычкылдануу даражасы кемийт.

Нейтралдуу атомдордуу калыбына келтирүү электрондордуу кошуп алуу менен терс заряддалган иондун пайда болушуна алыш келет. Иондун заряды сан жагынан кошулуп алынган электрондордун санына барабар. Мисалы,



4. *Татаал заттардын курамына кирген атомдордуу калыбына келтирүү*. Он заряддалган ион калыбына келтирүү процессине катышса, электрондордун кошулган санына жараша он кычкылдануу даражасынын ошончо санга азайышына алыш келет:



Магнийдин хлор менен аракеттенишин карап көрөлү: $\text{Mg} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{MgCl}_2$. Хлордун электрон тектештиги чон болгондугу-

на байланыштуу, бул реакция учурунда магний өзүнүн валенттик 2 электронун берет, ал эми хлор ал электрондорду кошуп алат (ар бир атому бирден электрондуу). Электрондук түрдө бул реакцияны төмөнкүчө жазууга болот:



Магний электронун берип, кычкылданат, хлор электрондуу кошуп алыш, калыбына келет. Хлор магнийдин кычкылданышына себепчи болот. Кычкылдануу менен магний хлорду калыбына келтирең.

- ? Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларында кандай процесс кычкылдануу, кандай процесс калыбына келүү болот, ал эми кайсы процесстер электрондор ташылбай жүрөт: $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \rightarrow \text{CrCl}_3$, $\text{K}_2\text{CrO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, $\text{HPO}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$, $\text{KNO}_2 \rightarrow \text{KNO}_3$, $\text{CO} \rightarrow \text{CO}_2$, $\text{NO}_2 \rightarrow \text{NO}$, $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$

§ 4. Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын тенденциелерин түзүү

Электрондук баланс түзүү методунун негизги жоболору. Эки жөнөкөй заттан бирикменин пайда болуу кычкылдануу-калыбына келүү реакциясы менен өткөн темадан тааныштынар. Адатта кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын тенденциелери татаал мүнөзгө ээ, ошондуктан коэффициенттерди аныктоо, коюу көп кыйынчылыктарды туудурат. Тенденциелерди түзүүнүн бир нече жолу бар. Электрондук баланс-методу колдонулганда төмөнкүлөрдү эске алуу керек:

а) калыбына келтиргичтер берген электрондордун суммасы бардык кычкылдандыргычтар кабыл алган электрондордун суммасына барабар; б) тенденциенин он жана сол жактарында бирдей аталыштагы атомдордун сандары бирдей; в) эгерде реакцияга кычкылтектин атомдору катышса (kyчкыл чөйрөдө) суунун молекуласы пайда болот же сарпталат, щёлочтуу чөйрөдө гидроксил иондору пайда болот.

Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын тенденциелерин бир нече баскыч аркылуу түзүү оноюраак болот: 1) реакцияга кирген заттардын жана реакциянын продуктуларынын формулаларын аныктоо; 2) реакцияга кирген заттардагы жана реакциянын продуктуларындагы элементтердин кычкылдануу дара-жаларын аныктоо; 3) калыбына келтиргичтер берген, кычкылдангычтар алган электрондордун санын жана калыбына келтиргичтер менен кычкылдандыргычтардын алдына коюлуучу коэффициенттерди аныктоо; 4) тенденциенин он жана сол жагындагы


атомдордун балансын эске алуу менен, реакцияга кирген жана пайда болгон заттардын бардыгынын алдына коюлуучу коэффициенттерди аныктоо.

Кычкылдануу-калыбына келүү реакциясынын тендемесин түзүүнү темирдин (II) сульфатынын кычкыл чөйрөдө калий перманганаты менен кычкылданыш реакциясынын мисалында кайрайбыз.

1. Реакциянын схемасын жазабыз:




2. Элементтердин кычкылдануу даражаларын аныктайбыз:




Тендемеде көрүнгөндөй марганец менен темирдин гана кычкылдануу даражалары езгергөн, биринчисиники төмөндөгөн (калыбына келүү), экинчисиники жогорулаган (кычкылдануу).

3. Калыбына келтиргич FeSO_4 берген жана кычкылданыштык KMnO_4 кабыл алган электрондорунун сандарын аныктайбыз:




Mn^{7+} беш электрон кабыл алат, ал эми Fe^{2+} эки иону эки электрон берет. Берилген жана кабыл алынган электрондорунун сандарынын ортосу бөлүмү онго барабар. Эми реакциянын тендемесиндеги кычкылданыштыктын жана калыбына келтиргичтин алдына коюлуучу коэффициенттерди оной эле табууга болот.



4. Тендеменин сол жана он тараптарындагы атомдордун балансын эсептөп, бардык заттардын алдына коюлуучу коэффициенттерди аныктайбыз. Тендеменин сол тарабында калийдин эки атому болгондуктан, калий боюнча баланс түзүү үчүн тендеменин он тарабына калий сульфатын жазуу керек:



Тендеменин он тарабында SO_4^{2-} тобунун саны сегизге көбүрөөк болуп калды, ошондуктан SO_4^{2-} тобу боюнча баланс түзүүдө тендеменин сол тарабына 8 молекула H_2SO_4 жазылат:



Тендеменин сол тарабында суутектин 16 атому бар, ал эми он тарабында азырынча жок. Ошондуктан суутек боюнча баланс түзүүдө тендеменин он тарабына 8 молекула суу жазылат:



Тенденциин сол жана он тараптарында кычкылтекте атомдорунун сандары бирдей, демек тенденции туура.

Кычкылдануу-калыбына келүү реакциясынын тенденциин көп баскычтуу метод менен жазуу аркылуу тенденции түзүүнүн логикасын түшүнүгө болот. Реакциялардын тенденциелерин түзүү боюнча тажрийбага ээ болгондон кийин аралык тенденциелерди кыскартып, бардык баскычтарды бир эле тенденмеде көрсөтүүгө болот.

- ?
- 1. Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын тенденциелери кантип түзүлөт?
- ⌂ 2. Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларын тенденциин кандай жолдору бар?

§ 5. Кычкылдандыргычтар жана калыбына келтиргичтер

Кандай заттар кычкылдандыргычтар, ал эми кандай заттар калыбына келтиргичтер боло алат?


- Электрондорун берип, кычкылданган заттар калыбына келтиргичтер деп аталат.
- Электрондорду кошуп алуучу заттар кычкылдандыргычтар деп аталат.

Демек, эн жогорку кычкылдануу даражасына ээ болгон элементтер кычкылдандыргычтар, ал эми кычкылдануу даражасы төмөн болгон элементтер калыбына келтиргичтер боло алат.

Металлдар бирикмелеринде он кычкылдануу даражаларын гана көрсөтөт, ошондуктан алардын эн төмөнкү кычкылдануу даражасы нөлгө барабар. Башкача айтканда металлдар эн төмөнкү кычкылдануу даражаларына эркин абалында гана ээ болот. Бардык эркин металлдар, ар түрдүү даражада болсо дагы калыбына келтиргич касиетке ээ. Практикада калыбына келтиргичтер катары алюминий, магний, натрий, калий, цинк ж. б. металлдар колдонулат. Эгерде металл бир нече кычкылдануу даражасына ээ болсо, анын эн төмөнкү кычкылдануу даражаны көрсөткөн бирикмелери да калыбына келтиргичтер болот, мисалы, темирдин (II), калайдың (II), хромдун (II), жездин (I) бирикмелери.

Кычкылдануу даражасы эн жогору болгон топтун санына барабар же ага жакын металлдардын бирикмелери кычкылдандыргычтар боло алат. Практикада күмүш оксидинин аммиактык эритмеси, жез (II) сульфатынын аммиактык эритмеси, сымап (II) хлориди, коргошун оксиidi PbO_2 , темир (III) хлориди, калий хроматы K_2CrO_4 жана дихроматы $K_2Cr_2O_7$, калий перманганаты $KMnO_4$, марганец диоксиди кычкылдандыргыч катары колдону-

лат. Демек, татаал заттардын ичинен кычкылданыргыч касиетке жогорку кычкылтектүү кислоталар (туздар) жана борбордук атомдору эң жогорку кычкылдануу абалында



(HNO_3 , KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) болгон элементтердин оксиддери жана гидроксиддери гана ээ болот, анткени борбордук атом электронду кошуп алууга (kychkyldanuu санын төмөндөтүүгө) гана жөндөмдүү, б. а. калыбына келет.

Металл эместер оң дагы, терс дагы кычкылдануу даражаларын көрсөтө алат. Эң жогорку оң кычкылдануу даражага ээ болгон металл эместердин бирикмелери кычкылданыргычтар, ал эми терс кычкылдануу даражаларын көрсөткөн металл эместердин бирикмелери калыбына келтиргичтер болот.


Эн негизги калыбына келтиргичтер болуп суутек, көмүртек жана көмүртектин (II) оксиidi саналат.

Күчтүү кычкылданыргычтарга мезгилдик системанын VI жана VII топторунун жогору тарабынан орун алган (кыска формадагы) элементтер кирет. Алардын күчтүү кычкылданыргыч касиеттери эң чоң терс электрлүлүгү менен мүнөздөлөт. Эң күчтүү кычкылданыргыч касиет фторго таандык, бирок практикада кычкылданыргыч катары кычкылтек, хлор жана бром колдонулат.

Кычкылданыргыч катары колдонулуучу бирикмелерге кислоталар да кирет. Алардын ичинен практикалык жактан маанилүүлөрү – туз, күкүрт жана азот кислоталары. Туз кислотасында кычкылданыргыч элемент – суутек, азот кислотасында – азот, ал эми суюлтулган күкүрт кислотасында – суутек, концентрацияланган күкүрт кислотасында – күкүрт. Туз жана суюлтулган күкүрт кислотасынын калыбына келүү процесси төмөнкүчө берилет: $2\text{H}^+ + 2\bar{\text{e}} = \text{H}_2$

Азот кислотасы концентрациясына, температурага жана калыбына келтиргичтин табиятына жарааша азоттун ар түрдүү кычкылдануу даражасына чейин калыбына келиши мүмкүн.


Азот кислотасындагы азоттун кычкылдануу даражасы $+5$. Кычкылданыргыч катары реакцияга киргенде, HNO_3 түрдүү продуктуларга чейин калыбына келиши мүмкүн:



Азот кислотасынын HNO_3 концентрациясы канчалык жогору болсо, етө терен эмес калыбына келет. Концентрацияланган кислота менен реакция жүргөндө, кепчүлүк учурда NO_2 белүнөт. Суюлтулган азот кислотасы активдүү эмес металлдар, мисалы,

жез менен реакцияга киргенде NO бөлүнөт. Активдүрөөк металлдар темир, цинк менен N₂O пайда болот. Өтө суюлтулган азот кислотасы активдүй металлдар – цинк, магний, алюминий менен аммоний ионун, кислота менен аммоний нитратын пайда кылат. Адатта бир эле мезгилде бир нече продукт пайда болот.

Айрым металлдардын азот кислотасы менен кычкылдануу реакциялары төмөнкүчө жүрөт:



Азот кислотасы металлдар менен аракеттенишкенде суутек бөлүнүп чыкпайт.

Металл эместерди азот кислотасы менен кычкылдандырганда, азот кислотасы металлдар менен реакцияга кирген учурдай эле NO₂ге чейин калыбына келет, мисалы,




Көбүрөөк суюлтулган кислота NO₃-го чейин калыбына келет, мисалы, 3P+5HNO₃+2H₂O=3H₃PO₄+5NO↑

Азот кислотасы катышкан кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары өтө кыйындык менен жүрөт.

Азот кислотасынын азоттун (II) оксидине NO чейин калыбына келишин төмөнкүчө жазууга болот: NO₃⁻+4H⁺+3e=NO+2H₂O

Күкүрт кислотасын калыбына келтирүүдө да түрдүү продукттар пайда болушу мүмкүн. Мисалы, күкүрт кислотасынын күкүрттүн (IV) оксидине SO₂ чейин калыбына келиши төмөнкүчө жазылат: SO₄²⁻+4H⁺+2e=SO₂+2H₂O

Концентрацияланган күкүрт кислотасы – ысытылганда өзгөчө күчтүү кычкылдандыргыч. Ал HI жана HBr заттарын (буларга HCl кирбейт) эркин галогендерге чейин, көмүрду көмүртек (IV) оксидине CO₂ чейин, күкүрттү күкүрт (IV) оксидине SO₂ чейин кычкылданырат. Алардын реакцияларынын тенденмелери төмөнкүчө жазылат:




Күкүрт кислотасынын концентрациясына жарааша металлдар менен реакциялары түрдүүчө өтөт. Суюлтулган күкүрт кислотасы өзүнүн курамындагы суутек иону менен кычкылданырат. Ошондуктан ал чыналуу катарындагы суутекке чейинки металлдар менен гана аракеттенишет, мисалы, Zn+H₂SO₄=ZnSO₄+H₂↑

Ошол эле учурда коргошун суюлтулган күкүрт кислотасында эрибейт, анткени эрибеген туз PbSO₄ пайда болот.

Концентрацияланган күкүрт кислотасы күкүрттүн (VI) әсеби-нен кычкылдандыргыч болуп саналат. Ал чыналуу катарындагы күмүшкө чейинки металлдарды жана күмүштүн өзүн да кычкылдандырат. Металлдардын активдүүлүгүнө, кислотанын концентрациясына, температурага жарапша калыбына келүүнүн продуктулары пайда болот. Активдүү эмес металл жез менен аракетте-нишкенде, күкүрт кислотасы күкүрттүн (IV) оксидине SO_2 чейин калыбына келет: $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

Активдүүрөөк металлдар менен аракеттенишкенде калыбына келүүнүн продуктулары күкүрттүн (IV) оксиidi SO_2 , эркин күкүрт, ошондой эле күкүрттүү суутек болушу мүмкүн. Мисалы, цинк менен реакциялар төмөнкүчө жүрүшү мүмкүн:



Металлдардын бирикмелеринен башка кычкылдандыргыч катары суутектин өтө оксиidi H_2O_2 , курамындагы кислота пайда кылуучу элементтери эн жогорку кычкылдануу даражасын көрсөткөн кислоталардын туздары – хлораттар (KClO_3), перхло-раттар (KClO_4) колдонулат.


 Түрдүү концентрациядагы кислоталар менен металлдардын кычкылдануу реакцияларына тенденмелерди түзгүлө.

§ 6. Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын түрлөрү

Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларын үч типке бөлүштүрүүгө болот: молекула ичиндеги кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары, молекула аралык жана диспропорциялоо (өзү кычкылдануу – өзү калыбына келүү реакциялары).

Молекула ичиндеги кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары. Реакциянын бул тибине бир эле молекуланын ичиндеги түрдүү атомдордун кычкылдануу даражаларынын өзгөрүшү менен жүргөн реакциялар кирет. Ага мисал катары төмөнкү реакцияны карап көрөлү: $\text{KClO}_3 \rightarrow \text{KCl} + \text{O}_2$

Реакция учурунда электрондорду берген жана кошуп алган



Кычкылдануу сандарын аныктагандан кийин электрондук баланс тенденесин түзөбүз. Баланстын негизги жобосу – калыбына келтиргичтин жоготкон электрондорунун суммалык саны кычкылдандыргычтар кошуп алган электрондордун суммалык са-


нына барабар болушу керек экенин билебиз. Электрондук баланс тенденесин түзүү үчүн калыбына келтиргичтер жоготкон жана кычкылдандыргычтар кошуп алган электрондордун санын аныктайбыз.

Эгерде жоготулган жана кошулуп алынган электрондордун сандары тен болбосо, аларды кошумча көбөйтүүчүлөрдү коюу менен тендер болот.


Электрондук баланс схемасы:



Кошумча көбөйтүүчүлөрдү табуу үчүн берилген жана кошулуп алынган электрондордун сандарына жараша ортос бөлүмдү табабыз.



Кошумча көбөйтүүчүлөр кычкылдануу-калыбына келүү процессине катышуучу заттарга коэффициент болот:




Алынган коэффициенттерди реакциянын тенденесине жазабыз: $2\text{KClO}_3 = 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$


Молекулалар аралык реакциялар. Молекулалар аралык кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары түрдүү молекулалардагы атомдордун кычкылдануу даражаларынын өзгөрүсү менен жүрөт. Эгерде реакция эритмеде кислотанын жана жегичтин катышуусу менен жүрсө, реакциянын тенденесине кычкылдандыргыч менен калыбына келтиргичтен тышкары кислота, жегич же суу кошулуп жазылат.

Молекула ичиндеги кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынан айырмаланып, молекулалар аралык реакцияларда электрондук балансты жазуудан, калыбына келтиргичтер жана кычкылдандыргычтар үчүн коэффициенттерди табуудан башка, чөйрөнү түзүүчү молекулалар үчүн да коэффициенттерди аныктоо зарыл болот.

Аны калий перманганаты менен калий йодидинин кычкыл чейрөдө өзара аракеттенишинин мисалында карап көрөлү:




Бул реакциянын учурунда коэффициенттерди тандоо жана коюу бир нече этаптардан турат, алгачкы эки этапы, буга чейин биз караган молекулалар ичиндеги реакцияга окшош:




Тенденциин сол тарабындагы күкүрт кислотасы, он тарабындагы калий сульфаты жана суу үчүн коэффициенттерди табуу схеманын сол жана он тарабындагы атомдордун сандарын салыштыруу менен жүргүзүлөт.


Электрондук баланска таянып, алынган коэффициенттерди схемадагы компоненттердин алдына коёбуз:



Сол тараптагы калий иондорунун саны 12, ал эми он тарабында – 2. Ошондуктан он тараптагы калий сульфатынын алдына 6 деген коэффициентти коёбуз:




Он тараптагы күкүрт атомдорунун саны ($6\text{K}_2\text{SO}_4$ жана 2MnSO_4) 8ге барабар. Ошондуктан күкүрт кислотасынын алдына 8 коэффициентин коёбуз. Сол тараптагы суутек атомдорунун саны 16 болгондуктан, суунун молекуласынын алдына 8 коэффициентин коёбуз. Эми реакциянын тенденмеси төмөнкүдөй болот:




Диспропорциялоо (өзү кычкылдануу-өзү калыбына келүү) реакциялары. Курамында аралык (минималдуу менен максималдуунун ортосундагы) кычкылдануу даражаларына ээ болгон элементтер киргөн заттар кычкылданыруучу касиетти да, ошондой эле калыбына келтирүү касиетин да көрсөтө алат.

Мындай заттар өзү кычкылдануу-өзү калыбына келүү реакцияларына жөндөмдүү. Бул учурда электрондорду берүү жана кошуп алуу бир эле элемент тарабынан жүрөт, б. а. бир эле элементтин кычкылдануу даражасы жогорулайт жана төмөндөйт. Мындай реакциялар диспропорциялануу же өзү кычкылдануу-өзү калыбына келүү реакциялары деп аталат. Мисалы, жегич металлдардын жана күкүрт кислотасынын туздарын өтө ысытканда диспропорциялануу реакциялары жүрөт:




Диспропорциялануу реакциялары галогендердин бирикмелерине мүнөздүү. Эгерде газ абалындагы хлорду натрий гидроксидинин NaOH эритмеси аркылуу өткөргөндө, диспропорциялануу-

нун натыйжасында хлордун кычкылдануу даражасы 1 жана -1 болгон бирикмелер пайда болот:




- ? 1. Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын кандай түрлөрү бар?
- ? 2. Молекула ичиндеги кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларына кайсы реакциялар кирет?
3. Молекулалар аралык реакциялардын тибине кайсы реакциялар кирет?
4. Өзү кычкылдануу-өзү калыбына келүү реакциялары кандайча мүнөздөлөт?
5. Реакцияларды тендөөнүн кайсы методдорун билесинер?
6. Төмөндө келтирилген реакциялардын кайсылары кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары болуп саналат:



Жообунарды негиздегиле, кычкылдануу-калыбына келүү процесстерди жүргөн реакциялардагы кычкылдандырыгычты жана калыбына келтиргичти көрсөткүлө.

7. Төмөнкү процесстердин кайсылары кычкылдануу, кайсылары калыбына келүү экендигин, ал эми кайсыларында реакция электрондордун берилиши менен жүрбөй тургандыгын көрсөткүлө:
- $$\begin{array}{lll} \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \rightarrow \text{CrCl}_3 & \text{K}_2\text{CrO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 & \text{HPO}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \\ \text{CO} \rightarrow \text{CO}_2 & \text{NO}_2 \rightarrow \text{NO} & \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \end{array} \quad \text{KNO}_2 \rightarrow \text{KNO}_3$$
8. Төмөнкү заттардын кайсылары: а) кычкылдандырыгыч гаға касиетти; б) калыбына келтиргич гана касиетти; в) кычкылдануу-калыбына келүү процесси бирдей жүргөн касиетти көрсөтөрүн аныктагыла: KMnO_4 , MnO_2 , N_2S , Na_2SO_4 , Na_2SO_3 , H_2SO_4 , SO_2 , KCrO_2 , Cr , HNO_3 , Fe .
9. Төмөнкү кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын тенденмелерин түзгүлө:



V глава

АЙРЫМ ЭЛЕМЕНТТЕРДИН ХИМИЯСЫ

§ 1. Металл эместер

Химиялық элементтерди әнктан әле металлдар жана металл эместер (металлоиддер) деп екиге бөлүп келген. Мунун себеби – аларга тиешелүү болгон жалпы касиеттердин бар экендиги. Мисалы, металлдык жаркырактық, электр жана жылуулук өткөргүчтүк ж.б. касиеттер. Мындай касиеттер айрықча металлдарга тиешелүү. Элементтерди мындай әки топко бөлүү шарттуу гана болуп эсептелет, себеби айрым элементтер металлдык да жана металл эместиң да касиетке ээ. Алсак, мышьяк, йод металлдык жаркырактыкка ээ болсо да, металл эместердин көрүнүктүү өкүлдөрү.

Металл эместердин саны металлдарга караганда аз. Элементтердин мезгилдик системасында алар таблицанын он жактагы жогорку бурчун ээлейт. Металл эместер топтордун негизги топчолорунда гана жайгашкан.

9-таблица

Мез- гилдер	Металл эместердин мезгилдик системада топ боюнча жайланнышы							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	H			C	N	O	F	He
2			B	Si	P	S	Cl	Ne
3					As	Se	Br	Ar
4						Te	I	Kr
5								Xe
6								Rn
7								

Металл эместердин жалпы мүнөздөмөлөрү. Химиялық элементтердин бардык санына салыштырмалуу металл эместер өтө аз болсо дагы, аларга жалпы мүнөздүү белгилерди бөлүп көрсөтүү өтө кыйын. Металл эместердин көпчүлүгүнүн агрегаттык абалы – газ. Бром – суюктук. Бор, кремний, фосфор, мышьяк, күкүрт, селен, теллур, йод, көмүртек – катуу заттар.

Металл эместер металлдарга тиешелүү болгон касиеттерге (жаркырактыкка, электр жана жылуулук өткөргүчтүк ж.б.) ээ эмес.

Металл эместердин элементардык заттарындагы байланыш – коваленттик байланыш. Металл эместердин атомдору металлдарга караганда сырткы электрондорун бекемирээк кармап турат да, онойлук менен бербейт. Башка элементтердин атомдорунун электрондорун женил кабыл алыш, көпчүлүгү кычкылдандырыгыч касиетке ээ. Электронду кошуп алыш, терс заряддагы ионго айланат.

Металл эместер – терс электрлүү элементтер, б. а. электрондорду кошуп албаса да, электрондук тыгыздыкты өзүнө тартып турат.

Металл эместер калыбына келтиргич касиетке ээ эмес деп айтууга болбайт. Жөн гана алардын кычкылдантыкч касиети калыбына келтиргич касиетине караганда көбүрөөк үстөмдүк кылат. Реакциянын жүрүш шартына жана шеригине (партнеруна) жараша айрым учурларда металл эместер калыбына келтиргич да боло алат.

Стандарттуу шарттарда металл эместердин бир бөлүгү – каттуу заттар (B , C , Si , P , As , S , Se , Te , I , At), айрымдары – газдар (N_2 , O_2 , F_2 , Cl_2), ал эми бром – суюктук. Ошондой эле металл эместердин түстөрү да ар түрдүү: кызыл (Br , P), сия, кызгылт көк (I_2), сары (S) түстө д.у.с. Көмүртек (C) жана күкүрт (S) байыркы замandan эле белгилүү болгон, ал эми астат (At) жасалма жол менен 1940-жылы алынган.

Ошентип, металл эместердин бардыгына тиешелүү жалпы касиеттер төмөнкүлөр:

1. Бардык металл эместер – р-элементтер, мындайча айтканда толуп бүтпөгөн р-орбиталдар (ошону менен бирге бардык эле р-элементтер металл эмес боло бербей турганын да эсибизден чыгарбашыбыз керек).

2. Бардык металл эместер терс электрлүлүктүн жогорку маанисине ээ болгондугу менен мүнөздөлөт: алар молекулаларды түзүүдө башка элементтерден электрондорду өзүнө тартып алат.

3. Металл эместердин жогорку оксиддери кислоталык оксиддер болушат.

4. Металл эместердин суутектик бирикмелери кадимки шартта газ абалында болот.

5. Металл эместер бири-бири менен коваленттүү же начар уюлдуу байланыш менен байланышат, ал эми металлдар менен иондук байланышты пайда кылат.

- ? 1. Металл әместер кандай жалпы касиеттерге әэ?
2. Металл әместердин негизги өкүлдөрү кайсылар?
3. Д. И. Менделеевдин мезгилдик системасында металл әместер кандай орунду эзлешет?
4. Металл әместердин қычкылдандырыгыч жана калыбына келтиригич касиеттерин кантитп мүнәздөөгө болот?



Кошумча адабияттарды колдонуу менен металл әместер боюнча жалпы маалымат топтогула, системага келтируүгө аракет жасагыла.

§ 2. Металл әместердин атомдорунун жана молекулаларынын түзүлүшү

Металл әместердин катар номурлары ескөн сайын кошулган электрондор сырткы электрондук катмарынан орун алышып, р-орбиталдарына жайгашат (суутек менен гелийден башкасы). Ошол себептүү металл әместерди р-элементтер деп да аташат.

Металл әместердин көпчүлүгү элементтердин мезгилдик системасынын әкинчи, үчүнчү жана төртүнчү мезгилдеринде орун алган. Ошого ылайык, алардын атомдорунун электрондук конфигурациялары төмөнкүчө: $1s^2 2s^2 2p^n$ (« n » борго тиешелүү болгон 1ден башталып, неонго тиешелүү болгон 6 менен аяктайт: B, C, N, O, F, Ne), $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^n$ (« n » кремнийге тиешелүү болгон 2ден башталып, аргонго тиешелүү болгон 6 менен толукталат: Si, P, S, Cl, Ar), $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^n$ (« n » мышьякка тиешелүү болгон 3төн башталып, криptonго тиешелүү 6 менен бүтөт: As, Se, Br, Kr) ж. б. у. с.

Топтун негизги топчолорунда жайгашкан металл әместердин атомдук түзүлүштөрү, б. а. электрондук конфигурациялары оқшош. Алсак,

$C-2s^2 2p^2$	$P-3s^2 3p^3$	$Se-4s^2 4p^4$	$Cl-3s^2 3p^5$
$Si-3s^2 3p^2$	$O-2S^2 2p^4$	$Te-5s^2 5p^4$	$Br-4s^2 4p^5$
$N-2s^2 2p^3$	$S-2s^2 3p^4$	$F-2s^2 2p^5$	$I-5s^2 5p^5$

Ошол себептүү топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтердин айрым физикалык жана химиялык касиеттери оқшош. Мисалы, галогендер тобу (VIIA), асыл газдардын тобу (VIIIA), халькогендер тобу (IVA).

Мезгилдик системасын VII тобунун негизги топчосунун элементтери галогендер деп аталат, фтор F, хлор Cl, бром Br, йод I, астат At (жаратылышта сейрек кездешет) – типтүү металл әместер. Бул элементтердин атомдорунун сырткы энергиялык деңгээл-

деринде жетиден электрондору бар, толукташ үчүн бирден гана электрон жетишпейт. Галогендер металлдар менен өзара аракеттенишкенде металлдардын атомдорунан бирден электронду кабыл алышат. Бул учурда иондук байланыш түзүлөт да, туздар пайда болот. Ошондуктан «галогендер» (туз пайда кылуучулар) деген жалпы атка ээ болуп калган.

Галогендер – күчтүү қычкылданырыгычтар. Химиялык реакция учурунда фтор қычкылданырыгыч касиетке ээ, анын қычкылдануу саны – 1. Ал эми калган галогендер терс электрлүлүгү жогору элементтер менен аракеттенишкенде калыбына көлтиргичтик касиетти көрсөтөт. Ал учурда қычкылдануу даражаларынын мааниси +1, +3, +5, +7 болот. Калыбына көлтиргичтик касиеттери хлордон йодду карай күчейт, анткени бул касиет галогендердин атомдорунун радиустарынын өсүшүнө байланыштуу: хлордун атомдору йоддун атомдорунан эки кичине.

Галогендер – жөнөкөй заттар. Бардык галогендер эркин абалында эки атомдуу молекулалардан турат, ал эми атомдор коваленттүү уюлсуз байланыш менен байланышкан. Галогендер молекулалык кристаллдык торчого ээ. Айтылгандарды галогендердин физикалык касиеттеринин таблицасы (10-таблица) далилдей турат.

10-таблица

Галогендердин физикалык касиеттери

Зат	Кадимки шарттагы			Балкып эрүү температу- расы, °C	Кайноо температу- расы, °C
	Агрегаттык абалы	Түсү	Жыты		
F ₂ фтор	Газ, кадимки температурада суюктукка айланбайт	Ачык сары	Кескин жыттуу	-220	-188
Cl ₂ хлор	Газ, кадимки температурада басым астында суюлат	Сары жашыл	Кескин жыттуу, тумчуктургуч	-101	-34
Br ₂ бром	Суюктук	Күрөн	Кескин сасык жыттуу	-7	+58
I ₂ йод	Катуу зат	Металлдай жаркырак, кара сия түстө	Кескин жыттуу	+114	+186



§ 4. Металл эместердин суутектик жана кычкылтектик бирикмелери

Суутектин башка элементтерден айырмасы – анын валенттик электрону түздөн-түз ядросу менен аракеттенишип тургандыгында. Валенттик электронун берип, он заряддагы ионго H^+ айланат. Бул – жылаңаң протон. Суутек кычкылдануу даражасы 1ге барабар кошулмаларга да ээ (металлдардын гидриддери, мисалы, NaH , MgH_2 , AlH_3 ж. б.). Элементтердин суутектик бирикмелери гидриддер деп аталат.

Металл эместер суутек менен коваленттик бирикмелерди пайдалы болат. Мисалы SiH_4 – силан, BH_4 – боран, CH_4 – метан, AsH_3 – арсин ж. б.

Металл эместердин гидриддери – химиялық табияты боюнча кислоталық бирикмелер. Алар суу менен аракеттенишкенде же сууда эригенде кислота пайдалы болот.

Мисалы, галогендүү суутектердин суудагы эритмелери кислоталар: HF – фтордуу суутек же плавик кислотасы, HCl – туз кислотасы, HBr – бромдуу суутек кислотасы, HI – йоддуу суутек кислотасы. Техникалық жактан хлордуу суутектин жана туз кислотасынын мааниси чоң.




13-сүрөт. Күкүрт кислотасынын колдоңулушу.

Галогендердин гидриддеринин суудагы эритмелери – күчтүү кислоталар: HF, HCl, HBr, HI. Алтынчы топко кирген металл эместердин гидриддеринин суудагы эритмелери – күчсүз кислоталар: H₂O, H₂S, H₂Se, H₂Te. Ал эми NH₃ (аммиак), PH₃ (фосфин) негиздик касиетке ээ.

Металл эместердин кычкылтек менен болгон бирикмелери оксиддер деп аталат.

Кычкылтек көпчүлүк бирикмелеринде туруктуу, -2 кычкылдануу даражасын көрсөтөт.




OF₂ жана H₂O₂ бирикмелеринде гана кычкылтек +2 жана -1 кычкылдануу даражасына ээ:



Металл эместердин мезгилдеги катар номурлары өскөн сайын алардын кислоталык касиеттери өсөт. Мисалы,

B ₂ O ₃	CO ₂	N ₂ O ₅
начар	орточо	күчтүү
кислоталык	кислоталык	кислоталык

Ушундай эле законченемдүүлүк калган мезгилдердеги металл эместерге да тиешелүү: SiO₂, P₂O₅, SO₃, Cl₂O₇ ж. б. Металл эместердин жогорку оксиддери дайыма кислоталык касиетке ээ. Алар суу менен аракеттенишкенде кислоталар пайда болот:



Кислоталык оксиддердин молекулаларындагы байланыш – коваленттик байланыш.

Кычкылдануу даражасы өзгөрүлмөлүү металл эместер бир нече оксидди пайда кылат. Ал оксиддерди металл эместердин атынын жанына рим цифрасын кооп атайды. Мисалы азоттун беш оксиidi бар: N₂O – азоттун (I) оксиidi, NO – азоттун (II) оксиidi, N₂O₃ – азоттун (III) оксиidi, NO₂ – азоттун (IV) оксиidi, N₂O₅ – азоттун (V) оксиidi. Ошондой эле As₂O₃, As₂O₅, P₂O₃, P₂O₅, SO₂, SO₃ ж. б.

Металл эместердин суу менен кошулуп, кислотаны пайда кылуучу оксиддери ангидриддер деп аталат. Мисалы, SO₂ – күкүрттүү ангидрид, SO₃ – күкүрттүү ангидриди, As₂O₅ – мышьяк ангидриди, P₂O₅ – фосфор ангидриди ж. б.

- ? 1. Суутектин башка элементтерден кандай айырмалары бар?
 2. Гидриддер деп кандай бирикмелер аталат?
 3. Металл эместердин кайсыларынын суутектик бирикмелеринин суу эритмелери кислоталарды берет жана кайсылары негиздик касиетке ээ болот?

4. Металл әместердин қычкылтек менен болгон бирикмелери кандай заттар? Алар кандай касиеттерге әэ болот?
5. Металл әместердин мезгилдеги катар номурлары ескөн сайын, алардын кандай касиеттери өсөт?


§ 5. Жаратылыштагы металл әместер

Жөнөкөй заттар түрүндө жаратылышта кездешүүчү металл әместерге: суутек, гелий, көмүртек, азот, қычкылтек, құқұрт кирет. Көмүртек менен құқұрттөн башкасы жаратылышта газ түрүндө кездешет. Суутек менен гелий – бош абалында өтө әле сейрек кездешкени (жанар тоо атылганда чыккан жана жаратылыш газдарынын курамында) менен, космосто әң кеңири таралған элементтер. Құндұн жана айрым жылдыздардын негизги масасын ушул әки элемент түзөт. Ал әми абдан чоң планеталар Юпитер жана Сатурн негизинен суутектен турат.

Азот менен қычкылтек – биз дем алып жаткан абанын негизги курамдық бөлүктөрү. Аба – көлөмү боюнча 78% азоттон, 21% қычкылтектен жана 1% ке жакын инерттүү газдардан жана көмүртек диоксидинен, суудан турган газдық аралашма.

Азот менен қычкылтек атмосферанын курамында молекула түрүндө (N_2 , O_2) болот. Азоттун жана қычкылтектин молекулаарынын химиялық жактан активдүүлүгү аз.





Кадимки шарттарда абанын (атмосферанын) курамына киргөн азот менен қычкылтек өзара аракеттенишпейт. Алар чагылғандын натыйжасында өзара бир аз санда аракеттенишип, азот (II) оксидин пайда кылат.



Бул реакциянын жүрүшү бир нече мин цельсий градусундагы температураны талап кылат.

Жаратылышта бош абалында кездешүүчү металл әместердин өкүлдөрүнүн бири – құқұрт. Құқұрт жаратылышта бирикмелер түрүндө жана таза түрүндө кездешет. Құқұрттүү жердин алдында таза түрүндө жаткан жеринен түздөн-түз балкытып эритүү аркылуу алышат. Құқұрттүү молекуласы кадимки шартта 8 атомдон (S_8) турган жабык шакекти элестетет. Құқұрттүү буусунда S_2 , S_4 , S_6 молекулалары да кездешет.

Құқұрт – жетишерлик активдүү зат. Бир аз әле ысытууда көптөгөн жөнөкөй заттарды қычкылданат. Ошол әле шартта өзү қычкылтек жана галогендер менен оной әле қычкылданат:



Металл эместерден азот менен йод гана күкүрт менен түздөн-түз аракеттенишпейт.

Жаратылышта бош (таза түрүндө) кездешүүчү металл эместердин дагы бир өкүлү – *көмүртек*. Көмүртектин элементтардык жөнөкөй заттары: алмаз, графит. Бул заттарды көмүртектин аллотропиялык түр өзгөрүштөрү деп аташат.

Көмүртек – жаратылышта кездешүүчү элементтердин эң негизгилеринин бири. Ал жандуу жаратылыштын негизин түзөт.


Көмүртек күйүүчү кен байлыктарда да көп: көмүрдө (таш-көмүр), мунайда (нефть), чымкөндө, жаратылыш газдарында ж. б. Таш-көмүрдүн айрым түрлөрүндө, мисалы, антрацитте 98% ке чейин таза көмүртек бар.

Алмаз өтө сейрек кездешет. Чоң алмаздар абдан кымбат. Ушул кезге чейинки табылган алмаздардын эң ириси «Куллинан» деп аталып, анын массасы 612,2 г га барабар.

Графит – минералдык аралашмалар менен булганган кен катмары түрүндө кездешет.

Көмүртек жана анын бирикмелери Күн системасынын бардык планеталарында, метеориттерде, жылдыздарда жана кометаларда да табылган.

Кадимки шартта көмүртек – абдан эле инерттүү элемент. Жогорку температурада ал көптөгөн элементтер менен өзара аракеттенишет.



Көмүртектин реакцияга кириүгө жөндөмдүү формасы – аморфтук көмүртек, андан кийин графит. Алмаз абдан туруктуу. Аморфтук көмүртек абада 300–800°C да күйсө, графит 600–700°C да гана күйөт. Ал эми алмаз 850°C наң жогорку температурада гана жалындайт: $\text{C} + \text{O}_2 = \text{CO}_2$



Алмаз – жаратылыштагы эң катуу зат. Катуулугу боюнча алмаздан ашкан зат жок. Алмаздын кристаллында көмүртектин төрт атому тетраэдрге коваленттик байланышта бирдей аралыкта байланышкан. Мында бардык байланыштар эквиваленттүү жана бекем. Ал эми графитте көмүртектин атомдору жарыш катмарларда гексагоналдык торчо пайда кылып жайгашкан. Катмардын ичиндеги көмүртектин атомдорунун байланышы бирдей бекем, ал эми катмарлар аралыгындағы байланыш башураак жана катмардын ичиндеги байланыштарга эквиваленттүү эмес. Ошол себептүү графит катмарланып, кагазга из калтырат.


Жаратылышта кездешүүчү металл эместердин өзгөчө тобун инерттүү газдар түзөт. Инерттүү газдардын атомдорунун валенттик орбиталдары толтурулган:

ры татаал болгондуктан, аларды оксиддердин жыйындысынын формулалары түрүндө берет. Мисалы, ортоклаз (талаа шпаты) – $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$, слюда – $K_2O \cdot 3Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot 2H_2O$, каолин (ак топурак) – $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$, асбест – $3MgO \cdot CaO \cdot 4SiO_2$ ж. б. Курамында алюминий бар силикаттар алюмосиликаттар деп аталат. Алар жаратылышта абдан көп тараалган.

Химия илиминин табигый силикаттардын жана алюмосиликаттардын түзүлүштөрүн, касиеттерин, колдонулуштарын окуп үйрөнүүчү бир тармагы *силикаттар химиясы* деп аталат.

Кремнийдин кош оксиidi – кремнезём (SiO_2) же кремний аングидриди – кыйынчылык менен эрүүчү катуу зат. Ал жаратылышта негизинен кварц минералы түрүндө кездешет. Анын кристобалит жана тридилит деген түр өзгөрүштөрү да бар. Алар түзүлүштөрү боюнча бири-биринен айырмаланышат. Абдан таза SiO_2 – кварц.


Щелочтун эритмелери менен кремнийдин оксиidi реакцияга кирип, кремний кислоталарынын туздарын пайда кылат.



Кремний кислоталарынын формуласы кыскача $nSiO_2 \cdot mH_2O$ түрүндө жазылат.

Кремнезём $1713^{\circ}C$ да эрийт, абдан катуу жана химиялык жактан туруктуу. Айнекке окшош абалга женил өтөт. Ал кварц айнеги деп аталат. Химиялык таасирлерге жана жогорку температурага абдан туруктуу болгондуктан, химиялык аппараттарды жана оптикалык приборлорду жасоо үчүн колдонулат.

Кремнезём щелочтордо, фосфор кислотасында, плавик кислотасында HF эрийт. Щелочтордо эрип, силикаттарды пайда кылат.




Натрий силикаты менен калий силикаты эрүүчү айнек деп аталат. Бул силикаттардын концентрацияланган эритмеси суюк айнек деген ат менен белгилүү. Андан желим (клей) жасалат.

Табигый алюмосиликаттар абанын жана суунун (жаандын) таасири менен бузулуп, щелочтуу металлдардын оксиддери эрип кетет да, анын ордун суунун молекулалары ээлеп, чопого, анан топуракка айланат.

Кремнезёмду, силикаттарды, чопону, топурактарды сырье катары пайдалануучу өнер жайы *силикат өнөр жайы* деп аталат. Өндүрүп чыгарылуучу негизги продуктулары – керамика, айнек жана цемент. Айнек байыркы Азия өлкөлөрүндө биздин эрага чейинки 3000-жылдарда эле чыгарылуучу экен. Буга Баг-

даддын жанынан табылган айнек цилиндр күбө. Цементтин негизинде бетон, шлакбетон жана темир-бетон сыйктуу куруулуш материалдары да өндүрүлөт.

Айнек чыгаруу. Кремнезёмдун басымдуу бөлүгү айнек даярдоо үчүн жумшалат. Кадимки терезе айнегин соданын, кумдун (SiO_2) жана акиташ ташынын аралашмасын балкытып эритип алышат. Балкытып эритүү 1400°C да газдар толук чыгып бүткөнчө улантылат.



Алынган айнекке жашыл сымак түстү андагы анча-мынча кошумча зат катары кармалып калган темир силикаты берет.

Айнекке тигил же бул физика-химиялык касиетти (тунуктук, бекемдик, түстүүлүк, химиялык жана термиялык туруктуулук) берүү үчүн ага кошумча заттар киргизилет. Мисалы айнектин курамындагы кальцийди коргошунга, натрийди калийге алмаштырса, жогорку тыгыздыктагы жана жарыкты жакшы чагылдыруучу айнек алынып, андан кооз хрусталь идиш-аяктар жасалат. Коргошун айнеги «хрусталь» деген ат менен белгилүү. Көк түстөгү айнектерде кобальттын бирикмелери, изумруддай жашыл түстөгү айнектерде Cr_2O_3 , сыя (фиолетовый) түстөгү айнектерде марганецтин бирикмелери ж. б. бар. Айнектерге айрым заттарды кошуп, майда кристаллдык структураны берүү менен, өтө бекем (ок өтпөгөн) айнектер алынууда.

Балкып эриген айнек акырындык менен катат. Ошол себептүү аны катканга чейин чоюп, үйлөп (бөтөлкө, электр лампалары), ныктап (топчулар), кысып өткөрүп (күзгү айнектери), чоюп (бараңча айнектер, айнек түтүктөрү жана таякчалары) ар кандай формаларга келтирүүгө болот. Айнектен айнек жиптери да жасалат. Алар изоляциялоочу материалдар катары пайдаланылат.

Керамика чыгаруу. Керамика өндүрүүнүн негизги сырьёсу – топурак. Топурактын көп түрү бар. Ал курамында кумду ж. б. заттарды кармал турат. Таза топурак (каолин) – ак түстө болот, анын курамы болжолдуу түрдө төмөнкү формула менен туюнтулат:



Ак топурак белгилүү сандагы суу менен камыр сыйктуу жуурулуп, каалагандай формага оной келүүчү массага айланууга жөндөмдүү. Алынган ал массаны ар кыл формага келтирип, кургатып, андан кийин күйгүзүп, ар түрлүү буюмдарды жасоого болот. Топурак отко чыдамдуу, б. а. жогорку температурада механикалык бышыктыгын сактайт.


Керамика өнөр жайы одоно керамика өндүрүүчү жана назик керамика өндүрүүчү болуп бөлүнөт. Одоно керамика чыгаруучу өндүрүштө кыш (кирпич), карапа, кислотага жана отко чыдамдуу буюмдар, дренаждык түтүктөр, черепица, каптоочу такталар жасалат. Ал эми назик керамика чыгаруучу өнөр жайларында фарфор жана фаянс буюмдары глазурь менен капталат. Глазурь – оной эрип, айнек сымал тунук, катта турган силикаттар. Айнек сымал, бирок тунук эмес каптооч заттар эмаль деп аталат.

Фарфор буюмдары турмуш-тиричиликтө, химия, электр-техника өнөр жайында, химиялык лабораторияларда кенири колдонулат.

Айнек, болот эритүүчү мештер, мартен мештери отко чыдамдуу динас же шамот менен төшөлөт. Динас дээрлик балкытып эритилген кремнезёмдон (93% SiO_2 жакын), ал эми шамот отко чыдамдуу ак топурактан турат. Ак топурак алдынала кызытылып, андан кийин майдаланып коюлат.

Цемент өндүрүү. Азыркы учурда курулуш иштерин жүргүзүү цементсиз мүмкүн эмес. Цемент – боз күкүм (порошок) түрүндөгү карман калуучу (чаптап калуучу) материал. Кыргызстанда цемент Күрмөнтүдө жана Кантта өндүрүлөт.

Цементтин баштапкы сырьёлору: кумга (SiO_2) бай топурак жана акиташ ташы – CaCO_3 . Бул заттар жакшы аралыштырылып, узундугу 200 м, диаметри 5 м, кыйгач орнотулган цилиндр түрүндөгү айланып туроочу меште күйгүзүлөт. Күйгүзүү учурунда меш өз огунда тегеренип турат. Мештин төмөнкү жагынан газ же башка отундар күйгүзүлүп, андан бөлүнүп чыккан ысык газдар мештин жогорку жагынан жылып келаткан баштапкы аралашмага карама-каршы ағып, аларды ысытып, татаал химиялык процесстердин жүрүшүнө шарт түзөт. Топурак менен акиташ ташынын ортосунда болжол менен төмөнкүдөй реакциялар жүрөт:



Реакциянын жүрүшүнөн пайда болгон зат тоголокчолор түрүндө мештин төмөн жагын көздөй жылып бышат. Бул затты музданан кийин майдалап, нымдан сактоо үчүн мүшектөрө салат. Алынган цемент «портландцемент» деп аталат. Цементтин суу менен аралаштырылган камыр сымал массасы ылдам катып, карман калууга (чаптап калууга) жөндөмдүү. Ылдам катып, карман калышынын себеби цементтеги силикаттардын, алюминаттардын суу менен аракеттенишип, аны өзүнө тартып алышы менен түшүндүрүлөт. Цементтин курамына кирүүчү компоненттер-

ди өзгөртүү менен цементтин аязга жана ысыкка чыдамдуу, ылдам катуучу, кеңейип кетүүчү ж. б. сортторун алышат.

Цементтин негизинде куруулуш материалдарынын дагы бир түрү – бетон алынат. Бетон шагыл менен аралаштырылып, шлакбетон алынат. Эгерде бетонду темир менен өзөктөнтүп алса, анда абдан эле бекем куруулуш материалы – темир-бетон (железобетон) алынат. Азыркы кездеги куруулуштардын дәэрлик басымдуу бөлүгү (имараттар, ГЭС тосмолору – плотиналар, завод-фабрикалардын корпустары, аэродромдор ж. б.) темир-бетондон турат.

- ?
- 1. Кремнийдин физикалык жана химиялык касиеттери кандай?
- 2. Кремний (IV) оксидинин физикалык касиеттерине токтолгула жана алардын көмүртек (IV) оксидинин физикалык касиеттеринен айырма-чылыгын айтып түшүндүргүлө.
- 3. Кремний (IV) оксидинин химиялык касиеттерин мүнөздөгүлө.
- 4. Кремний кислотасынын алышына, физикалык, химиялык касиеттерине токтолгула жана алар көмүр кислотасына эмнелери менен окошош жана кандай айырмалары бар?
- 5. Кремний кислотасынын сууда эрий турган кайсы түздарын билесинер?
- 6. Кремний кислотасын алуу реакцияларынын тенденмелерин жазгыла, кремний кислотасынын структуралык формуласын түзгүлө.



Кыргызстандагы силикат өнөр жайы жөнүндө кошумча адабияттардан маалымат топтугула.

§ 8. Металлдар

Азыр бизге белгилүү 110 элемент бар. Алардын басымдуу көпчүлүгү металлдарга тиешелүү (80ден көбүрөөгү). Металлдар металл эместерден айырмаланып, бардыгына тиешелүү болгон бир топ касиеттерге ээ. Алар менен төмөнүрөөктө таанышабыз.

Элементтердин мезгилдик системасында металлдар таблицанын ой менен жүргүзүлгөн диагоналдан ылдыйкы сол жак бөлүгүн ээлешет. Ар бир чоң мезгилдин 10 орду металлдарга тиешелүү. Эгерде таблицанын топчолору боюнча карасак, металлдар биринчи, экинчи, үчүнчү топтун негизги топчосунда, ошондой эле калган топтордун кошумча топчолорунда жайгашкан.

Негизги жана кошумча топчолордогу металлдардын жалпы мүнөздөмөсү. Биринчи топтун негизги тобунда литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций жайгашкан. Бул элементтердин жөнөкөй элементардык заттары – нуктура металлдар. Бул топко кирген элементтер щелочтуу металлдар деген ат менен белгилүү. Щелочтуу деп аталышынын себеби – күчтүү щелочторду (жегичтерди) пайда кылгандыгында.

Бул топчого кирген элементтердин сырткы электрондук катмарында бирден гана s-электрондору бар. Ал валенттик электрон деп аталып, ядро менен бошонураак тартылышат. Ошол себептүү щелочтуу металлдар ал электрондорун женил беришет да, күчтүү калыбына келтиргичтик касиетти көрсөтө алышат. Валенттик электрондорун берип, кычкылдантыч саны +1ге барабар он заряддагы ионго айланышат.

Бул топчого кирген металлдар өтө активдүү. Катар номурлары өскөн сайын булардын металлдык касиеттери күчөйт.

Экинчи топтун негизги топчосунда «щелочтуу жер металлдары» деп аталган кальций, стронций, барий жана радий элементтери жайгашкан. «Щелочтуу жер металлдары» деп щелочтуу металлдар менен (Na, K, Rb, Cs) жер металлдарынын (жердеги б. а. топурактын курамына кирген элементтер, өкүлү - Al) ортосунан орун алғандыгынан улам аталып калган болууга тийиш. Айрым учурларда бул элементтердин оксиддеринин щелочтуу металлдардын оксиддери менен алюминийдин оксидинин орток касиетине ээ болушунун натыйжасында келип чыккан деп да жүрүштөт. Бул топчого щелочтуу жер металлдарынан башка да бериллий жана магний элементтери тиешелүү. Топчонун элементтеринин ичинен радий гана өзүнүн радиоактивдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп турат. Калган касиеттери топчонун башка элементтерине окшош.

Бул топчонун элементтеринин атомдорунун сырткы катмарында жупташкан 2s-электрону бар. Химиялык реакцияларда булар электрондорун женил эле берип, кычкылдануу саны +2 барабар болгон ионго айланат. Күчтүү калыбына келтиргичтер. Женил кычкылданышат. Ядрорунун заряддары өскөн сайын атомдук радиустары кичиреет. Иондошуу потенциалдары азаят.

Үчүнчү топтун негизги топчосуна алюминий, гелий, индий, талий кирет. Бул элементтердин атомдорунун сырткы энергетикалык деңгээлинде жупташкан 2s-электрону жана жупташпаган бир p-электрону бар. Химиялык бирикмелерди пайда кылууда бул элементтер валенттик электрондорун толугу менен берип, кычкылдануу даражасы +3 болгон он ионго айланат. Бул топчого кирген элементтердин металлдык касиети кошуна болгон II топтун негизги топчосундагы элементтердин металлдык касиетине караганда начарыраак. Мисалы, II жана III топко кирген элементтердин айрымдарын салыштырсак, II топко тиешелүү болгон бериллий металл болсо, ал эми аны менен кошуна III топко тиешелүү болгон бор металл эмес. Бордун оксиidi B_2O_3 кислота-

лык касиетке ээ болсо, III топтун негизги топчосуна тиешелүү алюминийдин оксиidi Al_2O_3 амфотердик касиетке ээ.

Ошентип, мезгилдик системадагы элементтердин металлдык касиеттери топ боюнча жогортон төмөн карай өсөт да, ал эми мезгил боюнча солдон онго, б. а. элементтердин ядролорунун заряды (катар номуру) өскөн сайын начарлайт.


Атомдун ядросунун заряды (элементтердин катар номуру) бирге көбөйгөндө өзүн курчап турган электрондордун саны да бирге көбөйөт. Ошол жаны кошулган электрон системанын негизги топчосунда жайгашкан металлдардын атомдорунда анын сырткы энергиялык денгээлине жайгашат. Жаңы кошулган электрон кошумча топчодон орун алган металлдардын атомунда сырткы катмардын алдындагы энергиялык денгээлге жайгашат. Мисалы, 21-элемент Sc атомундагы сырткы жана анын алдындагы катмарда электрондор $3d^14s^2$ болуп жайгашат. Буга бир электрон кошулгандан кийинки элемент – титан. Атомунун сырткы жана анын алдындагы катмарда электрондор $3d^24s^2$ болуп калды. Эгер жалпы түрдө көрсөтсөк Sc – 2, 8, 9, 2; Ti – 2, 8, 10, 2.

Ошентип, ар бир жаңы кошулган электрон сырткы катмардын алдынкы катмарынан орун алыш олтуруп, жалпы саны 18ге жеткенде (Sc–Zn) ал катмар толук толгон болот да, жаңы катмар башталат. Андан кийинки жаңы кошулган электрон кайрадан эн сырткы жаны катмардан орун ала берет (б. а. сырткы катмардагы электрондордун саны 8ге чейин өсө берет).


V, VI, VII мезгилдердеги кошумча топчолордун металлдарында деле электрондор ушундай законченемдүүлүктө жүрөт.

Кошумча топчодогу металлдар химиялык реакцияларда сырткы жана анын алдындагы катмардан ар кандай сандагы электрондорун бере алат. Ошол себептүү алар ар кандай сандагы кычкылдануу даражасына ээ. Мисалы, ванадий +2ден +5ке чейин, хром +2ден +6га чейин, марганец +2ден +7ге чейин.

● **Кычкылдануу даражасы (кычкылдануу саны, формалдуу заряд) – кычкылдануу, калыбына келүү процесстерин жана кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларын жазудагы жардамчы (шарттуу) чондук болуп саналат. Кычкылдануу даражасы иондордун зарядына жана молекуладагы атомдун формалдуу зарядына же химиялык формалдуу бирдикке туура келет.** Мисалы,



Ар бир атомдун үстүнүн оң жағында көрсөтүлгөн индексте ал атомдун кычкылдануу даражасы көрсөтүлгөн. Жөнөкөй заттардын кычкылдануу даражалары нөлгө барабар, мисалы,



- ?
- 1. Учурда бизге белгилүү болгон 110 элементтин көпчүлүк бөлүгү металлдарбы же металл эмстерби?
- 2. Металлдарга мүнөздүү кайсы жалпы касиеттерди билесинер?
- 3. Металлдардын түзүлүшүндө кандай өзгөчөлүктөр бар?
- 4. Негизги топчонун жана кошумча топчонун металлдары кандайча айырмаланышат?

- 回家
- 1. Атомдун түзүлүшүн эсинарга түшүргүлө. Атомдогу энергиялык деңгээлдердин толтурулуш иретин мисалдардын негизинде көрсөткүлө.
- 2. Негизги жана кошумча топчолордун металлдарынын электрондук түзүлүштөрүнөн мисалдарды көлтиргиле.

§ 9. Металлдардын физикалык касиеттери



Асанов Усен Асанович

Химия илимдеринин доктору (1977), профессор (1980), КР Улуттук илимдер академиясынын академиги, КР Инженердик академиясынын мүчесү (1993), Эл аралык инженердик академиянын мүчесү (1995), КР илимге эмгек сицирген ишмери (1994).

Химия жана химиялык технология боюнча адис, 250 илимий эмгектин, 6 монографиянын, 7 окуу китебинин, 47 ойлоп табуунун автору.

Металлдардын физикалык жана химиялык касиеттеринин жалпылыгы алардын атомдорунун түзүлүшүнүн окшоштугу жана металлдык байланыш деп аталуучу өзгөчө химиялык байланыштын табияты менен түшүндүрүлөт.

● Металлдардын кристаллдык торчосунда бир эле убакта алардын иондору, нейтралдуу атомдору жана алардын арасындағы эркин жүрүүчү электрондору болгон учурдагы байланыш металлдык байланыш деп аталат.

Металлдардын кристаллдык торчосунда жайлансашкан атомдордун валенттик орбиталдары ар бирине тиешелүү болбостон,

алар жалпылаштырылган. Ошол себептүү валенттик электрондор бир атомдон экинчисине женил өтүп, газ түрүндө бош кыймылда болушат да, ар бир атомго эмес, жалпы атомдорго тиешелүү болушат. Металлдын торчосундагы электрондорду «электрондан турган газ» деп да коюшат. Бир сөз менен айтканда металлдардын кристаллдык торчосунда бир эле убакта алардын иондору, нейтралдуу атомдору жана бош кыймылдагы жалпылаштырылган электрондору болот.

Металлдарга жалпы тиешелүү болгон физикалык касиеттерге алардын металлдык жаркырактыгы, электр агымын жана жылуулукту жакшы өткөргүчтүгү, балка менен согууда ийкемдүүлүгү, ийилгичтиги, чоюлгучтүгү, бышыктыгы жана катуулугу кирет.

Металлдын жаркырактыгы. Тегизделип жышылса же жаңы эле кристаллдашкан абалда турса бардык металлдар жаркырактыкка ээ. Бул касиет алардын жарык нурларын жакшы чагылдырышы менен түшүндүрүлөт. Металлдар ошондой эле радиотолкундарды да жакшы чагылдырат. Металлдардын бул жөндөмдүүлүгү алыстагы телолорду издеөчү радиолокаторлордо пайдаланылат.

Майдаланган металл жаркырабайт. Абдан жуука чоюлган алтын жашыл түскө ээ.

Электр жана жылуулук өткөргүчтүгү. Металлдар электр агымын жана жылуулукту жакшы өткөрүшөт. Бул касиеттер металлдык торчолордо әркин жылып жүрүүчү бош электрондордун бар экендиги менен түшүндүрүлөт. Ал электрондор электр талаасында багыттуу кыймылга ээ.


Электр агымын жана жылуулукту өткөргүчтүгү боюнча биринчи орунда күмүш, андан кийин жез, алюминий турат. Электртехникада көбүнчө жез менен алюминий пайдаланылат. Биринчи орунdagы күмүштү пайдаланса болмок, бирок ал өтө эле аз жана кымбат. Начар электр өткөргүч металлдарга коргошун жана сымап кирет.

Чоюлгучтүгү жана ийилгичтиги. Көптөгөн металлдар морт сыяктуу көрүнөт. Металлдардын чоюлгучтүгү жана ийилгичтиги алардын тазалыгына жараشا болот. Алюминийди көп убакыт бою морт металл деп келишкен. Көрсө ал абдан тазартылган эмес экен. Таза алюминий – абдан эле чоюлгуч, ийилгич металл.

Металлдардын чоюлгучтүгү жана ийилгичтиги деле металлдык байланыш менен түшүндүрүлөт. Кристаллдык торчодогу иондор бири-бири менен түз байланышкан эмес. Алар катмар-катмар болуп жайланаishi кан. Чоюуда жана ийүүдө бир катмар экинчи катмардан ажырап, үзүлүп кетпестен, жөн гана жылышат.

Металлдардын чоюлгучтугу (согуудагы ийкемдүүлүгү) жана ийилгичтиги бирдей эмес. Эн жакшы чоюлгуч металлдарга алтын, күмүш, жез кирсе, чоюлгучтугу начар металлдарга висмут, марганец тиешелүү.

Катуулугу. Бардык металлдар (сынаптан башкасы) кадимки шартта катуу. Катуулугу боюнча да алар бирдей эмес. Щелочтуу металлдарды бычак менен кесүүгө болот. Ал эми хром катуулугу боюнча алмазга жакын.



14-сүрөт. Металлдык кристаллдын схема түрүндө берилиши.

Металлдар эрүү температурасы жана тыгыздыгы ж. б. касиеттери боюнча да айырмаланышат. Металлдардын эрүү температурасы -39°Сан (Hg) 3410°Сна (W) чейинки аралыкта жатат. Эрүү температурасы боюнча оной эрүүчү металлдар жана кыйынчылык менен эрүүчү металлдар болуп белүнүштөт.

Металлдардын тыгыздыктары $534 \text{ кг}/\text{м}^3$ дан (Li) $22500 \text{ кг}/\text{м}^3$ га (Os) чейинки аралыкта жатат. Металлдар тыгыздыктары боюнча жеңил металлдар (тыгыздыгы $5000 \text{ кг}/\text{м}^3$ дан аз – магний, алюминий,

титан ж. б.) жана оор металлдар (жез, коргошун, калай, цинк, осмий ж. б.) болуп белүнөт.

Металлдардын өнөр жайдын тигил же бул тармагында колдонулушу алардын жогоруда келтирилген физикалык касиеттерине негизделет. Мисалы, жеңил металлдар учуучу аппараттарды жасоодо ж. б. у. с.

- ?
- 1. Металлдардын жалпы физикалык касиеттери кайсылар?
- 2. Металлдардын жалпы физикалык касиеттерин алардын түзүлүш теориясына таянып түшүндүргүлө.
- 3. Физикалык касиеттери сilerге жакшы тааныш металлдарды атагыла.



Техникада металлдарды түрдүүчө классификациялашат:

1. Тыгыздыгына байланыштуу: а) жеңил металлдар (литий, натрий, калий, барий, берилий, алюминий, титан, магний); б) оор металлдар (жогорку аталгандардан башкалары).
2. Балкуу температурасына ылайык: а) оной балкып эрүүчү (калай, висмут ж. б.); б) оной менен балкып эрибөөчү (IV, V жана VI мезгилдердин кошумча топчосунун металлдары жана рений).
3. Химиялык активдүүлүгү төмөн болгонуна байланыштуу асыл металлдарды (алтын, күмүш, платина жана анын аналогдору – осмий,

иридий, рутений, палладий, радий) айырмалашат, өзгөчөлүгүн белгилешет.


4. Химиялык касиеттеринин жакындығы бойонча: а) щелочтуу металлдар (литий, натрий, I A топчосунун металлдары); б) щелочтуу жер металлдар (кальций, стронций, барий, радий); в) сейрек кездешүүчү металлдар (скандий, иттрий, лантан жана лантаноиддер, актиний жана актиноиддер).
5. Темир жана анын куймалары – кара металлдар, ал эми калгандары – түстүү металлдар деп аталышат.
6. Түстүү металлдардан сейрек кездешүүчү металлдар өз ичара төмөнкүдөй ажырымдалат:
 - а) женил металлдар (жегич металлдар жана бериллий);
 - б) чачыранды металлдар (гелий, индий ж.б.);
 - в) оной менен балкып эрибеген металлдар (жогоруда көрсөтүлгөндөр, хромдон башкасы);
 - г) радиоактивдүү металлдар (технеций, прометий, полоний, франций жана андан кийинкилер).

Бул маалыматтарды пайдаланып, жогоруда көлтирилген металлдардын кайда колдонула тургандыгын кошумча адабияттардан издешиле, дептеринерге жазып алгыла.

§ 10. Металлдардын химиялык касиеттери

Металлдардын атомдорунда валенттик электрондору ядросу менен начар тартылышкан. Андыктан алар химиялык реакцияларда ал электрондорун оңай эле беришет да, өздөрү он заряддагы иондорго айланышат, б. а. калыбына көлтиргичтер болуп эсептелишет. Эн күчтүү калыбына көлтиргичтер – щелочтуу жана щелочтуу жер металлдары. III–VI топтордун негизги топчолоруна кирген металлдардын калыбына көлтиргич касиеттери щелочтуу жана щелочтуу жер металлдарына караганда начарыраак.


Металлдар калыбына көлтиргичтер катары металл эместер, кислоталар, туздар менен аракеттенишет. Металл эместерден кычкылтек, күкүрт жана галогендер менен металлдар абдан күчтүү реакцияланышат.



Бул реакцияларда металл эместер – кычкылдантычтар, ал эми металлдар – калыбына көлтиргичтер. Мындај реакциялар кычкылдантыч-калыбына көлтиргич реакциялар болуп эсептөлөт. Көлтирилген реакцияларды жалпы түрдө: $\text{Me}^0 - \text{ne}^- \rightarrow \text{Me}^{+n}$ схемасы түрүндө көрсөтсө болот.


Металлдардын ар кандай заттар менен жүргөн реакцияларынын ылдамдыктары жана жүрүү температурадары ар түрлүү. Мисалы, щелочтуу металлдар абадагы кычкылтектен менен ылдам эле кадимки температурада реакцияга кирсе, темир жана жез ысытууда гана аракеттенишет. Ал эми асыл металлдар (алтын, платина ж. б.) кычкылтектен менен реакцияга кирбейт, б. а. кычкылданышпайт.

Металлдар кислоталар менен реакцияга кирип, сүүтектин сүрүп чыгарышат. Схема түрүндө ал төмөнкүчө берилет:



Металлдардын калыбына келтиргичтик касиеттери. Металлдардын калыбына келтиргич жөндөмдүүлүктөрүн салыштырууда алардын суу жана кислоталар, туздар менен болгон реакциялары абдан мүнөздүү. Бул металлдардын активдүүлүк катары менен байланыштуу.





§ 11. Металлдардын активдүүлүк катары





**Николай Николаевич Бекетов
(1827–1911)**

Физикалык химия боюнча орус окумуштуусу. Физикалык химиянын өз алдынча илим катары өөрчүшүнө көмөк берген. Металлдарды алардын туздарынан башка металлдардын жана сүүтектин таасири менен сүрүп чыгаруу химиялык процессин ачкан.

Металлдардын калыбына келтиргич жөндөмдүүлүктөрү ар кандай. Төмөнкү реакцияларды талдап көрөлү.





Келтирилген реакцияларда металлдар суутектин иондору жана башка металлдардын иондору (Cu^{2+}) менен да кычкылданып жаткандыгын көрүп турасыңыз. Бул реакцияларда натрий, цинк жана темирдин атомдору – калыбына келтиргичтер. Натрий, цинк суутектин ионун калыбына келтирецет. Ал эми жез аны калыбына келтире албайт, б. а. жез суутекти кислоталардан сүрүп чыгара албайт.

Ошондой эле темир жездин ионун (Cu^{2+}) калыбына келтирецет. Ал эми жез темирдин ионун (Fe^{2+}) калыбына келтире албайт.

Кайсы металлдын иону кайсы металлдын ионун калыбына келтире ала тургандыгын алдынала айтыш үчүн алардын активдүүлүк катарын билүүгө тийишизи.

Металлдарды калыбына келтиргич активдүүлүктөрү боюнча жайгаштырсақ, ал төмөнкү катарды түзөт:


Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Be, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.


Металлдардын бул катары чыналуу катары деп аталат. Бул катар жөн эле ойдон алышып түзүлгөн эмес. Ал металлдардын электрондорун берүү жөндөмдүүлүктөрү боюнча түзүлгөн. Металлдардын электрондорун берүү жөндөмдүүлүктөрү алардын иондошуу энергиясына жараша болот.

- **Дүүлүкпөгөн атомдон бир электрондуң бөлүнүп кетиши үчүн зарп кылынуучу энергиянын саны иондошуу энергиясы деп аталат.**

Атомдор электрондорун канчалык женил берсе, б. а. электрондорун берүүде аз энергияны талап кылса, ал ошончолук активдүү. Жогоруда келтирилген мисалда темир жезге караганда активдүү.

Эгерде жездин сульфатынын эритмесине сымалты таасир этсе реакция жүрбөйт. Сымал жезди анын тузунун эритмесинен сүрүп чыгара албайт. Ал эми тескерисинче жез пластинкасына кандайдыр бир сымалтын тузун (мисалы, сымал нитратын $-\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$) тамызганда, бир аздан кийин анын бетиндеги тамчы күмүшкө окшоп жаркырап калат. Түссүз эритме жездин тузунун эритмесинин түсүнө келет. Мында жез сымалты сүрүп чыгарып жатат. Сүрүлүп чыккан сымал жездин үстүнө жайгашып, ал күмүш түстү берип жаркырайт.





Жөз электрондорун сымапка берди. Келтирилген реакциялар жездин активдүүлүгү темирге караганда начар, ал эми сымапка караганда жогору экендигин далилдейт.

Ошентип, туздардын эритмелеринде металлды сүрүп чыгарыш үчүн электрондор активдүү металлдын атомунан активдүүлүгү салыштырмалуу төмөн болгон металлдын атомуна өтүш керек. Ошондо гана реакция жүрөт жана мындай реакциялар кайталангыс реакциялар болуп эсептелет.

Металлдардын чыналуу катары эң активдүү щелочтуу жана щелочтуу жер металлдарынан башталып, активдүүлүгү начар асыл металлдар менен бүтөт.

Жогоруда келтирилген мисалдардын негизинде бул катарга тиешелүү болгон төмөнкүдөй тыянактарды чыгарууга болот.

1. Металл чыналуу катарында канчалык баш жагында орун алган болсо, ал ошончолук активдүү жана калыбына келтиргич жөндөмдүүлүгү да жогору, б. а. женил кычкылданат.

2. Металл чыналуу катарында канчалык аяк жагында орношкон болсо, анын активдүүлүгү ошончолук начар, б. а. кыйынчылык менен кычкылданат (Ag , Pt , Au – асыл металлдар, абадагы кычкылтек менен кычкылданбайт). Иондорунан женил эле калыбына келишет.






3. Катардагы ар бир металл өзүнөн кийинки жайгашкан металлдардын иондорун (катиондорун) алардын туздарынын эритмелеринен калыбына келтире алат.

4. Катардагы суутекке чейинки жайгашкан металлдар (магнийден баштап) кислоталардын суюлтулган эритмелеринен (азот кислотасынан башкаларынан) суутекти сүрүп чыгарат. Ал эми суутектен кийинки металлдар аны сүрүп чыгара албайт.

Бул жердеги «магнийден баштап» дегенибиздин себеби, ага чейинки щелочтуу жана щелочтуу жер металлдары кислоталардын гана эритмелеринен эмес, суудан да суутекти оной эле сүрүп чыгарышат. Щелочтуу металлдар суу менен буркан-шаркан түшүрүп реакцияга кирет. Ошол себептүү щелочтуу жана щелочтуу жер металлдарын кислоталардан суутекти сүрүп чыгаруу үчүн пайдаланбайт.

«Азот кислотасынан башкалары» дегенибиздин себеби, азот кислотасы бардык концентрацияларында кычкылдантыч касиетке ээ. Металлдар менен реакцияга киргенде анын концентрациясына жараша ар кандай калыбына келген дарражадагы азот-

тун оксиддери пайда болот. Кислотанын концентрациясы канчалык аз болсо, кислотадагы азоттун калыбына келүү даражасы ошончолук жогору. Бир эле концентрациядагы азот кислотасы менен аракеттенишүүчү металлдар канчалык активдүү болсо, азот кислотасындагы азоттун калыбына келүү даражасы ошончолук чоң. Мисалы,



- ?
- 1. Эмне үчүн металлдардын атомдору валенттик электрондорун башка атомдорго оной беришет?
- 2. Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларында металлдар кандай касиеттерди көрсөтөт.
- 3. Металлдардын активдүүлүк катары алардын кайсы касиеттерине байланыштуу түзүлгөн.
- 4. Иондошуу энергиясы деп эмне аталат?
- 5. Химиялык реакция учурунда бир металлдын экинчи металлды сүрүп чыгаруу касиети эмнеге байланыштуу?
- 6. Кычкылдануу саны (даражасы) деген түшүнүк кандай түшүнүк?



Төмөнкү кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларын аягына чейин жазып, реакцияга кирген металлдар канчадан электрондорду берерин аныктагыла, реакцияларды төндегиле:



§ 12. Металлдардын алышы. Металлдарды рудадан калыбына келтирүү

Металлдардын жаратылышта кездешиши. Металлдын активдүүлүк катардагы абалы, б. а. катардын кайсы жеринде орун алышы анын жаратылышта кандай абалда кездешери жөнүндө да алдынала түшүнүк берет. Чыналуу катарындагы суутекке чейинки металлдар активдүү, андиктан алар жаратылышта биримелер түрүндө кездешсе, суутектен кийинки жайгашкан активдүүлүгү азыраак металлдар (сыман, жез, күмүш) айрым учур-

ларда баш уюган түрдө жолугат, көпчүлүк учурда бирикмелер түрүндө кездешет. Ал эми катардын эң аягынан орун алган элементтер (алтын, платина) дәэрлик баш уюган түрдө кездешет.

Металлды таза түрүндө бөлүп алуунун булагы болгон жаратылыштык бирикмелеринин орчуандуу жыйналышы руда деп аталат. Рудаларда металлдар оксиддер, сульфиддер, хлориддер, карбонаттар, сульфаттар, фосфаттар түрүндө болушу мүмкүн.

Эгерде руда эки же бир нече металлдарды бөлүп алууга мүмкүндүк берсе, анда ал руда полиметалл рудасы деп аталат.

Металлдардын алышын жолдору абдан көп жана металлдардын активдүүлүктөрүнө жараша жүргүзүлөт.




Абдан активдүү металлдар – щелочтуу, щелочтуу жер металлдары жана алюминий электролиз жолу менен алышат. Активдүүлүктөрү азыраак металлдар (темир, сурьма, сымап ж. б.) бирикмелеринен тигил же бул калыбына келтиргичтердин жардамы менен калыбына келтирилип алышат.







15-сүрөт. Жер кыртышында химиялык элементтердин таралышы.

- Металлдарды рудалардан бөлүп алуучу өнөр жайды металлургия өнөр жайы деп атайт. Металлдардын алышын жолдоруна жараша пирометаллургия, гидрометаллургия жана электрометаллургия өнөр жайы деп бөлүнөт.

Пирометаллургия өнөр жайында металлдарды жогорку температурада оксид түрүндөгү рудалардан кокс, көмүр оксиidi, суутек, метан ж. б. калыбына келтиргичтер менен калыбына келтирип, бөлүп алат. Мисалы,



Эгерде рудадагы металл сульфид түрүндө болсо, анда, руда алдынала қүйгүзүлүп, оксидге айландырылат да, андан кийин ал кокс менен калыбына келтирилет. Мисалы, Sb_2S_3 , HgS ж. б.




Сымапты алууда калыбына келтиригич пайдаланылбайт. Жогорку температурада пайда боло баштаган сымаптын оксиidi ошол замат эле курамдык бөлүктөрүнө ажырайт. Сымап буусу керамика түтүгүнөн өтүп жатканда конденсацияланат.

Айрым учурларда калыбына келтиригич катарында алынып жаткан металлга караганда активдүүлүгү жогору болгон металл колдонулат (металлотермия). Мисалы,





Ушундай жол менен хром, титан, молибден жана вольфрам алышат.

Айрым учурда металлдарды алардын оксиддеринен суутек менен калыбына келтирип алышат. Мисалы,




Гидрометаллургияда металлдар алардын туздарынын эритмелеринен алышат. Руда кислоталарда эритилип, электролит алышат да, алышуучу металл электролиттен же электролиз жолу менен, же активдүүрөөк металл менен сүрүп чыгарылат. Мисалы,



Бул жол менен алтын, күмүш, цинк, кадмий алышат.

Электр-химия өнөр жайында металлдар алардын балкытып эритилген оксиддеринен, хлориддеринен же щелочтордон электр тогунун жардамы менен калыбына келтирилип (электролиз) алышат. Металлдардын бул жол менен алышынын түшүнүү үчүн электролиз процесси менен таанышалы.

Электролиз. Электр ағымынын жардамы менен жүрүүчү химиялык реакцияларды (процесстерди) электролиз деп атайды.




16-сүрөт. Темирди анын оксидинен алюминий менен калыбына келтириүү.



Гемфри Деви (1778–1829)

Химия жана физика боюнча англиялык окумуштуу. Электр-химияны негиздөөчүлөрдүн бири. Туздарды жана жегичтерди электролиздөө жолу менен калииди, натрийди, барийди, кальцийди, стронцийдин амальгамасын жана магнийди алган.




17-сүрөт. Электролиз үчүн курал.

17-сүрөт. Электролиз үчүн курал.


17-сүрөт. Электролиз үчүн курал.

Электролиз – жеке гана активдүү металлдарды алуу үчүн эмес, татаал заттарды (NaOH , KOH) алууда жана металл буюмдарды никель, хром, цинк, калай, алтын ж. б. менен жаап кооздообдо да колдонулуучу, әл чарбасы үчүн эң керектүү процесс. Эмесе электролиз процессинин жүрүшүн талкуулайлы. У түрүндөгү айнек түтүкчөсүнө жез (II) хлоридинин эритмесин куюп, көмүр таякчалары орнотулган тыгындар менен жаап (17-сүрөт), туруктуу электр агымынын булагына (аккумулятор) туташтыралы. Бир аздан кийин түтүкчөнүн бир жагындагы көмүр таякча (электрод) жез менен капиталып кызарат. Ал эми экинчи жагына түшүрүлгөн көмүр таякчасынын (электроддун) жанынан хлор газынын бүртүкчөлөрү бөлүнүп жатканын көрсөнөр. Эритмеге түшүрүлгөн көмүр таякчалары ток булагына туташтырылганда бирөө он зарядга (анод), бирөө терс зарядга (катод) ээ болот. Эритмедеги жездин хлориди төмөнкүдөй диссоциацияланараы эсинарде чыгар:





Мына ушул иондор электр агымынын таасири менен багыттуу кыймылга ээ болуп, жездин иону катодго (-), ал эми хлор иону анодго (+) келе баштайт. Ал электроддордун үстүнкү беттеринде төмөнкүдөй электр-химиялык процесстер жүрөт:

катоддо (-)



аноддо (+)



Катод – терс заряддагы электрод. Анын үстүнкү бетинде электрондор көп. Ал эми анод он заряддагы электрод, анын үстүнкү бетинде электрондор жетишсиз.

Катоддо жездин иону 2 электронду андан кошуп алат да, нейтралдуу абалга келип, электроддун үстүнө жайгашат. Аноддо электрон жетишсиз болуп жаткандыктан, ал жанына келген хлор ионунан электронду алат. Нейтралдуу абалга келген хлор дун атомдору эки-экиден биригип, анын молекулалары газ бүртүк-чөлөрү түрүндө бөлүнө баштайт. Электролиз процессинде анод он зарядда, катод терс зарядда болору эсинарден чыкпасын. Катоддун үстүнкү бетинде кычкылдануу, ал эми аноддун үстүндө калыбына келүү процесстери жүрүп жаткандыгын көрдүнөр.

- Демек, электролиттердин эритмелери же балкымалары аркылуу электр агымын откөргөн учурда жүргөн кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары электролиз деп аталат экен.

Электролиз жүргөн идиш электролизёр деп аталат. Ал гальваникалык элементке окошош. Айырмасы гальваникалык элементте химиялык реакциянын негизинде электр агымы пайда болсо, электролизёрдо электр агымынын жардамы менен химиялык реакция жүрөт.


Жогоруда биз электролиттин эритмесинин электролизи менен таанышып оттүк. Эми электролиттин балкымасынын электролизин щелочтуу жана щелочтуу жер металлдарынын жана алюминийдин алышынш мисалында карал көрөлү (18-сүрөт).

Туздар, щелочтор, оксиддер балкытылып эритилгенде эритмедегидей эле иондорго ажырайт.





Электролизде:

катоддо (-)




kychkyldanuu

аноддо (+)



kalabyina kelyy



18-сүрөт. Натрий хлоридинин балкып эриген эритмесинин электролизи:
1-анод; 2-катод; 3-диафрагма.

Республикабыздын аймагындагы изилденген вольфрам (Нарын тарапта), калай (Сарыжазда), висмут (Миронов кени) алышуучу рудалардын келечеги кен.

Тоолорубуз алтынга да бай экендиги белгилүү, кыргыз жергеси толгон-токой кен байлыкка (алюминий, висмут, темир, марганец ж.б.) ээ экендигин геологдор ачкан 2000ге жакын кендер, анын ичинен запасы 10 млрд т Борбордуң Төнкүрттөндөгү темир кени эле көрсөтүп жатат.

- ? 1. Металлдардын алышын жолдору кайсылар?
- 2. Металлургия өнөр жайлары кайсылар?
- 3. Металлдарды рудалардан белүп алуу кантит ишке ашырылат?
- 4. Металлдарды алуунун электролиз жолунун кандай өзгөчөлүгү бар? Кайсы металлдар электролиз менен алышат?
- 5. Металлдардын металл катары активдүүлүгү менен алардын иондорунун активдүүлүгүндө кандай өзгөчөлүктөр бар?
- 6. Кыргызстанда кандай кендер бар экен? Силер дагы кайсы кендерди билесинер? Кайсылары иштетилип жатат?

- 1. Электролиз учурунда кандай процесстер жүрөрүн мисалдар менен түшүндүрүүгө аракет жасагыла.
- 2. Электролиздин практикада колдонулушу менен тааныштыла.

§ 13. Металлдардын техникада колдонулушу

Көпчүлүк металлдар күйма түрүндө колдонулат. Ошондуктан куймаларга токтололу.

Металлдар балкып эриген абалында бири-бири менен өзара аракеттенишке, бири-биринде эришке, бири-биринин кристаллдык торчолоруна өтүп кетишке жана торчолордо биринин ордун бири алмаштырууга жөндөмдүү. Мунун себеби – баарына тиешелүү болгон металлдык байланыштын өзгөчөлүгү.

Балкыма айрым металл әместерди да эритет. Мисалы, көмүртек, кремний, мышьяк ж.б.

Сүйткандан кийинки мындай аралашкан балкыманы күйма деп атait. Металлдар таза түрүндө сейрек колдонулат. Эл чарбасында көбүнчө алардын куймалары пайдаланылат. Металлдардын таза түрүндө сейрек колдонулушунун себеби алар өндүрүштө коюлган талаптарга толугураак жооп бербейт, б. а. бир касиети өндүрүштү канаттандырса, башка касиети канаттандырайт. Мисалы, жез жана алтын электр ағымын, жылуулукту жакшы өткөрөт, жакшы чоюлат, бирок алар өтө эле жумшак жана бышык әмес. Ал эми алардын куймалары бышык жана өтө жумшак әмес.

Күйма эки жана андан көп элементтерден турат. Балкып турган абалынан суутканда курамындағы компоненттердин кристаллдашып, катуу фазага айланышына жараша күйманы катуу эритме, механикалык (жөн эле) аралашма жана интерметаллдык бирикмелер деп айырмалап бөлүштөт.

Катуу эритме түрүндөгү күймада кристаллдык торчолорунун түйүндөрүндөгү металлдардын атомдорунун ар түрдүүлүгүнө карбай бир түрдүү кристаллдар пайда болот. Суюк абалында компоненттер бири-бири менен кандай аралашкан болсо, катуу абалында деле ошондой бойдон калат. Мисалы, жез менен никелдин же жез менен алтындын күймасы. Мында күймаларда компоненттердин өлчөмдөрү бири-бирине салыштырмалуу жакын.

Күймадагы компоненттердин өлчөмдөрү бири-бириненabdандэле айырмаланыпса, анда кристаллдык торчонун түйүндөрүндө металлдардын өлчөмдөрү жакын болгон атомдору жайгашып, ал эми өлчөмү боюнча айырмаланган компонент ал торчонун ичине сыйып калат. Мисалы, көмүр менен темирдин күймасы – болот. Мында көмүртектин атому темирдин кристаллдык торчосунун ичинен орун алат.

Механикалык аралашма түрүндөгү күйма суюк абалында бир түрдүү, б. а. компоненттер бири-бирине тегиз аралашкан.

Ал эми катуу абалында, б. а. суутканда ар бир компонент өз алдынча кристаллдашат. Мисалы, магний менен коргошундун, магний менен цинктин, калий менен коргошундун ж. б. күймалары.

Интерметаллдык бирикмелер түрүндөгү күймада компоненттер (ар кандай металлдардын атомдору) бири-бири менен химиялык кошулма түрүндө биригишкен болот. Мисалы, Mg_2Sn , Cu_3Al , Ag_5Al_3 ж. б.

Металл эместерди балкып турган металлдарда эриткенде да химиялык бирикме пайда болушу мүмкүн. Мисалы, металлдардын карбиддери. Булар да күйма катары каралат. Мисалы, MgC , FeC , W_2C , Mo_2C ж. б. Булар abдан катуулугу, кыйынчылык менен эригичтити жана жогорку температурага чыдамдуулуктары менен айырмаланып турат.

Күймалар өндүрүштө колдонулуш багыттары боюнча: женил эрүүчү, онойлук менен эрибөөчү, жумшак, катуу, женил, жогорку температурага чыдамдуу, химиялык чөйрөгө чыдамдуу ж. б. болуп белүнөт. Булардын айрымдарына төмөнкү темада токтолобуз.

Металлдардын жана күймалардын колдонулушу

Металлдар таза түрүндө күймаларына караганда салыштырмалуу сейрек колдонулат. Таза түрүндө колдонулуучу металлдар: сымап – медицинада, хром, никель, цинк – дат басып же бузулуп

кетүүчү шаймандарды каптоодо; уран – атом электр станциясында жана согуш техникасында; вольфрам, жез, алюминий – электр-техникада; рубидий, цезий – фотоэлементтерди чыгарууда ж. б.

Эл чарбасынын көпчүлүк тармактарында металлдардын куймалары колдонулат. Куймалардын физикалык касиеттери аны түзүп турган компоненттеринин физикалык касиеттеринен абсолюттеги айырмаланып турат. Мисалы, Вуддун куймасы: 50% Bi, 25% Pb, 12,5% Sn, 12,5% Cd ден туруп, эрүү температурасы 65–70°C ди түзөт, б. а. суунун кайноо чекитинен да төмөн. Ал эми 41% Bi, 22% Pb, 11% Sn, 8% Cd, 18% Zn тен турган куйманын эрүү температурасы 47°C. Ошол эле учурда ушул куймаларга киргөн металлдардын эрүү температуналары бир топ эле жогору: β -Sn – 231,9°C; Pb – 327,4°C; Bi – 271°C; Cd – 321°C; Zn – 157°C.

Адатта айтылып жүргөн алтын saat, күмүш иймек, платина билерик, алтын же платинадан салынуучу тиштер да таза металлдардан жасалбастан, аз санда кошулган тигил же бул металлдардын куймалары.

Азыркы учурда техникада дәэрлик металлдардын куймалары пайдаланылат. Куймалардын тизмеси өтө эле көп. Алардын ичинен айрымдарын келтирили.

Жогоруда келтирилген Вуддун куймасы басмаканада жана кандоо иштеринде колдонулат.

Кыйындык менен эрүүчү куйма 20% HfC, 80% TaC тен туруп, эрүү температурасы 4000°C уна барабар.

Электрон 3–10% Al, 0,2–3% Zn, 0,15–0,5 Mn, калганы Mg ден турат. Абдан бышык, тыгыздыгы аз ($1,8 \text{ г}/\text{см}^3$). Эрүү температурасы 625°C. Ракета жана самолет курууда пайдаланылат.

Мелхиор – жез менен никелдин куймасы. Андан кооз идиш-аяктар жасалат (53% Cu, 27% Ni жана 20% Zn). Бул куйма электр-техникада да колдонулат.

Дюралюминий – алюминийдин аз сандагы жез, марганец жана магний менен болгон куймасы. Бул куйма абдан жөңілдігіне карарай каттуулугу боюнча болотко жакын. Техниканын түрлүү тармактарында пайдаланылат.

Коло (бронза) – байыркы доордо алынган куймалардын өкүлү. Иштөөгө элпек, ошол эле убакытта бышык, б. а. жакшы механикалык касиетке ээ. Бул куйма куюп алынуучу жасалгалардан (кооз кашаалар, айкелдер ж. б.) баштап, техниканын подшипник өндүү айрым тетиктерин жасоого чейин пайдаланылат.

Латунь – жез менен цинктиң куймасы: 60% Cu, 40% Zn аралыгында курамы өзгөрө берет. Эл чарбасынын ар түрдүү тармактары көркөтөөчү материал.

Темирдин көмүртек менен куймалары адегендे чоюн жана болот болгон. Кийинчөрөк темирдин негизинде курамында хром, никель ж. б.

элементтерди камтыған жаңы күймалар алынган. Натыйжада темирдин башка жаңы күймалары – көмүртектүү болоттор, чоюндар, легирленген болоттор жана өзгөчө касиеттерге ээ болоттор алынды. Техникада темирдин күймалары кара металлдар, ал әми аларды өндүрүү кара металлургия деп аталат.

Машина курууда негизинен темирдин күймасы – болот пайдаланылат. Колдонулуучу металлдардын жалпы массасынын 90% тен ашыгы болоттон турат. Болотторго марганецти, хлорду, никелди, кобальтты, ванадийди, молибденди, вольфрамды кошуу менен легирленген болотторду алышууда. Легирлөө латындын «лигаре» – байланыштыруу, бириктируү деген сөзүнөн алынган.

Түстүү металлдардын ичинен жезді жана алюминийди өндүрүү эн алдынкы орундарды әзлөйт. Анткени жез жылуулукту жана электрди жакшы өткөрөт, бекем, коррозияга туруктуу, жакшы куюлат. Ар түрдүү электр-техникалык жабдууларды даярдоо үчүн да эн сонун материал болуп саналат. Жездин көпчүлүк белүгү электр-техникалык жабдууларды жасоо үчүн керектелет.

Жездин күймалары химиялык аппараттарды жасоодо концентрациялык материалдар катары, так приборлорду даярдоо үчүн, автомобиль өнөр жайларында колдонулат. Жөз баалуу жана жетишпейт. Ошондуктан анын ордуна башка металлдарды, мисалы, алюминийди, колдонууга болот.


Алюминийдин кенири колдонулушу анын төмөнкү сапат-касиеттегине – алюминийдин тыгыздыгынын төмөндүгүнө, күймаларынын бекемдигине, коррозияга туруктуулугуна, жакшы куюла тургандыгына жана арзандыгына байланыштуу.

Алюминийдин магний менен болгон күймалары коррозияга туруктуу, жогорку температурага чыдамдуу. Мындаи күймалар самолет курууда, электрондук жабдууларды жасоодо конструкциялык материал катары колдонулат.

Никелдин көпчүлүк белүгү темир, жез, цинк ж. б. металлдар менен күймаларды өндүрүүгө жумшалат. Никелдин ысыкка ($850\text{--}900^{\circ}\text{C}$) чыдамдуу күймалары турбиналарды, реактивдик кыймылдаткычтарды даярдоого кетет (алар – никоник, инконель, хастелой күймалары). Нихром күймасынан электр жылыткычтары даярдалат. Инвор күймасы (36% Ni жана 64% Fe) электр-радиотехникада, химиялык машиналарды курууда колдонулат.

Сымап – бөлмө температурасында суюк абалда болуучу жалгыз металл. Өндүрүштө натрий гидроксидин, хлорду өндүрүүдө катод катары, көптөгөн органикалык бирикмелерди алууда, атом энергетикасында уран блокторун эриттүүдө колдонулат. Ошондой эле күндүзгү жарык лампаларын, кварц лампаларын, манометрлерди, термометрлерди даярдоого жумшалат. Тоо-кен иштеринде алтынды металл әмес аралашмалардан белүүдө пайдаланылат.

Сурьма айрым күймаларды бекемдөө, бышыктоо үчүн кошулат. Сурьма, коргошун жана калайдан турган күйма басмакана металлы же



19-сүрөт. Электр лампасын даярдоодо колдонулуучу металлдар.

Күмүш дагы – жумшак металл. Анын куймалары зергер буюмдарын, тыйындарды, лабораториялык идиштерди даярдоодо колдонулат.

Күмүш башка металлдарды каптоого, электр өткөрүмдүүлүгү жогору жана коррозияга туруктуу болгондуктан, радиотетиктерди жасоого көркөтөт. Ошондой эле күмүш-цинк аккумуляторлорун өндүрүүдө да сарпталат.

Платина химиялык жактан туруктуу болгондуктан, андан лабораториялык идиштер – тигелдер, чашкалар, кайынчалар даярдалат. Платина аноддору электр-химиялык өндүрүштө пайдаланылат. Платина катализатор катары, ошондой эле электр жылытыкчарынын тетиктерин жасоо үчүн көркөтөт.

Молибдендин тантал менен болгон куймасынан лабораториялык идиштер, таза молибденден электр лампадарынын тетиктери – аноддор, торчлор, катоддор, токту киргизүү жеринин, лампанын күйүчү бөлүгүн карман туруучу тетиктер даярдалат.

Вольфрамдын көпчүлүк бөлүгү атайын болотторду жана куймаларды даярдоо үчүн жумшалат. Мындаидар киймалар кескичтерди, арааларды, фрезаларды, рубильниктерди даярдоодо колдонулат.

Вольфрамдан лампанын эн негизги жарык берүүчү бөлүгү жасалат.

- ?
- 1. Эмне үчүн металлдар куймалар түрүндө колдонулат?
- 2. Куймалар жөнүндө эмне билесинер?
- 3. Машина курууда негизинен кайсы куйма колдонулат?
- 4. Болот менен чоюндуң айырмасы барбы? Алардын техникада колдонулушу кандай?
- 5. Түстүү металлдардын техникада колдонулушун мисалдар менен түшүнүргүлө.




Биздин өлкөдө кайсы түстүү металлдар өндүрүлөрүн кошумча адабияттардан, маалымат каражаттарынан билүүгө аракеттенгиле.

VI глава


ОРГАНИКАЛЫК БИРИКМЕЛЕР

§ 1. Көмүртек атомунун түзүлүшүнүң өзгөчөлүгү

Химиялык белгиси – С. Салыштырма атомдук массасы $\text{Ar}(\text{C}) \approx 12$, ядросунун заряды +6. Көмүртектин атомунун сырткы электрондук катмарында жупташкан эки s- жана жупташпаган эки p-электрон болот. Көмүртектин электрондук формуласы:




Көмүртек атомунун дүүлүкпөгөн абалында электрондорунун орбиталдарга бөлүштүрүлүшү төмөндө келтирилген:



Бул учурда көмүртек башка атомдор менен аракеттенишип, эки коваленттик байланышты түзөт да, эки валенттүүлүккө ээ болот.

Көмүртек атомунун козголгон абалында экинчи энергиялык денгээлиндеги жупташкан s-электрондордун бирөө ажырап, p-орбиталдык бош уячасынан (ячейкасынан) орун алыши мүмкүн. Анда жупташпаган электрондордун саны төрт болот:




Көмүртек атомдорундагы жупташпаган төрт электрон башка атомдор менен аракеттенишкенде төрт уюлдуу коваленттик байланыштарды пайда кылат. Ар бир байланыш пайда болгондо энергия бөлүнүп чыгарын билебиз.

Көмүртек үч түрдүү аллотропиялык түр өзгөргүчтүккө ээ. Жаратылышта көздешүүчү жана жасалма жол менен алынуучу,

ички түзүлүшү менен айырмаланган, кадимки шартта туруктуу графит жана алмаз көмүртектин негизги аллотропиялык модификациялары болуп саналат.

- Бир элементтен түзүлгөн бир нече жөнөкөй заттардын түрлөрү, ошол элементтин аллотропиялык түр өзгөргүчтүгү же модификациясы деп аталат.

Графитте С атомдору Sp^2 -гибриддешүү, ал эми алмазда Sp^3 -гибриддешүү абалында болот. Жасалма жол менен графиттин жана алмаздын структурасы кайталанган *айнек көмүртек* аттуу зат алынган. Ыштын түзүлүшү да графитке окшош. Жасалма жол менен көмүртектин дагы бир модификациясы, формасы болгон карбин алынган. Башка формалардан айырмаланып, С атомдору өзара жөнөкөй гана байланыш (бир байланыш) менен байланышпастан, эки жана үчтүк байланыштар менен да байланышат.



20-сүрөт. Көмүртектин колдонулушу.

- ?
- 1. Мезгилдик системада алган орду боюнча көмүртектин атомунун мүнөздөмөсү кандай?
- 2. Көмүртек атомунун түзүлүшүндө кандай өзгөчөлүктөр бар?
- 3. Көмүртек атомунун нормалдуу жана дүүлүккөн абалдарынын айырмасы эмнеде?
- 4. Эмне үчүн көпчүлүк бирикмелеринде көмүртек төрт валенттүү?

- 1. Көмүртектин аллотропиялык түр өзгөргүчтүгү боюнча маалыматтарды кошумча адабияттардан издегиле, баяндоого аракет жасагыла.
- 2. Алмаз менен графиттин кристаллдык торчолорун айырмалагыла.




§ 2. Көмүртектин органикалык эмес жана органикалык бирикмелери


Көмүртектин аллотропиялык түрү болгон алмаз – изолятор, ал эми графит электр ағымын өткөрөт. Алмаз өтө катуу, графит болсо жумшак. 1200°C да жана 50 мин атм. басымда графитти алмазга айландырса болот, ал эми 1000°C да абаны катыштыrbай туруп, алмазды графитке айландырууга болот. Ыш болсо салыштырмалуу үстүнкү бети менен айырмаланат (1 г ыш бир нече жүздөгөн квадрат метрге жетет).

Бөлмө температурасында көмүртектин кайсы гана модификациясы болбосун инерттүү болот. Ысытканда аморфтуу көмүр оңой реакцияга кирет, алмаз болсо химиялык жактан туруктуу. Ыш $300\text{--}500^{\circ}\text{C}$ да, графит $700\text{--}800^{\circ}\text{C}$ да, алмаз $850\text{--}1000^{\circ}\text{C}$ да абада өзүнөн өзү от алат.

Эгерде кычкылтек жетиштүү болсо, CO_2 пайда болот:




Кычкылтек жетишпесе, 600°C да ис газы – CO пайда болот:




Жогорку температура ларда графит, көмүр, ыш суутек менен аракеттенишет:



Реакциянын жүрүү шарты – $600\text{--}1000^{\circ}\text{C}$, катализатор дун катышуусу.



Графит металлдар менен аракеттенишкенде карбиддерди: Al_4C_3 , CaC_2 ж.б. пайда кылат. Ал карбиддер суу менен аракетте-нишкенде ажырайт:



Көмүртектин жөнөкөйүрөөк курамга ээ негизги бирикмелери болуп метан CH_4 , көмүрtek (II) оксиidi CO жана көмүрtek (IV) оксиidi CO_2 саналат.

Метандын CH_4 молекуласы – тетраэдр, анын чокуларында суутек Н атомдору, борборунда С атому жайгашкан. Метан көп жылуулук бөлүп чыгаруу менен күйөт:





көмүртектин атомунун өзгөчөлүгүнөн издөө керек. Алардын не-гизгилери төмөнкүлөр:









1. Көмүртектин атомунун сырткы электрондук катмарында 2 s-электрону, 2 p-электрону, жалпысынан 4 электрону бар. 8 электрондук туруктуу катмарды ээлөө үчүн, 4 электронду кошуп алууга, же жоготууга муктаждыгы бирдей. Ошондуктан көмүртек мезгилдик системанын көпчүлүк элементтери менен түрдүү байланыштарда катышууга жөндөмдүү. Мисалы,



Электрондордо бай P, O, N, S элементтери менен көмүртек ар түрдүү байланыштарды пайда кылат:



2. Көмүртек өзара болобу же башка элементтер аркылуубу, эки атомдон баштап миндеген атомдордон турган түз, бутакташкан, туюк чынжырлуу жана мейкиндикте ар кандай түзүлүшкө ээ болгон молекулаларды пайда кылууга жөндөмдүү:



R – углеводороддук радикал.

3. Чынжырдагы көмүртектин атомдорунун саны өскөн сайын алардын изомерлеринин санынын кескин түрдө көбөйүшүү да, алардын бир себеби боло алат. Чынжырларга башка топтор-

дун же радикалдардын кошулушу изомерлердин санын ого бетер көбөйтөт (11-таблица).

11-т а б л и ц а

Углеводороддор менен спирттердин гомологиялык катарларындагы изомерлердин санынын өсүшү

Молекуларадагы көмүртектин саны	Изомерлердин саны			Молекуларадагы көмүртектин саны	Изомерлердин саны		
	метан катарында	этилен катарында	бир атомдуу спирттерде		метан катарында	этилен катарында	бир атомдуу спирттерде
C ₁	1	—	1	C ₆	5	13	17
C ₂	1	1	1	C ₇	9	27	43
C ₃	1	1	2	C ₈	18	66	93
C ₄	2	3	4	C ₉	35	—	225
C ₅	3	5	8	C ₁₀	75	—	543

4. Химиялык байланыштарды пайда кылууда көмүртектин атомдору өзара же башка элементтер менен жөнөкөй, кош жана үч (әселик) байланыштарды түзөт:



5. Көпчүлүк бирикмелеринде көмүртек байланыш энергиясы – Е₆ аз (12-таблица), бирок уюлдашуусу жогору, сырткы таасирге өтө ийкемдүү коваленттик жана уюлдуу байланыштагы молекулаларды пайда кылат.

12-т а б л и ц а

Коваленттик байланыш энергиясы

Байланыш	Байланыш энергиясы, ккал/моль	Байланыш	Байланыш энергиясы, ккал/моль
C – C	63	C – O	85
C = C	101	C = O	177
C ≡ C	128	C – F	102
C – N	73	C – Cl	78
C = N	147	C – Br	65
C – H	99	C – I	58



- ? 1. Көмүртектин аллотропиялык модификациялары кайсылар? Алар кандай касиеттерге ээ?
2. Көмүртектин органикалык эмес негизги бирикмелери кайсылар?
3. Көмүр кислотасынын кандай касиеттерин билесинер?
4. Органикалык заттардын көптүгүнүн жана ар түрдүүлүгүнүн себеби эмнеде?
5. Эмне себептен көмүртек көпчүлүк элементтер менен ар түрдүү байланыштарды пайда кылуу менен аракеттенишет?
6. Көмүртек түзгөн кандай органикалык бирикмелерди билдинер?
7. Көмүртек элементинин башка химиялык элементтерден кандай өзгөчөлүктөр бар?
8. Көмүртек элементи кандай байланыштарды түзө алат?



Көмүртектин бирикмелеринен кальций карбиди, көмүртек (II, III) оксидтери, натрий карбонаттары турмушта қандай максаттар үчүн колдонуладын кошумча адабияттардан издегиле, баяндап жазғыла.



§ 3. Көмүртек бирикмелеринин түзүлүш формулалары

Көмүртек өзгөчө элемент экендигине токтолдук. Мезгилдик системадагы бир да элемент көмүртек сыйктуу көп түрдүү бирикмелерди пайда кылбайт. Мындай көп түрдүүлүктүн себеби көмүртек атомдорунун бири-бири менен көп ирет биригишинде болуп саналат. Бул учурда түрдүү – түз, бутактуу жана жабык чынжырлар (циклдик) пайда болот. Мисалы:





Бул чынжырлар көмүртектин абдан көп атомдорун кармап жүрө аллат.

Көмүртек атомдору өзара жөнөкөй байланыштар (бирдик) менен гана байланышпастаң, кош жана үчтүк байланыштар менен байланышы мүмкүн:




Бул бирикмелердин ар биринде көмүртек атомдору төрт валенттүү.


- Молекулалардагы атомдордун биригиш иретин көрсөткөн формулалар структуралық формулалар же түзүлүш формулалары деп аталат. Элементтердин атомдору символдор менен берилет. Бирок түзүлүш формулалары реалдуу молекулалардын толук чагылдырылыши боло албайт. Түзүлүш формулаларды кыскартып жазууга болот, аларды жөнөкөй-лөтүлгөн формула деп атоого да болот. Мисалы,



метан




пропан



бутан

Формулалын жазуунун мындай түрүндө байланышты белгилеген сыйыкча көмүртектин атомдорунун ортосунда гана сакталат. Органикалык химияда электрондук формулалар да колдонулат.

Электрондук формулалар да молекулалардагы атомдордун байланыш иретин көрсөтөт, бирок сыйыкчанын ордунда атомдун сырткы электрондору көрсөтүлөт. Мисалы, метандын, этандын, пропандын электрондук формулалары төмөнкүчө жазылат:



- ? 1. Көмүртек элементинин башка элементтерден айырмасы кайсы?
2. Түзүлүш формулаларынын түрлөрү кандай?
3. Көмүртек атомдору байланыштын кайсы түрлөрү менен байланышты мүмкүн?
4. Кыскартылган (жөнөкөйлөтүлгөн) формулалар түзүлүш формулаларынан кандайча айырмаланат?
5. Электрондук формулалар кандайча жазылат, байланыштар кандай белгиленет?

§ 4. Гомология

Гректин homologos – оқшош деген сөзүнөн келип чыккан.

- Бир же бир нече бирдей функциялық топтор же метилен ($-\text{CH}_2-$) менен айырмаланған, бирдей түзүлүштөргө ээ болгон, химиялық касиеттери оқшош органикалық бирикмелердин катары гомологиялық катар деп аталат. $-\text{CH}_2-$ тобу гомологиялық айырма, ал эми гомологиялық катардын мүчөлөрү гомологдор деп аталат. Мисалы, чектүү углеводородордун (метандын) гомологиялық катары төмөнкү жалпы формулага ээ болот: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$.
- Молекулаларындагы көмүртек атомдорунун байланыштары сутек атомдору менен толук каныккан углеводороддор чектүү каныккан углеводороддор деп аталат.



Гомологиялық катардын мүчөлөрүнө типтүү химиялық реакциялар мүнөздүү, анткени алардын жалпы функциялық тобу оқшош.

Органикалық бирикмелердин касиеттери (молекулалын химиялық реакциялар учурунда өзгөрүүгө дуушарлануучу бөлүгү) негизинен функциялық тобу менен аныкталат. Ал органикалық бирикмелерди гомологиялық катары же органикалық бирикмелердин класстары боюнча системалоого мүмкүндүк берет. Кайсы гана гомологиялық катар болбосун көпчүлүк реакциялар бирдей

жүрөт, айрым учурда гана гомологиялық катардын бирикмелеринде башкача жүрүшү мүмкүн.

Жогоруда келтирген чектүү углеводороддор метан, этан, пропан, бутандын аягы -ан менен бүткөнүн билдик. Бул катардагы углеводороддор *алкандар* деп аталышат.

Этилендин катарындагы чексиз углеводороддор *алкиндер* деп аталышат. Алардын жалпы формуласы: C_nH_{2n} . Аталыштарынын аягы -ен менен бүтөт. Мисалы,



этилен



пропилен

Ацетилендин катарындагы чексиз углеводороддор *алкиндер* деп аталышат. Жалпы формуласы C_nH_{2n-2} . Бул катардагы бирикмелердин аттарынын баары -ин мүчөсү менен бүтөт.



ацетилен (этин)



пропин

Жалпы формулалардагы n – көмүртек атомдорунун саны.



Башка углеводороддордун гомологиялық катарлары менен бара-бара таанышасынар.

Гомологиялық катардагы заттардын физикалық-химиялық касиеттери алардын молекулалық массаларынын өсүшүнө жараша законченемдүү өзгөрүштөт.


- ?
- 1. Гомологиялық катарга органикалық бирикмелердин кайсы топтору кирет?
- 2. Гомологиялық катардагы органикалық бирикмелердин кандай окшоштуктары жана кандай айырмачылыктары бар?
- 3. Гомологиялық катардагы органикалық бирикмелердин физикалық-химиялық касиеттери эмнеге жараза өзгерөт?
- 4. Жалпы формулалар эмнени түшүндүрөт?

§ 5. Изомерия

А. М. Бутлеровго чейин органикалық химиядагы түшүнүксүз кубулуш – изомерия – бирдей молекулалық формулага ээ, бирок касиеттери ар кандай заттардын бар экендиги белгилүү болгон. 1861-жылга чейин C_4H_{10} курамдагы бир гана зат – бутан белгилүү эле. А. М. Бутлеров ушундай эле молекулалық формулага ээ болгон дагы бир зат болушу керек, бирок атомдордун жайланашиб ирети башка деп айткан. Ал затты А. М. Бутлеров изобутан (мындаайча айтканда бутандын изомери) деп атап, аны синтездөөнүн методун сунуш эткен да, аны тез арада өзү ишке ашырган:




Бутандын молекуласын карап, ой жүгүрткүлө, атомдорду дагы кандай кылышп жайгаштырса болот?




22-сүрөт. Тартылган молекулалының формулаларын жазғыла.

22а-сүрөттөгү түзүлүш менен 22в-сүрөттөгү түзүлүштү салыштыргыла. 22а,в-сүрөттөгү заттардын химиялық курамы бирдей, бирок көмүртектик «скелети» ар башка, атомдордун биригиш ирети менен айырмаланат, ошондуктан ал заттын касиети да башка. Химиялық курамы C_4H_{10} болгон түрдүү заттар менен кездешебиз, алар изомерлер деп аталышат. Алар физикалық (мисалы, Н-бутандын кайноо температурасы – 0,5°C, изобутандыкы – 11,7°C) жана химиялық касиеттери боюнча айырмаланышат. Изобутандын молекуласында үчүнчүлүк көмүртек атомуна бириккен суутектин атому (22а-сүрөттө) калгандарына караганда реакцияга жөндөмдүлүгү жорогу.

Гомологиялык катарды улантабыз. Суутектин атомдорун жазбасак деле болот, бирок алар жөнүндө унутпоо керек, анткени көмүртек дайыма төрт валенттүү.




23-сүрөт. Пентандын изомерлери.



24-сүрөт. Гептандын изомерлеринин жөнөкейлөтүлгөн формулаларын жазғыла. Анын канча изомери бар?

- ? 1. Изомерлер деп эмнени айтабыз?
 2. Эмне үчүн төмөнкү ереже (аныктама) туура эмес: «Изомерлер – бирдей химиялык курамга ээ, бирок молекулаларынын формасы ар түрдүү». Изомерлер бири-биринен эмнеси менен айырмаланышат?
 3. Изооктандын эң узун чынжырындагы көмүртек атомдорун номурлагыла.



- a) Молекуладагы биринчилик, экинчилик, үчүнчүлүк жана төртүнчүлүк көмүртек атомдорун көрсөткүлө. Андан да жогорку катардагы атомдор болушу мүмкүнбү?
- б) Көмүртектин кайсы атомдорунун жанындагы сүүтек атомдору реакцияга көбүрөөк же азыраак жөндөмдүү?
- в) Октандын формуласын жазгыла.
- г) Нормалдуу октандын түзүлүш формуласын түзгүлө.
4. Биринчилик, экинчилик, үчүнчүлүк, төртүнчүлүк көмүртек атомдору на канчадан сүүтек атомдору бириккен?
5. Кайсы затта (нормалдуу бутанда же изобутанда) молекулалар бири бирине катуу тартылышат? Жоопту параграфтын текстинен издегиле. Баяндап бергиле.
6. Көмүртектин аллотропиялык модификациясын изомерлер деп атаса болобу?
7. Гександын (C_6P_{14}) бардык изомерлеринин структуралык формулаларын түзгүлө.
8. Изооктандын химиялык формуласы кандай?

1. 25-сүрөттө заттардын изомерлеринин (2–3тен өкүлдөрү) 4 тобу берилген. Аларды тапкыла. Топторго белүп жазгыла.

1. $\text{C}-\overset{\text{C}}{\underset{\text{O}}{ }}-\text{C}$	2. $\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{Cl}$	3. $\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{C}$
4. $\text{C}-\text{C}-\text{C}=\text{O}$	5. $\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{OH}$	6. $\text{C}-\text{C}-\overset{\text{C}}{\underset{\text{O}}{ }}-\text{C}-\text{OH}$
7. $\text{C}-\overset{\text{C}}{\underset{\text{Cl}}{ }}-\text{C}$	8. $\text{C}-\overset{\text{C}}{\underset{\text{C}}{ }}-\overset{\text{C}}{\underset{\text{O}}{ }}-\text{C}-\text{OH}$	9. $\text{C}-\text{C}-\text{O}-\overset{\text{C}}{\underset{\text{O}}{ }}-\text{C}-\text{C}$

25-сүрөт. Төмөнкү заттардын формулалары берилген.


1-ацетон; 2-хлорпропан; 3-метилэтил эфири; 4-пропион альдегиди; 5-пропанол; 6-май кислотасы (жууган майга ачуу даам берет); 7-изохлорпропан; 8-изомай кислотасы; 9-этилацетат.

2. Эмне үчүн органикалык заттар көп? Азыркы учурда 7,5 млн зат белгилүү. Төмөнкү таблицадагы пентакозандын изомерлеринин санына көнүл бургула.

Метандын гомологиялык катарындагы углеводороддордун изомерлеринин аттары жана алардын сандары C_nH_{2n+2}

№	Аталышы	Изомерлеринин саны
1.	Метан	1
2.	Этан	1
3.	Пропан	1
4.	Бутан	2
5.	Пентан	3
6.	Гексан	5
7.	Гепттан	9
8.	Октан	18
9.	Нонан	35
10.	Декан	75
15.	Пентадекан	4347
20.	Эйкозон	366319
25.	Пентакозан	36797588
70.	Гептаконтан	$5 \cdot 10^{226}$

§ 6. А. М. Бутлеровдун органикалық заттардын химиялық түзүлүш теориясы



**Александр Михайлович Бутлеров
(1828–1886)**

Химия боюнча орус окумуштуусу, Петербург Илимдер академиясынын (1874-жылдан баштап) академиги. Органикалық заттардын химиялық түзүлүш теориясын түзгөн (1861-ж.). Көптөгөн органикалық бирикмелердин изомериясын алдын ала айткан жана изилдеген. Көптөгөн заттарды синтездеген.

Александр Михайлович Бутлеров атомдор молекулаларда белгилүү иретте жайланашият, молекулалынын түзүлүшүн окуп үйрөнсө болот, молекулалынын түзүлүшү гана заттардын касиеттерин аныктайт деп айткан (касиеттердин сапаттык жана сандык курамга байланыштуу экендиги мурдатан эле белгилүү болгон).

А. М. Бутлеров өзү түзгөн түзүлүш теориясынын негизги жоболорун табият сыноочулардын жана врачтардын 1861-жылы Шпейерде болгон съездинде жасаган «Заттардын химиялык түзүлүшү жөнүндө» докладында билдирген. Ал докладда төмөнкүлөр айтылган: «Татаал заттардын химиялык табияты алардын элементардык курамдык бөлүктөрү, алардын сандары жана химиялык түзүлүштөрү менен аныкталат, андан ары: телого кирген ар бир химиялык атом молекуланын түзүлүшүнө катышат да, өзүнө тиешелүү болгон химиялык күчтүн белгилүү саны менен таасир этет, мен химиялык түзүлүш деп бол күчтүн таасиригин (бөлүштүрүлүшүнүн) негизинде химиялык атомдор бири бирине түздөн-түз же кыйыр таасир этүү менен химиялык бир бөлүкчөгө биригишин атайм». А. М. Бутлеров «химиялык» түзүлүш деп атагандыгынын себеби, аны химиялык методдор менен заттардын айланыштарын окуп-үйрөнүү аркылуу аныктаса болот. Ошентип, А. М. Бутлеровдун теориясынын негизги идеясы түзүлүштүн касиеттер менен болгон диалектикалык байланышында болуп саналат: молекулалардын химиялык түзүлүштөрү алардын касиеттерин аныктайт, ал эми химиялык касиеттерин окуп-үйрөнүү түзүлүштү аныктоого, тактоого мүмкүнчүлүк берет.

Учурдагы терминдерди пайдалануу менен А. М. Бутлеровдун теориясынын маңызын төмөнкүчө берүүгө болот:

1. Молекулаларда атомдор валенттүүлүктөрүнө жараша белгилүү иреттүүлүктө химиялык байланыштар менен байланышкан.

2. Молекулалардын түзүлүшү ошол молекулага гана таандык болгон жекече түзүлүш формуласы менен берилет. Бул формула да элементтердин символдору (валенттик штрихтер) сызықчалар менен белгиленип, алар коваленттик байланыштарды белгилейт. Ошентип түзүлүш формулалары атомдордун иреттүү жайгашышын жана алардын ортосундагы (жөнөкөй, эки, үчтүк) байланыштардын эселигин көрсөтөт.

3. Заттардын касиеттери молекулалардын сапаттык жана сандык курамдары, алардын түзүлүштөрү жана химиялык байланыш менен байланышкан же байланышпаган молекулалардагы атомдордун өзара аракеттери менен аныкталат.

4. Молекулалардын түзүлүштөрү химиялык методдор менен окулуп үйрөнүлөт.

Түзүлүш теориясынын келип чыгышынын негизи болуп атом-молекулалык окуу, валенттүүлүк түшүнүгүнүн киргизилиши жана көмүртек атомунун төрт валенттүүлүгүнүн такталышы саналат.

А. М. Бутлеров түзгөн теория илимий дүйнөдө алгач терс кабыл алынган.

Бирок бир нече жылдан кийин ал теория жалпы окумуштуулар тарабынан таанылган. Таанылышынын эки жагдайы болгон:

1. Бутлеровдун теориясы ага чейинки органикалык химиядағы башаламандыкты иретке келтирген.

1835-жылы Ф. Велер (органикалық әмес заттардан органикалық заттарды биринчи алган химик окумуштуу) И. Берцелиуска төмөнкүдөй кат жазган: «Органикалық химия азыркы учурда кимди болсо да акылдан адаштырат. Ал түбүне бир түшсөн, чыга албай турган түпсүз идиш сыйктуу, өтүүгө мүмкүн әмес чытырман токой сыйктуу сезилет».

2. Ал кадимки илимий теориялар сыйктуу белгилүү фактыларды гана түшүндүрбөстөн, белгисиз фактыларды, ачыла элек заттардын бар экендингин, алардын касиеттерин алдынала айттууга мүмкүндүк берген.

Изомерия кубулушунун ачылышы А. М. Бутлеровдун теориясынын биринчи далили болгон.

А. М. Бутлеровдун теориясы, өзү алдынала көргөндөй, эки багытта – молекулалардын мейкиндиктик түзүлүшү (атомдордун үч өлчөмдүү мейкиндиктеги реалдуу орун алышы) жана электрондук элестөөлөрдүн өнүгүшү (химиялык байланыштын маңызын тактоо) – өнүккөн.

Молекулалардын реалдуу физикалык түзүлүшү, учурдагы методдор аркылуу аныкталуу менен, химиялык түзүлүшкө толугу менен туура келген да, теориянын тууралыгын дагы бир жолу далилдеген. Ушул себептүү молекуланын түзүлүшү жөнүндө сөз болгондо, «химиялык» деген терминди кошуп айтпай эле, жөн гана «түзүлүш» деп айтышат.

Учурда органикалык химияда органикалық реакциялардын механиздерин окуп-үйрөнүүгө көбүрөөк көнүл бурулууда. Бул окуп-үйрөнүү А. М. Бутлеровдун теориясынын химиялык процесс учурунда пайда болуучу туруксуз аралык белүкчөлөрдүн түзүлүшү боюнча идеяларынын колдонулушуна негизделген.

А. М. Бутлеровдун теориясынын мааниси көп кырдуу. Органикалык химияда анын пайда болушу сүрөттөп жазуу мезгилиinin бүтүшүн жарыялоо менен илимий мезгилдин башталышын белгилеген. Бул теория азыр дагы өз маанисин жоготкон жок: заттардын касиеттеринин түзүлүшү менен байланыштуулугу жөнүндөгү идея материянын түзүлүшүнүн химиялык денгээлинде гана әмес, башка да химиялык әмес денгээлде да жаратылыштын универсалдуу законченемдүүлүктөрүн чагылдырат (теория бардык коваленттик бирикмелер үчүн калыс).

Химиялык реакциялардын механизмин таанып-билигө терең жол ачуу менен, А. М. Бутлеровдун теориясы Д. И. Менделеевдин мезгилдик закону менен катар илимдер аралык прогресске жол ачты (анткени, материалдуу дүйнөдөгү бардык кубулуштар бири-бирине байланыштуу), дүйнөнүн бирдиктүү бир илимий сүрөттөлүшүн түзүүгө орчундуу салым кошту.

- ?
1. Виталисттик теория органикалык заттарды кандай түшүндүргөн?
 2. А. М. Бутлеров теориясынын негизги жоболору боюнча маалыматтарды кайда жана качан жарыя кылган?
 3. А. М. Бутлеровдун теориясы эмне үчүн химиялык түзүлүш теориясы деп аталаат?
 4. А. М. Бутлеровдун теориясынын негизги идеясы эмнеде?
 5. А. М. Бутлеровдун теориясынын негизги жоболору кандай окулат?
 6. Түзүлүш теориясынын өнүгүш багыттары кандай?
 7. А. М. Бутлеровдун теориясы кандай мааниге ээ болгон?

 Түзүлүш формулалары жөнүндө эмне билесинер? Силерге тааныш заттардын түзүлүш формулаларын түзгүлө.


§ 7. Валенттик бурчтар жана байланыш узундуктары.

Жөнөкөй жана эселик байланыштар

Изилдөөнүн жаңы физикалык метөддорун колдонуу менен атомдордун арасындагы аралыктарды (байланыш узундуктарын) жана валенттик бурчтарды, мындайча айтканда, органикалык молекулалардын реалдуу геометриялык формалары жөнүндө так маалымат алууга мүмкүндүк пайда болду.

Байланыш узундугун (мындайча айтканда, атомдордун коваленттик байланыш менен байланышкан борборлорунун ортосундагы аралыкты) учурда нанометрдин минден бир үлүшүнө чейин, ал эми валенттик бурчтарды бир нече бурчтук минутага чейин так аныктоого болот. Мындай жол менен алынган **натыйжалар химиялык түзүлүш теориясына** туура келет да, ал теорияны стереохимиялык әлестөөлөр менен толуктайт.

Ар бир коваленттик байланыш белгилүү бир узундук менен мүнөздөлөт. Мисалы, жөнөкөй көмүртек-көмүртек байланышынын узундугу 0,154 нм, ал эми көмүртек-көмүртек C–C атомдорунун ортосундагы кош байланыш C=C 0,133 нм, учтүк байланыш C=C 0,120 нм. Төрт бирдей ордун басуучулар бар. Көмүртектин атомдорунун ортосундагы байланыш бурчтары тетраэдрдик модель талап кылгандай $109^{\circ}28'$ та барабар. Мисал катары төрт хлордуу көмүртекти кароого болот (26-сүрөт).



26-сүрөт. Төрт хлордуу көмүртектин молекуласынын модели.

14-таблицада берилген маалыматтардан көрүнгөндөй, байланыш узундуктары 0,1 жана 0,2 нм аралыгында жатышат. Ошондой эле, жөнөкөйдөн кош байланышка, андан үчтүк байланышка өткөндө байланыш узундугу кыскарат.

14-таблица

Коваленттик байланыштардын узундуктары жана энергиясы

Байланыштын типтери	Узундугу (нм менен)	Энергиясы (кДж/моль менен)
C—C	0,154	348
C=C	0,133	620
C≡C	0,120	814
C—N	0,147	293
C=N	0,127	616
C≡N	0,115	882
C—O	0,143	344
C=O	0,121	708
C—F	0,140	485
C—Cl	0,176	331
C—Br	0,191	277
C—I	0,212	239
H—C	0,109	415
H—O	0,096	466
H—N	0,101	390
N—N	0,141	159
N=N	0,124	419
N≡N	0,109	943
N—O	0,137	201
N=O	0,122	377


Молекулалардын геометриясын аныктоонун жаны методдорунун тақтагы ушунча, алар тетраэдрдик моделди жалпы жонунан гана далилдебестен, реалдуу молекулалардагы алардын түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү менен байланыштуу болгон айырмачылыктарды табууга шарт түзөт. Мисалы этандагы CH_3-CH_3 C—C байланышы 0,1543 нм, ал эми ошондой эле байланыш ацетондо $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$ 0,152 нм, ацетонитрилде CH_3-CN 0,1458 нм. Бул сандар кошуна атомдордун жана байланыштардын таасирин айгинелеп турушат. Байланыш узундуктарынын өзгөрүшү

системада жөнөкөй жана эселик байланыштар кезектешкенде өзгөчө байкалат. Байланыш узундугу менен катар анын касиети да өзгерөт.


Ошентип, байланыш узундуктары жөнүндөгү маалымат, анын өзгөчөлүгү кошуна бөлүктөрдүн таасири менен молекулалардын кандай өзгөрөрүн, башкача айтканда, атомдордун өзара аракеттерин түшүндүрүүгө мүмкүндүк берет.

Бул айтылгандар байланыш бурчтарына да тиешелүү. Эгерде көмүртек атомуна түрдүү орун басуучулар байланышса, анда тетраэдрдин симметриялыулугу бузулат. Мисалы, хлордуу метилде CH_3Cl байланыш арасынdagы бурч $\text{H}-\text{C}-\text{H} 109^{\circ}28'$ га барабар болбайт, ал $110^{\circ}13'$, хлороформдо CHCl_3 байланыш бурчтары $\text{Cl}-\text{C}-\text{Cl} 112^{\circ}$ болот.


Көмүртек-көмүртек $\text{C}=\text{C}$ ортосундагы кош байланыштын өзүнчө геометриясы бар. Кош байланышты пайда кылган жана ага жанаша жаткан 6 атом, валенттик бурчу 120° болгон жалпак системаны пайда кылат. Натыйжада этилендин молекуласы төмөнкү геометрияга ээ болот:



Бензолдун молекуласы – туура алты бурчтук, көмүртек атомдорунун арасы $0,140$ нм жана байланыш бурчтары 120° .



Нафталиндин молекуласы да жалпак, бирок туура алты бурчтук шакекченин формасы сакталып турат:




- ? 1. Молекулалардын реалдуу геометриялык формалары жөнүндө маалыматтарды кантит алуга болот?
- 2. Байланыш узундугу деген әмнө? Ал кандай бирдик менен өлчөнөт?

3. Байланыш бурчу деген эмне? Ал кандай бирдик менен өлчөнөт?
4. Ар бир коваленттик байланыш кандай мүнөздөлөт?
5. Кайсы учурда байланыш узундугу кыскарат?
6. Эмне үчүн түрдүү бирикмелерде көмүртек-көмүртек байланыштары ар түрдүү болот?



Төмөндө кайсы заттардын молекулаларынын моделдери көлтирилген. Далилде.



§ 8. Органикалык заттарга мүнөздүү касиеттер жана реакциялар

А. М. Бутлеровдун түзүлүш теориясынын ачылганынан бери жүз жылдан ашык убакыт өттү, ал убакыттын ичинде заттардын түзүлүштөрүн жана касиеттерин окуп-үйрөнүү, таанып-билиү төрөндөди. Азыркы учурда химиялык бирикмелердин түзүлүштөрүн жана реакцияга жөндөмдүүлүктөрүн сипаттап жазуунун көптөгөн методдору бар.

Бул методдордун эң негизгиси болуп химиялык байланыш методу әсептелет.

Кандай гана химиялык реакция процесси болбосун, бир химиялык байланыштын үзүлүшү, әкинчисинин пайда болушу жүрөт, ошондуктан алардын касиеттерин аныктоо, үзүлүү жана пайда болуу жөндөмдүүлүктөрүн билүү заттардын касиеттерин божомолдоого (прогноздоого) жол ачат.

Органикалык заттар негизинен коваленттик байланыштын әсебинен түзүлгөн. Мындай байланыштын типтери – эки атомдун атомдук орбиталдарынын капиталышынан электрондордун жубунун пайда болушу. Атомдук орбиталдардын капиталыш симметриясына жараша σ (сигма)- же π (пи)-байланыштары пайда болот. Алар касиеттери боюнча айырмаланышат.

Көпчүлүк учурда молекулалардын касиеттерин түшүнүү үчүн атомдордун (атомдордун топторунун да) бири-бирине таасир этишин эске алуу зарыл. Бул таасирдин материалдык ташуучусу

булуп химиялык байланыштардын электрондору саналат, ошондуктан аны электрондук эффект катары сүрөттөп жазышат.

● σ-байланыштын чынжыры боюнча берилүүчү өзара таасир (атомдун же топтун) индукциялык (I) эффект, ал эми π-байланышынын чынжыры аркылуу берилүүчү таасир мезомердик (M) эффект же жалпы π системалык эффект деп аталат.

Электрондук эффекттердин бул эки түрүнүн бири биринен айырмасы, σ-жана π-байланыштарынын айырмасынан келип чыгат.

Ошентип, заттардын химиялык касиеттерин аныктоо үчүн төмөнкүлөрдү тактоо керек:

1. Молекулада байланыштын кандай түрү бар жана ал кандай касиетке ээ (биринчи иретте бекемдиги, уюлдуулугу, уюлдашусу) экендигин караш чыгуу.

2. Молекулада жаңы байланышты түзүү үчүн пайдаланууга мүмкүн болгон, сарпталбаган валенттик электрон жубунун баржогун аныктоо.

3. Индукциялык (I) жана мезомердик (M) эффекттердин таасири болгон учурларды эске алуу. Бул эффекттер айрым химиялык байланыштарга жана сарпталбаган валенттик электрондук жуптарга күчтүү таасир этишет.

Органикалык заттардын катышуусу менен жүргөн реакциялар өздөрүнө тиешелүү өзгөчөлүктөргө ээ. Органикалык эмес заттардын арасында жүрүүчү реакцияларга караганда айрым органикалык заттардын арасындагы реакциялар өтө жай жүрөт, анткени аларда иондор эмес, нейтралдуу молекулалар өзара аракеттенишет. Ошондуктан органикалык заттарды башка затка айландыруу үчүн ысытуу жана катализаторду колдонуу керек. Ошол эле убакта органикалык заттар катуу ысытканда иондук органикалык эмес заттарга караганда оной ажырашат, анткени органикалык заттын молекуласын ажыратыш үчүн, андагы бир эле коваленттик байланышты үзүү жетиштүү болот. Органикалык заттардын реакциясы чанда гана жалгыз продуктунун пайда болушуна алыш келет, процесс түрдүү багытта жүрүшү мүмкүн. Бул багыттардын атаандаштыгы көбүрөөк бөлүнгөн продукт менен аныкталат. Эгерде реакция (берилген шартта) кайталанма болбосо, анда көпчүлүк учурда анын жүрүшү эки факторго байланыштуу болот: реакцияга чейинки молекулалын түзүлүшү – статикалык фактор; реакция учурунда реакцияга чейинки заттардын молекуларынан туроксуз аралык бөлүкчөлөрдүн (радикалдардын, катиондордун же аниондордун) пайда болушу – динамикалык фактор.

- ?
- Органикалык заттардын касиеттери эмнеге байланыштуу?
 - σ -байланышынын чынжыры аркылуу берилүүчү таасир кандай аталаат?
 - π -байланышынын чынжыры аркылуу берилүүчү таасир кандай аталаат?
 - Заттардын химиялык касиеттерин такташ үчүн эмнелерди эске алуу керек?
 - Органикалык заттарды башка заттарга айландыруу үчүн эмне кылуу керек?
 - Эмне себептен органикалык заттар органикалык эмес заттарга кара-гана тез ажырайт.
 - Динамикалык фактор деген кандай фактор? Анын химиялык реакция учурунда кандай мааниси бар?

§ 9. Чектүү углеводороддор. Метан

Көмүртектин атомдору бири-бири менен ачык чынжырга (түз же бутактуу) бириккен углеводороддор ациклик (алифатикалык) деп аталашат. Көмүртек атомдорунун ортосундагы байланыштарынын мүнөзүнө карата углеводороддор чектүү же чексиз болуп бөлүнүштөт.

● Чектүү углеводороддор алкандар же парафиндер деп аталаат.

Чектүү углеводороддордун гомологиялык катары 15-таблицада берилген.


Алкандардын (парафиндердин) – алифатикалык углеводороддордун молекулаларында көмүртектин атомдору бири-бирине жөнөкөй (бир гана) байланыш – σ -байланыш менен байланышкан.

Чектүү углеводороддо (алканарда) көмүртек атому Sp^3 -гибриддешүү абалында болот. Демек анын төрт Sp^3 -гибриддик орбиталы бар, ал аркылуу төрт σ -байланышын түзө алат.

Алкандардын эң жөнөкөй өкүлдөрүнүн бири – метан CH_4 . Анын түзүлүшүн а) түзүлүш формула же б) электрондук формула менен белгилесе болот:




Бирдей төрт σ -байланыш өзара $109^{\circ}28'$ бурчту түзөт. Ошондуктан метандын молекуласы мейкиндикте тетраэдр формасын ээлэйт. Метандагы атомдордун мейкиндиктик жайгашышын тетраэдрдик (а), шар-өзөктүк (б) жана көлөмдүк (в) моделдер менен көрсөтсө болот (27-сүрөт).



27-сүрөт. Метандын молекуласының мейкиндиктік түзүлүш моделдери:
а) тетраэдрдик; б) шар-өзөктүк; в) көлөмдүк.

Метан – түссүз, жытсыз (же бензиндин чала жыты бар) газ абалындағы зат.

Метанды катуу ысытса, ал ажырайт. Ажыроо учурунда төмөнкү реакциялардын жүргүшү мүмкүн:



Бул реакциялардын эң акыркы продуктусу – көө түрүндөгү таза көмүртек. Ал негизинен толтургүч катары резина өндүрүүдө колдонулат. Метандын ажырашындағы экинчи продукт – суутек.

Керектүү температураны алуу жана процессти улантуу үчүн, метандын бир бөлүгүн ага кычкылтекти кошшу менен күйгүзүштөт:




Эн жогорку температурада метан толук күйбөгөндөгү продуктудар алынат:




- Метандын ажыроо реакцияларына (1–4) кайрылалы. Реакциялык аралашмада бош валенттүлүккө ээ бөлүкчөлөр бар, алар радикалдар деп аталышат.


Мисалы, метил радикалында CH_3 көмүртек менен үч суутек атомдорунун ортосунда байланыштыруучу үч молекулалык орбиталдар бар. Төртүнчү көмүртектин валенттик атомдук орбиталы (АО) бир электрону менен бош калат жана башка атомдун атомдук орбиталы (АО) менен капталууга даяр турат. Аны төмөнкүчө көрсөтсө болот:




Ошондуктан төмөнкү реакция ишке ашыши мүмкүн:



Метилен :CH_2 радикалдары эки эркин электрондору менен кош байланышты пайда кылышы мүмкүн:




:CH радикалдары үчтүк байланышы бар бирикмени пайда кылышы мүмкүн:



Ацетилен метандан өндүрүштө алына турган экинчи негизги продукт болуп саналат. Ацетилендин негизги колдонулушу – эң жогорку температуралуу жалынды алуу (газ менен ширетүүдө, металлдарды кесүүдө). Анын эң маанилүү колдонулушу болуп башка заттарды алуу үчүн алгачкы зат катары пайдаланышы саналат.



Метандан хлорлоштуруу менен түрдүү продуктулар алынат, алардын бири хлороформ:




Ошондой эле, төрт хлордуу көмүртек (тетрахлорметан) эрит-кич катары колдонулат.



Бир эле убакта метанды хлорлоштуруу жана фторлоштуруу менен негизинен муздаткычтарда колдонулуучу түрдүү фреондор, мисалы, фреон –12 (Φ -12) CCl_2F_2 алынат, ошондой эле аэрозолдук заттарды алууда колдонулат. Алардын көпчүлүгүнө негизги антропогендик (грекче *antropus* – киши) ролду тануулашат, мын-дайча айтканда адамдын иш-аракетинин айынан Жер атмосфе-расынын озон катмарынын бузулушу.

Метандан төмөнкү заттарды да алууга болот:






Метандын негизги бөлүгү химия өнөр жайларында синтез-газды алууда сырьё катары колдонулат, бул процесс метанды конверсиялоо деп аталат:



Синтез-газ (жылына дүнүйө боюнча 12 млн т синтез-газ өндүрүлөт) метанолду алууда сырьё катары (I), синтетикалык бензинди (II) ж.б. продуктуларды алууда колдонулат.



Метанды конверсиялоо менен өндүрүштө алышуучу суутек-тини негизги бөлүгү алышат, суутек өз кезегинде аммиакты синтездөөдө, суюк майларды гидрлөө менен катуу майларды өндүрүүдө колдонулат.

Бул темада силер таанышкан реакциялардын бардыгы жогорку температурада, дээрлик бардыгы жогорку басымда, түрдүү катализаторлордун катышуусу менен жүрөт, ошондуктан бирдей эле реагенттерден түрдүү продуктулар алышат (мисалы, синтез-газдан), ар түрдүү, негизинен органикалык эриткичтерде эритүү менен. Бул маалыматтардын көпчүлүгү химияга түздөн-түз тиешеси бар адамдарга таандык, бирок буларды билүүнүн мааниси чоң. Анткени бул заттар менен иштөөдө – күйө турган жана уу заттар менен иштөөгө туура келе тургандыгын, бул процесстер жүрө турган аппараттардын жылчыксыз (герметичный) жабалышына жана технологиялык режимдерди, техникалык коопсуздук эрежелерин сактоого чоң маани бериле тургандыгын билүү зарыл. Тилемке каршы практика жүзүндө химиялык өнөр жайларда кырсыктар көп учурайт.

- ? 1. Химиялык өндүрүштөрдүн сырьёсу болгон метандын булактары кайсы?
- 2. Өндүрүлгөн метандын көпчүлүк бөлүгү кайда жумшалат?
- 3. Эмне үчүн автомобилдердин резина дөнгөлөктөрү кара?
- 4. Метандын ажыроо реакциялары эндотермиялыкпыш же экзотермиялыкпыш?
- 5. Метандын кычкылтек менен өзара аракеттениши эндотермиялыкпыш же экзотермиялыкпыш?
- 6. Силердин оюнарча (5–7) реакциялардын кайсынысында метандын бирдей санынан жылуулук көбүрөөк бөлүнүп чыгат? Жоопту негиздегиле.

7. (5-7) реакциялардын кайсынысын метандан ышты көбүрөек алуу үчүн колдонуу пайдалуураак?
8. Кандай заттар фреондор деп аталышат?
9. Хлороформ кайда колдонулат?
10. Нитрометанды алуу үчүн метанга кайсы затты таасир этүү керек?
11. Синтез-газ деген эмнэ? «Синтез» деген сөз эмнени түшүндүрөт?
12. Өндүрүштө метандан кайсы органикалык эмес заттар алынат?



Төмөнкү таблицадагы чектүү углеводороддордун гомологиялык катарындагы заттардын формуулаларын, аттарын, агрегаттык абалдарын, алардын углеводороддук радикалдарынын формуулаларын жана атапыштарын үйрөнгүле, эске тутууга аракет жасагыла.


15-таблица

Чектүү углеводороддордун гомологиялык катары


Заттын формуласы	Атапышы	Кайноо температу-расы (°C)	Нормалдуу шарттагы абалы	Углеводороддук радикал	
				Формула	Атапышы
CH_4	Метан	-161,6	Газ	CH_3-	Метил
C_2H_6	Этан	-88,6	Газ	C_2H_5-	Этил
C_3H_8	Пропан	-42,1	Газ	C_3H_7-	Пропил
C_4H_{10}	Бутан	-0,5	Газ	C_4H_9-	Бутил
C_5H_{12}	Пентан	+36,07	Газ	$\text{C}_5\text{H}_{11}-$	Амил
C_6H_{14}	Гексан	+68,7	Газ	$\text{C}_6\text{H}_{13}-$	Гексил
C_7H_{16}	Гептан	+98,5	Суюктук	$\text{C}_7\text{H}_{15}-$	Гептил
C_8H_{18}	Октан	+125,6	Суюктук	$\text{C}_8\text{H}_{17}-$	Октил
C_9H_{20}	Нонан	+150,7	Суюктук	$\text{C}_9\text{H}_{19}-$	Нонил
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	Декан	+174,0	Суюктук	$\text{C}_{10}\text{H}_{21}-$	Децил

§ 10. Чексиз углеводороддор. Этилен


Жогорку темаларда жалпы формуласы $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ болгон, курамындагы көмүртектин атомдору бир гана байланыш менен байланышкан чектүү углеводороддор менен тааныштыңар. Көмүртек атомдорунун ортосунда эки же үч байланыш болгон углеводороддор бар. Кош байланышы бар углеводороддордун эң жөнөкөй өкүлү – этилен:



Өндүрүштө бул бирикмени этанды дегидрлөө жолу менен алышат:



Этилендин молекуласында көмүртектин ар бир атомуна суутектин экиден атому туура келет, дагы бир валенттүүлүк көмүртек атомдорунун ортосунда байланыштын пайда болушуна сарпталат. Натыйжада дагы бирден эркин валенттүүлүктөр калат. Ал валенттүүлүктөрдүн эсебинен көмүртек атомдорунун ортосунда экинчи байланыш пайда болот:




Бул байланыш кош байланыш экенин билесинер.


- Этилен молекуласындағы көмүртек атомдорунун валенттүүлүктөрү суутек атомдору менен чегине чейин каныккан эмес, ошондуктан көмүртек-көмүртек ортосунда кош байланыш пайда болгондуктан чексиз углеводород деп аталат.

Метан чектүү углеводороддордун эң негизги өкүлү болгон сыйктуу эле, этилен чексиз углеводороддордун гомологиялык катарынын эң башкы өкүлү болуп саналат. Этилендик углеводороддордун жалпы формуласы C_nH_{2n} .


Бирден кош байланышы бар углеводороддордун аттары *-илен* же *-ен* мүчөлөрү менен аяктайт. Мисалы:



Бутилендин изомерлери төмөнкүлөр:




Бутен-1 жана бутен-2 касиеттери боюнча айырмаланышат.




Акыркы экөө – циклобутан жана метилциклогептан этилендин гомологиялық катарына кирбейт, анткени аларда кош байланыштар жок.

Лабораторияда этиленди этил спиртинен C_2H_5OH суунун молекуласын бөлүү менен алууга болот:




- Бирикменин курамынан суунун бөлүнүүсү менен жүргөн ажыраоо реакциялары дегитратташуу реакциялары деп аталат.

Реакцияны ысытуу менен жүргүзүштөт. Күкүрт кислотасы сууну тартып алгыч кызмат кылат. Этилен газ абалында алынат. Этилен өтө жарык жалын менен күйөт:



Бул реакция практикада колдонулбайт. Этилен химиялык өндүрүштө полиэтилен пластмассасын жана көптөгөн баалуу органикалык заттарды алууда керектелет. Полиэтилен түтүктөрдү, идиштерди, суук мезгилде жашылча өстүрүүчү жайлардын үстүн жабуу үчүн пленкаларды өндүрүүдө, эл чарба продуктуларын салып сатуу үчүн баштыкчаларды жасоого жумшалат.

Этиленге жогорку басымды жана температуралы таасир этүү менен полиэтиленди алууга болот. Бул шарттарда этилендин молекуласындагы байланыштардын бирөө үзүлөт да, бош валенти бар көмүртектин атомдорун камтыган бөлүкчөлөр бири-бирине чексиз чынжырларды пайда кылуу менен биригишет:



же кыскартылган түрү: $nCH_2=CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH_2-)_n$

- Төмөнкү молекулалуу бирдей (окшош) заттардын биригүүсүнөн жогорку молекулалуу заттардын пайда болуу реакциясы полимерлешүү реакциясы деп аталат. Реакцияга кирген алгачы зат мономер, ал эми реакциянын натыйжасында пайда болгон продуктусу полимер делет.

Полимерлешүү, кошулдуу реакциясы чексиз углеводороддорго мүнөздүү. Кошулдуу реакциясын далилдеген дагы бир реакция – бул этилендин суу менен кошулушу же гидратация реакциясы:



Ацетилен да полимерлешүү реакциясына кире алат. Полимерлешүүнүн жекече учуру катары *тримерлешүү* карасак болот, мындайча айтканда ацетилендин үч молекуласынын бир молекулага биригиши: $3C_2H_2 \rightarrow C_6H_6$.


Бул реакциянын натыйжасында эң баалуу органикалык бирикме – бензол пайдада болот.

- ? 1. Ацетилендик углеводороддордун жалпы формуласы кандай болот?
- 2. Эмне үчүн ацетилен абада ыш чыгарып күйөт, ал эми кычкылтек менен үйлөткөнде толук күйөт.
- 3. Ацетиленди гидрлөө реакцияларынын натыйжасында кайсы заттарды алууга болот?
- 4. Эмне үчүн ацетиленди гидратташтыруу Кучеров реакциясы деп аталып калган.
- 5. 20% аралашмасы бар 500 кг кальций карбидинен канча көлөмдөгү ацетилен алышыны мүмкүн?



Эгерде продуктунун практикалык чыгышы теориялык чыгыштын 75% ин түзсө, 150 л ацетиленди тримерлештириүүдө канча грамм бензол алышарын эсептегиле.

§ 12. Жыпар жыттуу углеводороддор. Бензол



*Фридрих Август Кекуле
(1829–1896)*

Органикалык химия боюнча немец окумуштуусу. Анын изилдөөлөрү теориялык органикалык химияга жана органикалык синтезге багытталган. Атомдун касиети болгон валенттүлүк текстештиктин бирдиги бүтүн сан катары экендиги жөнүндө идеяны биринчи болуп айткан. Жөнөкөй жана кош байланышы кезектешкен бензолдук шакектик формуласын сунуш кылган. Анын эмгектери химиялык түзүлүш теориясынын өнүгүшүнө орчуандуу салым кошкон.


Ацетиленди тримерлештириүүнүн натыйжасында алышган бензол жыпар жыттуу углеводороддорго кирет. Жыпар жыттуу углеводороддордун эң алгачкылары жагымдуу жыттуу бальзамдардан, чайырлардан, эфир майларынан алышган.

Көпчүлүк бирикмелердин молекулаларынын негизин бензолдун молекуласы түзгөндүктөн, бензол жана андан өндүрүлгөндөр жыпар жыттуу углеводороддор деп аталышат. Азыркы учурда

бензолдон өндүрүлгөндөр өтө эле көп, бирок алардын эң аз саны жагымдуу жытка ээ, көпчүлүгү түк жыттанбайт, ал эми айрымдарынын жыты жагымсыз. Ошондой болсо да тарыхый аты сакталып калган. Жыпар жыттуу углеводороддордун эң жөнөкөйү – бензол.


Анын молекуласы C_6H_6 , 6 атом көмүртектен жана 6 атом сууткен турат, натыйжада көмүртек атомдорунун бардык байланыштары суутек атомдору менен каныккан эмес. Бензолду чексиз углеводород деп эсептесек, ага чексиз углеводороддорго мүнөздүү болгон реакциялар мүнөздүү болбойт. Ал калий перманганаты жана бром суусу менен кычкылданбайт. Кадимки шартта кошулуу реакциясына кирбейт.

Бензолдун молекуласынын түзүлүшү өзгөчө, аны менен органикалык химия курсун окуганда таанышасыңар. Азырынча бензолдун түзүлүш формуласын билсенер жетиштүү:




Бензол түссүз, мүнөздүү жыты бар суюктук, жытын жагымдуу деп айтууга болбойт. Бензол суудан жеңил (тыгыздыгы $0,88 \text{ г}/\text{см}^3$), кайноо температурасы $80,4^\circ\text{C}$, сууда эрибейт.


Кадимки шартта бензол кошулуу реакциясына кирбейт. Ал реакциялык аралашмага ургаалдуу жарык жиберүүнүн натыйжасында гана хлорду кошуп алат:



Бензолго молекуласындагы суутектин атомдорунун алмашуу реакциялары мүнөздүү.



Бензолдун молекуласы азот кислотасы HNO_3 менен аракеттенишкенде суутектин бир атому NO_2 нитротобуна алмашуусу мүмкүн:



Көп өлчөмдөгү бензол ташкөмүрдү жана мунайды (нефтини) кайра иштеткенде алышат.

Бензол боёкторду, дарыларды, жарылгыч заттарды, пестицидерди ж. б. алууда сырьё катары колдонулат. Аны эриткич, жана мотордук отунга кошумча катары да колдонушат.

Гексахлоран айыл чарбасында инсектицид катары, зыянкеч курт-кумурскалар менен күрөшүүдө колдонулат.

Органикалык заттар айыл чарбасында өсүмдүктөрдү зыянкечтерден, илдеттерден, отоо чөптөрдөн коргоо учун пайдаланылат. Алар – уу химикалтар, же *пестициддер*. Алар көп түрдүү. Мисалы, өсүмдүктөрдү жана жер кыртышын козу карындар пайда кылуучу илдеттерден сактоо учун *фунгициддер*, отоо чөптөргө каршы *гербициддер*, зыянкеч микроорганизмдерди жоюуда *бактерициддер*, кемириүүчүлөргө каршы *зооциддер* колдонулат.

- ?
- 1. Жыпар жыттуу углеводород деген ат кайдан келип чыккан?
- 2. Бензолдун кандай формулаларын билесинер?
- 3. Пестициддер кайсылар, алар кайда колдонулат?
- 4. Бензол кайсы учурда кошулуу реакциясына, ал эми кайсы учурда орун алмашуу реакциясына кирет?
- 5. Эмне учун бензол абада ыш чыгарып күйет?

- ⌂ 1. Пестициддерди колдонууда айланычайренү коргоонун кандай эрежелерин сактоо керек? Сунуштарыңарды жазгыла.
- 2. Кальций карбидин пайдалануу менен нитробензолду кантип алууга болот? Реакциялардын тенденмелерин жазгыла.

§ 13. Углеводороддордун табигый булактары жана аларды кайра иштетүү

Углеводороддорду алуунун негизги булактары болуп жаратылыш газы жана жолбун мунай газдары, мунай жана көмүр эсептелет.

Жаратылыш газынын курамында негизинен метан (75тен 99% ке чейин) бар. Жаратылыш газында метandan башка да углеводороддор, азот, көмүр кычкыл газы жана күкүрттүү суутек болот.

Жаратылыш газы күйгөндө көп жылуулук бөлүнүп чыгат. Жылуулук бөлүп чыгаруу боюнча башка отундардан (мазут, таш көмүр, күрөн көмүр, жыгач отун, чымкөн) артыкчылык кылат. Ошондуктан жаратылыш газдарынын 90% электр станцияларында, өнөр жайларда, тиричиликте отун катары колдонулат. Ал эми калган бөлүгү химиялык өндүрүштөрдө сырьё катары

керектелет. Жаратылыш газдарынан метан, этан жана башка алкандар алынат.

Мунайдын жолбун газдары басымдын таасиринде анда эриген түрдө болот. Аны жер үстүнө чыгарганда басым төмөндөйт да эригичтigi азаят, натыйжада газдар мунайдан бөлүнөт.

Жолбун газдарда метан жана анын гомологдору, ошондой эле эрибей турган газдар – азот, аргон жана көмүртек (IV) оксиди бар.

Жолбун газдарды кайра иштетүү менен метан, этан, пропан, бутан жана курамында беш жана андан көп көмүртек атомдорун камтыган газ бензини алынат. Этанды жана пропанды дегидрлөө менен чексиз углеводороддорду – этиленди C_2H_4 жана пропиленди C_3H_6 алышат. Суюлтулган пропан жана бутан газдарынын аралашмасы газ плиталары учун отун катары колдонулат.


Курамында оңой учма углеводороддор болгондуктан автомо билдердин кыймылдаткычтарын ишке киргизүүде оңой от алдыруу учун газ бензини кадимки бензинге кошулат.

Мунай (нефть) – кочкул күрөң түстөгү майланышкан суюк отун. Ал негизинен суюк углеводороддорун татаал аралашмасы болуп саналат.

Курамы боюнча мунай парафиндик, нафтендик жана жыпар жыттуу болот. Көпчүлүк учурда аралашма түрүндө кездешет. Мунайдын курамында углеводороддордон башка кычкылтектүү, күкүрттүү органикалык бирикмелер, ошондой эле суу, сууда эриген кальций жана магний туздары болот. Мунайда механикалык аралашмалар – кум, чопо да бар.

Мунай жогорку сапаттагы мотордук отун алуу учун баалуу сырье болуп саналат. Суу жана башка керексиз аралашмалардан арылтылгандан кийин, аны кайра иштетүүгө болот. Мунайды кайра иштетүүнүн негизги жолу – буулантып айдоо. Ал углеводороддордун кайноо температураларынын ар түрдүүлүгүнө негизделген. Ысытуу менен мунайды фракцияларга бөлүшөт.

28-сүрөттө мунайды буулантып айдоочу курага көрсөтүлгөн. Мунай колбада (1) ысытылат. Алды менен кайноо температуралары төмөн углеводороддор бөлүнөт. Ал углеводороддордун буулары (3) суу муздаткычына келет да, суюк абалга ётет. Суюк углеводороддор кабыл алгыч (4) пробиркада топтолот. Буулантып айдоо температурасын жогорулатуу менен кайноо температурасы жогору болгон углеводороддорду буулантып айдаса болот. Кабыл алгычты алмаштыруу менен мунайдан температуранын ар түрдүү интервалында кайнай турган бир нече фракция-




28-сүрөт. Мунайды буулантып айдоочу курал.

ларды бөлүп алууга болот. Буулантып айдоо температурасын термометр (2) менен көзөмөлдөөгө болот.

Өндүрүштө мунайды бөлүү үзгүлтүксүз иштөөчү ректификациялык колонналарда жүргүзүлөт.

Буулантып айдоо жолу аркылуу бөлүп алынган фракцияларды дыккаттык менен кайрадан буулантып айдоо менен андан да майда фракцияларга бөлүгө болот. Мисалы, бензин фракциясынан (C_5-C_{12} углеводороддордун аралашмасы) петролей эфири ($40-70^{\circ}\text{C}$), бензин ($70-120^{\circ}\text{C}$), лигроин ($120-180^{\circ}\text{C}$) алышат. Пётролей эфири – майларды жана чайырларды жакшы әритет. Бензин өз ичине сызыктуу түзүлүштөгү чектүү углеводороддорду пентандан деканга чейин жана циклоалкандарды (циклогептан, циклогексан) жана бензолду камтыйт. Бензин авиацияда, автомобиль кыймылдаткычтарында күйүүчү отун катары колдонулат. Бензиндин буусунун аба менен аралашмасы канчалық күчтүү кысылса, автомобильдин кыймылдаткычы ошончо күчтүү иштейт. Аралашманы максималдуу кысканды айрым углеводороддордун аралашмасы жарылуу менен күйөт да, детонация деп аталат. Мындай жарылуу менен күйүүдөн автомобилдин кыймылдаткычы бат бузулат.

Бензиндин детонациялык туруктуулугу октан саны менен мунэзделөт. Бул сан канчалык чоң болсо, детонацияга туруктуулугу жогорулайт. Нормалдуу гептандын $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ детонациялык туруктуулугун шарттуу түрдө 0, ал эми изооктандыкын



100 деп кабыл алышкан. Эгерде, бензиндин октандык саны 96 болсо, ал 96% изооктан менен 4% нормалдуу пентандын аралашмасы сыйктуу детонациясыз кысылууга дуушар болушу мүмкүн.

Түздөн түз буулантып айдалган бензиндин октандык саны өтө төмөн (50–65). Мындай бензинди колдонууга жарабайт. Бензиндин детонациялык туруктуулугун жогорулаттуу үчүн антидетонаторлорду, мисалы тетраэтилкоргошунду (же этил суюктугун) кошушат. Ал өтө уулуу, нерв системасынын бузулушуна алып келет жана башка ооруларга чалдыктырат. Ошондуктан этил суюктугу кошулган бензинди (0,5% тетраэтилкоргошуну бар) колдонгондо колго тамызбоого, дем алуу органдарына жолотпоого тырышуу керек. Этил суюктугу кошулган бензин уу болгондуктан, аны сия көк түскө боёп коюшат, ошол тусу боюнча башка бензиндерден айырмалоого болот. Этил суюктугу кошулган бензинди колдонуудан жыл сайын атмосферага 200000 т коргошун бөлүнүп чыгат да, абаны эле эмес, сууларды, жер кыртыштарын да ууландырат.

Кийинки мезгилде уулуу эмес антидетонаторлор колдонулууда.

Лигроин C_8-C_{14} менен керосин ($C_{12}-C_{18}$) өзүнүн курамында углеводороддорду кармал турат жана тракторлор үчүн керосин, ошондой эле реактивдүү самолеттор жана ракеталар үчүн күйүүчү май катары пайдаланылат.

Мунайдын дизелдик фракциясы дизелдик кыймылдаткычтарда колдонулат.

Мазут – жогорку температурада кайноочу углеводороддордун аралашмасы. Мазуттан буулантып айдоо жолу менен майлоочу майларды алышат. Мазутту буулантып айдоонун эң акыркы калдыгы *гудрон* деп аталат. Гудрондон битумду алышат. Бул продуктулар жол курулушунда колдонулат. Мазут буу казандарын ысытууда отун катары да керектелет. Мунай продуктулары менен иштөөдө техникалык коопсуздук эрежелерин сактоо зарыл. От алып кетүүгө, териге тийишине, дем алуу органдарына барышына, ошондой эле сууларга, жер кыртышына түшүшүнө жол бербөө керек. Мунай кошулган сууда балыктар өөрчүбөйт, кырылат, ал эми жер кыртышы түшүм бербей калат.


Мунайды кайра иштетүүдөн алынган бензин учурда абдан өнүккөн автомобиль, авиация унааларына жетишпейт. Ошондуктан бензинди мунайдын жогорку температуралык фракцияларынан кошумча өндүрүү ишке ашырылган. Ал жол – крекинг (англ. тилинде *to cracking* – ажыратуу) деп аталат.

- **Мунайдагы углеводороддорду термиялык жана катализатордун катышуусу менен ажыратуу процесси крекинг деп аталат.**
- **Ташкөмүрдү кайра иштетүүдөн да көптөгөн заттарды алууга болот.**

- Ташкемүр миллион жылдар ичинде жыгачтардын, есүмдүктөрдүн калдықтарынын ажырашынын натыйжаласында пайдал болгон органикалык заттардын татаал аралашмасы болуп саналат. Ташкемүрдү кайра иштетүү үч негизги багытта ишке ашырылат: кокстоо, гидрлоө жана толук эмес күйгүзүү аркылуу.

Бул процесстер менен кийин органикалык химияны окуганда таанышасынар. Ташкемүрдү кокстоонун продуктулары схемада көрсөтүлгөн.

Энергетикалык ресурстар: көмүр, мунай, газ отун катары колдонулуда. Алардын бир аз бөлүгү гана химиялык жана нефть-химиялык өндүрүштөрдө керектелет. Отун ресурстары электр энергиясын өндүрүүдө да пайдаланылат. Биздин республиканын энергетика боюнча чоң проблемалары бар. Анткени газды биз



Көмүрдү кокстоодон алынуучу негизги продуктулар.

кошуна мамлекеттерден алабыз. Ал эми көмүрдүн запастары жетиштүү. Газдын жетишипегендиги экологиялык проблемаларды пайда кылат. Эгерде газ жетиштүү болгондо абага құқұрттүн жана азоттун оксиддеринин чыгышы токтолмок, ал эми абанын көмүртек (II) оксиidi менен булгануусу эки эссе азаймак.

Демек планетанын климатына өтө терс таасири тийгизүүчү парник эффектисин пайда кылуучу көмүртек (II) диоксидинин көп өлчөмдө пайда болуу коркунучу сакталып калууда. Ошондуктан, биздин мамлекетибиз учун энергетиканы өнүктүрүү проблемасы боюнча узак мөөнөткө эсептелген программалар түзүлүшү жана туура багытталышы зарыл. Ошондо гана бирдиктүү үч бағыттагы – энергетика, экология жана экономика маселелерин чечүүгө болот. Автомобилдер үчүн экологиялык жактан таза отундар: суутек, метил жана этил спирттери колдонулат.

Келечекте күндүн, гидротермалдык табигый ысык булактардын энергиясы керектелиши мүмкүн. Көмүр дагы әле жылуулук электр станцияларында негизги отун катары кызмат кылат. Азырда көмүр көп колдонулганыктан, абанын негизги булгоочусу бойdon калууда. Ошондуктан, энергетика кызматкерлеринин негизги мильдеттеринин бири – жылытуучу станциялардын ишин экологиялык жактан таза кылууга жетиштүү. Келечекте бүгүнкү күндөгү энергетикалык системадан, жаратылыштагы органикалык сырьёдан баш тартып, практикалык жактан түгөнгүс ядролук жана термоядролук энергияга өтүү, күндүн радиациясын, шамалдын, дениз толкундарынын энергиясын колдонуу максаттары коюлууда.

Энергия ресурстары жашоо-тиричиликтө көп колдонулат. Ошондуктан ар бир окуучу энергияны үнөмдөөгө үйрөнүүсү зарыл. Ал үчүн электр чырагын ашыкча күйгүзбөө, электр энергиясын үйдө жана мектепте сарамжалдуу пайдалануу керек.

? 1. Жаратылыш газынын курамы кандай?

2. Мунайдын жолбун газдарынын курамына кайсы углеводороддор кирет?
3. Жаратылыш газдарынан жана жолбун газдардын курамындагы метан, этан жана мунайдын жолбун газдарындагы пропан, бутан кандай колдонулат?
4. Газ бензини жөнүндө эмне билдинер жана ал кайда колдонулат?
5. Мунайдын курамында кайсы углеводороддор бар?
6. Мунайды фракцияларга кантит белүүгө болот?
7. Бензиндин октандык санын кантит жогорулатууга болот?
8. Мунайды крекингдеөнүн кандай зарылчылыгы бар?
9. Көмүрдү кокстоонун продуктулары кайсылар?
10. Энергетикалык ресурстардын өнүгүш келечеги кандай?
11. Метандан кандай химиялык продуктулар алынат?



- Кыргызстандын энергия ресурстары боюнча кошумча маалыматтарды издең табууга аракет жасагыла.
- Хлорметан жана дихлорметан өмнө үчүн муздаткыштарда колдонулат?

§ 14. Спирттер

- Молекуласында углеводороддук радикал менен байланышкан бир же бир нече гидроксил тобу бар органикалык бирикмелер спирттер деп аталышат.**

Молекуладагы гидроксил тобунун саны спирттин канча атомдуу экендигин билдириет. Молекуласында бир гидроксил OH тобу бар спирттер бир атомдуу болушат, алардын жалпы формуласы R-OH (R – углеводороддук радикал).

Бир атомдуу спирттердин аттары курамындагы көмүртек атомдорунун санына туура келген углеводороддордун атына -ол мүчөсү уланып аталат. Мындай спирттердин өкүлдөрү – метил CH₃OH жана этил C₂H₅OH спирттери.


Метанол же метанол CH₃OH – түссүз суюктук, кайноо t°=64,7°C. Сууда жакшы эрийт. Түссүз жалын менен күйөт. Техникада органикалык әриткич катары колдонулат.

Метанол өтө уулуу. Аз өлчөмдөгү метанол жалпы ууланууга алыш келет, ошондой эле көрүү нервдерин шал кылат, сокур болуп калууга, көп өлчөмү өлүмгө дуушар кылат.

Этил спирти же этанол C₂H₅OH физикалык касиеттери боюнча метанолго окшош. Ал – мүнөздүү жыты бар, куйкалаган даамга ээ, түссүз суюктук. Суудан женил. Кайноо температурасы 78,3°C. Суу менен бардык катышта аралашат, химиялык заттар үчүн жакшы әриткич болуп саналат. Оңай от алат, бүлбүлдөгөн көгүлтүр жалын чыгарып күйөт.

Аз өлчөмдөгү этил спирти мас кылат, аны көп санда ичкен адам эсинен танышы мүмкүн, жалпы ууланууга дуушар болот, айрым учурда өлүмгө дуушарланат. Спирт ичимдиктерин үзгүлтүксүз ичүү алкоголизм оорусуна алыш келет.

Этил спиртинин жана башка спирттердин химиялык касиеттери алардын курамындагы гидроксил – OH тобуна байланыштуу. Спирттер кычкылданууга жөндөмдүү. Аны этил спиртинин кычкылдануу реакциясынын мисалында карап көрсөтөлү:



Силерге белгилүү болгон Кучеров реакциясы сыйктуу эле, бул реакция да уксус альдегидин алуу үчүн колдонулат.

Этил спиртин өндүрүштө этиленди гидратташтыруу аркылуу алышат. Мындай метод менен өтө уулуу метил спирти аралашкан техникалык этил спирти алынат, ошондуктан аны ичүү эч мүмкүн эмес.


Этил спирти техникада лак боёкторун, химиялык дары-дармектерди өндүрүүдө эриткич катары, боёкторду синтездөөдө колдонулат. Этил спиртинин мааниси 1930-жылы орус окумуштуусу С. В. Лебедев спирттин негизинде каучук алуу жолун ачкандан кийин өзгөчө жогорулады.

Этил спирти медицинада кенири колдонулат. Компресс үчүн, укол алдында дезинфекция жасоодо, сүртүнүүдө, эритмелерди, экстракттарды, ошондой эле көптөгөн дарыларды даярдоодо, парфюмерияда кенири колдонулат.

Этил спирти – ликёр, арак, вино өндүрүүдө да негизги сырьё болуп саналат. Алкоголь ичимдиктерин алууда канттуу заттарды ачытуу жолу кенен колдонулат.

Молекуласынын курамында эки жана үч гидроксил тобу камтылган спирттер да бар, алар – эки атомдуу жана үч атомдуу спирттер.

Эки атомдуу спирт этиленди калий перманганаты менен кычкылданырыганда пайда болорун билесинер. Анын формуласын төмөнкүчө жазганбыз:




Формуланы жакшылап карасаңар, андан этиленгликоль молекуласындагы ар бир көмүртекке биригип турган бирден суутектин атомдору гидроксил тобуна алмашкан этандан өндүрүлгөн дүгүнө ынанасыңар.

Этиленгликоль – түссүз, суудан оор, коюу суюктук (анын тыгыздыгы $1,1 \text{ г}/\text{см}^3$), 197°C да кайнайт, -13°C да тоот. Таттуу даамы бар. Уулуу.

Суу эритмеси, төмөнкү температурада тоңбай турган, музда туучу суюктук – антифриз катары автомобилдердин, тракторлордун, комбайндардын радиаторлорун толтурууда колдонулат.

Үч атомдуу спирттерге глицеринди мисал келтиребиз.

Глицеринди пропандан өндүрүлгөн катары карасак болот. Анын молекуласындагы ар бир көмүртектин атомуна бириккен суутектин бирден атомдору гидроксил тобуна алмашкан:




ке негизделген. Формальдегид тери иштетүүдө колдонулат, себеби териин курамындағы белок заттары менен бирикмелерди пайдаланып кылат.

Айыл чарбасында себүү алдында үрөндү суюлтулган формальдегиддин эритмеси менен иштетишет.


Формальдегид техникада жана тиричиликтөрде кенен пайдаланылуучу пластмассаны алууда көп санда керектелет.

Уксус альдегидинин формуласын төмөнкүчө жазууга болот:



Бул альдегид – чириген алма жыттанган оңой буулануучу суюктук. Сууда жакшы эрийт. Уксус кислотасын алууда колдонулат.

Альдегиддерди башка органикалық заттардан айырмалай турган «күмүш күзгү» реакциясы менен таанышып көрөлү.





Бул реакция альдегиддерге мүнөздүү сапаттык реакция болуп саналат.

Ошентип, органикалық заттар углеводороддордун иреттүү айланууларынан алынат: чектүү углеводород \rightarrow чексиз углеводород \rightarrow спирт \rightarrow альдегид \rightarrow кислота.

● Органикалық заттардын ортосундагы мындаи байланыш генетикалық байланыш деп аталат.

- ? 1. Альдегиддер деп кандай органикалық бирикмелер аталышат?
- 2. Альдегиддер кантитеп алышат?
- 3. Альдегиддердин агрегаттык абалдары кандай?
- 4. Сууда кандай эришет?
- 5. Альдегиддерге мүнөздүү болгон «күмүш күзгү» реакциясы кандай жүрөт?

Альдегиддерге таандык дагы бир сапаттык реакция төмөнкүчө жүрөт:




Альдегиддердин сапаттык реакцияларына түшүндүрмө бергиле.

§ 16. Чектүү бир негиздүү карбон кислоталары. Татаал эфиirlер


Органикалык кислоталардын айрымдарынын даамдары си-лерге белгилүү. Мисалы алма кислотасы, лимон кислотасы, сүт кислотасы, уксус кислотасы ж.б. Органикалык кислоталардын көптөгөн түрлөрү менен жогорку класстарда көнен таанышасынар.

Ал эми бул теманын чегинде бир негиздүү карбон кислоталарынын айрымдарын гана карайбыз.

Альдегиддерди кычкылдандыруунун натыйжасында органикалык кислоталар алынат. Алардын курамында карбоксил тобу бар:



- Демек, углеводороддук радикал менен байланышкан карбоксил тобу бар органикалык бирикмелер карбон кислоталары деп аталат, алардын жалпы формуласы:




Бул жерде R – углеводороддук радикал. Эгерде кислотанын курамындагы углеводороддук радикал C_nH_{n+1} болсо, анда ага туура келген кислотанын жалпы формуласын $\text{C}_n\text{H}_{n+1}\text{COOH}$ деп жазууга болот. Мындай жалпы формулага туура келген кислоталар чектүү бир негиздүү кислоталар деп аталышат. Бир негиздүү болгондугуунун себеби, алардын курамында бирден карбоксил тобу бар (молекуласында эки же андан көп карбоксил тобун кармап жүргөн органикалык кислоталар да бар).

Чектүү бир атомдуу карбон кислоталарынын гомологиялык катарын кумурска кислотасы баштайт. Анын молекуласында карбоксил тобу радикал менен байланышастаң, суутектин атому менен байланышкан:



Бул кислота метандык кислота деп да аталат (аны метандан өндүрүлгөн катары да кароого болот).

Чектүү бир негиздүү карбон кислоталарынын экинчи өкүлү – уксус же этан кислотасы:



Кумурска кислотасы HCOOH кумурскалар бөлүп чыгарган заттардан XVII кылымда табылган. Бул кислота чалкан өсүмдүгүнүн ширесинде, медузалардын айрым клеткаларында, жаныбарлардын теринде, айрым курт-кумурскалардын уусунда, мисалы, аарынын уусунда кездешет.

Бул кислота медицинада «кумурска спирти» деген туура эмес ат менен колдонулат, ал эми өндүрүштө эриткичтерди, жыттуу заттарды, кенелерге каршы күрөштүү үчүн заттарды өндүрүүдө пайдаланылат.


Уксус кислотасы CH_3COOH байыркы замандан адамдарга белгилүү. Ал тамак-ашка кошуу үчүн жана маринаддарды алууда колдонулат.

Таза уксус кислотасы – кескин жыттуу түссүз суюктук. Ал полимерлерди, боёкторду, дарыларды синтездөөдө, тамак заттарын консервалоодо керектелет (2%–6%).


Кумурска жана уксус кислоталары органикалык эмес кислоталарга мүнөздүү касиеттерге ээ. Бул эки кислотанын кислота калдыктары бир валенттүү. Карбон кислоталарынын кальций карбонаты менен аракеттенишүүсүнө мисал:



Уксус кислотасы үчүн бул реакцияны төмөнкүчө жаза алаңыз, уксус кислотасынын кислота калдыгы ацетат деп аталат.




Кумурска кислотасынын кислота калдыктары *формиаттар* деп аталат. Кумурска кислотасынын кальций карбонаты менен аракеттенишүүсүн төмөнкүчө жаза алаңыз:




- Органикалык кислоталар менен спирттердин ортосунда татаал эфирлерди пайда кылуу менен жүргөн реакция этирификация реакциясы деп аталат.

Этерификация реакциясын жалпы түрдө төмөнкүчө жазууга болот:



Уксус кислотасы менен этил спиртинин ортосунда жүргөн этерификация реакциясын жазып көрөлү:




Татаал эфирлер – мөмө-жемишиш жыттанган суюктуктар. Сууда аз эрийт, бирок спирттерде жакшы эрийт. Жаратылышта кенири таркалган. Аларды гүлдөрдүн жана мөмө-жемишиштердин жыттарынан байкайбыз.

Этерификация реакциясы үч атомдуу спирт глицерин менен жогорку чектүү жана чексиз карбон кислоталарынын (алар майлуу кислоталар деп аталышат) ортосунда да жүрөт. Жогорку чектүү кислоталарга мисал болуп пальмитин кислотасы $\text{C}_{16}\text{H}_{31}\text{COOH}$ жана стеарин кислотасы $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ саналат. Ал эми чексиз кислоталарга олеин кислотасы $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ ($\text{C}_{17}\text{H}_{33}$ радикалында бир кош байланыш бар) кирет.

Үч атомдуу спирт менен мындай кислоталар реакциялашканда өзгөчө эфирлер пайда болот, алар – майлар.

- **Үч атомдуу спирт глицерин жана майлуу кислоталардан пайда болгон татаал эфирлер – майлар деп аталат. Майлардын жалпы формуласын төмөнкүчө берүүгө болот:**



Бул формуладагы R-углеводороддук радикал, ал окшош болушу да, түрдүү болушу да мүмкүн.

Майлар жаратылышта кенен таралган, алар жаныбарлар жана өсүмдүктөр майлары болуп бөлүнүштөт. Катуу майлар жаныбарлардан алынат, алар катуу же бир аз суюк болушат, мисалы, балык майы.

Ал эми суюк майлар: күнкарама, зайдун (олива), пахта, кендер, зыгыр майлары. Өсүмдүктөрдөн катуу майлар да алышынышы мүмкүн, мисалы, какао майы, кокос майы.

Суюк майларды гидрлөө менен катуу майларды алууга болот. Анткени катуу майлардын техникалык жана тамак-аш продуктусу катары мааниси чон. Катуу майлардан баалуу самындар өндүрүлөт.

Самын – бул майлуу кислоталардын туздары болуп саналат. Натрий самындары көбүрөөк колдонулат. Аларды майларды же-гич натрий же сода менен ысытуу аркылуу гидролиздөөдөн алышат. Бул процесс майларды самындантуу деп аталат, натыйжада органикалык кислоталардын туздары пайда болот, майдын курамындагы глицерин белгүнүп чыгат. Самынды глицеринден белгүп алуу үчүн аралашмага хлордуу натрийдин эритмеси кошулат. Анткени хлордуу натрий эритмесинде самын өтө начар эрийт, ошондуктан эритменин ылдыйкы белгүгүндө глицерин жана кайнатма туздун эритмеси, үстүнкү белгүгүндө – алышган самын калат.

Натрий самынынын формуласы RCOONa . Калий самындары RCOOK формуласына туура келет. Алар – суюк самындар. Майлар самын өндүрүүдө, тамак-аш катары гана колдонулбастан, май боёкторун, глицеринди, косметикалык каражаттарды, курулуш сырларын суолтууга колдонулуучу олифтерди алууда да пайдаланылат. Азыркы учурда май боёкторун өндүрүүдө өсүмдүк майлары эмес, углеводороддук сырьё (мунай, газ) колдонулат. Бул сырьё кир кетириүүчү каражаттарды өндүрүүдө да кенири керектелип, синтетикалык кир кетириүүчү каражаттар да көп чыгарылууда.

- ?
- 1. Органикалык кислоталардын органикалык эмес кислоталардан айырмасы эмнеде? Окшоштугу кайсы?
- 2. Эмне үчүн айрым органикалык кислоталар карбон кислоталары деп аталышат?
- 3. Формиаттар жана ацетаттар кантип пайда болот?
- 4. Татаал эфирлердин пайда болуу реакциясы кандай жүрөт?
- 5. Эмне үчүн майлар татаал эфирлерге кирет?

- 
- 1. Карбон кислоталарынын металлдар, негиздик оксиддер, негиздер жана туздар менен болгон реакцияларынын тенденмелерин түзүүгө аракет жасагыла.
 - 2. Төмөнкү айланыштар ишке аша турган реакциялардын тенденмелерин түзгүлө: этан → этилен → этил спирти → уксус альдегиди → уксус кислотасы → уксус этил эфири.
 - 3. Суюк майларды кандай жол менен катуу майларга айландырышат? Самын кантип өндүрүлөт?

§ 17. Азоту бар органикалық бирикмелер. Аминдер. Аминокислоталар жана белоктор


- Аммиактын молекуласындагы суутектин атомдорунун бирөө же бир нечеси углеводороддук радикалдар менен алмашкан органикалық бирикмелер аминдер деп аталат.

Аммиактын молекуласындагы суутектин атомдорунун углеводороддук радикал менен алмашкан санына жарапша, аминдер үчкө бөлүнүштөт:

Биринчилик аминдер, жалпы формуласы: $R-\text{NH}_2$



Экинчилик аминдер, жалпы формуласы: $\begin{array}{c} R \\ | \\ \text{NH} \\ | \\ R \end{array}$




Үчүнчүлүк аминдер, жалпы формуласы: $\begin{array}{c} R' \\ | \\ R-\text{N} \\ | \\ R'' \end{array}$




$-\text{NH}_2$ тобу амин тобу деп аталат.

Аминдер күчтүү негиздер болуп саналат. Азоту бар органикалық бирикмелердин курамына көмүртек, суутек, кычкылтектен башка азот дагы камтылгандыгын билдик. Мына ошол азоту бар органикалық бирикмелердин эң маанилүүлөрүнүн бири – аминокислоталар. Аминокислоталардын курамында углеводороддук радикал менен бириккен карбоксил тобу $-\text{COOH}$ (карбон кислоталарын эстегиле) жана амин тобу $-\text{NH}_2$ бар. Аминокислоталардын курамын төмөнкү жалпы формула менен көрсөтүүгө болот:




Аминокислоталарды радикалдагы суутек атому амин тобуна алмашкан карбон кислоталарынан өндүрүлгөндөр катары кароого болот. Мисалы, уксус кислотасынан аминоуксус кислотасы өндүрүлөт. Анын курамы төмөнкүчө:




Практика жүзүндө аминокислоталарды карбон кислоталарынын радикалдарындагы суутектин атомун галогенге алмаштырып, андан кийин аммиакты таасир этүү аркылуу галогенди амин тобуна алмаштыруу менен алышат, мисалы:



Амин $-\text{NH}_2$ жана карбоксил $-\text{COOH}$ топтору экөө бирдей аминокислоталардын химиялык касиеттерин аныктайт. Амин тобу $-\text{NH}_2$ заттын негиздик касиетин көрсөтөт, анткени ал суутектин катионун донор-акцептор механизми менен азоттун сарпталбаган жуп электрондорунун эсебинен өзүнө тартып алат:



Донор-акцептор механизми менен аммиакты өткөнде таанышкансыңар, аммиактагы азоттун жалкы үч электрону суутектин атомдору менен байланышууга сарпталган, ал эми сарпталбаган жуп электронунун эсебинен суутектин катионун өзүнө тартып алып, аммонийди пайда кыларын өсүндерге түшүргүлө:



Демек аминокислоталарын курамындагы амин тобу өзүн аммиак сияктуу алып жүрөт.

Карбоксил тобу $-\text{COOH}$ аминокислоталардын кислоталык касиеттерин аныктайт.


- **Молекуласында углеводороддук радикал менен байланышкан амин тобу ($-\text{NH}_2$) жана карбоксил тобу ($-\text{COOH}$) бар органикалык бирикмелер аминокислоталар деп аталат.**

Аминокислоталарда (аминдерде) амфотердүүлүк касиет бар экендиги алардын түздар менен болгон көп сандагы комплекстик бирикмелеринен байкалат. Кыргыз Республикасынын Илимдер улуттук академиясында бул изилдөөлөргө арналган үч жүздөн ашык илимий әмгектер жарык көргөн. Ал әмгектер академик К. Сулайманкуловго таандык.


- Бир эле мезгилде мындай эки касиетке (негиздик жана кислоталық) ээ болгон заттар амфотердик заттар деп аталат.

Мындай касиеттерге органикалык эмес химия курсунан айрым металлдардын оксиддері жана гидроксиддері ээ болорун билесинер, мисалы, $Zn(OH)_2$, $Al(OH)_3$.


Молекуласында негиздик жана кислоталық топтору болгондуктан, аминокислоталар бири-бири менен аракеттенишип, белоктордун полимерлерин пайда кылат:



- Төмөнкү молекулалуу заттарды, мисалы, сууну кошумча пайда кылуу менен полимерлерди алуу реакциялары поликонденсация реакциялары деп аталат.
- Аминокислоталардын бири-бири менен аракеттенишүү реакцияларында бир молекуланын амин тобу менен экинчи молекуланын карбоксил тобунун ортосунда пептиддик байланыш пайда болот:



Полимерде бул байланыш көп жолу кайталанат, ошондуктан полимерди полипептид деп да аташат.




Э. Г. Фишер (1852–1919)

Аминокислоталардын молекулаларынан белоктор – полипептидер түзүлөт. 20дан ашык аминокислоталар белгилүү, ал эми белоктор өтө көп. Белокторду ажыратуу менен, алардын курамы көптөгөн аминокислоталардан тура турғандыгын далилдеген немец окумуштуусу, Нобель сыйлыгынын лауреаты Э. Г. Фишер болгон.

Жер жүзүндөгү ар бир организмде өзүнө тиешелүү белоктордун жыйындысы бар. Айрым учурда өтө жакын туугандардын, әгиздердин белокторунун жыйындысы окшош болушу мүмкүн.

Белоктун молекуласындағы полипептиддик чынжырда аминокислоталардың ирети белоктун түзүлүшүн аныктайт. Мындағы түзүлүш биринчилик түзүлүш деп аталат (29-сүрөт). Белоктордун экинчилик жана үчүнчүлүк, төртүнчүлүк түзүлүштөрү да белгилүү (30–31–32-сүрөттөр). Алар менен жалпы биология предметин окуганда таанышасынар. Белоктун молекуласын терен изилдеген орус окумуштуусу, биохимик А. Я. Данилевский болуп саналат.



**Александр Яковлевич Данилевский
(1838–1923)**

Орус биохимииги. Ферменттердин жана белоктордун химиясы жаатында иштеген. 1888-жылы белоктун молекуласының түзүлүш теориясын сунуш эткен. Ашқазан астындағы бездин ширесинин белокко тийгизген таасири гидролизге алып келерин далилдеген.

Белоктор тирыү организмдерде қөптөгөн маанилүү кызматтарды аткарат: куруучу, катализаторлук, сактоочу, ташуучу, энергиялық ж. б.


Белоктордун баары кислоталардың, жегичтердин таасиринде гидролизге учурайт, аминокислоталар пайда болот. Бул касиет тамак синириүүнүн негизин түзөт.

Айрым таасирлердин астында белоктордун табигый түзүлүштөрү бузулат, башкача айтканда денатурацияга учурайт. Мисалы, жумуртканың белогу сууга салып ысытканда уюп калат. Белоктор мұнәздүү жыл менен күйөт.


Белоктор үчүн түстүү реакциялар мұнәздүү.

- ?
- 1. Азоту бар органикалық бирикмелер кайсылар?
- 2. Эмне үчүн аминокислоталар бир эле мезгилде эки касиетті (негиздик жана кислоталық) алып жүрөт?
- 3. Полимерлешүү реакцияларынан поликонденсация реакциясы кандай айырмаланат?
- 4. Белоктордун түзүлүштөрү эмне менен аныкталат?
- 5. Белоктор кандай кызматтарды аткарат?



- 🏠
- 1. Төмөнкү айланыштар ишке аша турған реакциялардың тенденмелерин түзгүле: этан → этил спирти → уксус альдегиди → уксус кислотасы → хлоруксус кислотасы → аминоуксус кислотасы → полипептид (белок).
- 2. Белоктордун адамдың организми үчүн кандай мааниси бар экендиги тууралуу кошумча маалыматтарды топтотугула, баяндап жазғыла.



29-сүрөт. Белоктун биринчилік структурасы.



30-сүрөт. Белоктун үчүнчүлүк структурасы.



31-сүрөт. Белоктун экинчилік структурасы.

Гемоглобиндин мисалында:
1-полипептиддик чыңжырлар,
2-гемо топтору.

§ 18. Углеводдор

Углеводдор адамдын, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн жашоо тиричилигинде чоң мааниге ээ. Алар жаратылышта кенен таркалган (өзгөчө өсүмдүктөрдүн курамында), биздин планетанын органикалық заттарынын негизги массасын (өсүмдүктөрдүн кургак массасынын 70% и углеводдор) түзөт.

Углеводдордун жалпы формуласы $C_n(H_2O)_m$. «Углевод» деген терминдин пайда болгонуна көп болгон. Эн алгач белгилүү болгон углеводдордун курамында көмүртек менен суутектин катышы суунукундай 1:2 болгондуктан, углеводдорду көмүртек менен суунун бирикмеси катары карашкан. Кийинcherәэк ачылган өкүлдерүү жогоркудай катышта болбогондугу да белгилүү болгон, бирок «углевод» деген ат бүгүнкү күнгө чейин сакталып калды.

Углеводдор үч чоң топко бөлүнүштөт.

Моносахариддер – гидролизге учурабай турган жөнекөй углеводдор. Алардын жалпы формуласы $C_nH_{2n}O_n$. Мисалы, глюкоза моносахарид болуп саналат. Анын формуласы $C_6H_{12}O_6$. Өзүнүн атын гректин «гликос» – «таттуу» деген сөзүнөн алган. Глюкоза – өтө майда кристаллдык зат, жыты жок, сууда жакшы эрийт.

Глюкоза жаратылышта кенен таркалган. Ал мөмө-жемиштердин таттуу даамдарын түзөт. Ал жүзүмдүн ширесинде көп, ошондуктан глюкозанын дагы бир атальшы – жүзүм канты.

Адамдын жана жаныбарлардын организмдеринде глюкоза кандын курамында, лимфа суюктуктарында (0,1%) кездешет.

Дени сак адамдын заарасында глюкоза өтө аз санда болот. Ал эми диабет менен ооруган адамдыкында (12%) глюкоза көбөйүп кетет.

Глюкоза – бир эле убакытта альдегид да, спирт дагы. Альдегид катары «күмүш күзгү» реакциясына кирет, ысытканда жез (II) гидроксиди менен аракеттенишет. Натыйжада кызыл-күрөң түстөгү Cu_2O чөкмөгө чыгат. Көп атомдуу спирт катары жаны даярдалган жез (II) гидроксидин кошкондо, глюкоза ачык көк түстү берет. Демек глюкоза бир эле убакта эки касиетке, альдегиддик жана спиртик касиетке ээ болот. Дагы бир моносахарид – фруктоза. Анын формуласы дагы $C_6H_{12}O_6$. Ал көптөгөн мөмөлөрдүн курамына кирет. Балдын 50% ин фруктоза түзөт.

Олигосахариддер – молекуласы эки же андан көбүрөөк (онго чейин) моносахариддердин калдыктарынан түзүлгөн татаал углеводдор. Дисахариддердин жалпы формуласы: $C_{12}H_{22}O_{11}$.

Бул формула биз күндө колдонуп жүргөн канттын молекуласына туура келет.

Моносахариддердин молекулаларынын көп сандаган калдыктарынан турган татаал түзүлүштөгү молекулалар – полисахариддер болуп саналат.

Мындай биополимерлердин жалпы формуласы – $(C_6H_{10}O_5)_n$.

Полисахариддерге крахмалды жана целлюозаны мисал келтирсек болот. Крахмалды гидролиздөө менен глюкозаны алууга болот. Андан спирт да алынат. Крахмал кондитердик азыктарды өндүрүүдө, парфюмерияда, текстил өнөр жайында, медицинада колдонулат.

Целлюлоза – түз сзыяктуу макромолекулалардан турган полимер. Өсүмдүк клеткаларынын сырткы бөлүгүн түзүү менен, ага механикалык бышыктыкты камсыз кылат. Булаларда 90–95% целлюлоза болот. Түрдүү жыгачтарда клетчатка 40–60% кармалып жүрөт.

Сууну жакшы синириүүчү кебез жана чыпкалоочу кагаз – таза целлюлоза болуп саналат.

Целлюлозаны гидролиздегенде глюкоза пайда болот. Целлюлоза көп санда (карагай жыгачтары) кагаз өндүрүүдө колдонулат. Бул учурда канттуу заттары бар кошумча эритме алынат, аны спирттик ачытуу менен техникалык гидролиздик этил спиртин өндүрүүгө болот.

Целлюлозадан алынган коллодий медицинада өтө чоң эмес жарааттарды чаптоо үчүн колдонулат. Ошондой эле целлULOИD, нитролактар жана боёктөр, жарылгыч заттар (нитроцеллюлоза же пироксилин) жана ацетат жибёги алынат.

Кыргызстанда кант Кайынды жана Карабалта кант заводдорунда кант қызылчасынан өндүрүлөт. Кант өндүрүү үчүн кант қызылчасын өтө майдалап, ысык суу менен иштетишет. Алынган эритмени сүзүшөт. Кант эритмеге өтөт, ал эритмеде белоктук заттар, органикалык кислоталар жана түрдүү туздар болот. Аларды бөлүү үчүн эритмени акиташибеттүү менен бирге ысытышат. Бул учурда белоктук заттар коагуляцияга учурдайт, ал эми органикалык заттар кальцийдин эрибеген туздары иретинде чекмөгө чөгөт. Сахароза кальцийдин эрий турган тузун пайдалыат. Аны сүзүп, андан кийин көмүр кычкыл газынын жардамы менен бөлүштөт: бул учурда кальций карбонатынын эрибеген туздары пайдалыат. Сүзгүчтөн өткөрүлгөн эритмени буулантуу менен кантты кристаллдаштырып алышат.

- ? 1. Углеводдордун: моносахариддердин, дисахариддердин, полисахариддердин бири-биринен кандай айырмачылыктары бар? Түзүлүштөрү кандай?
- 2. Силерге тааныш углеводдордун (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза) касиеттери кандай?

3. Көмүр кычкыл газы менен суунун ортосунан глюкозаны пайда қылуучу фотосинтез реакциясынын тенденциясын түзгүлө.
4. Глюкозанын бир эле убакытта эки түрдүү касиетке ээ болгондуугун кантип түшүндүрүгө болот?
5. Глюкозанын, сахарозанын, крахмалдын жана клетчатканын колдонулушу кандай?

-  1. Глюкоза менен фруктозанын молекулалык формуласы окшош $C_6H_{12}O_6$. Мындай заттар кандай аталарын эсинарге түшүргүлө.
2. Сахароза гидролизге учуралганда эки моносахарид – глюкоза жана фруктоза пайда болот. Сахарозанын формуласын эске тутуу үчүн глюкоза менен фруктозанын курамдарын кошуп, анын суммасынан суунун бир молекуласын алыш таштоо керек. Ошондо сахарозанын формуласы $C_{12}H_{22}O_{11}$ келип чыгат.
- Сахароза моносахариддерге мүнөздүү реакцияны бербейт. Ал реакциялар сахарозаны гидролизге учураткандан кийин гана жүрөт. Эмне үчүн экенин түшүндүргүлө.
- Жаратылышта сахароза кант кызылчасынын ширесинде 20% ке, ал эми бал камышта (кант тростникинде) 25% ке чейин кездешет.
3. Углеводдор боюнча кошумча адабияттардан маалыматтарды чогултуула. Адамдын жашоо-тиричилигинде углеводдор кандай ролду ойнайт, баяндагыла.

§ 19. Полимерлер

Полимерлер (грекче polymers – көп бөлүктөн туруучу) деп көптөгөн бирдей молекулалардын (мономерлердин) бир ири молекулала (макромолекулала) биригүүсүнүн (полимерлешүүсү) натыйжасында касиети өзгөргөн продуктусу аталат.

Полимерлердин кыскача аныктamasы төмөнкүдөй:

- **Көптөгөн окшош элементардык звенолордон турган жогорку молекулалуу бирикмелер полимерлер деп аталат.**


Полимерлер келип чыгышы боюнча экиге бөлүнөт: табигый полимерлер (биополимерлер) жана полимерлешүү же поликонденсация реакциялары менен алынган синтетикалык полимерлер.

Табигый полимерлерге табигый каучук, крахмал, целлюлоза, белоктор, нуклеин кислоталары кирет. Бул заттар тириү организдердин клеткаларын жана ткандарын түзөт.



Табигый полимерлердин ичинде органикалык эмес полимерлер да бар. Алар – силикаттар (талаа шпаттары, чополуу минералдар, слюдалар, асбест), пластикалык күкүрт, чыңжырлуу түзүлүштөгү селен жана теллур.

Синтетикалык полимерлерге көп түрлүү пластмассалар, булалар, каучуктар кирет. Азыркы мезгилде полимерлердин мааниси чоң.

Полимерлешүү жана поликонденсация реакциясы менен си-лер таанышсынар. Полимерлешүү реакциясы менен этиленден полиэтиленди алууга болот:



Поликонденсация реакциясы менен аминокислоталардан био-полимер – белоктун алышынш реакциясын караганда кездешкен-синер. Полимерлешүүдөн айырмасы, поликонденсация учурунда белок менен катар кошумча продукт – суу пайда болот:



33-сүрөт. Полимерлердин түзүлүштөрү: а - сзызыктуу; б - бутактуу; в - мейкиндиктик.

Полимерлер менен таанышууда төмөнкүлөрдү эсинарге тутуу-га аракеттенгиле: $(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$ – полимерлердин макромолекулалары (гректин макрос – чон, узун деген сөзүнөн алынган). $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ – мономер, полимер алышуучу алгачкы зат.

$(-\text{CH}-\text{CH}-)_n$ – элементардык звено, макромолекулада көп жолу кайталануучу атомдордун тобу. Кашаанын сыртындагы n – поли-мерлешүү даражасы, мындайча айтканда макромолекуладагы элементардык звенолордун саны.

Полимерлер түрдүү түзүлүштө болушу мүмкүн (33-сүрөт), ми-салы, полиэтилен – сзызыктуу (а), крахмал – бутактуу (б), бело-ктордун әкинчилик жана үчүнчүлүк түзүлүштөрү – мейкиндик-тик түзүлүштө (в).

Полимер материалдары әки топко: пластмассаларга жана бу-лаларга бөлүнүштөт.

- Полимерлердин негизинде даярдалуучу, ысытканда берген белгилүү форманы муздаланда сактап калууучу материалдар пластмассалар болот.

Полимерлер женил, өтө бышык, химиялык жактан түрктуу, жылуулукту жана электр агымын тосуп калуу, чыгарбоо касиеттерине ээ болушат. Алар газ-мунай-химия, көмүр, токой-химия өндүрүштөрүнүн сырьёлорунан өндүрүлөт да, алардан түрдүү буюмдар даярдалат. Мисалы, полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, фенолформальдегид өндүү полимерлер өндүрүштө, айыл чарбасында, медицинада, маданиятта, тиричиликтө кенен колдонулат.

Булалар – ийрүүгө жарактуу жана текстиль буюмдары даярдала турган ийкемдүү, ийилчээк жиптер. Алар табигый же синтетикалык полимерлерден өндүрүлөт.

Табигый булалар өсүмдүктөрдөн же жаныбарлардан алынат: пахта, зыгыр, жүн, жибек, кендир.

Химиялык булалаларды табигый же синтетикалык полимерлерди кайра иштетүүдөн алышат, мисалы, целлюлозадан жасалма булалар – вискоза, ацетат буласы алынат. Синтетикалык булалар: капрон, нейлон, лавсан.

- ? 1. Табигый полимерлер (органикалык жана органикалык эмес) жана синтетикалык полимерлер кайсылар?
- 2. Полимерлешүү реакциясы менен поликонденсация реакциясынын ошоштугу жана айырмасы эмнеде? Мисалдар менен түшүндүргүлө.
- 3. Мономер, макромолекула, элементардык звено, полимерлешүү дара-жасы деген түшүнүктөрдү чечмелегиле?
- 4. Полимердин түзүлүштөрү эмнеге жараша болот жана анын кандай түрлөрү болот?
- 5. Полимердин кандай негизги топтору бар? Аларга мүнөздөмө бергиле.

1. Винилхлориддин формуласы: $\text{CH}_2=\text{CH}$
- |
Cl

Анын полимерлешүү реакциясын жазгыла жана элементардык звено-сун бөлүп көрсөткүлө. Алынган полимердин атын атагыла.


- 2. Пластмассалар жана булалар боюнча маалыматтарды издегиле, алар жөнүндө баяндама жасагыла.
- 3. Пластмассалардын, булалардын коллекцияларын түзүүгө аракет-тенгиле.

ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ТАЖРЫЙБАЛАР

1-т а ж р ы й б а. ОРГАНИКАЛЫК ЗАТТАРДАГЫ КӨМҮРТЕКТИ, СУУТЕКТИ АНЫКТОО

Органикалык заттардагы көмүртекти жана суутекти сапаттык аныктоону углеводороддорду жez (II) оксиди менен кычкылдандыруу методу аркылуу ишке ашырууга болот.

Кургак пробиркага 1 г жez оксидин салып, ага 0,1–0,2 г керосинди кошуу керек. Керосин жez оксидин нымдагыдай болсун. Кийин пробирканы горизонталдык абалга келтирип, анан суусунан ажыратылган



34-сүрөт. Углеводороддордогу көмүртекти жана суутекти сапаттык аныктоо.

бир аз өлчөмдөгү жez купоросун орто ченине сүрөттөгүдөй жайгаштыргыла. Пробирканы газ өткөрүүчү түтүгү бар тыгын менен жабуу керек. Ал эми газ өткөрүүчү түтүктүн экинчи учун акиташ суусу бар пробиркага салыла. Горизонталдык пробиркадагы заттардын аралашмасын ысыткыла. Жez сульфаты жана акиташ суусу кандай өзгөрүүгө дуушар болгонуна байкоо жүргүзгүлө. Молекуласында көмүртектин 10 атому бар алкандын жez оксиди менен кычкылдануу реакциясынын тенденмесин түзгүлө.

2-т а ж р ы й б а. АЦЕТИЛЕНДИ АЛУУ ЖАНА АНЫН АЙРЫМ КАСИЕТТЕРИ МЕНЕН ТААНЫШШУУ

Э ск е р т үү: Бул тажрыйбаны абаны соргуч шкафтын алдында жүргүзгүлө.

Пробиркага 1 мл суу куюп, кичине өлчөмдө кальций карбидин салыла. Пробирканын оозун газ өткөрүүчү түтүгү бар тыгын менен тез жапкыла, бөлүнгөн газды биринчи бромдуу суусу бар пробиркага, экинчи, кычкылдандырылган калий перманганатынын эритмесине жибергиле. Эки пробиркада тен эритмелер түссүздөнүштөт. Ал эмнени түшүндүрөт. Ацетиленди дагы бир жолу алышп, аны күйгүзүп көргүлө. Абада ацетилен кандай жалын менен күйөрүн байкагыла. Баяндап жазгыла.

3-т а ж р ы й б а. ЭТИЛ СПИРТИНИН КАСИЕТТЕРИ

Пробиркада берилген этил спиртин карап, жытын искең көргүлө. Башка пробиркага бир нече тамчы этил спиртин тамчылатып, үстүнө 2–3 мл суу кошкула. Этил спиртиниң эригичтигін баяндагыла.

Эки пробирканын бириңисине 1–2 мл суу, әкинчисине 1–2 мл спирт куюп, аларга 2–3 тамчыдан суюк майды тамчылатқыла. Кайсы пробиркада май әриди, байкагыла.

Чылпақа қағазга суудан жана спирттен бирден тамчы тамчылатқыла. Кайсы тамчы тез бууланып кетерин байкагыла. Бул тажрыйбаның негизинде спиртиниң касиеттери жөнүндө жыйынтық жасагыла.

4-т а ж р ы й б а

Пробиркадагы 1 мл сууга ошончо өлчөмдөгү глицеринди тамызғыла да, аралашманы аралаштыргыла. Кийин глицеринден мурдагыдай өлчөмдү дагы кошкула. Глицерин сууда кандай эрий турғандығын айттып бергиле.

5-т а ж р ы й б а

Төрт пробиркага 2 мл ден уксус кислотасын куйгула. Жытын искеңгиле. Пробиркалардын бирөөнө бир нече тамчы лакмус тамызғыла, андан кийин жегичтин эритмесин кошуп нейтралдаштыргыла. Эмнени байкадынар, баяндагыла. Экинчи пробиркага магнийдин же цинктин кесекчелерин же күкүмүн салғыла, үчүнчүсүнө кайсы бир металлдын оксидин, төртүнчүсүнө бордун кесекчесин же сода кошкула. Байкоолорунарды баяндагыла. Реакциялардын тенденмелерин жазғыла.

6-т а ж р ы й б а

Эки пробирканын бирине 1 мл суу, әкинчисине ошончо өлчөмдөгү спирт куйгула, алардын ар бирине каттуу майдын кичине кесекчесин же 1–2 тамчы суюк май кошкула. Кайсынысында май жакшы эрий турганына байкоо жүргүзгүлө.

7-т а ж р ы й б а

Эки стакандын бирине крандагы суудан, ал эми әкинчисине дистирленген суу куйгула. Экөөнө бирдей өлчөмдө кир самындын күкүмдөрүн салғыла. Кайсы стаканда самын жакшы көбүрөрүн байкагыла. Баяндап жазғыла.


Булалардын, пластмассалардын коллекциялары менен таанышшуу.

ПРАКТИКАЛЫК ИШТЕР

1. Этилендин алынышы жана анын касиеттерин окуп-үйрөнүү

1. Пробиркага 1 мл этил спиртин куюп, ага 6–9 мл концентрацияланган күкүрт кислотасын (өтө чебердик менен) кошкула. Эритме кайнаганда ташып кетпесин үчүн пробиркага бир аз ысытылган күм, же пемзанын кесекчелерин салыш керек. Пробирканын оозун газ түтүкчесү бар тыгын менен тыгындал, штативге бекиткиле (37-сүрөт). Пробирканы ысыткыла. Эмнени байкаганынарды баяндап жазгыла.

2. Экинчи пробиркага 2–3 мл бром суусун куюп, анын түбүнө чейин ысытылган биринчи пробирканын оозундагы газ еткөрүүчү түтүктү салгыла да, чыгып жаткан газды бром суусу аркылуу өткөзгүлө. Эмнени байкаганынарды айтып бергиле.



35-сүрөт. Этиленди алуу үчүн курал.

3. Учунчү пробиркага 2–3 мл күкүрт кислотасы менен кычкылдандырылган калий перманганатынын суюлтулган эритмесин күйгүла да, ал аркылуу газды өткөргүлө. Эмнени байкаганынарды баяндагыла.

4. Биринчи пробиркадан бөлүнүп чыгып жаткан газды күйгүзүп көргүлө. Этилен кандай жалын менен күйөт?

Бардык тапшырмалардагы реакциялардын тенденциелерин жазгыла.

2. Заттарды аныктоону үйрөнүү

1. Силерге берилген пробиркалардын биринде глицерин, экинчи синде альдегид, үчүнчүсүндө глюкоза бар. Бирдей окшош реактивдердин жардамы менен ар бир затты аныктагыла.

2. Этил спиртинен а) жөнөкөй эфирди, б) альдегидди, в) кислотаны алгыла.

3. Кадимки канттын курамында көмүртек бар экендигин тажрыйба жүзүндө далилдегиле.

4. Картөшкө жана ак нан крахмалдан туарын тажрыйба жүзүндө далилдегиле.

5. Сапаттык реакциялардын жардамы менен эки топтогу заттарды аныктагыла: 1) крахмал, сахароза, глюкоза; б) глицерин, самын, крахмал (эрители).


6. Эритмеде белок бар экендигин аныктагыла.

3. Пластмассаларды таанып-билиш

Силерге эки түрдүү пластмассанын үлгүлөрү берилген. Алар полиэтилен, поливинил хлорид, полистирол, фенопласт болушу мүмкүн. Төмөнкү таблицаны пайдаланып, силерге берилген пластмассаларды аныктагыла.

16-таблица

Пластмассалардын касиеттери

Пластмассанын аты жана структуралык звеносунун формуласы	Сезүү органдары менен аныкталуучу физикалык касиеттери	Ысытууда өзгөрүшү	Күйүү мүнәздөмөсү
Полиэтилен $(-\text{CH}_2-\text{CH}_2)_n$	Кармаганда майланышып турғансыйт. Пленка түрүндө, тунук, ийилгич.	Жумшарат, формасын оңой өзгөртөт, жип болуп созулат.	Балкып эриген парафин сыйктуу жыттанып, жарык жалын менен күйөт.
Поливинил-хлорид $(-\text{CH}_2-\text{CH}-)_n$ Cl	Ийилгич, жалын болсо катуу. Тунук же тунук эмес.	Жумшарат жана хлордуу суутекти белүү менен ажырайт.	Ыштуу жалын менен күйөт. Жалындан алыштаганда өчүп калат.
Полистирол 	Бат сына турган, ийилгич эмес, тунук, айрымдары тунук эмес.	Жумшарат, жип болуп оной созулат.	Ыштуу жалын менен күйөт, стиролдун жагымдуу жыты жыттанат. Жалындан сырткары да күйүүсүн улантат.
Фенол-формальдегид чайыры	Тунук эмес, ийилгич эмес, оной сынат.	Жумшарбайт, ажырайт.	От алып күйөт. Көпкө ысытканда фенолдун мүнәздүү жыты билинет.

4. Булаларды таанып-билиш

Силерге төмөнкү тизмеден (пахта, жүн, табигый жибек, вискоза буласы, ацетат буласы, капрон, лавсан) үч буланын үлгүсү жип же кездеменин үзүндүсү түрүндө берилет.

Төмөнкү таблицаны пайдалануу менен силерге берилген булаларды аныктагыла. Эгерде үлгү кездеменин бир бөлүгү түрүндө берилсе, андан бир-эки жипти чыгарып, аны булаларга ажыратып, анан аныктоону баштагыла. Кыргыз Республикасы кайсы булаларга бай экендигин белгилегиле.

Булалардын касиеттери

Буланын аты	Күйү мүнөздөмөсү жана анын натыйжасы	Концентрацияланган кислоталардын жана жегичтердин таасири		
		HNO ₃	H ₂ SO ₄	NaOH
Пахта (кебез)	Бат күйөт, күйгөн кагаз жыттанат, күйгөндөн кийин боз күл калат.	Эрийт. Эритмеси түссүз.	Эрийт.	Көбөт, бирок эрибейт.
Вискоза	Жогоркудай.	Эрийт. Эритмеси түссүз.	Эрийт. Эритмеси кызыл-күрөн.	Эрийт.
Жүн жана табигый жибек	Күйөт, күйгөн канат жыттанат. Борпон кара тоголок шарик пайда болот.	Сары түстү берет.	Бузулат.	Эрийт.
Ацетат	Жалында күйөт, жалынсыз күйбейт. Кочкул түстөгү катуу тоголок шарикчеге айланат.	Эрийт. Эритмеси түссүз.	Эрийт.	Саргарат жана эрийт.
Капрон	Ысытканда жумшарат, балкып эрийт, катуу жаркырак шариктер пайда болот. Балкыганда жип болуп чоюлат. Жалында жагымсыз жыт менен күйөт.	Эрийт. Эритмеси түссүз.	Эрийт. Эритмеси түссүз.	Эрибейт.
Лавсан	Катуу, кочкул жаркырак шариктерди пайда кылат. Ысытканда балкыйт. Балкыганда жип болуп чоюлат.	Эрибейт.	Эрийт.	Эрибейт.

МАЗМУНУ

Кириш сөз 3

I г л а в а. ЭРИТМЕЛЕРДИН ХИМИЯСЫ

§ 1. Эритмелер	5
§ 2. Эригичтик. Каныккан жана канықпаган эритмелер	7
§ 3. Эритмелердин концентрациясы	11
§ 4. Реакциянын продуктусун чөкмөгө айлантуу	14
§ 5. Эригичтиктин жылуулугу	15
§ 6. Суу – эриткич. Иондордун гидратташуусу. Катиондор жана аниондор	17
§ 7. Электролиттер жана электролит эместер	20
§ 8. Кристаллогидраттар	22
§ 9. Суутектик көрсөткүч жөнүндө түшүнүк	24
§ 10. Электролиттик диссоциация	27
§ 11. Кислоталардын, негиздердин, туздардын диссоциациясы	28
§ 12. Диссоциация даражасы. Күчтүү жана начар электролиттер	30
§ 13. Ион алмашуу реакциялары	32
§ 14. Туздардын гидролизи	35
§ 15. Сапаттык реакциялар жөнүндө түшүнүктөр	37
Лабораториялык тажрыйбалар	39
Практикалык иш	42

II г л а в а.. ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАРДЫН ҮЛДАМДЫГЫ

§ 1. Заттардын концентрациялары жана молекулалардын кагылышуу мүмкүнчүлүктөрү	43
§ 2. Активдүү кагылышуулар	45
§ 3. Молекулалардын активдешүүлөрү	46
§ 4. Активдешүү энергиясы	47
§ 5. Химиялык реакциянын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлор	49
§ 6. Химиялык реакциянын ылдамдыгына катализаторлордун тийгизген таасири. Катализ	51
§ 7. Уланма реакциялар	53
Лабораториялык тажрыйбалар	55

III г л а в а. ХИМИЯЛЫК ТЕҢ САЛМАКТУУЛУК

§ 1. Кайталанма жана кайталанбоочу реакциялар	56
§ 2. Химиялык тен салмактуулук	57
§ 3. Химиялык тен салмактуулукка таасир этүүчү шарттар	59
Практикалык иш	61

IV г л а в а. КЫЧКЫЛДАНУУ-КАЛЫБЫНА КЕЛҮҮ РЕАКЦИЯЛАРЫ

§ 1. Кычкылдануу даражасы	62
§ 2. Кычкылдануу-калбына келүү реакциялары	64
§ 3. Кычкылдануу-калбына келүү – электрондордун етүшү менен жүрүүчү процесс	65

§ 4. Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын тенденциелерин түзүү	67
§ 5. Кычкылдандыргычтар жана калыбына келтиригичтер	69
§ 6. Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын түрлөрү	72
V г л а в а. АЙРЫМ ЭЛЕМЕНТТЕРДИН ХИМИЯСЫ	
§ 1. Металл эместер	76
§ 2. Металл эместердин атомдорунун жана молекулаларынын түзүлүшү	78
§ 3. Металл эместердин касиеттери	80
§ 4. Металл эместердин суутектик жана кычкылтектик бирикмелери	82
§ 5. Жаратылыштагы металл эместер	84
§ 6. Металл эместердин колдонулуштары	86
§ 7. Силикаттардын химиясы	87
§ 8. Металлдар	91
§ 9. Металлдардын физикалык касиеттери	94
§ 10. Металлдардын химиялык касиеттери	97
§ 11. Металлдардын активдүүлүк катары	98
§ 12. Металлдардын алынышы. Металлдарды рудадан калыбына келтирүү	101
§ 13. Металлдардын техникада колдонулушу	108
VI г л а в а. ОРГАНИКАЛЫК БИРИКМЕЛЕР	
§ 1. Көмүртек атомунун түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү	113
§ 2. Көмүртектин органикалык эмес жана органикалык бирикмелери	115
§ 3. Көмүртек бирикмелеринин түзүлүш формулалары	120
§ 4. Гомология	121
§ 5. Изомерия	122
§ 6. А. М. Бутлеровдун органикалык заттардын химиялык түзүлүш теориясы	125
§ 7. Валенттик бурчтар жана байланыш узундуктары. Жөнөкөй жана эселик байланыштар	128
§ 8. Органикалык заттарга мүнөздүү касиеттер жана реакциялар	131
§ 9. Чектүү углеводороддор. Метан	133
§ 10. Чексиз углеводороддор. Этилен	137
§ 11. Ацетилен	140
§ 12. Жыптар жыттуу углеводороддор. Бензол	142
§ 13. Углеводороддордун табигый булактары жана аларды кайра иштетүү	144
§ 14. Спирттер	150
§ 15. Альдегиддер	152
§ 16. Чектүү бир негиздүү карбон кислоталары. Татаал эфирлер	155
§ 17. Азоту бар органикалык бирикмелер. Аминдер. Аминокислоталар жана белоктор	159
§ 18. Углеводдор	164
§ 19. Полимерлер	166
Лабораториялык тажрыйбалар	169

Учебное издание

*Сулайманкулов Кажин Сулайманкулович
Кособаева Бакдолот Махмутовна*

ХИМИЯ

Учебник для 9 класса средней школы

Дополненное, второе издание

Окуу басылмасы

*Сулайманкулов Кажин Сулайманкулович
Кособаева Бакдолот Махмутовна*

ХИМИЯ

Орто мектептердин 9-классы учун окуу китеби

Толукталып, экинчи басылышы

Редактору С. Ш. Төлөгөнова

Көркөм редактору жана дизайнери Ж. С. Субанов

Компьютердик калыпта салган Ж. С. Субанов

Техникалык редактору В. В. Крутякова

Корректору Р. Сакелова

Терүүгө 03.04.2006. берилди. Басууга 20.05.2006. кол коюлду. Офсет кагазы № 1. Форматы 60 x 90¹/₁₆. «Мектеп» ариби. 11,0 физ. басма табак.

Нускасы 50000. Заказ 2261.

«Билим күтү» басма борбору
Бишкек ш., Н. Исанов кочосу, 87

Т. Суванбердиев атындагы «Кыргызполиграфкомбинат» ААК басылды.
720005, Бишкек ш., Т. Суванбердиев көчөсү, 102

Ар түрдүү бирикмелидердин эригичтигинин жана түстөрүнүн таблицасы

www.bizdin.kg

	Al ³⁺	Ag ⁺	Ba ²⁺	Ca ²⁺	Cd ²⁺	Co ²⁺	Cr ³⁺	Cu ²⁺	Fe ²⁺	Fe ³⁺	H ⁺	Hg ₂ ²⁺	Hg ²⁺	K ⁺	Li ⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	NH ₄ ⁺	Na ⁺	Ni ²⁺	Pb ²⁺	Sn ²⁺	Sr ²⁺	Zn ²⁺	
Br ⁻	101 —	Эб Эб	104 149	143 312	99 160	113 257	—	126 96	115 178	455 20	198 130	Эб —	0,55 4,9	65 104	177 266	96 120	147 228	75 146	90 121	131 155	0,85 4,7	85 225	93 222	448 672	
CO ₃ ²⁻	—	11,1 Эб	9,4 Эб	8,4 Эб	12 Эб	10 Эб	—	9,6 Эб	20 Эб	— —	— —	16 Эб	?	110 155	1,4 0,7	4,6 Эб	10 —	100 45	21 Эб	6,8 Эб	13 Эб	? Эб	10 Эб	11 Эб	
C ₂ O ₄ ²⁻	—	10 Эб	0,7 Эб	8,6 Эб	7,8 Эб	7,2 Эб	—	7,5 Эб	6,7 Эб	?	9,5 Эб	13 Эб	Эб	36 78	8 —	4,0 Эб	5,3 34	4,5,4,0 3,4 6,5	9,4 Эб	9,3 Эб	— —	— —	6,8 Эб	7,5 Эб	
CH ₃ COO ⁻	— + 2,5	1 75	63 29	34 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	25 100	255 396	45 —	63 —	Э —	148 + 170	46 16	40 —	+ —	41 36	30 44	
Cl ⁻	46 49	9,7 Эб	35 58	74 159	113 161	52 106	34 —	72 110	62 95	91 536	60 —	17 Эб	6,6 63	34 56	78 127	54 73	73 115	37 77	36 40	61 88	1 3,3	270 —	53 100	367 614	
F ⁻	1,7 205	172 —	0,15 Эб	— —	— —	— —	— —	1,5 —	81 —	3,5 —	1 Эб	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
I ⁻	— + —	16 Эб	203 284	208 426	86 125	187 420	— —	— —	— —	— —	— —	28 Эб	— —	144 208	165 481	139 —	— —	172 250	178 302	143 188	0,06 0,44	1 4,2	177 383	436 510	
NO ₃ ⁻	73 159	227 900	9 34	115 363	150 681	100 >300	— —	124 247	83 ?—	82 ?	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
OH ⁻	Эб —	16 —	— —	3,8 >100	0,16 0,07	Эб —	14 —	14 —	17 —	19 —	15 —	37 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
PO ₄ ³⁻	Эб —	18 Эб	19 Эб	38 Эб	28 Эб	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
S ²⁻	+	49 Эб	+	+	28 Эб	20 Эб	— —	35 —	17 —	?	0,3 0	47 Эб	51 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
SO ₃ ²⁻	—	13 Эб	6,1 Эб	6,5 Эб	AЭ —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0,1 +	
SO ₄ ²⁻	36 89	0,8 1,4	Эб —	9,9 0,2	0,2 0,16	77 58	36 38	120 —	20 75	26 —	440 +	— —	6,2 +	— —	11 24	34 29	35 68	62 34	26 101	19 42	37 76	7,8 Эб	18 18	6,5 Эб	47 60

заттын эритмесинин түсү (канчалык сол тарабыраак болсо концентрациялдуу)

100 г сууда 20° С да эриген суусуз заттын эригичтиги г менен ошол эле 100° С да

туруктуу кристаллогидраттын түсү (эгер зат аны пайда кылса)

суусуз заттын түсү

139

Көк түс, заттын же эритменин түссүз экенин билдириет.

Ак ячейка – маалымат жок экенин билдириет.

Э – эрийт; АЭ – аз эрийт; Эб – эрибейт; + – суу менен кошулат; - – зат жок;

? – бирикменин болушунда шек бар; ∞ – чексиз эрийт.

оной менен эрибеген зат

кыйындык менен эрүүчү заттын эригичтигинин көбөйтүндүсүнүн логарифмасы – lg(ПР)

туруктуулугу аз кристаллдык модификациянын түсү



1155-07 (2007/7)

Национальная библиотека
Кыргызской Республики