

П-1321

Гл. бот. сад. СССР

Известия.

1927 г. № 26 в. 6.

ИЗВЕСТИЯ
Главного Ботанического Сада СССР.

под редакцией В. Л. КОМАРОВА.

Том XXVI

Вып. 6-й

B U L L E T I N
D U

Jardin Botanique Principal de l'U.R.S.S.

sous la rédaction de V. L. KOMAROV.

Tome XXVI

Livr. 6

ЛЕНИНГРАД.
1927.

СОДЕРЖАНИЕ ВЫП. 6.

Стр.

SOMMAIRE FASC. 6.

	Стр.
1. Шипчинский, Н. В. Урмий-ская экспедиция.	537
2. Гончаров, Н. Ф. К позна-нию бразильских Passifloraceae, сборы Риделя и Лангсдорфа.	556
3. Вольф, Э. Л. Изменчивость Понтийской Азалии, Rhododen-dron flavum Don (Azalea pontica L.)	563
4. Саребек-Агамов. К воп-росу о кутикулярной транспи-рации.	576
5. Лозина-Лозинская, А. С. Род Calligonum в Монголии.	595
6. Воронов, Ю. Н. Новые Кав-казские виды р. Rutilus L.	608
7. Воронов, Ю. Н. Материалы к познанию лилейных (Lilia-ceae) Кавказского Края, Закав-казские виды р. Bellevallia Lap.	610
8. Кречетович, В. И. Заметки об осоках Ярославской	
9.	
10. Задорожный, А. И. Опыт по выращиванию зерновых культур в Кавказском Крае.	622
11. Григорьев, С. А. Анализ почв Кавказа.	624

10. Задорожный
11. Григорьев
пр. С. А.
ана-
лоз.Некроло-
Положен-известий
Главного Ботанического Сада СССР. № 1-50

Ит. Это произош-
ло укомплектова- постановки учета. Никакие на-
шепех, неко-рушения устава терпимы быть
иты поступали на не могут. Колхозный учет дол-
жно неграмотны- жи быть поставлен образцово.

В. А.

Pages

1. Schipczinsky, N. W. Expe-dition nach Urmia 554
 2. Gontscharov, N. F. Beitrag zur Kenntniss der brasiliianischer Passifloraceen (nach dem im Herbar von Riedel und Langsdorff enthaltenen Material 562
 3. Wolf, Egbert, Rhododendronis flavi mutabililitas 570
 4. Saribek-Agamov, Ueber di cuticulare Transpiration 593
 5. Losina-Losinskaja, A. S. Le genre Calligonum en Mongo- lie 607
 6. Woronow, G. N. Neue cau-kasische Pyrus-Arten 609
 7. Woronow, C. N. Beitrage zur Kenntniss der Liliaceen der Kaukasus Länder, Transkaukasi-sche Bellevallia Arten 620
 8. Kreczetowicz, W. I. Einige Anmerkungen über im Gouver- int Joroslaw auftretenden grasarten 627
 9. Mörzow, B. V. Fragmen-tora Manshuriae, Trapae ls formae Manshuricae 630
 10. Lenskij, I. The influence minium on xerophyte and tyte wheat 643
 11. Stein, L. N. Ueber die keit der directen metho-Vinogradski zu Boden-i, in Zusammenhang mit sorption der Bakterien in Boden 654
- hronique.
- M. Wislouch 655
vel du Jardin 655

A-3825 862

ИЗВЕСТИЯ

Главного Ботанического Сада СССР.

под редакцией В. Л. КОМАРОВА.

Том XXVI

Вып. 6-й

BULLETTIN
DU

Jardin Botanique Principal de l'U.R.S.S.

sous la rédaction de V. L. KOMAROV.

Tome XXVI

Livr. 6

ЛЕНИНГРАД.

1927.

Н. В. Шипчинский.

Урмийская экспедиция.

Маршрут и краткое описание поездки в персидский Азербайджан и Курдистан летом 1916 года.

В 1916 году я был командирован Главным Ботаническим Садом в состав экспедиции Кавказского музея (теперь музея Грузии) в район Урмийского озера в Северную Персию.

По соглашению Ботанического Сада с Кавказским музеем за мое командирование Ботанический Сад должен получить первый дублетный экземпляр ботанических коллекций. В декабре 1926 года, т. е. спустя 10 лет после экспедиции, Ботаническим Садом получено лишь около двух третей договоренного, остальное же остается еще в музее Грузии в Тифлисе.

Общий отчет по экспедиции и описание района предполагалось выпустить в ближайшее время после окончания экспедиций, но по независящим обстоятельствам отчет этот не издан до сих пор и находится у начальника экспедиции А. Б. Шелковникова.

Хотя маршрут экспедиции всецело зависел от разрешения военных властей соседнего фронта, а маршрут мой, как ботаника, был нераздельно связан с маршрутом начальника экспедиции — энтомолога А. Б. Шелковникова и других ее участников зоолога Н. А. Смирнова и геолога В. В. Богачева, что сильно мешало посещению интересных в ботаническом отношении мест и не позволяло задерживаться, где того требовало дело, тем не менее удалось собрать очень богатый материал для изучения состава растительного покрова этих, почти не исследованных мест.

Исследованиями экспедиции был охвачен район, прилежащий к Урмийскому озеру на севере до Хоя $38^{\circ} 33' С. Ш.$, на востоке до вершины горы Секенд, на юге до города Мараги и южнее г. Урмии до укрепления Кала-Зева ($37^{\circ} 13' С. Ш.$), на западе до Турецко-Персидской границы и отчасти еще западнее, а именно в пределах Турции до с. Нери в верховьях р. Хеланэ (провинция Шамсдинан), впадающей в Заб-эль-ала (Верхний Заб) и, в свою очередь текущей в р. Тигр, в который и впадает верст на 35 ниже Моссула. Таким образом, весь обследованный нашей экспедицией район находится


№ 8424

п 5625

Библиотека Изв. зго
Филиаса А.Н.

в пределах персидского Азербайджана, западная же часть в пределах частью персидского, частью турецкого Курдистана.

Весь этот район сильно приподнят над поверхностью моря и в основной массе является горным, исключая ближайших окрестностей Урмийского озера. Урмийское озеро занимает дно котловины и стока не имеет, что и обуславливает его особенности, учитывая, что северная часть озера лежит под 38° с. ш. Поверхность озера находится на высоте 1330 метр. (4363 ф.) над уровнем моря. Озеро имеет продолговатую форму и вытянуто с С.-С.-З. на Ю.-Ю.-В.



Карта Урмийского района с указанием маршрутов экспедиции 1916 г.

Длина озера достигает 125 км. при средней ширине около 40 км. и максимальной около 55 км. Водная поверхность озера около 4000 кв. км. При такой значительной поверхности озеро, однако, имеет очень незначительную глубину, которая достигает лишь 4—5 метров. Причиной столь малой глубины озера, мне кажется, является то, что оно принимает в себя весьма мутные

воды многих ручьев и нескольких довольно значительных речек, из которых главными являются: р. Аджи-чай с востока, Кара-куба и Джату с юга и с запада Назлу-чай, Роуз-чай, Шехер-чай и ряд других. Благодаря этим речкам бассейн все более и более заполняется наносными отложениями и при этом озеро постепенно становится все солоней и солоней; в настоящее время соленость воды озера достигает уже 23% (в Мертвом море соленость воды 21,7%). Благодаря такому большому % солености, в озере не может жить никакая рыба и из живых существ мы здесь видим лишь большие массы своего-го лиши Урмийскому озеру ракообразного *Anemia urmiensis* и на дне озера в виде как бы клочьев какую-то водоросль, по своему характеру похожую на колонии *Nostoc*. Во время бурь, а бури на озере бывают часто и очень сильные, массы этих водорослей выбрасываются на берега и, главным образом, набиваются в более защищенные бухты, где, высыхая на берегу, спекаются в массы рогоподобной консистенции.

Острова на озере имеются лишь в средней части — это группа небольших скалистых островов, из которых главный остров Коюн-Даг, а в северной части мы имеем лишь один большой Шахский остров, который составляет целиком гора Шах-даг; издали он похож на громадную шапку. Этот остров отделен от восточного берега озера не широким, меньше версты шириной, проливом, который имеет местами столь малую глубину, что некоторые смельчаки решаются переходить его в брод, правда почти по горло в воде.

Ближайшие окрестности озера довольно мрачные и пустынные: местами берега низменные и, даже, болотистые более или менее сильно засоленные, как в низовьях р. Аджи-чая и Кара-кубы. Местами к самому берегу озера подходят горы, круто обрываюсь к воде (отроги г.г. Сяхенд, Бызоу-даги и Бей-даги). В общем окрестности озера представляют собою высокую холмистую равнину, покрытую полупустынной растительностью с мутно-бледною, светло-желтою или серовато-зеленою окраской. В окрестных горах много минеральных холодных и теплых горько-соленых, щелочных-газированных и не газированных, серных и железистых источников (около Ханаги, Мараги и Куши). Пресной воды в окрестностях озера мало или она находится очень глубоко в почве. Это вполне понятно, т. к. количество выпадающих в районе осадков весьма незначительно, а именно 547 миллиметров в год, из которых большая часть (297 милл.) приходится на период с февраля до мая, а остальные б. ч. на зиму.

В температурном отношении район характеризуется так: январская изотерма от 0° до $+5^{\circ}$ в зависимости от широты и высоты местности по вертикали, а на более высоких горах, как Сяхенд и еще меньшей величиной, не выше -5° , т. к. на вершине Сяхенда снег лежит почти круглый год, а часто даже и круглый год. Июльская изотерма района дает $+30^{\circ}$, причем зачастую в конце июля максимумы доходят до 40° и даже более. Высокие температуры лета часто связаны с сильными горячими иссушающими ветрами, при которых весь воздух наполняется мельчайшей пылью: при таких условиях путешествие становится весьма тяжелым. Земледелие в районе возможно лишь там, где есть пресная вода, которая системой арыков и киаризов

проведена в долины с гор иногда за десятки верст. Неполивные культуры возможны только кой-где в горах.

Экспедиция начала работы в Тавризе 22/IV¹⁾, я же, благодаря опозданию прибытия из Ленинграда, присоединился только 29/IV в Шериф-ханэ, это пристань и поселок на северном берегу Урмийского озера. Этот пункт и был фактическим исходным пунктом экспедиции.

Шериф-ханэ представляло в то время маленький поселок из нескольких глинобитных домиков, расположенных вблизи берега; кроме того, здесь вырос целый поселок палаток и юрт для расквартировки войск и складов военного снаряжения. Берег Урмийского озера здесь песчаный, очень мелкий и ровный с почти полным отсутствием растительности. По мере удаления от берега местность очень постепенно повышается, далее обрамлена довольно высокими холмами, за которыми вдалеке виднеются горы Мешау-даг.

1 и 2 мая нами были предприняты первые экскурсии на север в холмы. До подножья холмов идет равнина с очень пологим склоном на юг. Не далеко от подножья холмов начинает попадаться щебенка, количество которой к холмам все больше и больше увеличивается, а склоны холмов целиком состоят из щебня.

Здесь по щебнистым склонам отмечены: *Carex stenophylla* Wahl., *Spergularia marginata* (DC.) Kit., *Ceratocephalus faecatus* (L.) Pers., *Ranunculus oxyspermus* M. B., *Adonis aestivalis* L., *Fumaria parviflora* Lam., *Euphorbia Marschalliana* Boiss., *Scutellaria orientalis* L. var. *pinnatifida* Boiss., *Calamintha rotundifolia* (Pers.) Benhth., *Gallium humifusum* (W.) Staph., *Callipeltis cucullaria* Stev., *Senecio vernalis* W. K., *Centauraea depressa* M. B. и др.

Около ручейка расположено несколько домиков, а около них сад с культурой миндаля.

3 мая весь состав экспедиции на моторной лодке военного ведомства отправился через озеро на остров Коюн-даг. В озере вода настолько прозрачна, что почти везде видно дно. К вечеру мы бросили якорь в восточной бухте большого острова. Этой бухте военными властями было дано название бухты Чернозубова. Эта бухта является единственным местом острова, где можно было остановиться на несколько дней, т. к. здесь недалеко от берега имеется небольшой ключик хорошей пресной воды. Кроме того, пресная вода нами была найдена еще в одном месте в центре острова, где в небольшой пещере-ущельи она едва сочится из трещины, чуть орошая каменные стены.

4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая мы пробыли на этом острове. Остров имеет очень дикий вид и весь покрыт скалами, которые местами обрываются отвесно в озеро. Пониженные части острова сплошь покрыты щебенкой. Севернее бухты Чернозубова имеется небольшой песчаный пляж. На острове вас поражает невероятно большое количество ядовитых змей и множество скорпионов²⁾. Очень интересным

¹⁾ Все числа указаны по старому стилю, как на этикетках Гербария. В этикетках Гербария ошибочно напечатано собр. В. Шипчинский, тогда как надо Н. В. Шипчинский.

²⁾ Все собранные экспедицией зоологические и другие коллекции находятся в Тифлисе в Музее Грузии.

животным здесь является дикий баран (*Ovis urmienensis*), который является эндемичным и уцелел только на острове Коюн-даг, благодаря его трудной доступности. Баран этот чрезвычайно осторожен и замечательно ловко бегает по горам.

Древесная растительность на острове представлена чрезвычайно слабо: около бухты Чернозубова, несколько выше пресноводного ключика растет один значительной величины экземпляр *Pistacia mutica* F. et Mey. и кой где разбросаны *Rhamnus Pallasii* F. et Mey.; в центре острова в неглубоком ущельи по его дну и отчасти по северному склону растет несколько (около 10) экземпляров древовидных *Juniperus* sp., кроме того, около пресноводного ключика в бухте Чернозубова имеется небольшая заросль *Lycium*. Местами по щебнистым склонам попадаются отдельные экземпляры *Prunus (prostrata Labill.) Cotonneaster* sp. и *Atraphaxis* sp. Других древесных растений на острове нами обнаружено не было.

Несмотря на то, что пресноводный ключик дает очень небольшое количество воды, тем не менее болотная флора здесь хоть и слабо, но представлена и в воде ключа собрана *Zannichellia palustris* L. var. *genuine* Aschers.

По скалистым и щебнистым склонам мы видим типичных представителей ксерофильной флоры: *Ephedra procera* F. et Mey., *Stipa* sp., *Avena pilosa* M. B., *Melica atropatana* Schischkin, *Nardurus Woronowii* Schischkin, *Bromus Danthoniae* Trin., *B. sterilis* L., *Aegilops Tauschii* Coss., *Heteranthelium piliferum* Hochst., *Hordeum crinitum* Desf., *Carex stenophylla* Wahl., *Gagea persica* Boiss., *Iris* sp. с красивыми душистыми бархатно-лиловыми цветами, *Gladiolus illyricus* Koch. v. *anaticus* Boiss., *Parletaria judaica* L. var. *brevipetaloidea* Boiss., *Queria hispanica* Loefl., *Silene conica* L., *S. spargulifolia* (Desf.) M. B., *Ranunculus oxyspermus* M. B., *Thalictrum isopyroides* C. A. M., *Th. sultana-badense* Staph., *Hypocoum pendulum* L., *Fumaria* sp., *Aethionema cristatum* D. C., *Isatis (glaucia Auch. et Boiss.)*, *Camelina rumelica* Velen., *Umbilicus elymaiticus* Boiss. et Hausk., *Trigonella coeruleocephala* (M. B.) Nalaczy., *Astragalus camptoceras* Bge., *Geranium rotundifolium* L., *Hyperricum* sp., *Viola modesta* Fenzl., *Caucalis leptophylla* L., *Ferula ovina* Boiss., *Caccinia crassifolia* Vent., *Myosotis hispida* Schl., *Rochelia cardiosepala* Bge., *Ajuga chamaecistus* Ging., *Hymenocarpet bituminosus* F. et Mey., *Eremostachys macrophylla* Montb. et Auch., *Salvia ceratophylla* L., *S. distincta* Grossheim, *S. dracocephaloides* Boiss., *Thymus Kotschyanus* Boiss., *Galium Vaillantii* DC., *G. verticillatum* Danth., *Callipeltis cucullaria* Stev., *Filago prostrata* Parl., *Chamaemelum praecox* Vis., *Senecio orientalis* W., *Chardinia orientalis* (W.) Hayek., *Crupina vulgaris* Cass., *Garradiolus hedypnoides* (F. et Mey) Jaub. et Sp., *Tragopogon collinus* DC. и др.

На северном берегу острова, где волны озера постоянно выбрасывают песок, образовался длиной около 1/2 километра песчаный пляж, на котором в большом количестве растет *Carex divisa* Huds., образующая мощные корневища, тянувшиеся на целые метры в длину.

Каждый вечер на закате мы любовались перелетом фламingo, которые живут здесь большими стаями круглый год по мелким недоступным скалистым островам Коюн-Даг. Птица эта чрезвычайно осторожная и не подпускает к себе даже на очень большое расстояние.

10-го мая за нами пришел моторный катер и мы отправились на восток на пристань Даналу, расположенную в глубокой бухте на восточном берегу озера Урмия против острова Коюн-Даг. Бухта, в которой находится пристань Даналу, имеет форму амфитеатра, окруженного холмами с покатыми склонами, по которым кой-где разбросаны багарные пашни, правда в тот год заброшенные. По этим заброшенным пашням в массе растет *Althaea* sp. и разбросаны: *Ceratocarpus arenarius* L., *Delphinium rugulosum* Boiss., *Ceratocephalus falcatus* (L.) Pers., *Fumaria* sp., *Erodium oxyrrhynchum* M. B., *Malva* sp., *Hyoscyamus reticulatus* L., *H. pusillus* L. и др.

Склоны окружающих холмов местами покрыты щебенкой, местами скрытой под небольшим слоем почвы, а кой-где выглядывают каменистые породы. Здесь по склонам растут: *Stipa* sp., *Boissiera Pumilio* (Trin.) Hack., *Agropyrum Biopapartis* (Spr.) Bornm., *A. lasianthum* Boiss., несколько видов *Allium* sp., *Kochia* sp., *Silene Marschallii* C. A. M., *Dianthus* sp., *Adonis aestivalis* L., *Isatis* sp., *Asragalus cancellatus* Bge., *A. dictyolobus* C. A. M., *A. eriopodus* Boiss., *A. hymenostegis* Fisch., *Vicia ervilia* L., *Zygophyllum fabago* L., *Euphorbia* sp., *Scandix* sp., *Acantholimon sahendicus* Boiss. et Buhse., *Convolvulus commutatus* Boiss., *Heliotropium* sp., *Paracaryum undulatum* Boiss., *Heterocaryum Szovitsianum* (F. et Mey) DC., *Anchusa strigosa* Lab. ssp. *tonsa* Bornm.?, *Onosma Bodeanum* Boiss., *Scutellaria orientalis* L. var. *pinnatifida* Boiss., *Nepeta micrantha* Bge., *Lallemandia iberica* M. B. (*corolla coerulea*), *Asperula glomerata* (M. B.) Graeb., *Galium nigricans* Boiss., *Callipeltis cucullaria* Stev., *Valerianella* sp., *Achillea santolina* L., *Centaurea squarrosa* W., *Cripina cripinastrum* Vis., *Cnicus benedictus* L., *Koelpinia linearis* Pall. и др.

В общем, надо сказать, что хотя в видовом отношении мы здесь видим большое разнообразие, тем не менее растительный покров очень разреженный.

В Даналу мы пробыли 10, 11 и часть 12 мая, делая небольшие экскурсии по окружающим склонам.

12-го мая за нами прибыли военные двухколки и, погрузившись в них, мы направились в г. Марага. От Даналу дорога идет вверх по пологим склонам на вершину увала, а оттуда поворачивает на юго-восток и, следя по шлейфам, чередующимся с долинками и впадинами, выходит на равнину близ селения, Хедеру. Эта долина является результатом длительной работы р. Софи-чай, которая, размывая склоны г. Сяхенд, выносит здесь весь материал к озеру, отлажает его, образуя совершенно ровные, сильно засоленные луга, местами с резкими солончаками.

По пути до Хедеру, между прочим, были отмечены в цвету следующие виды: *Alopecurus agrestis* L., *Ceratocarpus arenarius* L., *Delphinium rugulorum* Boiss., *Ranunculus arvensis* L., *Thlaspi arvense* L., *Astragalus Szovitsii* F. et Mey, *Onobrychis Aucheri* Boiss., *Scutellaria orientalis* L. var. *pinnatifida* Boiss., *Lallemandia iberica* M. B., *Galium articulatum* (L.) R. et Sch., *Filago prostrata* Parl., *Anthemis collina* (Woron.) Sosnowsky var. *Intermedia* Sosnowsky и др.

Около Хурмазада дорога снова поднимается на небольшой хребтик, являющийся одним из шлейфов горы Сяхенд. Как только

мы переваливали через этот хребтик, нашим глазам сразу предстала отрадная картина: то там, то здесь виднелись небольшие поля, засеянные люцерной, а вдалеке перед нами внизу виднелись обширные сады, в которых утопает г. Марага. Уже за несколько верст при встречном ветре слышался запах дикой маслины (*Elaeagnus hortensis*).

В г. Мараге мы пробыли 13 и 14 мая, экскурсируя по его окрестностям. Город находится на расстоянии 35 килом. на восток от оз. Урмии и расположен на высоте 1618 метр. над уровнем моря. Река Софи-чай, на которой стоит Марага, выше города разбивается на массу арыков и дает возможность существовать, как в самой Мараге, так и широко по его окрестностям массе чудных садов и виноградников. Этот пункт является очень древним населенным местом и, несмотря на то, что в 1029 году Марага была разрушена сельджуками, сейчас это цветущий центр с населением более 15000 человек.

Главнейшим культурным растением в Мараге и его окрестностях является виноград, который здесь культивируется не на жердях, а на земляных валах, так как дерево здесь слишком дорогой материал. С филлоксерой здесь успешно борются путем замораживания корневой системы винограда, для этого снимают часть верхнего слоя почвы, заливают водой и замораживают зимой. Кроме винограда здесь в большом количестве разводится миндаль, черешня и вишня. Культура яблоков, груш, персиков и абрикосов в последние годы сильно упала, так как в массе появился шелкопряд и мне пришлось видеть не мало садов, где эти деревья стояли совершенно безлистными, но сплошь, как бы тюлом, опутанные паутиной.

Из окрестностей Мараги наиболее интересными являются восточные и южные предгорья, где много минеральных источников, особенно так называемых „Нарзанов“, т. е. щелочных газированных. Местечко Верави, около которого сосредоточена целая группа таких „Нарзанов“, лежит в 7 верстах на юг от Мараги и является главным центром минеральных источников. Дорога из города сначала идет среди садов, затем, по мере того, как используется вода, вдоль дорог тянутся ивы, а за ними уже начинается каменистая степь, а далее идет под'ем в предгорья.

Здесь местами на более ровных склонах идут небольшие неполивные поля, местами же круто возвышаются скалы, на которых растут: *Melica* sp., *Festuca* sp., *Parietaria judaica* L., *Queria hispanica* Loefl., *Anemone biflora* DC. v. *rosea* Bornm., *Linum mucronatum* Bert., *Convolvulus* sp., *Alkanna orientalis* (L.) Boiss., *Ajuga chamaecistus* Ging., *A. chia* (Poir.) Schreb., *Scutellaria orientalis* L. var. *pinnatifida* Boiss., *Lallemandia iberica* M. B. (*corolla coerulea*), *Stachys lavandulifolia* Vahl., *Thymus* sp., *Hyoscyamus (reticulatus* L.?), *Galium hyrcanicum* C. A. M. var. *puberulum* Trautv. и др. Древесной растительности, исключая одного экземпляра карагача, да и то в деревне, нет вовсе.

Сады, окружающие г. Марагу в ботаническом отношении представляют не малый интерес, так как здесь мы находим не мало луговых и болотных типов растений: *Equisetum* sp., *Alopecurus*

ventricosus Pers., *Glyceria plicata* Fr., *Chlorocyperus longus* (L.) Palla, *Heleocharis palustris* (L.) R. Br., *Schoenoplectus tabernaemontani* (Gmel.) Palla, *Carex diluta* M. B., *C. divisa* Huds., *C. vulpina* L., *Juncus* sp., *Orchis* sp., *Rumex* sp., *Polygonum* sp., *Ranunculus paucistamineus* Tausch., *Cardamine* sp., *Capsella Bursa pastoris* L., *Potentilla* sp., *Goebelia alopecuroides* Bge., *Trifolium (repens* L.?) *Lotus* sp., *Oxytropis* sp., *Vicia* sp., *Lathyrus* sp., тут же *Tamarix* sp., *Myosotis caespitosa* Schultz., *Veronica* sp. и др., а по берегам крупных арыков и берегу р. Софи-чай крупные экземпляры *Salix alba* L., ветви которых свешиваются к самой воде.

15 мая мы выступили из Мараги на северо-восток. Дорога шла то пологими склонами, то горными долинами, то, наконец, узкими горными тропами на крутых скалах и обрывах. На своем пути мы пересекли несколько горных речек; по мере продвижения вперед, местность становится все более изрезанная, подъемы все круче и круче. На одном из скользких трудных подъемов недалеко от сел. Карцевуль лошадь, на которой ехал наш зоолог, поскользнулась и своей тяжестью навалившись на его ногу, переломила ее. Это нас порядочно задержало: надо было вызвать помочь и отправить больного в сел. Карцевуль, где местный лекарь (знахарь) положил первую повязку.

Между Марагой и Карцевулем характер растительного покрова остается почти тот же, что и по окружающим Марагу склонам: *Orchis* sp., *Silene* sp., *Berberis* sp., *Astragalus caraganae* F. et Mey., *A. chrysotrichus* Boiss., *Onobrychis scrobiculata* Boiss., *Linum squamulosum* Rud., *Haplophyllum* sp., *Euphorbia* sp., *Echinospermum* sp., *Alkanna orientalis* (L.) Boiss., *Ajuga chamaecistus* Ging., *Stachys lavandulaefolia* Vahl., *Hyoscyamus reticulatus* L., *Linaria* sp., *Veronica* sp. и др.

16 мая мы пробыли весь день в сел. Карцевуль. Около самого селения были собраны: *Equisetum ramosissimum* Desf., *Onosma Bodeanum* Boiss., *Ajuga chia* (Poir.) Schreb., *Salvia dracocephaloides* Boiss.

17 мая мы продолжали свой путь, поднимаясь все выше и выше на г. Сяхенд. Путь шел горными плато и не очень крутыми склонами. По мере подъема на гору характер растительного покрова меняется очень постепенно, почти незаметно. Здесь по склонам растут: *Carex stenophylla* Wahl., *Allium* sp., *Bellevalia* sp., *Rumex* sp., *Silene* sp., *Astragalus talyschensis* Bge., *Geranium* sp., *Euphorbia botriosperma* Boiss., *Mattia lanata* (Lam.) Schult. var. *stenophylla* Bornm., *Gymnandra stolonifera* C. Koch., *Senecio* sp., *Psephellus* sp. и др., а в воде старицы горного ручья найден *Ranunculus paucistamineus* Tausch., частью на более или менее ровных плато попадались целые поля больших, невероятно колючих подушек *Acantholimon* sp. и *Astragalus* sp.

В этот день к вечеру мы дошли до Эшмэ. Отсюда отчетливо были видны снежные пятна у вершины Сяхенда в ложбинах, а кругом нас расстилались довольно бедные, об'еденные скотом альпийские луга.

Весь день стояла жаркая погода и, благодаря длинному переезду по горам, мы сильно устали, а поэтому поспешили лечь спать в отведенном нам пастушьем шатре. Однако, ночью то и дело мы просы-

пались, так как со стороны снежных пятен тянул очень холодный ветерок, или, вернее, ток воздуха, который не давал нам возможности согреться.

Утром 18 мая мы встали перед восходом солнца, умылись ледяной водой в ручье и отправились пешком к вершине г. Сяхенд. Под'ем на вершину с южной стороны довольно крутой, местами покрытый щебенкой, местами же довольно крупными каменными глыбами осыпей. Уже издали на склоне виднелось какое то красноватое пятно. По мере приближения к нему, оно становилось все ярче и ярче. Когда мне, наконец, после долгой борьбы с каменными глыбами, удалось приблизиться к нему, то моим глазам представилась чудная заросль, целая поляна среди щебенки и камней, цветущих, пышно развитых *Fritillaria imperialis*, окаймленная широкой и не густой зарослью *Ferula?* sp. На отмирающих корнях прошлогодних *Ferula* расли какие то белого цвета шляпочные (*Basidiomycetes*) грибы, которые нами были собраны и испробованы в пищу в жареном виде. Они оказались съедобными довольно вкусными, но и довольно-таки жесткими.

Снег у вершины Сяхенда (3500 м. н. у. м.) лежал большими полями по ложбинам, но вершина горы была свободна от снега и лишь кой где по седловинам оставались отдельные пятна его. У краев снежных полей почва была совершенно мокрая и здесь в громадном количестве расли: *Gagea confusa* Tengg., *Fritillaria racemosa* Ker.-Gawl.; *Muscaria pycnanthum* C. Koch., *Ranunculus Kochii* Ledeb., *R. Kotschy* Boiss., *Viola Kitaibeliana* R. et Sch. var. *Schelkownikovii* Schischkin, *Myosotis alpestris* Schmidt и некоторые другие, при чем луковичные во многих местах пробивали своими соцветиями снежную корку и цвели над снегом.

Несколько ниже, или, вернее, чуть поотдала на альпийских лугах: *Phleum* sp., *Alopecurus Aucheri* Boiss., *Poa* sp., *Carex aterrima* Hoppe, *C. nutans* Host., *Ranunculus oreophilus* M. B., *R. sahendicus* Boiss. et Buhsé, *Fumaria* sp., *Cardamine* sp., *Astragalus declinatus* W., *Onobrychis cornuta* (L.) Desv., *Geranium tuberosum* L. var. *macrostylum* Boiss., *Euphorbia iberica* Boiss., *Solenanthus sahendicus* Schischkin, *Nonnea pulla* (L.) DC., *Veronica* sp., *Plantago* sp., *Psephellus* sp. и др., а рядом в мочажине *Veronica beccabunga* L.

19 мая мы новой дорогой, несколько западнее прежней, вернулись в сел. Карцевуль, где нас ожидал наш больной зоолог. С вечера мы все приготовили для перевозки больного в спокойных носилках из двух длинных жердей с прикрепленным между ними ковром. Эти носилки передними концами были привязаны к одному ишаку, а задними концами к другому ишаку. В таких носилках больной не чувствовал никаких толчков и тряски и его сломанная нога была гарантирована от беспокойства.

20 мая все мы двинулись в обратный путь в г. Марагу, придерживаясь приблизительно той же дороги, по которой мы шли вперед.

Приблизительно в середине пути нас застал порядочный холодный дождь, который продолжался более часа. Когда дождь окончился и горизонт прояснился, мы невольно обратили свой взор назад на

вершину Сяхенда, чтобы полюбоваться ею на прощанье. Но каково было наше удивление, когда нашим глазам представилась совершенно неожиданная картина: вся вершина горы и склоны ее почти до половины были одеты белой шапкой; значит в то время, когда нас мочил дождь с ветром, там на горе бушевали мятели. Таким образом, наше восхождение на Сяхенд было чрезвычайно удачным: мы побывали там в тот момент, когда там, вероятно, был полный расцвет флоры в этом году.

В Марагу мы прибыли совершенно благополучно и пробыли там 21 и 22 мая, отдавая официальные визиты местным властям и делая небольшие экскурсии в окрестности. Здесь были собраны: *Holoschoenus australis* (L.) Rchb., *Eremurus spectabilis* M. B.?), *Gladiolus illyricus* Haeb. var. *anatolicus* Boiss., *Dianthus orientalis* Ym., *Delphinium orientalis* J. Gay., *Cerasus microcarpa* (C. A. M.) Boiss., *Eremostachys laciniata* (L.) Bge., *Salvia acetabulosa* Vahl., *S. dracocephaloidea* Boiss., *Orobanche anatolica* Boiss. et Reut., *Gundelia Tournefortii* L. и др.

23 мая из Мараги мы старой дорогой вернулись на пристань Даналу, где в ожидании моторного катера (так как вокруг южной части озера сухим путем военные власти нас не пустили), нам пришлось пробыть 24, 25, 26 и часть 27 мая. За эти дни ожиданий мы экскурсировали по окружающим щебнистым склонам и каменистым холмам, где нашли много интересных растений: *Melica atropatana* Schischkin, *Boissiera pumilio* (Trin.) Hack., *Polygonum thymiflorum* Jaub. et Sp., *Buffonia oliveriana* Ser., *Silene conoidea* L., *Acanthophyllum crassifolium* Boiss., *Delphinium persicum* Boiss., *Ranunculus arvensis* L., *Glaucium grandiflorum* Boiss. et Hoh., *Papaver elegans* Schischkin, *Crambe juncea* M. B., *Erysimum crassipes* C. A. M., *Cleome ornithopodioides* L. var. *stipitata* Boiss., *Astragalus chrysotrichus* Boiss., *A. dictyolobus* C. A. M., *A. latifolius* Lam., *A. Stevenianus* DC., *Onobrychis scrobiculata* Boiss., *Haplophyllum acutifolium* (DC.) Don., *Bupleurum commutatum* Boiss. et Bal., *Johrenia Candolii* Boiss., *Acantholimon sahendicus* Boiss. et Buhs., *Ferula ovina* Boiss., *Teucrium polium* L., *Lallemandia iberica* M. B., *Stachys Kotschyana* Boiss., *Salvia limbata* C. A. M., *Thymus Kotschyana* Boiss., *Celsia Suworowiana* C. Koch., *Crucianella exasperata* F. et Mey., *Asperula trichodes* J. Gay, *Rubia pauciflora* Boiss., *Valerianella* sp., *Scabiosa calocephala* Boiss., *S. Olivierii* Coul., *S. setulosa* F. et Mey., *Pyrerhrum chiliophyllum* F. et Mey., *Xeranthemum squarrosum* Boiss., *Chardinia orientalis* (W.) Hayne, *Crepis pulchella* L., *C. Bureniana* Boiss. и мн. др.

23 мая из Даналу мы сделали на автомобиле экскурсию в сел. Эреуш (Эруш), где в засоленной долине близ селения Эреуш отмечена целая заросль *Halimodendron argenteum* D. C.

27 мая за нами пришел моторный катер и мы направились сначала на север к нашей базе в Шериф-ханэ, чтобы обновить запасы снаряжения. С середины пути на озере начала нас бить сильная волна. К вечеру буря на столько усилилась, что волны перекатывались через палубу. К пристани в Шериф-ханэ подойти не было никакой возможности, тем более, что уже начинало темнеть, и мы бросили якорь верстах в 2-х от берега. Каюты моторного катера вместить всех нас не могли, и некоторым из нас, в том числе и мне,

пришлось ночевать на палубе. Ночь была очень неприятной, так как то и дело через палубу перекатывались волны и всего обливало соленой водой, которая пропитывала все платье, попадала в рот, нос и глаза. На утро буря стихла и мы обсохли, но все на нас было пропитано солью, все жесткое как картон, все тело покрыто коркой соли.

Высадившись на берег, мы скоро все привели в порядок, переснарядились на нашей базе, снова погрузились на моторный катер и отправились на юг, на пристань Гюльман-ханэ, которая является, как бы портом города Урмии.

В Гюльман-ханэ мы прибыли в тот же день, т. е. 28 мая. Бухта, где находится небольшая деревянная пристань, глубокая; защищена довольно хорошо от ветров с трех сторон и открыта лишь с юго-востока. На берегу близ пристани стоит лишь один дом. Берега скалистые, круто падающие в озеро. По южным каменистым склонам скал растут: *Ceterach officinarum* Willd., *Cheilanthes pteridoides* (Reich.) C. Chr., *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers., *Melica* sp., *Carex diluta* M. B., *Velezia rigida* L., *Linnum* sp., *Teucrium orientale* L., *Crucianella ghilanica* Trin., *Helichrysum arenarium* (L.) DC. var. *roseum* Trautv., *H. leucocephalum* Boiss.? и др.

29 мая мы передвинулись в Урмию, которая и явилась базой второй части нашего путешествия. Дорога от Гюльман-ханэ до Урмии шла все время то степными, то каменистыми увалами, местами крутыми, местами пологими, но в общем очень однотонными.

Подъезжая к г. Урмии с востока, попадаешь сначала в полосу древних кладбищ, тянувшихся по обе стороны дороги. Почти весь город окружен высокими стенами с башнями и массивными воротами. До настоящего времени здесь чувствуется настоящее средневековье: при закате солнца, как только мулла с минарета произнесет призыв к вечерней молитве, раздаются на башнях городских стен трубные звуки и ворота города в этот момент запираются. Никто после этого до восхода солнца попасть в город не может.

Город Урмия является одним из очень древних населенных пунктов: он уже известен во времена Ассирио-Вавилонии и по предположениям был родиной Заратустры (Зороастра). До настоящего времени в северной части города сохранилась очень древняя круглая башня, на внутренних стенах которой имеются символические знаки огнепоклонников. Затем у северо-восточной окраины города имеется так называемый Зороастрейский холм, который занимает площадь в несколько гектаров и имеет, судя по оставшимся столбам грунта, метров 20 или даже более высоты. Весь этот холм состоит целиком из жилищных остатков, накопленных тысячелетиями. В нем слоями в большом количестве встречается древняя керамика с черной и бурой поливой, целые прослойки обуглившейся пшеницы, кости млекопитающих и хищников, а также и человека. Сейчас население эти тысячелетние накопления разрабатывает и разрабатывает уже очень давно для добычи селитры. В небольшом расстоянии от этого холма имеются и еще подобные же, но меньших размеров.

Почти по всему городу Урмия идут арыки, которые местами размывают почву и глубже обнаруживают опять какую-то древнюю подземную оросительную систему из обожженых глиняных труб и камней (то же пришлось наблюдать и в г. Мараге). Вообще город Урмия и его окрестности, да и вообще весь район, в археологическом отношении должен быть в высшей степени интересным. Около города Мараги по указанию местного губернатора есть даже древние циклические постройки в горах, но нам побывать там не удалось).

30, 31 мая и 1 июня мы подготовлялись к экскурсиям в Курдистан на границу с Турцией и в то же время экскурсировали в окрестностях г. Урмии.

В долине р. Бердесур, в той части, где река подходит с юго-запада к г. Урмии, расстилаются небольшие луга, на которых наравне с формами чисто луговыми растут и элементы степи и болот; *Phleum* sp., *Calamagrostis* sp., *Phragmites* sp., *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla, *Carex* sp.; *Juncus bufonius* L., *Gypsophila* sp., *Nigella segetalis* MB., *Ranunculus arvensis* L., *Potentilla* sp., *Sanguisorba* sp., *Oxytropis* sp., *Convolvulus lineatus* L., *Dactylis glomerata* L., *Bromus scoparius* L., *Ballota nigra* L., *Paronychia kurdica* Boiss. (на отмели), *Herniaria glabra* L., *Onobrychis sativa* Lam. (на отмели), *Verbena officinalis* L. (отмель). *Celsia heterophylla* Desf. (отмель), а здесь же в лужах, оставшихся после половодья *Lemna gibba* L.

31 мая мы предприняли экскурсию к устью р. Роузечай. Сначала проехали сады, затем поля, далее арыки, обсаженные ивами, наконец солонцеватые луга. До устья реки мы не доехали верст 5, т. к. остановились в очень интересном месте, где река образовала старицу и вода в старице еще не осолонилась. В воде этой старицы расли: *Potamogeton pectinatus* L., *P. fluitans* Roth., *P. crispus* L., *Alisma* sp., *Acorus calamus* L., *Myriophyllum* sp. и др., а по берегу, слегка засоленному. *Beckmannia eruciformis* (L.) Host., *Atropis* sp., *Scirpus maritimus* L., *Heleocharis palustris* (L.) R. Br., *Carex divisa* Huds., *Juncus* sp., *Vicia* sp., *Glaux maritima* L., *Convolvulus arvensis* L., и др.

На обратном пути мы проехали по отдыхающим багарным полям, где расли: *Aegilops* sp., *Chenopodium vulvaria* L., *Stellaria* sp., *Delphinium* sp., *Astragalus* sp., *Peganum harmala* L., *Malva mauritiana* L. и др.

Далее мы проехали каменистые склоны отрогов горы Бызудаги, где расли: *Stipa* sp., *Allium* sp., *Bellevalia* sp., *Hypericum* sp., *Acantholimon Schelkovnikowi* Palibin, *Marrubium parviflorum* F. et Mey., *Orobanche cumana* Wallr., *Orobanche* sp. in *Artemisia*, *Artemisia* sp. и др. ксерофильные формы.

2 июня через магал Тергевер мы направились в магал Барадост. От города Урмии путь шел через сел. Семир-абад, небольшой горный хребтик с небольшим под'емом и пологим спуском, сел. Бадаги, далее через р. Роуз-чай около сел. Киллю, затем на р. Назлу-чай у сел. Измайл-ага, вверх по р. Назлу-чай и ее левому притоку через сел. Хошехан до сел. Ичке-су.

В окрестностях сел. Ичке-су по каменистым склонам, которые уже сильно приподняты над Урмийским озером, начинают появляться

кой- какие деревянистые породы: *Pirus (salicifolia?)*, *Crataegus* sp., *Rosa* sp., *Tamarix* sp., но только одиночными экземплярами, а под ними по склонам: *Allium* sp., *Melandryum* sp., *Sisymbrium* sp., *Astragalus comosus* Bge., *Haplophyllum Buxbaumii* (Poir.) Buxb., *Gentiana Oliwieri* Grisb., *Onosma bulbotrichum* DC., *Cerinthe minor* L. var. *maculata* (MB.) Vis., *Eremostachys laciniata* (L.) Bge., *Stachys* sp., *Salvia aristata* Auch., *S. dracocephaloides* Boiss., *S. suffruticosa* Montb., *Linaria grandiflora* Desf., *Carduus uncinatus* MB. и др. По мере под'ема в горы растительный покров становится все более и более богатым по видовому составу. По берегам речек и около селений попадаются *Salix angustifolia* Willd., *S. australis*, *Ulmus campestris* L., а по склонам: *Bromus japonicus* Thub., *Agropyrum caespitosum* C. Koch., *Allium* sp., *Ornithogulum narbonense* L., *Ranunculus oxyspermus* MB., *Thalictrum minus* L., *Adonis aestivalis* L., *Papaver pseudo-orientale* (Fedde) Medv., *Fibigia suffruticosa* (Vent.) Boiss., *Goebelia alopecuroides* Bge., *Astragalus collinus* Boiss.?, *A. vegetus* Bge., *Onobrychis sativa* Lam., *O. subnitens* Bornm., *Chaerophyllum bulbosum* L., *Onosma sericeum* Willd., *Ajuga chia* (Poir.) Schreb., *Scutellaria orientalis* L. var. *pinnatifida* Boiss., *Lallemantia iberica* MB., *Salvia orientalis* Mill., *S. silvestris* L., *S. suffruticosa* Montb. et Auch., *Orobanche* sp., *Galium verum* L. s. l., *Achillea nobilis* L. var. *ochroleuca* (Ehrh.) Boiss., *Centaurea pseudoscabiosa* Boiss. et Bech.

Из приведенного списка видно, что здесь к обычным ксерофитам, которые встречались в низменной части, все больше и больше начинают примешиваться представители более влаголюбивые.

3 июня мы направились горными склонами сначала на запад, а потом на юг через перевал высотой в 1750 м. выше уровня моря вышли в бассейн р. Барадоста. Здесь местность приобретает уже вполне горный характер: со всех сторон идут гребни гор и над ними южнее высится вершины, на которых кой-где виднеются в ложинах небольшие пятна снега. Продвигаясь на запад, мы к вечеру достигли селения Нейчалан.

4 июня наш путь шел на юг через селения Кереван, Бордамула, Накси, около горы Зардя, сел. Фосан до сел. Арзин. На этом пути вас поражает большое количество крупных сухопутных черепах. Растительный покров здесь меняется мало и мы встречаем опять почти все тех же представителей, которые были и раньше, но с примесью элементов более высоких гор: *Muscari longipes* Boiss., *Gladiolus illyricus* Haeb. var. *anatolicus* Boiss., *Orchis* sp., *Salix angustifolia* W., *Acanthophyllum Fontanesii* Boiss., *Amygdalus Kotschy* Boiss. et Hoh., *Astragalus seidabadiensis* Bge., *Onosma* sp., *Nepeta Nawaschini* Bordz., *Salvia macrochlamys* Boiss. и др.

5 июня мы предприняли экскурсию на гору Ситавер (Ситтоу), которая возвышается на пограничном с Турцией хребте. Под'ем на эту гору чрезвычайно крут, местами щебнистый, местами скалистый. В одном месте пришлось пересечь уже недалеко от вершины небольшое снежное поле, при чем местами снег имел яркую розовую окраску, повидимому это зависело от *Sphaerella nivalis*. С вершины горы (не менее 2100 м. выше уровня моря) открылся чрезвычайно широкий вид, особенно в сторону Мессула. В этом направлении очень далеко

была видна громадная горная группа с многочисленными конусообразными вершинами и обширными снежными полями, ярко блестевшими на солнце. Повидимому это горная группа у вершины Сары-Сати (Сат-даг) или южнее, не значащаяся на картах. В этой горной группе видимо имеются большие фирновые поля и глетчеры.

На гору Ситавер мы сделали 2 экскурсии. Близ вершины расли здесь следующие растения: *Equisetum* sp., *Bromus* sp., *Gagea anisanthos* C. Koch., *Allium akaka* Gmel., *Fritillaria racemosa* Ker.-Gaul., *Ornithogalum* sp., *Rheum ribes* L., *Minuartia lineata* C. A. M., *Silene* sp., *Ranunculus Kochii* Ledeb., *Aethionema grandiflorum* Boiss. et Hoh., *Draba bruniaefolia* Stev., *D. polytricha* Ledeb., *Alyssum* sp., *Anchonium elichrysifolium* Boiss., *Umbilicus persicus* Boiss., *Sanguisorba* sp., *Alchimilla acutiloba* Stev. (coll.), *Amygdalus Kotschy* Boiss. et Hoh., *Astragalus macrourus* F. et Mey., *A. rigidus* Boiss. et Bal., *Oxytropis Kotschyana* Boiss. et Hoh., *Lathyrus* sp. (?), *Euphorbia* sp., *Prangos ferulacea* (L.) Lindl., *Cachrys subglobosa* Schischkin, *Primula* sp., *Myosotis (alpestris)* Schmidt?, *Onosma* sp., *Scutellaria orientalis* L., var. *pinnatifida* Boiss., *Eremostachys laciniata* (L.) Bge., *Salvia sclarea* L., *S. xanthocheilla* Boiss., *Veronica* sp., *Orobanche lutea* Baumg., *Achillea vermicularis* Trin. и др. Древесных пород здесь найдено не было.

6 июня мы отправились на юг в селение Мавана. Здесь по пути по склонам попадались разбросанные экземпляры *Pirus (salicifolia?)*, *Pirus (eleagnifolia?)* и *Crateagus pectinata* C. A. M., а из травянистой растительности: *Bellevalia* sp., *Silene* sp., *Aethionema cristatum* DC., *Sedum album* L., *Rubus* sp., *Onobrychis subnitens* Bornm., *Anchusa italicica* Retz., *Salvia aristata* Auch., *S. macrochlamys* Boiss., *Asperula arvensis* L., *Valerianella* sp., *Scabiosa macrochaete* Boiss. et Haussk. и др.

От Мавана через сел. Шейбаны, Кауш и далее на восток, мы в тот же день вернулись в город Урмию.

7 июня мы пробыли в Урмии.

8 июня из г. Урмии мы направились вверх по р. Бердесур через сел. Херра далее на юг до сел. Негри (Негри). Дорога шла большей частью пологими степными и каменистыми склонами.

9 июня мы шли далее на юг по очень ровной степной долине через сел. Разга, Гаран, Букеран, Хишмава до сел. Гирдык, которое расположено у подножья круто поднимающегося пограничного с Турцией хребта с высоким в этом месте перевалом Зини-Гядук (2046 м. выше уровня моря). Гребни гор поднимаются здесь до 3000 м. и более.

В этот день мы должны были пройти перевал, спуститься в долину речки Хеланэ-чай (Хиланэ-чай) в пределах турецкой провинции Шамсикан и достигнуть сел. Негри (Нехри) и Бенарве, где была стоянка саперных частей фронта.

Дорога на перевал Зини-Гядук была разработана военными властями для колесного движения, а поэтому для прохода не представляла трудностей. Сначала под'ем идет по правой стороне ущелья, а затем переходит то на левую, то на правую его сторону и то змейкой, то петлями поднимается все выше и выше. Местность очень дикая: везде обрывы, скалы, осыпи и щебнистые склоны. Древесной

растительности никакой. На вершине перевала в глубоких ущельях и ложбинах еще лежит снег. В начале спуска на запад (т. е. в Турцию) горный ручей Хеланэ-чай, который был у нас с левой стороны, склоняющей массой низвергается по страшным быстрикам в ущелье и прорывается под очень высокий и широкий снежный мостом. Спуск с перевала верст на 10 остается все таким же диким и картины растительного покрова остаются все такие же. От начала под'ема на перевал и почти до поста Хиланэ встречаются: *Lolium rigidum* Gaud., *Carex nutans* Host., *C. stenophylla* Wahl., *Allium vineale* L., *Tulipa* sp., *Ornithogalum persicum* Stapf.?, *Muscaris longipes* Boiss., *Gladiolus* sp., *Bellevalia* sp., *Thesium asperulum* Boiss. et Buhle, *Minuartia lineata* C. A. M., *M. longisepala* Schischkin, *Silene commelinifolia* Boiss., *Caltha polypetala* (Host.) Boiss., *Delphinium hybridum* W. var. *laxiusculum* Boiss., *Ranunculus Kotschy* Boiss., *Papaver persicum* Lindl., *Aethionema grandiflorum* Boiss. et Hoh., *Sedum acutifolium* C. A. M., *Umbilicus persicus* Boiss., *Astragalus* sp., *Linum catharticum* L., *Polygonum anatolicum* Boiss. et Chod., *Bunium caroides* (Boiss.) Bornm., *Globularia trichosantha* F. et Mey., *Centranthus longiflorus* Stev., *Campanula involucrata* Auch., *C. Stevenii* M. B., *Inula cordata* Boiss., *I. Oculus Christi* L., *Senecio taraxacifolius* (M. B.) D. C., *Cephalorrhynchus hispidus* (M. B.) Boiss. и др., а по щебнистому склону близ самого перевала целая заросль *Rheum ribes* L.

Немного ниже поста Хиланэ картина растительности резко меняется: сначала попадаются то там, то здесь отдельные кусты *Ficus carica* L. var. *rupestris* Haussk, кой где по обрывам *Vitis vinifera* L., а по берегам р. Хеланэ-чай *Salix alba* L. Потом же сначала у самого берега реки, а затем и по склонам узкой долины, почти ущелья, все в большем и большем количестве начинают встречаться *Juglans regia* L., *Quercus Boissieri* Raut., *Q. Libani* Oliv., вечно-зеленый *Q. rigida* Lindl., *Rosa dumetorum* Thui., *Prunus* sp., *Sorbus* sp., *Celtis* sp., *Cornus australis* C. A. M., *Syringa* sp., *Fraxinus syriaca* Boiss., деревья дальше становятся все более и более крупными и мы едем уже по чудному, хотя и не крупному, лесу. По дороге к вечеру то и дело пробегают крабы, которых сильно пугаются лошади. Говорят, что здесь уже начинают попадаться даже хамелеоны.

Переход этого дня, благодаря неточности карт, сильно затянулся и к назенненному месту (Бенарве), мы дойти не могли. Последние версты мы шли ночью в полной темноте по каким то горным карнизам. Опасность ночного перехода усугублялась еще тем, что в этом районе сильно пошливали курды, которые с успехом нападали даже на крупные (до 1 сотни) отряды казаков. Верстах в 2 от лагеря Бенарве нас остановил военный пикет и приказали нам ночевать около них, так как с наступлением темноты пропуск был закрыт. Мы остановились на ночевку около пикета, но спали весьма тревожно, так как невдалеке от нас мяжал барс или тигр и его голос в ночной тишине жутко разносился по ущелью.

На утро 10 июня мы перешли в Бенарве, где был расположен саперный лагерь и полевой лазарет. Здесь мы пробыли 10 и 11 июня. Бенарве расположено в небольшом расширении горной долины и поэтому очень живописно. Здесь много древесной растительности (*Salix*), которая дает впечатление тенистого парка.

Флора окрестностей Бенарве сильно отличается от той, которая была по восточную сторону перевала Зини-Гядук в Персии. Здесь к ксерофильным типам примешивается большое количество мезофитов. В тени деревьев, на прогалинах и отчасти открытых местах мы здесь находим: *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh., *Equisetum arvense* L., *Hordeum fragile* Boiss., *Scirpus australis* L., *Gladiolus Kotschyanus* Boiss., *Rumex* sp., *Atraphaxis* sp., *Agrostemma githago* L., *Silene chlorifolia* Sm. f. *macrocalyx* Bornm., *S. comutata* Guss., *Dianthus asperulus* Boiss. et Haussk., *D. Libanotis* Ledeb., *Papaver pseudoorientale* (Fedde) Medw., *Aethionema membranaceum* DC., *Aubrieta Kotschyi* Boiss., var. *brachycarpa* Bornm., *Umbilicus persicus* Boiss., *Cotoneaster* sp., *Rubus* sp., *Potentilla* sp., *Geum urbanum* L., *Alchimilla acutiloba* Stev. ssp. *pontica* Buser., *Agrimonia (eupatoria) L?*, *Rosa* sp., *Melilotus officinalis* Dsf., *Lotus* sp., *Trifolium* sp., *Glycyrrhiza glandulifera* W. K., *Euphorbia denticulata* Lam., *Hypericum scabrum* L., *Viola* sp., *Prangos ferulacea* (L.) Lindl. var. *scabridula* Boiss., *Heracleum persicum* Desf., *Erythraea* sp., *Paracaryum cristatum* Boiss., *Anchusa italicica* Retz., *Nonnea anchusoides* Boiss. et Buhs., *Onosma* sp., *Rochelia* sp., *Nepeta Nawaschini* Bordz., *Lallemandia peltata* (L.) F. et Mey., *Brunella vulgaris* L., *Salvia verticillata* L., *S. xeranthocheila* Boiss., *Calamintha vulgaris* (L.), *Mentha spicata* Huds., *Verbascum* sp., *Linaria pyramidata* (Lam.) Spr., *Scrophularia kurdica* Schischkin. *Veronica* sp., *Asperula Haussknechtii* Boiss. var. *obscura* Grossh., *Galium lejophyllum* Boiss., *Bryonia dioica* Jacq., *Campanula glomerata* L. var. *cervicarioides* D. C., *C. propinqua* F. et Mey., *Erigeron orientale* Boiss., *Filago arvensis* L., *Achillea filipendulina* Lam., *Chamaemelum disciforme* (C. A. M.) Vis., *Scorzonera* sp., *Hieracium* sp. и др.

12 июня прежним путем мы двинулись в обратный путь. Переочевали в Хёланэ.

13 июня прошли перевал Зини-Гядук и прибыли в Гирдык.

14 июня через Нерги (Негри) и Херра к вечеру прибыли в город Урмии.

Пересекая реку Баандуз-чай, мы посетили интересный луг, на котором расли: *Chlorocyperus longus* (L.) Palla, *Bulboschoenus maritimus* (L.) Palla, *Lepidium latifolium* L. f. *glaberrima* Busch., *Filipendula ulmaria* Max. var. *denudata* Max., *Astragalus strictifolius* Boiss., *Epilobium hirsutum* L. var. *tomentosum* Boiss., *E. parviflorum* Schreb., *Chaerophyllum macropodium* Boiss., *Erythraea centaurium* Pers., *Scutellaria galericulata* L. и др.

15 и 16 июня пробыли в г. Урмии, привели в порядок собранные коллекции и 17 июня двинулись на север через Гердабад до Кярим-абада (Керим-абада). Дорога шла сначала между садов Урмии, потом сады сменились плантациями табака, полями и другими угодьями. По обе стороны дороги шли обсаженные ивами арыки, пройдя которые мы начали подниматься по пологому склону. Через р. Назлу-чай мы переезжаем по древнему кирпичному мосту с красивым сводом (тип Тамерлановских мостов). Далее дорога идет то по степной равнине, то по щебнистым увалам. Местами попадаются уже сжатые пшеничные поля (багарные).

Около Керим-абада по щебнистым склонам попадаются: *Ficus carica* L., *Delphinium persicum* Boiss., *Althaea flavescens* Boiss. et Buhse var. *tabrissiana* (Boiss. et Buh.) Iljin, *Onosma microcarpum* Stev. var. *Stapfii* (West.) Bornm., *Echinops kurdica* Boiss. et Haussk. и др.

По засоленным местам: *Alhagi camelorum* Fisch., *Aeluropus litoralis* Parl. var. *dasyphyllus* Trautv., *Scirpus Tabaernae montani* Gmel., *Frankenia hirsuta* L. var. *hispida* DC. и др.

18 июня мы проезжаем мимо сел. Каиза, Гяулана и останавливаемся в сел. Куши. Здесь по дороге нам попалось несколько очень длинных киаризов (подземных искусственных водотоков), идущих с гор, расположенных на западе. Не далеко от Куши мы встретили два ключа, которые расположены один от другого на расстоянии всего $1\frac{1}{2}$ — 2 метров, на одинаковой высоте на равнине, но совершенно различных между собою свойств: оба представляют собою совершенно круглые отверстия в почве, диаметром около $\frac{3}{4}$ метра, до краев наполнены водой, которая едва переливается, утекая на восток к озеру Урмия. В одном ключе вода была слегка щелочная, тогда как в другом резко-горько-соленая типа слабительной воды Франца Иосифа (в чем мы убедились по личному опыту на себе и на лошадях).

Около сел. Куши (вернее это не селение, а постоянный двор, состоящий из одного большого квадратного двора, обнесенного высокой глинобитной стеной с башнями на углах; жилые помещения тянутся вдоль внутренних сторон стен и составляют с ними одно целое) на дневную поверхность выходят воды одного киариза и, орошая местность, образуют небольшой лужок с сочной травой.

19 июня от Куши мы начали подниматься на южный склон хребта Бейдагы к перевалу Вергевиз. Под'ем на этот не очень высокий перевал довольно живописный, идет извилистой лентой по склонам. У вершины перевала попадаются кой-какие кустарники. Спуск с перевала по северному склону хребта очень живописный, местами очень крутой и узкий настолько, что раз'ехаться со встречными довольно трудно.

В этот день мы доехали до с. Хантахты.

20 июня вся экспедиция направилась дальше к северу на город Хой, я же со всеми коллекциями на пристань Хантахты (Евгеньевскую) которая расположена в очень укромной бухте на восточном берегу полуострова, образованного отрогами гор Бейдагы. Вечером я погрузился на моторный катер и переехал со всем грузом в нашу базу Шериф-ханэ.

В Шериф-ханэ я пробыл с 21 по 24 июня. В это время прибыли и остальные члены экспедиции, которые посетили интересные места между Урмийским озером и городом Хой, а также остров Фламинго на Урмийском озере.

24 июня мы погрузились со всем снаряжением и весьма солидными коллекциями (ботаническими, геологическими, энтомологическими и зоологическими) в предоставленный для нас вагон и двинулись в обратный путь в Тифлис через Софиан, Маранди и Джульфу.

Последние дни работы экспедиции, а именно с того дня, как мы выехали из г. Урмии на север, началась очень жаркая погода:

с сильными ветрами, которые поднимали массу пыли. Степи выгорели и работа становилась очень тяжелой. В июле месяце работа была бы возможной только в горах, но в виду иссякновения средств нам пришлось закончить свою работу, сделав за все время около 1000 верст полезного пути, большую частью верхом или пешком.

Большим недостатком экспедиции было то, что зачастую делались слишком длительные переходы и слишком длинные в день экскурсии, а потому очень мало времени оставалось на перекладку растений, благодаря чему растения медленно сохли и занимали весь запас бумаги. Если бы сушка производилась в сунке, то за время нашей экспедиции можно было собрать минимум в 2 раза более растений. Всего нами было собрано около 1000 номеров растений.

В 1917 году комиссия по изучению производительных сил СССР (КЕПС) пригласила меня организовать в этом же приблизительно районе самостоятельную ботаническую экспедицию, но разыгравшиеся вскоре политические события остановили все начинания подобного рода и экспедиция, обещавшая так много интересного, состояться не могла. Теперь, когда хозяйство нашей страны окрепло, пора было бы подумать о возможности осуществления поездки в этот район Персии, как с целью сбора чисто ботанических коллекций, так и прикладных сельско-хозяйственных.

N. W. Schipczinsky.

Expedition nach Urmia.

Marschroute und kurze Beschreibung der Reise nach Aserbeidjan und Kurdistan (Persien).

Resumé.

Verfasser wurde, im Jahre 1916, vom Botanischen Hauptgarten nach Nordwesten Persiens, in den Bereich des Urmia-sees, abkommandiert um, als Botaniker, an den Arbeiten der, vom Kaukasischen Museum organisierten Expedition teilzunehmen. Die Arbeit enthält eine kurze Beschreibung der von der Expedition gefolgten Marschroute und eine Reihe von in dieser Gegend gefundenen Pflanzenarten. Im ganzen wurden ungefähr 1000 №№ von Pflanzen, von denen viele neue Arten, gesammelt. Dieselben sind teilweise im Text angegeben.

Zunächst wurden, im Zwischenraum vom 22 April bis 30 April, Pflanzen in den Umgebungen von der Stadt Tabris gesammelt. Ferner war die von der Expedition gefolgte Marschroute die folgende:

- 1 und 2 Mai — Umgebungen von Scherif-Khane.
- 3 Mai — von Scherif-Khane nach der Insel Kujun-Dagh.
- 4 — 9 Mai — Insel Kujun-Dagh.

- 10 und 11 Mai — Danalu.
- 12 Mai — von Danalu bis zur Stadt Maraga.
- 13 und 14 Mai — Stadt Maraga und Ausflüge in deren Umgebungen.
- 15 Mai — von Maraga nach Kartevül.
- 16 Mai — Kartevül.
- 17 Mai — von Kartevül nach Eschme.
- 18 Mai — Ersteigung des Gipfels Sahend.
- 19 Mai — von Sahend bis Kartevül.
- 20 Mai — Rückfahrt von Kartevül nach der Stadt Maraga.
- 21 und 22 Mai — Stadt Maraga und Ausflüge in deren Umgebungen.
23. Mai — von Maraga nach Danalu.
- 24, 25, 26 und ein Teil des 27 Mai — Exkursionen in den Umgebungen von Danalu.
- 27 Mai — Seeüberfahrt von Danalu zurück nach Scherif-Khane.
- 28 Mai — von Scherif-Khane nach Hülman-Khane.
- 29 Mai — von Hülman-Khane nach der Stadt Urmia.
- 30 Mai — Stadt Urmia.
- 31 Mai — Ausflug zur Mündung des Flusses Rouse-Tschai.
- 1 Juni — Stadt Urmia.
- 2 Juni — von Urmia nach Itschke-Su.
- 3 Juni — von Itschke-Su nach Neitschanan.
- 4 Juni — von Neitschanan nach Arzin.
- 5 Juni — Arzin und Ersteigung des Gipfels Sitaver (an der Grenze mit der Turkei).
- 6 Juni — von Arzin nach Mavana.
- 7 Juni — von Mavana zurück nach der Stadt Urmia.
- 8 Juni — von Urmia bis zum Flusse Berdessur und von dort nach Cherra und Nergi (Negri).
- 9 Juni — von Nergi über Rosga, Garan, Bukeran, Chischmava-Girdik, Zini-Giadukpass (2047 m. über dem Meeressniveau), Chelane-Tschai nach Negri (Provinz Schamsdinan in der Turkei).
- 10 Juni — von Negri bis Benarve.
- 11 Juni — Benarve.
- 12 Juni — Rückfahrt auf denselben Wege von Benarve bis Chelane.
- 13 Juni — von Chelane durch den Zini-Giadukpass bis Girdik.
- 14 Juni — von Girdik über Negri und Cherra zurück nach Urmia.
- 15 und 16 Juni — Urmia.
- 17 Juni — von Urmia über Herdabad nach Kjarim-abad (Kerimabad).
- 18 Juni — von Kjarim-abad über Kariza nach Kustchi.
- 19 Juni — von Kustchi über den Vergevitzpass nach den Landungsplatz Chantakty.
- 20 Juni — Seeüberfahrt von Chantakty nach Scherif-Khane.
- 21 Juni — Abfahrt nach Tiflis.

Н. Ф. Гончаров.

К познанию бразильских Passifloraceae. Сборы Риделя и Лангсдорфа¹⁾.

N. Gontscharow.

Ad cognitionem Passifloracearum brasiliensium.
Passifloraceae ex herbario Riedeliano et
Langsdorffiano.

Настоящая работа является результатом обработки гербарного материала из коллекций Риделя и Лангсдорфа. К сожалению значительная часть сборов ограничена районом Rio-Janeiro, районом хорошо освещенным сборами ряда позднейших коллекторов, своевременно обработанными. Однако несмотря на это, а также на почти столетнюю давность коллекций, они все же вносят ряд новых данных к познанию как отдельных видов так и родов семейства Passifloraceae, ввиду чего я считал возможным опубликование этого небольшого списка. При систематическом распределении материала я придерживался главным образом системы Н. Хармса²⁾.

Genus *Mitostemma* Mast.

1. *M. brevifilis* N. Gontsch. sp. nov. Frutex 0,9—1,2 m. altus („Riedel“) cirsus, ramulis teretibus vix sulcatis glabris, dense foliatis. Folia breviter petiolata, petiolis eglandulosis crassis circa 3—4,5 mm. longis glabris, laminis coriaceis oblongo-lanceolatis vel lanceolatis rarius spathulato-late-ob lanceolatis circa 12,5—14 cm. longis 3,5—5,5 cm. latis (foliorum superiorum saepe multo minoribus) apice obtusis vel breviter acuminatis rarius paulo emarginulatis, basi sensim angustatis integris margine subrevolutis utrimque glaberrimis, unicostatis (costa supra prominula nervis lateralibus supra distinctis inter sese parallelibus ad apices arcuatis. Cirri ex axillis foliorum sterilibus orientes, simplices,

filiformi-tenues (in diam. 0,75 mm. non superantes) glabri circa 5 cm. longi. Flores albi („Riedel“) tetrameri racemosi rarius solitarii axillares; racemis axillaribus terminalibus breviter puberulis foliis longitudine non superantibus ad 9 cm. longis, bracteis setiformi-linearibus acutis villosulis circa 2—3,5 mm. longis, pedicellis crassiusculis breviter puberulis et dense subsulcatis in parte plerumque submediana articulatis (articulatione a basi 1,2—1,8 cm. distante) et in articulatione bibracteolatis bracteolis oppositis setiformi-linearibus villosulis acutis circa 3 mm. longis. Receptaculum brevissimum late campanulatum. Sepala 4 intus colorata („Riedel“), oblonga apice obtusa circa 1,5—1,7 cm. longa 0,6 cm. lata, basi inter sese coalita carnosula dense et brevissime extus intusve sericeo-puberula. Petala 4 sepalis consimilia sed paulo angustiora et tenuiora minusve sericea. Coronae coeruleae („Riedel“) multiseriatae series extima filis liberis teretibus glabris tenuibus acutissimis petalis sepalsique duplo brevioribus ad 8,5—9 mm. longis; series intermedia e filis praecedentis longitudine subaequantibus sed parte inferiore paulo dilatatis et in fila 2—4 laceratis; series intima ex efformationibus parte superiori valde membranaceo-dilatatis et in parte inferiore irregulariter lacerato-fimbriatis filamentis subduplo brevioribus ad 5 mm. longis constans. Stamina 8 gynophoro libera petalis breviora filamentis filiformibus erectis glabris ad 8 mm. longis coeruleis („Riedel“) antheris oblongis circa 3,5 mm. longis 0,7 mm. latis subhorizontaliter versatilibus loculis subparallelibus. Ovarium elliptico-oblongum vix sulcato-lobatum dense albido-vilosum cum gynophoro villoso 6,5—7 mm. longum, basi in gynophorum vix distinctum 1,5—2,5 mm. longum paulo attenuatum, apice stylis 4 gracilis circa 1,5 mm. longis praeditum, stigmatibus majusculis reniformi-capitatis. Capsula inflata valde coriacea subglobosa apice in appendiculum conicum brevem valde attenuata circa 5—5,4 cm. longa 3,5 cm. in diametro, densissime et brevissime velutina, basi gynophoro elongata (ad 1 cm. longo et ad 3—4 mm. in diametro) praedita.

Brasilia australis; in campis Serrado dictis prope flumen Rio-Pardo. Legit L. Riedel. 1826 Sept. (florifera et fructifera) n. 535.

A M. Jenmanii Mast. foliorum forma petalis sepalis brevioribus nec longioribus, stylis ovario brevioribus, coronae filis extimis petalis sepalsique duplo brevioribus bene differt. A M. Glaziowii Mast. ovario elliptico-oblongo nec ovoideo dense albido-villoso gynophoro quam ovarium duplo breviore distinguitur.

Род *Mitostemma* Mast. являющийся наиболее примитивным из всех американских Passifloraceae и в своем распространении образующий разорванный ареал с 1 видом в Британской Гвиане и 2 видами в южн. Бразилии, повидимому, был широко распространен по всему Бразильско-Гвианскому горному массиву. Характерно, что представители этого рода не спускаются в долины рр. Амазонки и Параны, уступая место более высоко развитым видам близкого рода *Dilkea* Mast. Привожу ниже список известных в настоящее время видов.

1. *M. Jenmanii* Mast. in Journ. of Bot. XXI (1883) 34.—Brit. Guiana. Prope fl. Mazaruni (Jenman n. 622).

¹⁾ Представлено к напечатанию Б. А. Федченко.

²⁾ Engler & Prantl. Die Natürl. Pflanzenfam. Band. 21 (1925) pag. 470—507.

2. *M. Glaziowii* Mast. l. c.—*Brasilia australis*. Prope Rio-Janeiro (Glaziou n. 12741).
3. *M. brevifilis* m.—*Brasilia australis*. Prope fl. Rio-Pardo Riedel n. 535.

Наиболее примитивным является описываемый вид, так как в цветке лишь намечается дифференциация на гинофор и завязь, которая уже явственно выступает у *M. Glaziowii* Mast. и наибольшего выражения достигает у представителей р. *Passiflora*.

Благодаря любезности директора „Kew Botanical Garden“ d-r'a Hill'я, приславшего по нашей просьбе образцы аутентичных экземпляров 2-х описанных Masters'ом видов, явилась возможность сравнить их между собой. Кстати, считаю не лишним отметить, что цветок *M. Jenmanii* Mast. у аутентичного экземпляра не вполне соответствует диагнозу. По диагнозу: „petalis quam sepala multo brevioribus“ тогда как в действительности „petala sepalis sesquilonigiora“. (Повидимому, имеет место опечатка). Привожу ниже ключ к определению видов. К сожалению в присланном нам цветке *M. Jenmanii* Mast. отсутствуют завязь и тычинки, так что ключ по необходимости является не вполне исчерпывающим.

Clavis specierum.

1. Petala sepalis sesquilonigiora. Folia elliptico-oblonga. Styli ovario longiores. *M. Jenmanii* Mast.
- Petala sepalis paulo breviora. Folia lanceolato-oblonga. Styli longitudine ovario non superantes 2
2. Gynophorum ovario duplo longius. Ovarium ovoideum glabrum. Folia acutissime acuminata *M. Glaziowii* Mast.
- Gynophorum brevissimum ovario duplo brevius. Ovarium elliptico-oblongum dense albido-villosum. Folia obtuse acuminata vel obtusa. *M. brevifilis* m.

Genus *Passiflora* Linn.

Sectio Astrophea DC.

2. *P. Mansoi* (Mart.) Mast.
Prov. Matto Grosso. In campis siccis petrosis prope Cuyaba. Sept. 1824, Riedel n. 1186 (spicimina cirrhosa).
Экземпляр без цветов. По форме и опушению листьев и ветвей настолько идентичен с имеющимся в гербарии экземпл. Martius'a n. 276, что принадлежность к этому виду не внушает никаких сомнений.

Sectio Dysosmia DC.

3. *P. foetida* L. var. *hirsuta* Mast.
Prov. Rio-Janeiro. In fruticetis in collibus apricis prope Rio-Janeiro. Majo—Aug. 1832 (florifera et fructifera). Riedel n. 714.

4. *P. villosa* Vell.
Prov. Rio-Janeiro. Rio-Janeiro (florifera). Langsdorff s. n.

Sectio Decaloba DC.

5. *P. truncata* Regel.
Prov. Rio-Janeiro. In fruticetis in monte Corcovado. Oct. 1832 (florifera et fructifera). Riedel n. 1108.
Описанный по оранжерейному экземпляру, выведенному в Петерб. Ботан. Саду¹⁾ из семян, доставленных Риделем, этот вид характеризуется очень мелкими цветами не более 1 д. в диаметре (по диагнозу Сегала)²⁾. На приводимых экземплярах цветы не более 0,5 дюйма в диаметре. Так как в диагнозе отсутствует описание плодов, считаю возможным дополнить его: „Fructus globosus tenuiter coriaceus glaber in sicco flavovirescens circa 1,8 cm. in diametro. Semina ovata acuta basi rotundata laeviter (in sicco valde) compressa scrobiculariter rugosula (in sicco valde transverse scrobiculariter rugosa), margine angustissime alata circa 4 mm. longa 2,5—2,75 mm. lata“.
6. *P. capsularis* L.
Prov. Rio-Janeiro. In collibus inter frutices prope Rio-Janeiro. Mart—Majo 1832 (florifera) Riedel n. 718; Rio-Janeiro (florifera) Langsdorff s. n.; Mandioca (florifera) Langsdorff s. n.
7. *P. Maximilliana* Bory. (?)
Prov. Rio-Janeiro. Rio-Janeiro 12 Jan. 1833 (florifera) Riedel (?) s. n.
Цветы плохо сохранились и принадлежность к этому виду не вполне достоверна.
8. *P. saxicola* N. Gontsch. sp. nov.—*Cirrhosa scandens*, glabra. Ramuli compressi sulcato-striati. Folia tenuiter chartacea, petiolo gracili eglanduloso ad 7 mm. longo (vix 0,5—0,75 mm. in diametro), laminis in configuratione transverse oblongis bilobis, lobo medio-(tertio) nullo, apice emarginatis vel emarginulatis basi cordatis vel subcordatis ad 1,8 cm. (in parte media) longa, 6 cm. lata, lobis late obovalibus apice rotundatis (vel ad apicem parte superiori sublobulum parvulum formantes), trinervia, nervis apice ex lamina excurrentibus (parte excurrente vix 0,75 mm. longa), nervo medio ad apicem nervis duabus secundariis lateralibus (quam nervi laterales primarii tenuioribus) praedito; basi inter nervos primarios glandulis duabus magnis praeditis praeterea glandulis punctiformibus rotundatis obsitis. Stipulae minimaee setiformi-subulatae 1—2 mm. longitudine non superantes. Cirri gracillimi simplices filiformes ad 6 cm. longi. Flores albido-lutei in axillis foliorum sessiles vel pedunculati, pedunculis petiolum longitudine non superantibus circa 5—7 mm. longis 2—3 floris, pedicellis gracillimis circa 6—10 mm. longis bracteolis duabus setiformi-subulatis circa 1 mm. longis inter

¹⁾ H. Harms. „Beiträge zur Kenntnis der amerikanischen Passifloraceen“ In Fedde Repert. XIX. 1923, pag. 56.

²⁾ Gartenflora VIII. (1859) 356. t. 276.

sese valde remotis instructis. Receptaculum brevissimum circa 3 mm. longum urceolato late campanulatum. Sepala oblonga apice obtusa circa 12 mm. longa basi circa 6 mm. lata versus apicem angustata tenuia 8—9 nervia. Petala oblonga tenuissima circa 6,5 mm. longa. Corona extima biseriata, serie extima e filis liberis filiformibus in parte media angustissime membranaceo-dilatatis (parte dilatata 0,5 mm. latitudine non superantes circa 7,5—8 mm. longis apice glochidiiformibus, serie sequente praecedenti appoximata e filis liberis filiformibus circa 3 mm. longis apice bilateraliter appendiculatis appendiculis duobus dentiformibus vel longioribus, longitudine saepe inaequalibus uno quam altero duplo breviore. Corona mediana a praecedente vix 1 mm. remota, membranacea, membranam circa 2,5 mm. altam in parte superiori plicatam margine breviter denticulato infexo subcrispato formans. Corona intima a praecedente ad 1 mm. remota et a gynophori basi circa 2 mm. distans annulum crissatum crassiusculum margine subrevolutum formans. Gynophorum gracile sulcato-striatum circa 6 mm. longum apice filamentis 5 compressis et dilatatis circa 4 mm. longis et ad 1 mm. latis instructum. Antherae oblongae circa 3,5 mm. longae versatiles. Ovarium a filamentorum insertione haud remotum apice gynophori ovoideum glabrum circa 2 mm. longum sulcato-lobulatum, stylis 3 gracillimis circa 5 mm. (cum stigmatibus) longis patentibus, stigmatibus majusculis reniformi-capitatis. Fructus ignotus. Prov. Bahia. Inter saxa prope Ilheos. Majo—Junio 1822 (florifera). L. Riedel n. 789.

P. Maximiliana Bory. valde affinis sed foliorum forma et calycis colore differt.

Praeterea a P. Maximiliana Bory (Mast. in Mart. Fl. Bras. XIII, pag. 592) mihi ignota coronae filis exterioribus non petaloideis ut videtur differt; a P. punctata L. (Mast. l. c pag. 593) coronae filis exterioribus petalis longioribus, ovario glabro, corona mediana non simbriata sed dentata ut videtur (specimina authentica non vidi) differt; a P. microcarpa Mast. (l. c. pag. 593) mihi ignota coronae filis exterioribus non liguliformibus, corona intima non simbriifera, petalis quam sepala duplo brevioribus ut videtur differt.

Sectio Cieca (Medic.) DC.

9. P. suberosa L.

Prov. Rio-Janeiro. Rio-Janeiro. 1832 (florifera). Riedel (?) s. n.; Prov. Minas Geraes. „Iter ad Minas Geraes“ (florifera) Langsdorff s. n.

Sectio Granadilla DC.

10. P. setacea DC.

Prov. Rio-Janeiro. In fruticetis prope Rio-Janeiro. 1832 (florifera). Riedel n. 715.

11. P. alata Ait.
Prov. Rio-Janeiro. Rio-Janeiro 1832 (florifera). Riedel s. n.
12. P. speciosa Gardn.
Prov. Minas Geraes. In silvis. 1824 (florifera). Riedel n. 330.
13. P. mucronata Lam.
Prov. Rio-Janeiro. Rio-Janeiro (florifera). Luschnat s. n.
14. P. racemosa Brotero.
Prov. Rio-Janeiro. Rio-Janeiro 1832 (florifera). Riedel n. 717.
15. P. edulis Sims.
Prov. Rio-Janeiro. In fruticetis prope Rio-Janeiro. Nov. 1832 (florifera). Riedel n. 1197; In fruticetis prope Mandiocea (на этикетке можно прочесть только Mand...i....) (florifera) Riedel s. n.; Brasilia (loco accuratius non indicato (florifera) Riedel et Langsdorff n. 493; Sumidorio (florifera). Langsdorff. s. n.
16. P. Raddiana DC.
Prov. Rio-Janeiro. Rio-Janeiro (florifera) Langsdorff s. n.; In fruticetis prope Rio-Janeiro Jun.—Jul. 1832 (florifera) Riedel n. 716; Mons Corcovado (florifera) Langsdorff s. n.
17. P. silvestris (Mast. in Mart. Flor. Brasil. XIII. pag. 620 tab. 127 non Velloso (Flor. Flumin IX tab. 74).
Prov. Rio-Janeiro. In collibus siccis prope Rio-Janeiro. 1832 (florifera et fructifera) Riedel n. 719.
Цитируя описание этого вида, Masters говорит „flores non bene evoluti sunt“. Экземпляр Riedel'я с вполне развитыми цветами и плодами отличается несколько более крупными цветами по сравнению с размерами, приводимыми Masters'ом. Ввиду этого, а также ввиду того, что описание плодов для этого вида вообще отсутствует, считаю возможным внести следующие дополнения в диагноз: „Sepala 3,5 cm. longa circa 1 cm. lata, apice obtusa 3-nervia. Petala sepalis longitudine subaequalia sed angustiora circa 0,5—0,6 cm. lata apice obtusa. Fructus capsularis. Capsula valde scrobiculariter rugosa oblongo-ovoidea circa 6—7 cm. longa circa 3,5—4 cm. in diametro in sicco flavo-virescens glabra. Semina scrobiculariter rugosa ovata circa 0,8 cm. longa 0,6 cm. lata apice acuta basi recte abrupta, compressa. От P. silvestris Vell. отличается отсутствием прицветников. По форме листьев и плодов очень напоминает P. ovalis Vell. (Flor. Flum. IX, t. 75), но, так как на таблице отсутствует рисунок цветка, не решаюсь отождествлять эти виды.

N. Gontscharov.

Beitrag zur Kenntniss der brasiliischen Passifloraceen (nach dem im Herbar von Riedel und Langsdorff enthaltenen Material).

(Résumé).

Verfasser hat die Passifloraceen, die von der russischen Expedition in Brasilien gesammelt wurden, einer kritischen Bearbeitung unterworfen. Die Arbeit enthält außerdem eine kritische Uebersicht der Gattung *Mitostemma* Mast. und einen Schlüssel zur Bestimmung ihrer Arten. Es erwiesen sich dabei zwei neue Arten und zwar: *Mitostemma brevifilis* N. Gontsch. und *Passiflora saxicola* N. Gontsch.

Э. Л. Вольф.

Изменчивость Понтийской Азалии.—*Rhododendron flavum* Don (*Azalea pontica* L.).

Многочисленные живые экземпляры Понтийской Азалии, находящиеся в Акклиматационном Отделе Главного Ботанического Сада и в дендрологическом саду Ленинградского Лесного Института, весьма наглядно показывают, в какой сильной степени варьирует этот вид. Подвергавшиеся исследованию экземпляры были получены с мест их естественного произрастания, — отчасти с Кавказа, отчасти с Украины. Варьируют они ростом, окраскою листвы, формою, нервациою и опушением листьев. Цветы, которые также весьма различны по окраске, форме, наконец и по величине, не только общей, но и по сравнительным размерам отдельных своих частей, — варьируют, можно сказать, совершенно самостоятельно от вегетативных органов, не проявляют, например, никакого отношения к окраске листвы, так часто наблюдаемого у многих других растений. Наибольшее число форм приходится на кавказских представителей вида, и из семи установленных мною групп форм только одна — представлена и на Волыни.

Из подвергавшихся исследованию экземпляров немногие выделяются сравнительно маленькими цветами: их венчики имеют около 37 мм. в диаметре (*f. parviflorum*). Малочисленны и экземпляры, отличающиеся особенно величиною цветов: диаметр венчика достигает до 63 мм. (*f. grandiflorum*). Громадное большинство кустов приносят или относительно крупные цветы: диаметр венчика = 50—55 мм., или же цветы средней величины: диаметр венчика = 42—48 мм. Доли, на которые разделен венчик, то очень узки (срединная верхняя доля 8—12 мм. ширины: *f. angustilobum*) или узки (14—15 мм. ширины), то средней ширины (16—17 мм. ширины) или широки (18—19 мм. ширины: *f. latilobum*). Длина столбика колеблется между крайностями: коротким столбиком, равняющимся длине долей венчика, и длинным столбиком, высывающимся из зева: часть которого вдвое длиннее долей. Обыкновенно же столбик средней длины т. е. — длиннее долей, но менее, чем вдвое. Короткий столбик имеется лишь у одной из наших форм (*f. brevistylum*), длинный столбик у трех (*f. longistylum*). Длина тычинок также подвержена сильным колебаниям: тычинки коротки, если они короче

долей венчика или приблизительно равны им (*f. brevistamineum*); тычинки средней длины: наиболее длинные из них превышают доли; длинные тычинки достигают длины столбика или незначительно короче его (*f. longistamineum*).

Длина чашелистика варьирует от 2 до 11 мм. (*f. longisepalum* чашелистики до 11 мм. длины). Наконец, цветы обнаруживают также различия в густоте своего опушения, в окраске и в размерах трубки венчика (*f. brevitubulatum*: трубка 13 мм. длины, *f. longitubulatum*: трубка 24 мм. длины). Окраска венчиков то бледнее, то ярче: венчик золотистожелтый или (но реже) желтый, а средняя доля верхней губы оранжевая (*f. aurantiacum*) или венчик желтый с золотистожелтою среднею долею (*f. aureum*), или же — лимонно-желтый с желтою среднею долею (*f. citrinum*). Иногда размеры отдельных частей цветка значительно колеблются в одном и том же цветке (*f. vagum*). Наблюдается и разница во времени цветения: волынские экземпляры зацветают здесь на 1 неделю позже ранних кавказских и на 2 дня позже поздно-цветущих кавказских экземпляров. Неописуемо разнообразна окраска листьев, которую различные формы принимают — одни раньше, другие позже, — осенью. Осенняя окраска куста то одноцветна, то пестра и проявляет всевозможные переходы от золотисто-желтой до пурпурово-шарлаховой, пурпурово-каштановой и до винно-красной. Ниже отмечены те формы, которые отличаются особенно эффектною осеннюю окраскою.

Имеющийся в моем распоряжении живой материал я предпочел классифицировать, главным образом, по листьям, потому что основанная в главном на цветках классификация гораздо труднее осуществима.

Из многочисленных исследованных экземпляров, между которыми, без преувеличения, можно сказать, едва найдутся два в совокупности своих признаков одинаковых, — я включил в свою систему только наиболее характерные варианты установленных мною форм, иллюстрирующие вполне достаточно чрезвычайную изменчивость Понтийской Азалии.

I. Листья снизу сизые.

a) Листья сверху сизо-зеленые.

Var. glaucum. Боковые жилки листьев отходят от главной жилки под крупным углом и более или менее параллельны. Столбик средней длины, тычинки короткие. Кавказ.

Forma elatum: более высокие кустарники, производящие длинные ростовые побеги. Верхние листья сильных ростовых побегов длинно-остроконечные — от середины своей длины дугообразно-заостренные; — нижние листья заостренные или острые, достигающие до 165 и до 180 мм. длины¹⁾; слабо волосистые. Венчики очень крупные, золотисто-желтые с оранжевою среднею долею, трубка 22—23 мм. длины и 5 мм. в диаметре.

¹⁾ Указанная длина пластинок относится всегда к листьям относительно сильнейших ростовых побегов.

Вариант 1. Листья сверху чистой окраски, ширина пластинок¹⁾, = 0,270—0,190+0,300—0,243 мм. длины. Венчиковые доли средней ширины; чашелистики до 5 мм. длины. Зацвел 15—VI.

Вариант 2. Листья сверху с несильным буро-пурпуровым налетом²⁾; ширина пластинок = 0,310—0,190+0,373—0,247 мм. длины. Венчиковые доли широкие, чашелистики до 2 мм. длины. Зацвел 16—IV.

Forma humile: низкие кустарники с короткими ростовыми побегами. Верхние листья сильных ростовых побегов коротко-дугобразно-острые, нижние с более или менее округлою верхушкою, достигающие до 120 мм. длины; почти голые. Венчики крупные, желтые с золотисто-желтою среднею долею, трубка около 16 мм. длины и 5 мм. в диаметре. Листья сверху с пурпурвато-бурым налетом, ширина пластинок = 0,410—0,218 мм. Доли венчика средней ширины, чашелистики до 3 мм. длины.

б) Листья сверху зеленые (со слабым пурпурвато-бурым налетом).

Var. discolor. Боковые жилки листьев отходят от главной жилки под крупным углом и более или менее параллельны. Венчики крупные, столбик средней длины, тычинки короткие, трубка 17—18 мм. длины и 5 мм. в диаметре. Кавказ.

Forma excelsum: более высокие кустарники, производящие длинные ростовые побеги. Листья сверху светло-зеленые; верхние на сильных ростовых побегах длинно-остроконечные, от середины своей длины дугообразно заостренные, нижние заостренные или острые; почти голые, достигающие до 160 мм. длины, ширина пластинок = 0,330—0,145+0,330—0,247 длины. Венчики желтые с золотисто-желтою среднею долею, доли широкие, чашелистики до 8 мм. длины. Зацвела 20—VI. Осенняя окраска листья шарлахово-оранжевая.

Forma paput: низкие кустарники с короткими ростовыми побегами. Листья сверху зеленые, от середины своей длины то суженные в более или менее притупленную или округленную верхушку, то острые, волосистые, достигающие до 135 мм. длины, ширина пластинок = 0,355—0,236 мм. длины. Венчики золотисто-желтые с оранжевою среднею долею, доли средней ширины, чашелистики до 3 мм. длины. Зацвела 21—VI.

2. Листья снизу зеленые (сверху темнее окрашенные, чем снизу, чисто зеленые или подернутые пурпурватым или пурпурвато-бурым налетом).

А. Низкие кустарники с короткими ростовыми побегами; листья достигают до 120 мм. длины, причем ширина = 0,500—0,200 мм. длины.

¹⁾ Первая пара цифр, стоящая впереди знака +, обозначает ширину листьев сильных ростовых побегов, а вторая пара — ширину листьев коротких побегов. На сильных ростовых побегах ширина листьев уменьшается по направлению от основания к вершине побега; наиболее узкие листья — верхние, наиболее широкие — нижние или нередко средние.

²⁾ Как у этой формы, так и у всех других подобно окрашенных пурпурватым или буроватым подернуты не все листья, а лишь наиболее освещенные, преимущественно верхние; к концу лета этот налет обыкновенно сгущается.

Var. brevifolium. Листья волосистые, их боковые жилки отходят от главной жилки под крупным углом. Столбик средней длины, тычинки короткие, венчиковые доли широкие, трубка 21—22 мм. длины и 5 мм. в диаметре, чашелистики до 7—11 мм. длины. Кавказ.

Вариант 1. Верхние листья сильных ростовых побегов длинно-остроконечные, от середины своей длины дугообразно заостренные; нижние листья заостренные или острые. Листья сверху светло-ярко-зеленые с пурпуровым налетом и ширина пластинок = 0,424—0,200 + 0,460 — 0,200 мм. длины. Между вариантом этой группы найдена форма *longisepalum*: венчики крупные, желтые с золотисто-желтою среднею долею, чашелистики до 11 мм. длины; зацвела 21—VI; осенняя окраска листы шарлахово-пурпуровая.

Вариант 2. Листья то с заостренною или острою верхушкою, то с более или менее округлою; сверху желтовато-зеленые с пурпурово-бурым налетом; ширина пластинок = 0,500—237 мм. длины. Венчики средней величины, золотисто-желтые с оранжевою среднею долею; чашелистики до 7 мм. длины. Зацвела 15—VI.

В. Более высокие кустарники, производящие сильные длинные ростовые побеги, или же листья более узки, чем у *var. brevifolia*.

а) На сильных длинных ростовых побегах ширина листьев = 0,430—0,260 мм. длины пластинки (на коротких побегах ширина = 0,430—0,320 длины).

Var. latifolium. Листья сверху желтовато-зеленые с буровато-пурпуровым налетом, снизу почти голые; боковые жилки отходят от главной под углом, близким к прямому. Тычинки короткие, трубка венчика 20 мм. длины и 5 мм. в диаметре. Кавказ.

Вариант 1. Верхние листья сильных ростовых побегов заострены; длина листьев достигает до 150 мм., ширина = 0,430—0,266 + 0,420—0,330 мм. длины. Между вариантами этой группы — форма *brevisylbum*: столбик короткий, тычинки равны столбiku, венчики средней величины, светло-желтые с золотисто-желтою среднею долею, доли чашелистики 4—5 мм. длины; зацвела 20—VI.

Вариант 2. Верхние листья сильных ростовых побегов округло-острые; длина листьев достигает до 135 мм.; ширина = 0,400—0,260 + 0,427 — 0,320 длины. Столбик средней длины, венчики крупные, желтые с золотисто-желтою среднею долею, доли широкие, чашелистики 5—7 мм. длины; зацвела 19/VI.

в) На сильных длинных ростовых побегах ширина листьев не превышает 0,380 длины.

а) Верхние листья сильных ростовых побегов длинно-остроконечные, от середины своей длины дугообразно-заостренные; нижние листья также заостренные или острые:

Var. acuminatum, Кавказ.

Forma pubescens: нижняя поверхность листовых пластинок сплошь усеяна волосками. Венчики крупные.

Вариант 1: листья сверху зеленые с буровато-пурпуровым налетом (к концу более или менее сплошным) снизу с пурпуровою главною жилкою (с черешком такой же окраски); боковые жилки восходящие. Листья достигают до 150 мм. длины, ширина = 0,300—0,185 +

+ 0,350 — 0,162 длины. Венчики золотисто-желтые с оранжевою среднею долею, доли узкие, трубка 18 мм. длины и 5 мм. в диам., столбик короткий и средней длины, тычинки длинные, чашелистики до 7 мм. Зацвела 15/VI.

Варианты 2 и 3: листья сверху ярко-светло-зеленые со слабым пурпурово-бурым или пурпуровым налетом, снизу с зеленою главною жилкою (черешок такой же окраски); боковые жилки отходят от главной жилки под крупным углом.

Вариант 2: листья достигают до 140 мм. длины, ширина = 0,355—0,226 + 0,360 — 0,245 длины. Венчики светло-желтые с золотисто-желтою среднею долею, доли широкие, трубка 20 мм. длины и 4 мм. в диам., столбик короткий или средней длины, тычинки короткие, чашелистики до 4 мм. длины. Зацвела 19/VI.

Вариант 3: листья достигают до 165 мм. длины, ширина = 0,250—0,213 + + 0,346 — 0,220 длины. Венчики золотисто-желтые с оранжевою среднею долею, доли узкие, трубка 23 мм. длины и 5 мм. в диам., чашелистики 3 мм. длины; зацвела 16/VI.

Forma pilosum: на нижней поверхности листовой пластинки жилочки там и сям усажены волосками, боковые жилки волосисты, а главная жилка волосиста или пушиста.

Вариант 1: боковые жилки листьев восходящие. Листья сверху ярко-светло-зеленые, к концу лета со слабым пурпурвато-бурым налетом, а снизу с более или менее пурпуровою главною жилкою (черешок также окрашен); листовая пластинка достигает до 160 мм. длины, ширина ее = 0,336—0,200 + (476) 0,370 — 0,250 длины. Между вариантами этой группы наблюдалась форма *longistylum*: столбик длинный, тычинки средней длины, венчики средней величины, золотисто-желтые с оранжевою среднею долею, доли узкие, трубка 18 мм. длины и 5 мм. в диам., чашелистики до 5 мм. длины. Зацвела 15/VI.

Варианты 2 и 3: боковые жилки листьев отходят от главной жилки под крупным углом.

Вариант 2: листья сверху зеленые с сильным пурпурвато-бурым налетом, снизу с зеленою главною жилкою (черешок такой же окраски) достигающие до 150 мм. длины, ширина пластинок = 0,250—0,200 + 0,300 — 0,200 длины. Между вариантами этой группы — форма *brevistamineum*: тычинки короткие, столбик средней длины, венчики очень крупные, светло-желтые с золотисто-желтою среднею долею, доли средней ширины, трубка 22 мм. длины и 4 мм. в диам., чашелистики до 7 мм. длины. Зацвела 19/VI. Осенняя окраска листы винно-красные.

Вариант 3: листья сверху чисто-зеленые; достигающие до 145 мм. длины, ширина пластинок = 0,305—0,164 + 0,400 — 0,246 длины. Сюда — форма *parviflorum*: венчики маленькие, желтые с золотисто-желтою среднею долею, доли очень узкие (8—10 мм.. ширины), трубка 20 мм. длины и 4 мм. в диам.; столбик средней длины, но длиннее тычинок средней длины; чашелистики до 6 мм. длины. Зацвела 20/VI.

Forma glabrescens: на нижней поверхности листовой пластинки жилочки совершенно голы, боковые жилки усажены единичными

волосками, а главная жилка волосиста или лишь к своему основанию пушиста. Столбик средней длины, тычинки коротки.

Варианты 1 и 2: листья сверху желтовато-зеленые со слабым, исчезающим затем, пурпуральным налетом или с несильным остающимся; черешок более или менее ярко пурпуровый; боковые жилки восходящие.

Вариант 1: листья сильно блестящие, достигающие до 140 мм. длины, ширина их $= 0,357 - 0,182 + 0,420 - 0,214$ длины; черешок и главная жилка (снизу) ярко пурпуровы. Венчики очень крупные, желтые с золотисто-желтою среднею долею, доли широкие, трубка 18 мм. длины и 5 мм. в диаметре чашелистики 5—7 мм. длины. Зацвел 16/VI.

Вариант 2: листья достигают до 130 мм. длины, ширина их $= 0,330 - 0,210 + 0,350 - 0,233$ длины. Венчики средней величины, золотисто-желтые с оранжевою среднею долею, доли узкие, трубка 18 мм. длины и 4 мм. в диам., чашелистики 5 мм. длины. Зацвел 15/VI.

Вариант 3: листья сверху зеленые с более или менее сильным пурпуровым налетом, черешок и (снизу) главная жилка зеленые; боковые жилки отходят от главной жилки под крупным углом. Листья достигают до 135 мм. длины, их ширина $= 0,327 - 0,232 + 0,343 - 0,233$ длины. Венчики желтые с золотисто-желтою среднею долею, доли средней ширины, трубка 19 мм. длины и 5 мм. в диам., чашелистики до 6 мм. длины. Зацвел 19/VI.

3) Верхние листья сильных длинных ростовых побегов коротко-дугобразно-остры, а нижние листья имеют более или менее округлую верхушку.

Var. acutum. Листья снизу слабо волосисты, их боковые жилки отходят от главной жилки под углом близким к прямому. Кавказ.

Вариант 1: листья сверху ярко-светлозеленые, позже со слабым пурпурово-бурым налетом, черешок и (снизу) главная жилка пурпуроваты. Листья достигают до 160 мм. длины, их ширина $= 0,380 - 0,250 + 0,340 - 0,234$ длины. Венчики средней величины, почти маленькие, золотисто-желтые с оранжевою среднею долею, доли узкие, трубка 15 мм. длины и 4 мм. в диам., столбик средней длины, тычинки короткие, чашелистики 5—8 мм. длины. Зацвел 19/VI.

Вариант 2: листья сверху желтовато зеленые, чистой окраски, достигают до 150 мм. длины; их ширина $= 0,368 - 0,250 + (0,544)$ $0,414 - 0,259$ длины. Не цвел еще.

γ) Все верхние на сильных длинных ростовых побегах листья, или хоть часть из верхних листьев имеют округло-острую верхушку или округлую, оканчивающуюся коротким шипиком.

Var. obtusiusculum. Листья подернуты пурпуровым или пурпурово-бурым налетом, усиливающимся и расширяющимся к концу лета. Листья сравнительно не крупны: длина пластинок обычно не превышает 135 мм.; боковые жилки листьев отходят от главной жилки под углом, более близким к прямому. Кавказ и Волынь.

Forma calvescens: на нижней поверхности листовой пластинки жилочки совершенно голы, боковые жилки усажены единичными волосками, а главная жилка волосиста или лишь к своему основанию пушиста. Волынь. Листья сверху ярко-зеленые с пурпурово-

бурым налетом, длина пластинок достигает до 140 мм. длины, ширина $= 0,325 - 0,232 + 0,343 - 0,225$ длины. Венчики средней величины, желтые с оранжевою среднею долею, доли узкие, трубка 21 мм. длины и 5 мм. в диам., столбик средней длины, но длиннее тычинок средней длины, чашелистики до 5 мм. длины; зацвела 22/VI. Осенняя окраска листья шарлахово-пурпуровая с золотисто-оранжевою.

Forma raripilum: на нижней поверхности листовых пластинок жилочки там и сям усажены волосками, боковые жилки волосисты, а главная жилка волосиста или пушиста. Венчики золотисто-желтые с оранжевою среднею долею.

Вариант 1: листья сверху желтовато-зеленые с пурпуровым налетом, черешок и (снизу) главная жилка ярко пурпуровые; длина пластинок достигает до 140 мм., ширина $= 0,319 - 0,183 + 0,330 - 0,283 - brevitubulatum$: венчики средней величины, доли широкие, трубка около 13 мм. длины и 5 мм. в диам., столбик средней длины, но длиннее тычинок средней длины, чашелистики до 9 мм. длины. Зацвел 15/VI. Кавказ.

Вариант 2: листья сверху ярко-светлозеленые с пурпуровым налетом, длина пластинок до 120 мм., ширина $= 0,362 - 0,210 + 0,356 - 0,263$ длины; ростовые побеги сильно щетинистые, форма *longistylum*: столбик длинный, тычинки средней длины или почти длинные, венчики средней величины, доли узкие, трубка 20 мм. длины и 4 мм. в диам., чашелистики до 5 мм. длины. Зацвела 15/VI. Кавказ.

Вариант 3: листья сверху зеленые с пурпурово-бурым налетом; длина пластинок до 150 мм., ширина $= 0,352 - 0,192 + 0,428 - 0,250$ длины. Венчик крупный, доли широкие, трубка 18 мм. длины и 5 мм. в диам., столбик средней длины, но длиннее тычинок средней длины, чашелистики до 4 мм. длины; зацвел 26/VI; осенняя окраска листья винно-красно-пурпуровая. Волынь.

Forma vestitum: нижняя поверхность листовых пластинок сплошь усеяна волосками. Волынь.

*. Все листья на сильных ростовых побегах имеют округлую верхушку, оканчивающуюся коротким шипиком.

Subforma tholiforme: листья сверху с пурпурово-бурым налетом, длина пластинок до 120 мм., ширина $= 0,306 - 0,226 + 0,343 - 0,275$; венчики крупные, почти очень крупные, золотисто-желтые с оранжевою среднею долею, доли широкие, трубка 20 мм. длины и 5 мм. в диам., столбик средней длины, тычинки средней длины или почти длинные, чашелистики до 5 мм. длины; зацвела 24/VI; осенняя окраска листьев пурпурово-шарлаховая.

**. Не все верхние листья сильных ростовых побегов округло-остры или округлы у своей верхушки.

Вариант 1: листья сверху матово-светло-зеленые с буро-пурпуровым налетом, длина пластинок до 120 мм., ширина $= (0,372) 0,333 - 0,210 + 0,380 - 0,237$ длины. Венчики крупные, светло-желтые с золотисто-желтою среднею долею, доли средней ширины, трубка 17 мм. длины и 4 мм. в диам., столбик средней длины, тычинки короткие, чашелистики до 4 мм. длины. Зацвел 22/VI.

Варианты 2 и 3; листья сверху зеленые.

Вариант 2: листья сверху зеленые с пурпурным налетом, длина пластинок до 105 мм., ширина = $0,338 - 0,283 + 0,325 - 0,200$ длины. Сюда форма *vagum*: столбик или короткий, равный долям и тычинкам, или средней длины и длиннее тычинок, венчики золотисто-желтые с оранжевою среднею долею, доли узкие или широкие, трубка 15 мм. длины и 5 мм. в диам., чашелистики до 5 мм. длины. Зацвела 22/VI.

Вариант 3: листья сверху зеленые с буровато-пурпурным налетом, черешок и (снизу) главная жилка ярко-пурпуровая, длина пластинок до 110 мм., ширина = $0,312 - 0,205 + (0,442) 0,355 - 0,222$ длины. Сюда форма *angustilobum*: венчики средней величины, золотисто-желтые с оранжевою среднею долею, доли очень узкие, трубка 24 мм. длины и 4 мм. в диам., столбик длинный, тычинки короткие, чашелистики до 5 мм. длины. Зацвела 22/VI.

Egbert Wolf.

Rhododendronis flavi Don mutabilitas.

Species valde polymorpha. Variant statura, foliorum forma, magnitudo, color, pubescencia et nervatio, flores. Corollae variant magnitudine: saepius magnae (diam. = 50 — 55 mm.) vel mediocri magnitudine (42 — 48 mm.), rarius permagnae (circiter 60 mm.: forma grandiflorum) rarissime parvae (circiter 37 mm.: f. parviflorum); — lobis nunc angustissimis (lobi medii superioris latitudo = 8 — 12 mm.: f. angustilobum) vel angustis (lat. = 14 — 15 mm.), nunc mediocri latitudine (lat. = 16 — 17 mm.) vel latis (lat. = 18 — 19 mm.: f. latilobum). Variat etiam longitudine genitalium: stylus plerumque mediocris, longitudine varians inter sat raro occurrentes stylum brevem, limbum aequantem, (f. brevistylum) ac stylum longum, limbum duplo superantem (f. longistylum). Stamina nunc brevia: limbum adaequantia vel breviora (f. brevistamineum), nunc mediocri longitudine: longissima eorum limbum superantia, nunc longa: stylo paulo breviora aequilongave (f. longistamineum). Colore corollae variant hoc modo: corolla lutea (rarius flava) lobo medio limbi superioris aurantiaco ornata (f. aurantiacum), — flava lobo medio luteo (f. aureum) vel citrina lobo medio flavo (f. citrinum). Denique flores variant: pubescenciae densitate, sepolorum longitudine, inter 2 et 11 mm. vagante (f. longisepalum: sepala ad 11 mm. longa), tubi longitudine (f. brevitubulatum: tubus 13 mm. longus, f. longitubulatum: tubus 24 mm. long.). In floribus formae „vagum“ mensurae styli lobi rurumque maxime incostantes. Frutices postrema variant non modo tempore efflorescentiae, — volhynici hac regione (Leningrad) 2 — 7 diebus tardius florere incipiunt, quam caucasici inter se hac in re variantes, — sed etiam tempore colorum autumnalis mutationis ac tono frondis, quae dicit maxime varios colores; purpureum, vinosum, puniceum, aurantiacum, luteum et eorum commisuras transitusque.

Plantae nostrae, — de multis variantiis tantum memoratu dignissimas refero, — generatim hoc modo distribuere possumus.

I. Folia subtus glauca.

+) Folia supra saturate glauco-viridia.

Var. glaucum. Folia pilosiuscula, subrectangulo-nervosa (id est nervis secundariis plus minusve parallelis sub angulis amplis a nervo primario divergentibus). Stylus mediocri longitudine, stamina brevia. Caucasus.

Forma elatum: frutices elati ramulos elongatos ferentes. Ramulorum validorum folia superiora a medio arcuato-acuminata, folia inferiora — acuminata vel acuta; usque 165 — 180 mm. longa¹⁾. Corollae permagnae, luteae lobo aurantiaco, tubus 22 — 23 mm. longus et 5 mm. latus.

Variantia 1. Folia supra coloris puri, laminarum latitudo²⁾ = 0,270 — 0,190 + 0,300 — 0,243 longitudinis; corollae lobi mediocri latitudine; sepala 5 mm. usque longa. Flor. 15/VI.

Variantia 2. Folia supra levi rubore castaneo-purpureo³⁾; laminarum latitudo = 0,310 — 0,190 + 0,373 — 0,247 longitudinis. Corollae lobi lata, sepala 2 mm. usque longa. Flor. 16/VI.

Forma humile: frutices humiles ramulis brevibus. Ramulorum validorum folia superiora breviter arcuato-acuta, folia inferiora apice plus minusve rotundata; usque 120 mm. longa. Corollae magnae, flavae lobo luteo, tubus 16 mm. longus et 5 mm. latus. — **Folia supra rubore purpureo-castaneo;** laminarum latitudo = 0,410 — 0,218 longitudinis. Corollae lobi mediocri latitudine, sepala usque 3 mm. longa. Flor. 20/VI.

++) Folia supra viridia (levi rubore purpureo-castaneo).

Var. discolor. Folia subrectangulo-nervosa. Corollae magnae, stylus mediocri longitudine, stamina brevia, tubus 17 — 18 mm. longus et 5 mm. latus. Caucasus.

Forma excelsum: frutices elati. Folia supra pallide viridia, acuminata, glabrescentia, 160 mm. usque longa, laminarum latitudo = 0,330 — 0,145 + 0,330 — 0,247 longitudinis. Corollae flavae lobo luteo, lobi lati, sepala 8 mm. usque longa. Flor. 20/VI. Frondis color autumnalis pulcherrimus miniato-aurantiacus.

Forma nanum: frutices humiles. Folia supra viridia, a medio in apicem nunc obtusum vel plus minusve rotundatum, nunc acutum attenuata, pilosa, usque 135 mm. longa, laminarum longitudine = 0,355 — 0,236. Corollae luteae lobo aurantioco, lobi mediocri latitudine, sepala usque 3 mm. longa. Flor. 21 — VI.

¹⁾ Mensurae pertinent ad laminas foliorum ramulis hornotinis sterilibus relative validissimis inhaerentum.

²⁾ Par primum duarum cruce inter punctarum notarum numeri signat longitudinem foliorum ramulis hornotinis validis insidentum, par secundum — longitudinem foliorum ramulos breves ornantum. In ramulis his validis latitudo foliorum ramuli apicem versus decrescit, ergo folia superiora angustiora sunt quam media inferioraque.

³⁾ Ut in hac variantia, ita in omnibus sequentibus similiter coloratis, rubore suffusa tantum modo folia pleno soli exposita, praecipue suprema; extrema aestate hic rubor plerumque accedit.

II. *Folia utrinque viridia, superne saturatius viridia.*

A. *Frutices humiles*; *folia* 120 mm. *usque longa*, *laminarum latitudo* = 0,500 — 0,200 *longitudinis*.

Var. brevifolium. *Folia pilosa*, *subrectangulo-nervosa*. *Stylus mediocris* *longitudine*, *stamina brevia*, *corollae lobi lati*, *tubus* 21 — 22 mm. *longus et 5 mm. latus*, *sepala usque 7 — 11 mm. longa*. Caucasus.

Variantia 1. *Folia acuminata*, *supra laete viridia rubore purpureo*, *laminarum latitudo* = 0,424 — 0,200 + 0,460 — 0,200 *longitudinis*. In hunc locum — *forma longisepalum*: *corollae magnae flavae lobo luteo*, *sepala 11 mm. usque longa*, *flor. 21/VI*; *frondis color autumnalis pulcherrimus miniato-purpureus*.

Variantia 2. *Folia apice nunc acuminata vel acuta*, *nunc plus minusve rotundata*, *supra lutescenti-viridia rubore purpureo-castaneo*, *laminarum latitudo* = 0,500 — 0,237 *longitudinis*. *Corollae mediocri magnitudine luteae lobo aurantiaco*, *sepala asque 7 mm. longa*. Flor. 15/VI.

B. *Frutices majoris incrementi vel foliis angustioribus obsiti.*

a) *In ramulis validis foliorum latitudo* = 0,430 — 0,260 *longitudinis* (*in ramulis brevibus* — 0,430 — 0,320).

Var. latifolium. *Folia supra lutescenti-viridia rubore castaneo-purpureo*, *subtus subglabra*, *subrectangulo-nervosa*. *Stamina brevia*, *tubus 20 mm. longus et 5 mm. latus*. Caucasus.

Variantia 1. *Ramulorum validorum folia superiora acuminata*, *usque 150 mm. longa*; *laminarum latitudo* = 0,430 — 0,266 + 0,420 — 0,330 *longitudinis*. In hunc locum *forma brevistylum*: *stylus brevis*, *stamina stylo aequilonga*, *corollae mediocri magnitudine*, *citrinae lobo luteo*, *lobi angusti*, *sepala 4 — 5 mm. longa*; flor. 20/VI.

Variantia 2. *Ramulorum validorum folia superiora rotundato-acuta*, *usque 135 mm. longa*; *laminarum latitudo* = 0,400 — 0,260 + 0,427 — 0,320 *longitudinis*. *Stylus mediocri iongitudine*, *corollae magnae*, *flavae lobo luteo*, *lobi lati*, *sepala 5 — 7 mm. longa*. Flor. 19/VI.

b) *Formae angustifoliae*: *in ramulis validis foliorum latitudo* 0,380 *longitudinis non excedit*.

a) *Ramulorum validorum folia superiora a medio arcuato-acuminata* *folia inferiora — acuminata vel acuta*.

Var. acuminatum. Caucasus.

Forma pubescens: *folia subtus ex toto pilis obsita*. *Corollae magnae*.

Variantia 1: *folia supra viridia rubore purpureo-castaneo extrema aestate ea plus minusve omnino perfundente*, *subtus nervo primario (petioloque) purpureo*; *nervis secundariis adscendentibus*. — *Folia 150 mm. usque longa*, *laminarum latitudo* = 0,300 — 0,185 + 0,350 — 0,162 *longitudinis*. *Corollae luteae lobo aurantiaco*, *lobi angusti*, *tubus 18 mm. longus et 5 mm. latus*, *stylus brevis vel mediocris*, *stamina longa*, *sepala 7 mm. usque longa*. Flor. 15/VI.

Variantiae 2 et 3: *folia supra laete-viridia leví rubore purpureo-castaneo vel purpureo persistente vel evanescente*, *subtus nervo primario (petioloque) viridi*, *subrectangulo-nervosa*.

Variantia 2. *Folia 140 mm. usque longa*, *laminarum longitududo* = 0,355 — 0,226 + 0,360 — 0,245 *longitudinis*. *Corollae citrinae lobo luteo*, *lobi lati*, *tubus 20 mm. longus et 4 mm. latus*, *stylus brevis vel mediocris*, *stamina brevia*, *sepala 4 mm. usque longa*. Flor. 19/VI.

Variantia 3. *Folia 165 mm. usque longa*, *laminarum latitudo* = 0,250 — 0,213 + 0,346 — 0,220 *longitudinis*. *Corollae luteae lobo aurantiaco*, *lobi angusti*, *tubus 23 mm. longus et 5 mm. latus*, *stylus mediocris nihilominus stamine mediocri longitudine superans*, *sepala 3 mm. longa*. Flor. 16/VI.

Forma pilosum: *folia subtus venulis pilosiusculis*, *nervis secundariis pilosis*, *nervo primario piloso pubescente*.

Variantia 1: *foliorum nervi secundarii adscendentes*. *Folia supra laete-viridia extrema aestate levi rubore purpureo-castaneo*, *subtus nervo primario (petioloque) plus minusve purpureo*, *usque ad 160 mm. longa*, *laminarum latitudo* = 0,336 — 0,200 + (0,476) 0,370 — 0,250 *longitudinis*. In hunc locum *forma longistylum*: *stylus longus*, *stamina mediocri longitudine*; *corollae mediocres luteae lobo aurantiaco*, *lobi angusti*, *tubus 18 mm. longus et 5 mm. latus*, *sepala usque 5 mm. longa*; flor. 15/VI.

Variantiae 2 et 3: *folia subrectangulo-nervosa*.

Variantia 2. *Folia supra viridia saturo rubore purpurascenti-castaneo*, *subtus nervo primario (petioloque) viridi*; *usque 150 mm. longa*, *laminarum latitudo* = 0,250 — 0,200 + 0,300 — 0,200 *longitudinis*. In hunc locum *forma brevistamineum*: *stamina brevia*, *stylus mediocri longitudine*, *corollae permagnae*, *citrinae lobo luteo*, *lobi mediocri latitudine*, *tubus 22 mm. longus et 4 mm. latus*, *sepala 7 mm. usque longa*; flor. 19/VI.

Variantia 3. *Folia supra pure viridia*, 145 mm. *usque longa*, *laminarum latitudo* = 0,305 — 0,164 + 0,400 — 0,246 *longitudinis*. In hunc locum — *forma parviflorum*: *corollae parvae*, *flavae lobo luteo*, *lobi angustissimi (8 — 10 mm. lati)*, *tubus 20 mm. longus et 4 mm. latus*, *sepala usque 6 mm. longa*, *stylus mediocris nihilominus stamine mediocri longitudine superans*; flor. 20/VI.

Variantia 3. *Folia supra pure viridia*, 145 mm. *usque longa*, *laminarum latitudo* = 0,305 — 0,164 + 0,400 — 0,246 *longitudinis*. In hunc locum — *forma parviflorum*: *corollae parvae*, *flavae lobo luteo*, *lobi angustissimi (8 — 10 mm. lati)*, *tubus 20 mm. longus et 4 mm. latus*, *sepala usque 6 mm. longa*, *stylus mediocris nihilominus stamine mediocri longitudine superans*; flor. 20/VI.

Forma glabrescens: *folia subtus nervis secundariis pilo uno altero que obsitis nervoque primario piloso vel tantum basin versus pubescenti exceptis glaberrima*. *Stylus mediocri longitudine*, *stamina brevia*.

Variantiae 1 et 2: *folia supra lutescenti-viridia rubore diluto demum evanescente vel haudsatu (permanente) purpurascenti*, *petiolo plus minusve lutescenti-purpureo*; *foliorum nervi secundarii adscendententes*.

Variantia 1. *Folia nitidissima*, 140 mm. *usque longa*, *laminarum latitudo* = 0,357 — 0,182 + 0,420 — 0,214 *longitudinis*, *petiolo (subtusque nervo primario) acriter purpureo*. *Corollae permagnae*, *flavae lobo luteo*, *lobi lati*, *tubus 18 mm. longus et 5 mm. latus*, *sepala 5 — 7 mm. longa*. Flor. 16/VI.

Variantia 2. Folia 130 mm. usque longa, laminarum latitudo = 0,330—0,210 + 0,350 — 0,233 longitudinis. Corollae mediocri magnitudine, luteae lobo aurantiaco, lobi angusti, tubus 18 mm. longus et 4 mm. latus, sepala 5 mm. longa. Flor. 15/VI.

Variantia 3; folia supra viridia rubore plus minusve saturo purpurascenti, petiolo (subtusque nero primario) viridi, subrectangulo-nervosa. Folia usque 135 mm. longa, laminarum latitudo = 0,327 — 0,232 + 0,343 — 0,233 longitudinis. Corollae magnae, citrinae lobo luteo, lobi mediocri latitudine, tubus 19 mm. longus et 5 mm. latus, sepala 6 mm. usque longa. Flor. 19/VI.

β) Ramulorum validorum folia superiora breviter arcuato-acuta, olia inferiora — apice plus minusve rotundata.

Var. acutum. Folia subtus parce pilosa, subrectangulo-nervosa. Caucasus.

Variantia 1. Folia supra laete-viridia, demum diluto rubore purpurascenti-castaneo, petiolo (subtusque nero primario) purpurascenti. Folia usque 160 mm. longa, laminarum latitudo = 0,380 — 0,250 + 0,340 — 0,234 longitudinis. Corollae mediocri magnitudine, parvaefere, luteae lobo aurantiaco, lobi angusti, tubus 15 mm. longus et 4 mm. latus, stylus mediocris, stamna brevia, sepala 5—8 mm. longa. Flor. 19/VI.

Variantia 2. Folia supra pure lutescenti-viridia, 150 mm. usque longa, laminae latitudo = 0,368 — 0,250 + (0,544) 0,414 — 0,259 longitudinis. Flores?

γ) Ramulorum validorum folia superiora omnia aut certo nonnulla apice rotundato-acuta vel rotundato-mucronata.

Var. obtusiusculum. Folia rubore purpureo vel purpurascenti-castaneo extrema aestate accidente et se diffundente suffusa, haud magna (laminarum longitududo vulgo 135 mm. non excedit), plus minusve exacte subrectangulo-nervosa. Caucasus et Volhynia.

Forma calvescens: folia subtus nervis secundariis pilo uno altero que obsitis nervoque primario piloso vel tantum basin versus pubescenti exceptis glaberrima; Volhynia. Folia supra acriter viridia rubore purpurascenti-castaneo, usque 140 mm. longa, laminarum latitudo = 0,325 — 0,232 + 0,343 — 0,225 longitudinis. Corollae mediocri magnitudine, flavae lobo aurantiaco, lobi angusti, tubus 21 mm. longus et 5 mm. latus, stylus mediocri longitudine, nihilominus stamna mediocria superans, sepala usque 5 mm. longa. Flor. 22/VI. Frondis color autumnalis pulcherrimus ex miniato-purpureo luteo-aurantiacoque varius.

Forma raripilum: folia subtus venulis parcissime pilosis, nervis secundariis pilosis, nero primario piloso pubescente. Corollae luteae lobo aurantiaco.

Variantia 1. Folia supra lutescenti-viridia rubore purpurascenti, petiolo (et subtus nero primario) acriter purpureo; 140 mm. usque longa, laminarum latitudo = 0,319 — 0,183 + 0,330 — 0,283 longitudinis. In hunc locum — forma brevitubulatum: corollae mediocri magnitudine, lobi lati, tubus circiter 13 mm. longus et 5 mm. latus, stylus mediocris nihilominus stamna mediocri longitudine superans, sepala 9 mm. usque longa; flor. 15/VI; Caucasus.

Variantia 2. Folia supra laete-viridia rubore purpurascenti, usque 120 mm. longa, laminarum latitudo = 0,362 — 0,210 + 0,356 — 0,263 longitudinis. Surculi hispidissimi. — Etiam hic forma longistylum: stylus longus, stamna mediocria vel longa fere, corollae mediocri magnitudine, lobi angusti, tubus 20 mm. longus et 4 mm. latus, sepala usque 5 mm. longa; flor. 15/VI; Caucasus.

Variantia 3. Folia supra viridia rubore purpurascenti-castaneo, 150 mm. usque longa, laminarum latitudo = 0,352 — 0,192 + 0,428 — 0,250 longitudinis. Corollae magnae, lobi lati, tubus 18 mm. longus et 5 mm. latus, stylus mediocris, sed stamna mediocri longitudine superans, sepala usque 4 mm. longa. Flor. 22/VI. Frondis color autumnalis pulcherrimus vinoso-purpureus.

Forma vestitum: folia subtus ex toto pilis obsita; Volhynia.

*) Ramulorum validorum omnia ad unum folia apice rotundato-mucronata:

Subforma **tholiforme**, folia supra rubore purpurascenti-castaneo, 120 mm. usque longa, laminarum latitudo = 0,306 — 0,226 + 0,343 — 0,275 longitudinis; corollae magnae, permagnae fere, luteae lobo aurantiaco, lobi lati, tubus 20 mm. longus et 5 mm. latus, stylus mediocri longitudine, stamna mediocria vel longa fere, sepala 5 mm. usque longa; flor. 24/VI; frondis color autumnalis pulcherrimus purpureo-miniatus.

**) Partim e foliis superioribus ramulorum validorum apice rotundato-acuta rotundatave.

Variantia 1: folia supra opaca pallide viridia, — rubore castaneo purpureo; 120 mm. usque longa, laminarum latitudo = (0,372) 0,333 — 0,210 + 0,380 — 0,237 longitudinis. Corollae magnae, citrinae lobo luteo, lobi mediocri latitudine, tubus 17 mm. longus et 4 mm. latus, stylus mediocris, stamna brevia, sepala 4 mm. usque longa. Flor. 26/VI.

Variantiae 2 et: folia supra viridia.

Variantia 2. Folia supra rubore purpurascenti, 105 mm. usque longa, laminarum latitudo = 0,338 — 0,283 + 0,325 — 0,200 longitudinis. In hunc locum — forma vagum: stylus nunc brevis lobis staminibusque aequilongus, nunc mediocris et quam stamna longior, corollae luteae lobo aurantiaco, lobi angusti vel lati, tubus 15 mm. longus et 5 mm. latus, sepala 5 mm. usque longa; flor. 22/VI.

Variantia 3. Folia supra rubore brunneolo-purpureo, petiolo (nervoque primario subtus) intense purpureo, 110 mm. usque longa, laminarum latitudo = 0,312 — 0,205 + (0,442) 0,355 — 0,222 longitudinis. In hunc locum — forma angustilobum: corollae mediocri longitudine, luteae lobo aurantiaco, lobi angustissimi, tubus 24 mm. longus et 4 mm. latus, stylus longus, stamna brevia, sepala 5 mm. usque longa; flor. 22/VI.

Сарифек Агамов.

К вопросу о кутикулярной транспирации.

I. Введение.

Несмотря на то, что вопросу о кутикулярной транспирации у растений посвящено несколько крупных работ, однако сущность и характер ее еще далеко не выяснены окончательно.

Еще в 1849 году Garreau отметил проницаемость кутикулы для жидкостей и газов, что затем подтверждалось многократно почти во всех последующих работах, посвященных эпидермальной транспирации. K. Rudolph (1) и Н. А. Максимов (2) приводят подробный обзор имеющейся литературы по данному вопросу; поэтому я ограничусь лишь приведением данных, положенных в основу моих изысканий.

Rudolph в своей работе, посвященной специально эпидермальной транспирации, пользуясь опытом своих предшественников и их методическими достижениями, выработал свою оригинальную методику и дал целый ряд новых данных. Он установил определенную зависимость между интенсивностью транспирации и толщиной кутикулы. Такую же зависимость он обнаружил между толщиной кутикулы и пропускной способностью кутинизованных оболочек для разных ядовитых веществ, в особенности кислот (его „Giftmethode“). Вначале он применял для этого растворы ядовитых солей, но скоро отказался от этого, вследствие специфичности действия их на разные объекты. Более определенные результаты получились с минеральными кислотами. Водородные ионы этих кислот, являющиеся главной причиной их ядовитого действия, легко проникают через кожистый слой протоплазмы (Pfeffer, Ruhland). Действие их столь сильно, что концентрация $p: 6400$ явно вредит плазме (Czapek). При употреблении сильных кислот ($3,7\% HCl$ и $5\% H_2SO_4$) протоплазма тканей листа умирает, как только кислота проникает через кутикулу и наружную стенку эпидермиса и, таким образом, скорость умирания ткани листа стоит в прямой зависимости от скорости проникновения кислоты. Умирание ткани констатируется легко по изменению окраски (побурение). Осмотическое давление клеточного сока и устьица никакой роли в проникновении кислот не играют. Часто изменение окраски листа начинается неравномерно, что заметил еще Schröder (3). Вначале появляются отдельные небольшие пятна (чаще всего

над нервацией), которые потом сливаются друг с другом в более крупные. Это особенно характерно для листьев с толстой кутикулой, листья же с тонкой кутикулой обычно буреют равномерно. Rudolph полагает, что только при слабой кутикуле кислота фильтруется через кутикулу, а у листьев с сильной кутикулой она, главным образом, распространяется под кутикулой, попав туда через участок листа с менее совершенной изоляцией (пятна). Разница между толстой и тонкой кутикулой яснее тогда, когда совершенно исключена возможность подкутикулярного распространения кислоты, для чего при выборе испытуемого материала надлежит особенное внимание обращать на цельность и сохранность кутикулы.

В одной из таблиц, которую я считаю ненужным привести здесь, Rudolph дает время побурения листьев с кутикулой различной мощности, погруженных в $5\% H_2SO_4$:

Листья с толстой кутикулой:

<i>Aspidistra elatior</i>	180 час.
<i>Opuntia rhodantha</i>	120 час.
<i>Aloe arborescens</i>	90 час.
<i>Aucuba japonica</i>	46 час.
<i>Agave striata</i>	28 час. и т. д.

Листья с нормальной кутикулой:

<i>Aloe cymbifolia</i>	14 час.
<i>Peperomia obtusifolia</i>	8 час.
<i>Bulbine frutescens</i>	5 час. и т. д.

Листья с тонкой кутикулой:

<i>Ludwigia spec.</i>	25 мин.
<i>Cabomba aquatica</i>	20 мин.
<i>Trianea bogotensis</i>	3 мин.
<i>Elodea canadensis</i>	2 мин. и т. д.

Приблизительно такую же последовательность имел Rudolph при определении быстроты отдачи воды растениями, в зависимости от толщины или иной степени развития кутикулы.

Как весьма заметные отступления от общего правила отмечены им *Agave striata*, различные *Crassulaceae*, *Begonia rubella* и *Tradescantia zebrina*.

Первая, имея толстую кутикулу, погибает сравнительно скоро (см. таблицу), а остальные, несмотря на незначительную толщину кутикулы и сравнительную проницаемость ее, отдают воду подобно суккулентам чрезвычайно медленно и, с замазанной нижней стороной долго не вянут.

Много внимания уделено Rudolph'ом вопросу о локализации кутикулярной транспирации. Положив в основу своих изысканий данные Buscaglioni и Pollacci (4), которые при помощи разработанного ими коллоидонного метода обнаружили, что кутикулярная транспирация идет, главным образом, по радиальным стенкам эпидермиса, по антиклиналам, он при помощи целого ряда своих собственных методов, главным образом основанных на диффузии внутрь клеточной стенки солей, дающих цветные осадки (берлинская лазурь, турнбулева синь и др.) подтвердил эти данные на разнообразном материале. Он

применил также несколько других, весьма своеобразных методов, как напр. искусственное подкрашивание листа раствором гентиана-виолетт (как индикатора), распыление мелкого порошка *Nachtblau*, жадно соединяющегося с водою, на поверхности листа и т. д.

При помощи своего „Giftmethode“ Rudolph проверил также теорию Wiesner'a о повышении транспирации и вообще пропускной способности растянутых клеточных стенок. Кусочки листа, растянутые в особых аппаратах, построенных по принципу Schwendener'a, погружал он в 3,7% HCl вместе с контрольными (не растянутыми) и наблюдал, что растянутые кусочки листа погибали значительно раньше.

Некоторое отношение к первой части моей работы имеют данные и выводы А. Ничипоровича (5). Определяя транспирацию срезанных листьев растений разных экологических групп, он пришел к тем же выводам, к каким позже пришел и я. Среди прочих выводов, у него мы имеем:

1) У ксерофитов отдача воды быстро сокращается и удерживается на очень низком уровне, несмотря на напряжение внешних факторов.

2) У мезофитов за сокращением транспирации наступает резкий подъем, сменяющийся через некоторое время вторичным сокращением.

Главной целью настоящей моей работы было: выделить кутикулярную транспирацию, как таковую, из „суммарной транспирации“, дав ей соответствующую характеристику, и еще раз проверить на новом материале имеющиеся в литературе несколько разноречивые данные о кутикулярной транспирации.

Работа выполнена летом 1926 года под руководством проф. Н. А. Максимова в лаборатории экспериментальной морфологии и экологии Главного Ботанического Сада С. С. С. Р., с любезного разрешения академика В. Л. Комарова. Считаю своим приятным долгом выразить им здесь глубокую благодарность. Спешу выразить свою признательность также сотрудникам лаборатории Е. В. Лебединцевой и С. И. Кокиной за дружеское содействие, которое я всегда встречал с их стороны.

2. Методика.

Самой трудной и важной задачей было нахождение и выработка вполне подходящей и точной методики учета кутикулярной транспирации.

За основу был взят мной весовой метод, детали которого, однако, по ходу работы пришлось перерабатывать несколько раз, с целью подойти как можно ближе к истинной природе кутикулярной транспирации.

Вначале работа велась следующим образом: специально выращенные для этого в оранжерее растения доводились до состояния завядания, при котором устьица обычно закрываются (у большинства растений). Испытывались отдельно срезанные листья и целые растения в горшках. Горшки испытываемых растений тщательно обвязывались шарами-пилотами (Максимов) для предотвращения испарения

с поверхности почвы и горшка. Срезанные листья, у которых черешки и места срезов обмазывались вазелином, для изъятия их из общей площади транспирации, помещались на особые пронумерованные медные сеточки (с ячейками в 3 мм.), которые в свою очередь размещались на особых проволочных полках, с большими ячейми. Так как перекладка и перетрясание сильно отзываются на транспирации. (А. Ничипорович), листья взвешивались вместе с тарированными сеточками. Сначала листья испытывались в темноте (в шкафу, на проволочных полках) и на свету, под лучами 1000-ватной лампы (на тех же полочках), потому что при таком искусственном освещении внешние условия опыта были более или менее постоянными. Вскоре однако я убедился, что действием света лампы я вызываю раскрытие щели даже у завядающих листьев, и в дальнейшем стал вести опыт исключительно в темноте. Растения, предназначенные к испытанию, помещались за сутки до испытания в условия сухости и темноты, способствовавших закрытию устьиц (полив прекращал значительно раньше и к началу опыта растения были уже завявшими). В помещении, где производились опыты, измерялась t° и определялась относительная влажность воздуха психрометром Ассмана¹). Взвешивались растения на больших и малых технических весах. Первые весы, имевшие чувствительность до 0,02 гр., служили для взвешивания целых растений, на вторых, с точностью до 0,01 гр., взвешивались срезанные листья. Взвешивание производилось через каждый час. Результаты взвешиваний, как обычно, пересчитывались на 1 кв. дециметр листовой поверхности, которая определялась при помощи планиметра.

После того, как я определил указанным способом транспирацию 35 видов на срезанных листьях, и 25 видов на целых растениях, причем большинство растений испытывалось не менее 5 раз, я убедился в несовершенстве моей методики, и подверг ее коренной переработке. Главной причиной моего решения было то, что испытание устьиц у завядающих листьев при помощи метода инфильтрации обнаруживало щель, через которую явственно проникал реагент если не сразу, то через несколько минут. Таким образом, при устьицах, закрытых не идеально, не герметически, о чистой кутикулярной транспирации не могло быть и речи. После некоторых исканий и колебаний, я избрал другой, как мне кажется, более совершенный путь. У специально подобранных (по известной книге Solereder'a) листьев, имеющих устьица лишь на одной стороне пластинки, эта сторона выключалась из транспирации при помощи замазки Haberlandt'a (3 ч. воска и 1 ч. масла какао, в которой я иногда масло какао с успехом заменял вазелином), для чего срезанные листья налеплялись нижней поверхностью на мягкую замазку, которая покрывала не толстым слоем кусок пергаментной бумаги. Способ этот оказался более удобным и надежным, чем просто покрытие замазкой нижней поверхности листьев, и я после нескольких проб остановился именно на нем.

До начала опытов с изоляцией устьиц была испытана пригодность самой замазки, причем потеря в весе в течение суток у нее

¹) Колебания относительной влажности в лаборатории в течение всего периода работы оказались в общем незначительными.

ТАБЛИЦА 1.

 $t^{\circ} = 19^{\circ}\text{C}$. Относ. влажн. = 43%.

	1-й час	2-й час	3-й час	4-й час	5-й час	6-й час
<i>Salvia austriaca</i> L.	0,116	0,107	0,106	0,134	0,092	0,041
<i>Verbascum thapsiforme</i> Schrad	0,066	0,016	0,083	0,033	0,025	0,011
<i>Phaseolus</i> sp.	0,153	0,071	0,095	0,037	0,014	0,009
<i>Xanthium strumarium</i> L.	0,141	0,135	0,104	0,182	0,085	0,043
<i>Zygophillum fabago</i> L.	0,090	0,076	0,115	0,053	0,032	0,011
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	0,076	0,057	0,038	0,103	0,057	0,021
<i>Ampelopsis</i> sp.	0,038	0,037	0,021	0,057	0,057	0,013
<i>Echynops sphaerocapillus</i> L.	0,041	0,022	0,033	0,020	0,011	0,009
<i>Geum urbanum</i> G.	0,063	0,040	0,062	0,041	0,013	0,013
<i>Salvia nutans</i> L.	0,072	0,053	0,022	0,093	0,035	0,027
<i>Xeranthemum annuum</i> L.	0,095	0,063	0,044	0,067	0,063	0,034
<i>Sonchus arvensis</i> L.	0,104	0,147	0,035	0,024	0,021	0,013

Весьма возможно, что эти колебания имеют более простую природу и вызываются какими-либо едва заметными движениями устьиц, что не исключено и у завядающих листьев.

У некоторых растений (не много) целый ряд весовых определений не обнаружил колебаний в интенсивности транспирации, которая у них плавно и равномерно затухала. Эти колебания привожу на таблице 2.

ТАБЛИЦА 2.

 $t^{\circ} = 19,2^{\circ}\text{C}$. Относ. влажн. = 41%.

	1-й час	2-й час	3-й час	4-й час	5-й час	6-й час
<i>Cynanchum acutum</i> L.	0,031	0,031	0,026	0,015	0,012	0,009
<i>Androsace elongata</i> L.	0,062	0,056	0,044	0,036	0,011	0,008
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	0,063	0,061	0,045	0,028	0,014	0,010
<i>Soja hispida</i>	0,243	0,192	0,206	0,101	0,094	0,072

У другой небольшой группы наблюдаемые в нескольких сериях весовых определений правильно чередующиеся повышения и понижения в интенсивности транспирации напомнили мне указания Nicolic'a (8) о ритмическом движении устьиц. В качестве примеров приведу:

ТАБЛИЦА 3.

 $t^{\circ} = 18,8^{\circ}\text{C}$. Относ. влажн. = 41%.

	1-й час	2-й час	3-й час	4-й час	5-й час	6-й час
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	0,057	0,143	0,057	0,123	0,033	0,012
<i>Salvia austriaca</i> L.	0,076	0,083	0,116	0,066	0,068	0,056
<i>Centaurea axillaris</i> Willd.	0,062	0,038	0,060	0,016	0,019	0,010
<i>Physalis alkekengi</i> L.	0,066	0,044	0,058	0,016	0,022	0,012

ТАБЛИЦА 4.

 $t^{\circ} = 18,6^{\circ}\text{C}$. Относ. влажн. = 44%.

	1-й час	2-й час	3-й час	4-й час	5-й час	6-й час
<i>Alhagi camelorum</i> Fisch.	0,086	0,083	0,064	0,057	0,032	0,031
<i>Aster</i> sp.	0,042	0,051	0,010	0,021	0,018	0,011
<i>Centaurea orientalis</i> L.	0,092	0,064	0,054	0,042	0,033	0,081
<i>Cerinthe major</i> L.	0,055	0,027	0,018	0,008	0,006	0,004
<i>Euphorbia virgata</i> W. K.	0,023	0,018	0,019	0,012	0,011	0,007
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	0,108	0,100	0,093	0,018	0,010	0,009
<i>Lamium album</i> L.	0,062	0,063	0,060	0,011	0,010	0,009
<i>Onopordon acanthium</i> L.	0,060	0,075	0,043	0,031	0,023	0,013
<i>Paeonia anomala</i> L.	0,025	0,022	0,020	0,012	0,010	0,008
<i>Potentilla recta</i> L.	0,106	0,083	0,031	0,031	0,012	0,009
<i>Ranunculus acer</i> L.	0,121	0,070	0,088	0,067	0,046	0,023
<i>Spiraea sorbifolia</i> L.	0,083	0,084	0,062	0,059	0,051	0,031
<i>Stachys tuberosa</i>	0,101	0,061	0,042	0,023	0,025	0,011
<i>Soja hispida</i>	0,233	0,233	0,183	0,103	0,092	0,051
<i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	0,112	0,101	0,096	0,081	0,021	0,011

Здесь мы имеем два повышения и два понижения, разделенных друг от друга равными промежутками времени.

Абсолютные весовые данные для остальных растений, полученные по методу срезанных листьев, сведены в таблице 4 в алфавитном порядке, причем для каждого вида привожу один протокол, по возможности близкий к равнодействующей всех остальных.

Все эти растения были испытаны также и на проницаемость кутикулы путем погружения листьев в 5% H_2SO_4 ; количество времени, необходимое до побурения листьев, указано в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5.

<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	1 ч. 40 м.
<i>Alhagi camelorum</i> Fisch.	2 ч. 40
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	— . 06
<i>Ampelopsis</i> sp.	1 ч. 14
<i>Androsace elongata</i> L.	1 ч. 15
<i>Aster</i> sp.	3 ч. 25
<i>Centaurea axillaris</i> Willd.	— . 46
<i>orientalis</i> L.	— . 50
<i>Cerinthe major</i> L.	2 ч. 15
<i>Cynanchum acutum</i> L.	4 ч. 50
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	1 ч. 08
<i>Salvia austriaca</i> L.	— . 45
<i>nutans</i> L.	— . 48
<i>Sonchus arvensis</i> L.	— . 29
<i>Spiraea sorbifolia</i> L.	— . 35
<i>Stachys tuberosa</i>	1 ч. 05

<i>Echynops sphaerocephalus</i> L.	2 ч. 48 м.
<i>Euphorbia virgata</i> W. K.	1 ч. 06
<i>Geum urbanum</i> L.	1 ч. 15
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	— . 07
<i>Lamium album</i> L.	1 ч. 03
<i>Onopordon acanthium</i> L.	1 ч. 10
<i>Paeonia anomala</i> L.	6 ч. 45
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	— . 37
<i>Physalis alkekengi</i> L.	1 ч. 04
<i>Potentilla recta</i> L.	2 ч. —
<i>Ranunculus acer</i> L.	— . 37
<i>Soja hispida</i>	— . 33
<i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	1 ч. 12
<i>Verbascum thapsiforme</i> Schrad.	— . 52
<i>Xanthium strumarium</i> L.	— . 33
<i>Xeranthemum annuum</i> L.	1 ч. 10

Что транспирация почти всех упомянутых завядающих листьев заметной своей частью была кутикулярной, можно усмотреть в некоторой зависимости ее от проницаемости кутикулы.

Для того, чтобы сделать показательнее эту зависимость, а также облегчить ориентировку в проводимом довольно громоздком цифровом материале, я решил прибегнуть к следующей упрощенной сводке.

Сначала в зависимости от толщины, или вернее, от проницаемости кутикулы для кислот я разбил все листья на 4 группы, положив в основу группировки следующее: в первую группу я включил листья, погибающие в 5% H_2SO_4 в промежуток времени от 0 до 40 минут, во 2-ю группу—от 40 мин. до 1 ч. 20 мин., в 3-ю группу—от 1 ч. 20 мин. до 3 час. и в 4-ю группу—от 3 ч. и более. Затем, руководствуясь абсолютной величиной транспирации, вычисленной в граммах в час на 1 кв. дециметр, я снова разбил листья на другие 4 группы:

1-я группа с интенсивн. транспирации (в среднем для 3-х первых взвешиваний) — более 0,10.

2-я группа с интенсивн. транспирации (в среднем для 3-х первых взвешиваний) — от 0,10 до 0,05.

3-я группа с интенсивн. транспирации (в среднем для 3-х первых взвешиваний) — от 0,05 до 0,01.

4-я группа с интенсивн. транспирации (в среднем для 3-х первых взвешиваний) — менее 0,01.

Порядковые номера групп первого ряда были отмечены арабскими цифрами, а группы второго ряда римскими.

В преобладающем большинстве случаев порядковые номера групп, с одной стороны характеризующие проницаемость кутикулы, а с другой стороны интенсивность транспирации растения, оказывались равнозначущими. Эта упрощенная классификация данных, хотя и со случайным критерием для групп, все же, как мне кажется, много облегчает ориентировку в предлагаемом материале.

ТАБЛИЦА 5.

Название растения	Группы по проницаемости кутикулы	Группы по интенсивности транспирации	Название растения	Группы по проницаемости кутикулы	Группы по интенсивности транспирации
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	3	III	<i>Onopordon acanthium</i> L.	2	I
<i>Alhagi camelorum</i> Fisch.	4	II	<i>Paeonia anomala</i> L.	4	III
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	1	II	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	1	I
<i>Ampelopsis</i> sp.	2	I	<i>Physalis alkekengi</i> L.	2	II
<i>Androsace elongata</i> L.	2	II	<i>Potentilla recta</i> L.	3	II
<i>Aster</i> sp.	4	III	<i>Ranunculus acer</i> L.	1	I
<i>Centaurea axillaris</i> Willd.	2	II	<i>Salvia austriaca</i> L.	2	I
<i>orientalis</i> L.	2	II	<i>nutans</i> L.	2	II
<i>Cerinthe major</i> L.	3	II	<i>Sonchus arvensis</i> L.	1	I
<i>Cynanchum acutum</i> L.	4	III	<i>Spiraea sorbifolia</i> L.	1	II
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	2	II	<i>Stachys tuberosa</i>	2	II
<i>Echynops sphaerocephala</i> L.	3	III	<i>Soja hispida</i>	1	I
			<i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	2	I
<i>Euphorbia virgata</i> W. K.	2	III	<i>Verbascum thapsiforme</i> Schrad.	2	II
<i>Geum urbanum</i> L.	2	II			
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	1	I	<i>Xanthium strumarium</i> L.	1	I
<i>Lamium album</i> L.	2	II	<i>Xeranthemum annuum</i> L.	2	II

Имеющиеся отступления от общего правила не многочисленны и могут быть чисто индивидуального характера. Особенно яркое отступление дало *Alhagi camelorum* 4/II, которое обяснять не трудно биологическими особенностями этого интересного растения, обладающего мало проницаемой кутикулой, но в то же время высокой интенсивностью транспирации.

Содержание воды в стенках сильно отражалось на интенсивности транспирации. Особенно выявилось это при испытании растений, специально выращенных в различных условиях влажности воздуха и почвы и любезно предоставленных мне Е. В. Лебединцевой и С. И. Кокиной из обрабатываемого ими лично опытного материала. Привожу средние цифры ряда испытаний:

ТАБЛИЦА 6
Отн. влажн. 4%, $t = 18,8^\circ\text{C}$.

	1-й час	2-й час	3-й час	4-й час	5-й час	6-й час
<i>Phaseolus vulgaris</i> L. лист растения, выращенного в сухой атмосфере . . .	0,085	0,085	0,023	0,043	0,011	0,009
<i>Phaseolus vulgaris</i> L. выращенного во влажной атмосфере	0,285	0,242	0,106	0,041	0,002	0,001
<i>Soja hispida</i> лист растения, выращенного при малой влажности почвы . . .	0,266	0,264	0,133	0,111	0,099	—
<i>Soja hispida</i> при оптимальн. влажн. почвы	0,806	0,985	0,080	0,038	0,021	—
<i>Soja hispida</i> при избыточной влажн. почвы	1,333	0,633	0,133	0,033	0,0	—

Весьма близкое соотношение было получено также и у экземпляров *Amaranthus retroflexus* из влажной и сухой камеры. В обоих приведенных здесь случаях, как и во всех остальных, растения влажных мест, испаряя вначале большое количество воды, через несколько часов или совершенно прекращали отдачу воды, или отдавали ее в очень небольшом количестве, сильно отставая от растений, выросших в условиях сухости. И в то время, как последние были еще мягки и продолжали слабо транспирировать, листья растений влажных мест оказывались совершенно сухими.

У целых растений, испытанных в горшках, интенсивность транспирации в стадии завядания оказалась весьма близкой к таковой срезанных листьев.

Абсолютные данные их были лишь несколько выше, что обясняю во-первых, несомненным участием в транспирации неучтеннной поверхности стебля и черешков (верхушки с молодыми листочками удалялись, а срез замазывался вазелином), во вторых, недостаточной изолировкой горшков при помощи шаров-пилотов (вследствие некоторых морфологических особенностей самих растений). В горшках были испытаны следующие растения:

Agrimonia eupatoria L.

Alhagi camelorum Fisch.

Androsace elongata L.

Aster sp.

Centaurea axillaris Willd.

" *orientalis* L.

Cerinthe major L.

Cynanchum acutum L.

Cynoglossum officinale L.

Echynops sphaerocephalus L.

Euphorbia virgata W. K.

Onopordon acanthium L.

Phaseolus vulgaris L.

Physalis alkekengi L.

Potentilla recta L.

Ranunculus acer L.

Salvia austriaca L.

" *nutans* L.

Sedum spectabile.

Stachys tuberosa.

Verbasacum thapsiforme Schrad.

Xanthium strumarium L.

Xeranthemum annuum L.

Zygophyllum fabago L.

Ввиду того, что большой цифровой материал этого варианта, обладая указанным недостатком, не дает ничего существенного по сравнению с данными опытов со срезанными листьями, я не включаю его в настоящую главу.

Так как на транспирации завядающих растений с устьицами лишь относительно закрытыми, явно оказывается еще некоторое влияние устьичных движений, то я не решаюсь называть ее кутикулярной. Справедливость такой оценки приведенного материала подтверждается опытным материалом следующей главы.

4. Результаты опытов над листьями с замазанными устьицами.

Совершенно иного характера транспирация наблюдалась при совершенном изолировании устьиц. Я испытал свыше 40 видов растений с устьицами только на нижней стороне листовой пластинки, где они были изолированы замазкой Haberlandt'a указанным выше способом. Здесь я имел дело уже с действительно кутикулярной транспирацией, вне всякого влияния устьиц. Наблюдения велись при искусственном освещении и нагревании электрической лампой в 1000 ватт, при $t = 32^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 39—43%.

Высокая температура, сопровождавшая опыт, несколько утрировала обычный ход транспирации, почему приведенные здесь цифры должны быть несколько выше нормальных. Такая небольшая утрировка, несколько изменившая абсолютные величины, не могла извратить самой природы кутикулярной транспирации, как таковой, ее характерных особенностей.

Из них в первую очередь я должен отметить наличие плавного и равномерно-постепенного понижения интенсивности транспирации в течение опыта, без заметных скачков, всегда сопровождавших предшествующие опыты.

Это плавное понижение обусловлено, несомненно, постепенным убыванием количества воды в самой кутикуле. Все цифровые данные (по одному среднему протоколу для каждого вида) сведены в таблице 7. Взвешивания производились через час.

ТАБЛИЦА 7

	1-й час	2-й час	3-й час	4-й час	5-й час	6-й час
<i>Acanthus longifolius</i> Potr.	0,092	0,079	0,060	0,044	0,020	0,010
<i>Acer platanoides</i> L.	0,106	0,083	0,062	0,042	0,032	0,024
<i>Actaea spicata</i> L.	0,101	0,083	0,079	0,063	0,060	0,043
<i>Aesculus glabra</i> Willd.	0,093	0,082	0,073	0,054	0,021	0,018
<i>octandra</i> Marsch.	0,076	0,062	0,041	0,033	0,021	0,019
<i>Atropa belladonna</i> L.	0,127	0,090	0,060	0,051	0,043	0,032
<i>Berberis aquifolius</i> Mutt.	0,034	0,026	0,021	0,017	0,010	0,006
<i>Bignonia Lindleyi</i> DC.	0,083	0,063	0,043	0,033	0,023	0,016
<i>Cornus alba</i> L.	0,072	0,034	0,026	0,018	0,016	0,010
<i>Croton cascarilla</i> Benn.	0,057	0,048	0,040	0,022	0,012	0,008
<i>Diclitra spectabilis</i> DC.	0,109	0,075	0,054	0,021	0,019	0,016
<i>Digitalis grandiflora</i> Lam.	0,102	0,087	0,062	0,034	0,016	0,010
<i>lanata</i> Ehrh.	0,060	0,045	0,036	0,018	0,012	0,011
<i>purpurea</i> L.	0,101	0,032	0,030	0,021	0,020	0,012
<i>Elaeagnus reflexa</i> E. Mor.	0,052	0,028	0,026	0,021	0,163	0,012
<i>Helleborus niger</i> L.	0,113	0,095	0,071	0,052	0,029	0,008
<i>Hypericum perforatum</i> L.	0,107	0,087	0,058	0,033	0,023	0,010
<i>Laurus nobilis</i> L.	0,144	0,012	0,011	0,006	0,006	0,005
<i>Linum flavum</i> L.	0,053	0,033	0,033	0,028	0,019	0,015
<i>Lonicera orientalis</i> Lam.	0,113	0,093	0,080	0,066	0,043	0,033
<i>Lythrum salicaria</i> L.	0,102	0,082	0,063	0,057	0,030	0,022
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	0,042	0,031	0,022	0,016	0,013	0,011
<i>Mirabilis jalappa</i> L.	0,062	0,061	0,040	0,031	0,030	0,026
<i>Passiflora foetida</i> Vell.	0,047	0,033	0,028	0,022	0,014	0,008
<i>suberosa</i> L.	0,032	0,028	0,020	0,016	0,010	0,007
<i>Paeonia anomala</i> L.	0,054	0,046	0,040	0,032	0,021	0,010

Продолжение таблицы 7

	1-й час	2-й час	3-й час	4-й час	5-й час	6-й час
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	0,086	0,063	0,043	0,036	0,031	0,021
<i>Peperomia pellucida</i> H. B. et K.	0,052	0,046	0,039	0,030	0,026	0,008
<i>rubella</i> Hook.	0,010	0,008	0,005	0,003	0,001	0,000
<i>Piper</i> sp.	0,063	0,043	0,033	0,031	0,030	0,023
<i>Podophyllum Emodi</i> Wall.	0,073	0,068	0,059	0,031	0,022	0,010
<i>Rhododendron afghanicum</i> Aith. et Hemsl.	0,032	0,030	0,023	0,021	0,016	0,009
<i>ponticum</i> L.	0,032	0,028	0,021	0,018	0,010	0,006
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	0,062	0,044	0,032	0,030	0,021	0,010
<i>Ribes Grossularia</i> L.	0,027	0,028	0,016	0,009	0,008	0,006
<i>Rosa canina</i> L.	0,018	0,009	0,008	0,008	0,006	0,004
<i>Spiraea sorbifolia</i> L.	0,073	0,057	0,028	0,026	0,020	0,016
<i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. et Zucc.	0,034	0,021	0,019	0,009	0,006	0,005
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	0,103	0,085	0,073	0,056	0,032	0,014
<i>glaucum</i> Desf.	0,063	0,053	0,048	0,015	0,013	0,012
<i>minus</i> L.	0,108	0,093	0,061	0,041	0,021	0,007
<i>Trollius europeus</i> L.	0,125	0,082	0,075	0,063	0,058	0,031
<i>Valeriana officinalis</i> L.	0,067	0,042	0,041	0,037	0,010	0,006
<i>Viburnum opulus</i> L.	0,052	0,042	0,036	0,032	0,021	0,018
<i>lantana</i> L.	0,021	0,020	0,013	0,012	0,008	0,008

Все эти растения были испытаны также и на проницаемость кутикулы по методу погружения в 5% серную кислоту. Время, прошедшее до полного отмирания листьев, указано в таблице 8.

Несколько об'ектов этой серии, испытанные в условиях завядания, без изоляции устьиц, дали также по ходу опытов соответствующие понижения и повышения транспирации, как мы имели выше. Априорные предположения о еще большей зависимости здесь интенсивности транспирации от толщины и проницаемости кутикулы на опыте вполне оправдались. Примененный и тут упрощенный прием сводки

дал более положительные и определенные результаты. Критерии для разбивки материала на группы здесь, конечно, были несколько иные. Для первого ряда групп я взял следующие значения:

Первый ряд характеризуется побурением через промежутки времени:

1 группа	до 2 часов
2	от 2 ч. до 8 ч.
3	от 8 ч. до 20 ч.
4	от 20 ч. и более

Второй ряд характеризуется интенсивностью транспирации в 1 час на кв. десим. листов. поверхности:

I группа	от 0,05 и выше
II	0,05 — 0,03
III	0,03 — 0,01
IV	0,01 и менее

ТАБЛИЦА 8

Acanthus longifolius Poir.	1 ч. 2 м.	Passiflora foetida Vell.	1	I.
Acer platanoides L.	3 . . 6 .	Acer platonoides L.	2	II.
Actaea spicata L.	1 . . 26 .	Actaea spicata L.	1	I.
Aesculus glabra Will.	1 . . 6 .	Aesculus glabra Willd.	1	II.
octandra Märsch.	1 . . 28 .	Aesculus octandra March. var. purpurascens Schm.	1	I.
Atropa belladonna L.	36 .	Atropa belladonna L.	1	I.
Berberis aquifolius Mutt.	26 .	Berberis aquifolius Mutt.	2	II.
Bignonia Lyndleyi D.C.	2 „ 15 .	Bignonia Lyndleyi D. C.	2	II.
Cornus alba L.	3 . . 19 .	Cornus albus L.	2	II.
Croton cascarilla Benn.	2 . . 50 .	Croton cascarilla Benn.	2	II.
Diclitra spectabilis D.C.	40 .	Diclitra spectabilis D. C.	1	I.
Digitalis grandiflora Lam.	33 .	Digitalis grandiflora Lam.	1	I.
lanata Ehrh.	1 . . 5 .	lanata Ehrh.	1	I.
purpurea L.	35 .	purpurea L.	1	I.
Eleagnus reflexa E. Morr.	5 . . 60 .	Elaeagnus reflexa E. Morr.	2	III.
Helleborus niger L.	1 . . 48 .	Helleborus niger L.	1	I.
Hypericum perforatum L.	35 .	Hypericum perforatum L.	1	I.
Laurus nobilis L.	17 . . 52 .	Laurus nobilis L.	4	III.
Linum flavum L.	3 . . 11 .	Linum flavum L.	2	II.
Lonicera orientalis Lam.	4 . . 32 .	Lonicera orientalis L.	2	II.
Lythrum salicaria L.	42 .	Lythrum salicaria L.	1	I.
Magnolia grandiflora L.	18 . . 25 .	Magnolia grandiflora L.	3	III.
Mirabilis jalappa L.	1 . . 30 .	Mirabilis jalappa L.	1	II.
Passiflora foetida Vell.	28 .	lantana L.	4 . . 30 .	

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЯ	Группы по прони- цаем. кутикулы	Группы по интен- сивн. транспирац.	НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЯ	Группы по прони- цаем. кутикулы	Группы по интен- сивн. транспирац.
Acanthus longifolius Poir.	1	I.	Passiflora foetida Vell.	1	II.
Acer platanoides L.	2	II.	suberosa L.	1	III.
Actaea spicata L.	1	I.	Paeonia anomala L.	2	II.
Aesculus glabra Willd.	1	II.	Peperomia pellucida H. B. et K.	1	II.
rubella Hoock.			rubella Hoock.	1	IV.
Aesculus octandra March. var. purpurascens Schm.	1	I.	Philadelphus coronarius L.	1	I.
Atropa belladonna L.	1	I.	Piper sp.	2	II.
Berberis aquifolius Mutt.	2	II.	Podophyllum Emodi Wall.	1	I.
Bignonia Lyndleyi D.C.	2	II.	Rhamnus cathartica L.	2	II.
Cornus alba L.	2	II.	Rhododendron afganicum Aith. et Hemsl.	3	III.
Croton cascarilla Benn.	2	II.	Rhododendron ponticum L.	3	III.
Diclitra spectabilis D.C.	40 .		Ribes Grossularia L.	1	III.
Digitalis grandiflora Lam.	33 .		Rosa canina L.	4	IV.
lanata Ehrh.	1 . . 5 .		Spiraea sorbifolia L.	2	II.
purpurea L.	35 .		Thalictrum aquilegifolium L.	1	I.
Eleagnus reflexa E. Morr.	5 . . 60 .		glaucum Desf.	1	I.
Helleborus niger L.	1 . . 48 .		minus L.	1	I.
Hypericum perforatum L.	35 .		Trochodendron aralioides Sieb. et Zucc.	3	III.
Laurus nobilis L.	17 . . 52 .		Trollius europeus L.	1	I.
Linum flavum L.	3 . . 11 .		Valeriana officinalis L.	1	I.
Lonicera orientalis Lam.	4 . . 32 .		Viburnum opulus L.	1	II.
Lythrum salicaria L.	42 .		lantana L.	2	III.
Magnolia grandiflora L.	18 . . 25 .				
Mirabilis jalappa L.	1 . . 30 .				
Passiflora foetida Vell.	28 .				

Соответствие между группами двух параллельных рядов здесь выявилось еще ярче. Исключения не многочисленны.

Очень яркие отклонения от общего положения, замеченные у *Ribes*, видов *Passiflora* и *Peperomia*, совершенно различного характера. В то время как у первого причина кроется в каких-либо индивидуальных особенностях, у остальных причина яснее: незначительное содержание воды в самих листьях (при значительной поверхности листовые пластинки их очень тонки и нежны).

Абсолютные величины подлинно кутикулярной транспирации, несмотря на то, что они были у меня увеличены высокой t' (32°), все же оказались за немногими исключениями (*Acanthus*, *Atropa*) значительно ниже таковых, полученных без изоляции устьиц. Убедиться в этом не трудно, сверив данные настоящей главы с предыдущей.

5. Заключение.

Фактически накопившийся и подвергшийся обработке цифровой материал значительно превышает приведенный здесь, но и публикуемые данные приводят к вполне определившимся положениям и выводам, которые можно резюмировать следующим образом:

1. Транспирация завядающих листьев по характеру своему еще близка к транспирации стоматической, несмотря на то что она значительной своей частью является кутикулярной. Переходя на кутикулярную транспирацию, завядающие листья повидимому не прекращают вполне и транспирации через устьица.

2. У исследованных мною свыше 35 видов растений разных экологических групп, устьица на всех стадиях завядания были закрыты лишь относительно (не герметически). Ксилол, применяемый по способу Molisch'a, медленно, но определенно инфильтрировался.

3. Транспирация завядающих листьев часто дает внезапные понижения и повышения интенсивности, взаимно компенсирующиеся, чему причиной также может быть не прекращающееся влияние устьиц.

4. В большинстве случаев интенсивность транспирации завядающих листьев находится в прямой зависимости от проницаемости кутикулы (определенной по Rudolph'y), а тем самым и от толщины ее.

5. При завядании транспирация листьев, развившихся в условиях большой влажности, вначале более интенсивная, скоро понижается и отстает от таковой листьев, выросших в условиях сухости.

6. Подлинная кутикулярная транспирация может быть выявлена лишь при полном устранении влияния устьиц, что при локализации устьиц на одной стороне листовой пластинки может быть лучше всего достигнуто наклеиванием листа на пергаментную бумагу при помощи замазки Haberland'ta.

7. Кутикулярная транспирация при изолировании устьиц дает в общем равномерное, плавное понижение без 'внезапных скачков, чем резко отличается от транспирации стоматической.

8. Кутикулярная транспирация находится в еще более определенной зависимости от толщины кутикулы, чем транспирация завядающих листьев.

9. По своей абсолютной величине интенсивность кутикулярной транспирации значительно ниже устьичной.

Баку,
Государственный Азербайджанский
Университет.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Rudolph, K. Epidermis und epidermale Transpiration. *Botanisches Archiv* 9, 1925, 49—94.
2. Максимов, Н. А. Физиологические основы засухоустойчивости растений. Ленинград, 1926 г.
3. Schröder. Ueber den Verlauf des Welkens und die Lebensfähigkeit der Laubblätter. *Diss. Göttingen*. 1909.
4. Buscallion e Pollacci. L'applicazione delle pellicole di collodio. *Atti Inst. Botanico Pavia*. 2. 1901. 44 pp.
5. Ничипорович, А. О потере воды срезанными растениями в процессе завядания. (Из работ Отдела Прикладной Ботаники Саратовск. Опытной Станции).
6. Linsbauer, K. Beiträge zur Kenntnis der Spaltöffnungsapparate. *Mitteil. des Bot. Inst. Graz*. 1886.
7. Благовещенский, А. Чимганская горная ботанич. станция. *Бюллетень Гос. Средне-Азиат. Унив.*, 7. 1924. 8—14.
8. Nicolic, M. Beiträge zur Physiologie der Spaltöffnungsbewegung. *Beih. z. Bot. Centralbl.* 41. 1925. 309—346.

Saribek Agamov.

Ueber die Cuticulare Transpiration.

Résumé.

Der Frage der cuticularen Transpiration sind verhältnismässig wenig Arbeiten gewidmet, und ihre Grösse bei den verschiedenen Pflanzen ist immer noch beinahe unbekannt. Um diese Grösse zu beurteilen, begnügt man sich gewöhnlich mit anatomischer Untersuchung der Blätter und der Festsetzung der Cuticula. Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, welche im Sommer 1926, unter Leitung von Prof. N. A. Maximow, im Laboratorium für Experimentelle Morphologie und Oecologie, am Botanischen Garten zu Leningrad, ausgeführt wurde, bestand in der Feststellung der Grösse der cuticularen Transpiration auf direct-experimentellem Wege. Zunächst wurde zu diesem Zweck folgende Methode angewandt: ganze Pflanzen oder einzelne Blätter wurden zum Welken gebracht, worauf ihre Transpiration bestimmt wurde. Es wurde dabei vorausgesetzt, dass die Spaltöffnungen der verwelkten Blätter geschlossen sein müssen und der ganze beobachtete Wasserverlust der cuticularen Transpiration zuzuschreiben ist. Detaillierte Analyse der erhaltenen Zahlen, sowie die Untersuchung der Spaltöffnungen mittels Xylolinfiltration, zeigte jedoch, dass bei allen untersuchten Pflanzenarten (über 35) die Spaltöffnungen nicht vollständig geschlossen waren, und dass ihre Transpiration keine rein-cuticulare, sondern eine gemischte cuticular-stomatäre war. Der Einfluss der Spaltöffnungen war nicht nur darin zu sehen, dass die Transpirationsgrösse der welkenden Blätter eine verhältnismässig hohe war, sondern auch darin, dass dabei ein sprunghafte Steigen und Fallen beobachtet werden konnte, welches gerade der stomatären Transpiration eigen ist. Der Hauptfaktor dabei war aber die cuticulare Transpiration;

das ist, z. B., daraus zu ersehen, dass die Transpirationsintensität der welkenden Blätter in direkter Abhängigkeit von der Durchlässigkeit der Cuticula steht, welche nach Rudolph's Methode festgesetzt wurde, d. h. mittels Eintauchen des Blattes in verdünnte Schwefelsäure und Feststellung der Zeit, in welcher das Absterben der Epidermis- und Mesophyllzellen eintritt.

Für das Erforschen der tatsächlichen cuticularen Transpiration erweisen sich daher die Versuche mit welkenden Blättern als nicht völlig geeignet, und es wurde eine andere Methode zu diesem Zweck ausgearbeitet, und zwar, um die stomatäre Transpiration gänzlich zu beseitigen, wurden solche Pflanzen gewählt, deren Blätter nur an der unteren Blattfläche Spaltöffnungen tragen. Diese Fläche wurde mit Anwendung von Haberlandt's Kitt mit Pergamentpapier verklebt, worauf die Intensität der Transpiration durch die übliche Wiegemethode festgestellt wurde. Die durch diese Methode konstatierte cuticulare Transpiration bildete einen nur unbedeutenden Teil der stomatären Transpiration und wichen von dieser sehr ausgesprochen ab durch ihren ganz gleichmässigen, ununterbrochenen Gang, ohne jegliche Sprünge. Im Verhältnis zur Abnahme des Wassergehalts im Blatte sank die Transpiration ununterbrochen, was einen Beweis zu Gunsten der Wirklichkeit der nicht-stomatären Regulierung der Transpiration liefern kann. Diese echte cuticulare Transpiration erwies sich mit der Durchlässigkeit der Cuticula, wie es durch Rudolph's Methode festgestellt wird, noch enger verbunden zu sein, als die Transpiration der welkenden Blätter. Somit erweist sich die Dicke und Durchlässigkeit der Cuticula, welche bei der stomatären Transpiration wasserseitigster Pflanzen keine grosse Bedeutung hat, als ein äusserst wichtiges Schutzmittel welkender Pflanzen vor übermässigem Wasserverlust.

А. С. Лозина-Лозинская.

Род *Calligonum* в Монголии.

Род *Calligonum*, так подробно изученный для Туркестана, в Монголии до настоящего времени оставался неисследованным, а материал Гербария Главного Ботанического Сада необработанным. В литературе указывался для Монголии лишь один вид *C. mongolicum* Turcz., описанный в Bull. Soc. Nat. Mosc. V. 1832. 204, а в монографии сем. Polygonaceae Meissner приводит вариацию *gobicum* Bge., которая имеет некоторые отличия от типа (DC. Prodromus t. XIV).

Обработка Гербария Главного Ботанического Сада дает возможность указать для Монголии виды *crispum* Bge. и *calliphysum* Bge. и еще выделить 10 новых видов.

Sect. I *Pterococcus*.

1. *Cal. crispum* Bge. Del. Sem. Dorp. 1839. 8.

Зап. Монголия. Пески на правом берегу Ч. Иртыша 1908. 26/VI; степь к западу от Ченкур (Бурчум) 1906. 28/VIII; г. Иртыш, бугристые пески, левый берег Джалтайдар 1914 (Сапожников), Ч. Иртыш, пески 1876. 28/VIII; Кран, 1876. 28/VIII (Г. Н. Потанин).

Mongolia occ.

Sect. II *Pterigobasis*.

2. *Cal. Klementzii* sp. nov.

Плод до 20 мм. дл., широко яйцевидный, закругленный; орешек продолговатый, слабо закрученный вправо. Ребра не выдаются, граница между ними не заметна. Крылья меньше длины щетинок, поверхность их гладкая с заметным жилкованием; вместе со щетинками крылья в 2—3 раза превышают ширину орешка. Щетинки ветвятся в верхней части вилообразно 2 раза по 2—3, иногда срастаются вместе, образуя широкую ветвь. Кустарник с длинными ветвями и светлой корой. Похож на *C. acanthopterum* Borschz., отличается от него более широкими и менее ветвящимися щетинками.

Джунгария: на песчаных холмах между Джин-джи-ху и Хонько. № 95. 1898. 12/VIII (Е. Клеменц).

Calligonum Klementzii A. Los. sp. nov.

Fructus usque 20 mm. lg., late ovatus, rotundatus, achaenium oblongum leniter dextrorum tortum, costis minime prominentibus; alis quam seta brevioribus glabris venis conspicuis; alae setibusque duplo triplo, quam achaenii diametrum latiores; setae bis bifurcatim ramosae interdum in ramos latiores concrescentes.

Frutex ramis elongatis, cortice albido. Affinis C. acanthoptero Borscz. differt autem achaeniorum setis latioribus minus ramosis.

Soongoria.

Sect. III *Eucalligonum.*

- | | |
|---|----|
| 1. Орешек прямой | 2 |
| Орешек закрученный | 4 |
| 2. Щетинки тонкие и ломкие, плоды в среднем 10 mm. | 3 |
| <i>C. mongolicum</i> Turcz.
Щетинки крепкие и толстые, плоды в средн. 15 mm. | 3 |
| 3. Щетинки свободные, ветвятся мало | |
| <i>C. gobicum</i> (Bge.) sp. nov.
Щетинки срастаются расширенными основаниями, ветвятся сильно | |
| 4. Плоды мелкие (10 mm.) Щетинки ломкие | 5 |
| Плоды крупные (15—20 mm.) Щетинки крепкие | 7 |
| 5. Щетинки в 1 ряд | 6 |
| <i>C. pumilum</i> sp. nov.
Щетинки в 2 или 3 ряда | 6 |
| 6. Щетинки в 2 ряда, орешек сильно закручен | |
| <i>C. Potanini</i> sp. nov.
Щетинки в 3 ряда, орешек слабо закручен | |
| 7. Щетинки в 2 ряда | 9 |
| Щетинки в 3 ряда | 8 |
| 8. Щетинки равны или короче ширины орешка | |
| <i>C. chinense</i> sp. nov.
Щетинки длиннее ширины орешка <i>C. alaschanicum</i> sp. nov. | |
| 9. Щетинки книзу расширенные | |
| <i>C. Roborovskii</i> sp. nov.
Щетинки книзу не расширенные | 10 |
| 10. Щетинки почти в 2 раза длиннее ширины орешка | |
| <i>C. Przewalskii</i> sp. nov.
Щетинки равны ширине орешка | |
| 3. <i>Cal. mongolicum</i> Turcz Bull. Soc. Nat. Mosc. V. 1832. 204. | |

Плод 8—12 mm. дл., орешек варьирует от узкого, длинного, почти линейного до широко-овального, с острыми верхушкой и основанием, прямой или слабо закрученный. Ребра не выдающиеся, граница между ними в виде неглубоких бороздок. Щетинки очень тонкие и хрупкие, довольно редкие в 3 ряда на ребре, иногда 3-й ряд плохо выражен. Расширенные основания щетинок образуют узенький грэ-

бешок. Ветвятся щетинки 2 раза по 2—3, длина их равна или короче ширины орешка, особенно коротки верхние, иногда верхушка орешка выступает наружу. Околоцветник при плоде горизонтально распростертый. Ветви короткие, ветвятся под большими углами; плоды одиночные. Рост варьирует.

Вид этот очень изменчив. Западные формы (сборы Потанина и Клеменца из Джунгарии) имеют длинные плодики с линейным орешком, иногда слегка закрученные, с негустыми мягкими щетинками, 3-й ряд которых часто плохо выражен. Восточные формы (сборы Пржевальского из Ю.-Восточной и Заболотного из Восточной Монголии) имеют плодики меньших размеров, с яйцевидным коротким орешком, густыми щетинками, всегда 3-х рядными, более тонкими и ломкими. Крайние формы сильно отличаются, но выделить их не представляется возможным, т. к. они связаны рядом переходных форм.

Западные формы приурочены к глинистым и каменистым почвам. а восточные — к пескам; круглый плодик с густыми щетинками меньше подвергается засыпанию песком, чем длинный. Первичными формами видимо являются западные формы.

Улусутай, котловина около ключика Котон-булук № 1813. 1894. 9/VIII. Уринск. р. песчаные холмы севернее р. Хункыр. № 212. 1894. 12/VIII; Джунгария, Ламан-кюм-гоби, между ключиками Кюп и Чуджей. № 91. 1898. 8/VIII; Ханий, южн. скл., в степи среди кустов Caragana. № 175а. 1893. 10/VIII (Е. Клеменц). Вост. Монголия между Хутул-долон и Чжубурга. 1898. 3/VIII (д-р Заболотный). Ханий р. Туйн-гол. 1886. 4/IX; Убсунский р. Бага-нор, на песках, наметенных на южный склон конгломератовых холмов 1879. 31/VIII; Путь от Хами до Улусутая, каменная гряда Цаган-Дерку и Бура. 1877. 3/VII; пуст. Гоби, сев. Тянь-Шаня, щель между Туркюль и Адак, на каменистой и песчаной почве и на глинистой степи, прилегающей к Адаку. 1877. 17/VI; Сев. Гоби, ущелье Хапцыл на южном склоне хребта у Байн-Цаган (Г. Н. Потанин); Пустыня Хами, глинистая почва. 1879. 6/VI; Земля Уротов, г. Муни-ула. IV— $\frac{1}{2}$ —V. 1872; Земля Уротов; путь из Алашана в Ургу. VII— $\frac{1}{2}$ —VIII. 1873. (Н. М. Пржевальский).

Из гербария Ледебура есть 1 экземпляр из Кит.-Монголии с определением Турчанинова, с незрелыми, очень маленькими плодами, который поэтому особенной ценности не представляет.

C. mongolicum Turcz., *Fructus 8—12 mm. lg. ovalis; achaenium ab angusto longo fere lineare ad late-ovalem versus basin apicemque acutatum rectum vel leniter tortum; costae obsoleta; sulcis non profundis divisae; setae valde tenues fragiles non crebrae bis bi vel trifurcatae nucis diametro aequilongae vel breviores, in costa triseriales, serie tertiae interdum male evoluta; setarum partes basales cristam angustam formant; achaenii apex interdum nuda; sepala fructificatioris tempore horizontaliter patentia.*

Frutex magnitudine varia ramis brevibus angulo magno divergentes, achaenia solitaria.

Gobi bor, desert. Chami, Thian-Schan bor, Urato, Muni-Ula, Urga, Uliassutai, Ubsa, Changai, Mong. or.,

4. *Cal. gobicum* sp. nov. (Bge.).

Плод 13—16 мм. дл. овальный, орешек прямой, продолговатый, чуть суженный кверху, с округлыми ребрами и глубокой бороздой между ними. Щетинки довольно толстые, редкие, ломкие, расп. в 2 ряда по краю ребра, по 6—9 на ребре, свободные, слегка расширенные книзу; верхние срастаются вместе, ветвятся дихотомически, 2 раза по 2, в верхней части; длина их немного превышает или равна ширине орешка; околоцветник при плоде вниз отогнутый. Кустарник с прямыми длинными ветвями и светлой корой.

От *C. mongolicum* отличается большими размерами плода, более толстыми и длинными, но менее ветвящимися щетинками.

Южн. Гоби между ур. Нарын и Чаган-тохой по р. Едзингол. 1886. 16/VII; между г. Фуи-тин и Гаотай. 1886. 9/VI; пески в окрестностях г. Фуи-тин. 1886. 5/VI. (Г. Н. Потанин). р. Едзин-гол, уроч. Хашата, песч. барханы. 1909. 19/V. № 90. (П. К. Козлов).

Монол. назв. "торлук".

C. gobicum (Bge.) A. Los. sp. nova. *Fructus* 13—16 mm. lg. ovalis achaenium rectum oblongum, apicem versus vix attenuatum, costis subobsoletis rotundatis, sulcis profundis terminatis, setae satis crassae fragillissimae ad margines costarum biseriatim dispositae, liberae, basin versus sub latiores; setae superiores concrescentes, omnes dichotome ramosae bis bifurcatim dispositae, achaenio parum longiores vel aequales; calyx fructifer reflexus.

Frutex ramis longis, rectis cortice albido.

A. C. mongolicum, cui affinis, differt achaeniis amplioribus, satis longis crassioribus minus ramosis.

Gobi austr.

5. *Cal. Koslovi* sp. nov.

Плод 13—18 мм. дл., овальный; орешек прямой, продолговатый, с невыдающимися ребрами и ясно заметной границей между ними (В поперечнике почти квадрат). Щетинки расположены посередине ребра в 2 ряда, довольно густые, срастаются по 2—3 своими расширенными основаниями, образуя ясно выраженный гребень. Ветвятся в верхней части на пять—восемь коротких долей, отчего плодик кажется курчавым; длина щетинок превышает ширину орешка. Околоцветник при плоде отогнутый. Высокий кустарник с длинными, вверх стоящими ветвями и светлой корой. Плоды собраны большими массами.

От *Cal. gobicum* (Bge.) sp. nov., к которому он ближе всего, отличается ветвлением щетинок и орешком. Напоминает формой орешка *C. murex*.

В. Цайдам. Уроч. Эргицюль 2700 м. с. м. 4/VIII. 1901. № 3478 (П. К. Козлов).

C. Koslovi A. Los. sp. nov. *Fructus* 13—18 mm. lg., achaenio recto oblongo in sectione fere quadrato costis non prominentibus, sulcis terminalibus bene evolutis setae achaenio longiores in medio costarum biseriatim dispositae, satis crebrae, partibus basalibus latioribus per 2—3

concrecentes, cristam bene evolutam formantes; apicem versus ramulos 5—8 breves formant, quam ob rem fructus quasi crispus ostendit.

Frutex elatus ramis longis sursum prominentibus, cortice albido, calix fructifer reflexus. *Fructus* numerosissimi. А *C. gobicum*, cui affinis differt ramificatione setarum *C. murex* simile, achaeniarum forma et magnitudine.

Zaidam or.

6. *Cal. Potanini* sp. nov.

Плод широко овальный, 8—10 мм. дл., орешек довольно сильно закручен, продолговатый с резко выдающимися ребрами и ясно выраженной границей между ними. Щетинки густые, равны или короче ширины орешка, расположены в 2 ряда посередине ребра, свободные и в нижней части не расширенные. Ветвятся с нижней части на 3—4, и каждая доля еще на 2—4, доли коротенькие. В молодости конечные доли торчат во все стороны, в зрелости пригибаются назад, почему поверхность плода кажется гладкой. Околоцветник при плоде назад отогнутый. Ветви короткие.

Очень близок к *C. mongolicum* Turcz. Отличается постоянной и довольно сильной закрученностью, свободными и густыми щетинками; от *C. pumilum* sp. nov. отличается более густыми крепкими 2-х рядными щетинками. Из туркестанских видов близок ему *C. Litwinovi* Drob.

Гоби между Адаком и Ноим Тологаем 18/19/VII. 1877; на пути из Улясутая в Хами, 5—13/V. 1877 (Г. Н. Потанин).

Cal. *Potanini* A. Los. sp. nov.

Fructus late-ovalis, 8—10 mm, lg., achaenium oblongum satis spiraliter tortum costis valde prominentibus, sulcis profundis; setae densae, nucis diametro aequales vel breviores, biseriatae in medio costarum dispositae, basi non dilatatae liberae, a parte inferiore 3-vel 4-furcatim ramosae, rami 2—4 divisi ramulis brevibus, junctoribus in omnibus partibus prominentibus, maturis reflexis, quoad fructi superficies glabra videtur, calyx fructifer reflexus.

Frutex ramosus, ramis brevibus.

Affinis *C. mongolicum*, differt fructibus semper tortis, setis liberis densioribus, а *C. pumilo* setis firmioribus biseriatis. Е speciebus turcstanicis omnipium affinior *C. Litvinovi* Drobov.

Gobi.

7. *Cal. pumilum* sp. nov.

Плодик широко овальный, 7—12 мм. дл., орешек продолговатый, сильно закрученный вправо. Сильно выдающиеся острые ребра разделены глубокой бороздой. Щетинки немногого длиннее ширины орешка, редкие, расположенные в 1 ряд посередине ребра на выдающихся валике, свободные, слегка расширенные книзу, почти правильно дихотомически 3-ды ветвящиеся, светло-желтые, очень тонкие и ломкие, верхние срастаются вместе. Околоцветник отгибается назад. Кустарничек около 35 см., с отходящими от корня побегами, и очень светлой корой. Плодики равномерно разбросаны по всем ветвям.

Общим видом походит на западные низкорослые экземпляры *C. mongolicum* Turcz., отличается сильно закрученным плодом и однорядными щетинками.

Лючун. 29/IX. 1898. (Е. Клеменц)

C. pumilum A. Los. sp. nov.

Fructus late-ovalis 8—12 mm. lg., achaenium oblongum valde dextrorum tortum; costae valde prominentes acutae sulco profundo divisae; setae nucis latitudinem parum superantes rarae, secus medium costarum in vallo prominulo uniserialis liberae, basin versus parum latiores ter dichotome ramosae, pallide luteae, tenuissimae fragilesque, calyx reflexus.

Frutex parva 35 cm. alta, a basi ramosa, cortice albido, fructus per totam plantam aequaliter dispersae.

— Habitu toto speciminibus occidentalibus *pumilis* C. mongolici similes. Fructus autem valde tortus, setae uniserialis.

Ейксин.

8. *Cal. alaschanicum* sp. nov.

Плод широко-яйцевидный, до 2,5 см. дл., орешек закручен вправо или влево, продолговато-яйцевидный, в средней части расширенный. Ребра сильно выдаются, граница между ними сильно заметна; щетинки густые и крепкие; более, чем в 2 раза превышают ширину орешка, расположены в 3 ряда, по краям и по середине ребра; срастаются расширенными основаниями и образуют по краям ребра каемку, средний ряд этой каемки не образует. Ветвятся в средней части 2 раза по 2—3. Концы их загибаются и переплетаются между собой. Поверхность орешка гладкая. Околоцветник при плоде назад отогнутый. Дерево до 3 м. высоты, с длинными вверх стоящими, вытянутыми ветвями, на молодых ветвях кора желтая, на старых темно-серая, плоды желтые и красные.

По форме и величине плодов напоминает *C. arborescens* Litw., но верхние щетинки не образуют колонки, как у *C. arborescens* Litw. Из Монгольских *Callionum* стоит ближе всего в *C. Roborowskii* sp. nov., от которого отличается 3-х рядными щетинками.

Ю. Алашань. Пески Тынгери, песч. и глин. почва. 1880. 15/VIII; (Н. М. Пржевальский).

Ордос, пески Кузуп-чи, дол. р. Хуан-хе, на песке. № 364. 1871. 17/VIII.

C. alaschanicum A. Los. sp. nov.

Fructus late-ovoideus usque ad. 2,5 cm. lg.; achaenium dextrorum vel sinistrorum tortus, oblongo-ovoideus; costae valde prominentes, setae densae et firmae, latitudinem achenii plus quam duplo superantes, triseriales, secus margines atque ad medium costarum, series marginales basi confluentes et cristam formantes, ad medium longitudinis sui bis dichotome vel trichotome ramosae, fines eorum reflexi inter se perlectant. Superficies achaenii laevis, calyx reflexus.

Arbuscula ad. 3 м. alta, ramis elongatis sursum prominentibus; cortex ramorum juniorum lutea, ramorum vetustiorum cinerea. Fructus lutei vel rubri.

E forma et magnitudine fructuum atque ramificatione C. arborescens in mentem vocat, setae autem superiores columnas non formant.

E *Calligoneis mongolicis* omnium affinior *C. Roborowskii*, setae autem triseriales.

Alaschan austr., *Ordos*.

9. *Cal. chinense* sp. nov.

Плод 15 mm. длиной, почти шаровидный, орешек широкоовальный, закрученный вправо, с резко выдающимися ребрами и глубокими бороздами между ними. Щетинки густые, очень крепкие и толстые, расположенные в 3 ряда по ребру, с расширенными, но свободными основаниями; верхние срастаются вместе; ветвятся 3 раза на 2—3, конечные доли короткие и острые, торчат во все стороны. Плодики единичные; ветви заметно ребристые, кора светлая.

Резко выделяется среди монгольских видов своими крепкими толстыми щетинками.

Пров. Ганьсу. Пески между г. Гань-чжоу и сел. Шахэ. 27—VII 1876. (д-р. Пясецкий).

C. chinense A. Los. sp. nov.

Fructus 15 mm. lg. fere orbicularis, achaenium late ovale dextrorum tortus, costis prominulis sulcis profundis; setae densae firmae et crassae in costa eadem triseriales, basi latiores sed liberae; superiores confluentes; ramuli ter bi-vel trifurcati; ramuli terminales breves acutaeque in partibus omnibus divergentes. Fructus solitarii, cortex albidus, rami insigniter costati.

Inter omnes species mongolicas setis firmis et latis insignis.

Prov. Кансу.

10. *Cal. zaidamense* sp. nov.

Плод овальный, 10—15 mm. длины, орешек продолговато-яйцевидный, закрученный влево, с выдающимися, округлыми ребрами и глубокой бороздой между ними; поверхность орешка гладкая, темно-лиловато-коричневая.

Щетинки довольно тонкие, редкие, свободные, едва расширенные книзу, дважды почти правильно дихотомически ветвящиеся, расположенные посередине ребра, кончаются острыми долями, ярко-желтые. Плоды собраны довольно густо; кора светлая.

Вост. Цайдам. Уроч. Эргицюль. 2700 м. с. м. 1901. 4/VIII (П. К. Козлов).

Cal. zaidamense A. Los. sp. nova.

Fructus ovalis 10—15 mm. lg., achaenium oblongo ovatum, sinistrorum tortum, costis prominulis rotundatis, sulcis profundis; superficies laevis lilacino-fusca; setae satis tenues rarae liberae, in medio costarum dispositae basin versus vix latae, bis dichotome ramosae, ramulis acutis finientes, luteae.

Fructus dense glomerulati, cortex albidus.

Zaidam or.

11. *Cal. Przewalskii sp. nov.*

Плод шаровидный 15—18 мм. длины; орешек слабо-закрученный вправо, продолговатый, узкий; ребра не выдаются, граница между ними хорошо заметная. Щетинки не густые, длинные, очень тонкие, более чем в 2 раза превышают ширину орешка, расположенные в 2 ряда по краям ребра, свободные и книзу не расширенные, ветвятся в нижней части 2 раза на 2—3; последние доли длинные, торчат в стороны; поверхность орешка гладкая; оклоцветник при плоде отогнутый назад. Плоды собраны густыми массами. Кустарник больше 1 м. высоты, с короткими изогнутыми ветвями и светлой серой корой.

Торчащими длинными щетинками похож на *C. molle* Litw.; формою плода и щетинками близок к *C. eriopodum* Bge., от которого отличается голыми ветвями и гладкой поверхностью орешка.

Ю. Алашань. Пески Тынгери, глинистая и песчаная почва № 170. 1880. 15/VIII. (Н. М. Пржевальский).

C. *Przewalskii A. Los. sp. nov.*:

Fructus globosi, 15—18 mm. lg. *densae glomerulati numerosi*; *achaenium dextrorum leniter tortum*, *oblongum angustum*, *costis non prominentibus*, *sulcis terminalibus satis notatis*, *setae non densae tenuissimae longae*, *plus quam duplo latitudinem nucis superantes*, *ad margines costarum biseriales liberae*, *basin versus non latae*, *in parte inferiore 2—3 bifurcatae*, *ramuli finitimi longi prominentes*; *superficies achaenii laevis*; *calyx fructifer reflexus*.

Frutex metrallis vel ultra ramis brevibus incurvis, *cortice pallide griseo*.

Affinis *C. eriopodo* Bge., e. *fructus forma setisque*, differt autem *ramis nudis achaeniisque superficie glabra*. Similis *C. molle* Litw. *setis longis prominentibus*.

*Alaschan austr.*12. *Cal. Roborowskii sp. nov.*

Плод широко яйцевидный, 15—18 мм. длины; орешек яйцевидный, суженный кверху, довольно сильно закрученный, с выдающимися, довольно острыми ребрами и глубокой бороздой между ними. Щетинки негустые, крепкие и толстые, немного длиннее ширины орешка, расположены посередине ребра в 2 ряда, с сильно расширенными, но свободными основаниями; ветвятся в средней части 2—3 раза на 2—3 доли, иногда срастаются вместе, особенно верхние. Кустарник до 2-х м. высотой со светлой корой и редкими равномерно разбросанными по ветвям плодами.

Плоды и ветви часто поражены галлами, на ветвях образуются нарости и утолщения, а плоды недоразвиваются, они имеют вид шариков, густо покрытых короткими щетинками, не ветвящимися и торчащими во все стороны.

Гоби. р. Едзин-гол у г. Гаотай. 1886. 25/VI; левый берег реки Едзин-гол между уроч. Хоир-тооре и Гапцы-дзак. 1886. 19/VII. (Г. Н. Потанин).

Куень-Лунь, северный склон хребта Русского, р. Мольджи, 2.500 м. с. м., на песке. 1890. 14/VI; Северный склон хребта Гумбельда, наклонная к северу каменистая степь, 3000 м. с. м. № 196, 1895 23/VI (Роборовский).

Керия, оазис Ниа. 1885 18—30/V, 1500 м. с. м. (Пржевальский).

Cal. Roborowskii A. Los. sp. nova.

Fructus late-ovatae 15—18 mm. lg., *achaenium ovatum apicem versus attenuatum*, *satis tortum*, *costis prominentibus satis acutis sulcis profundis*, *setae non crebrae firmae et crassae*, *achaenii latitudinem parum longiores*, *in medio costarum biseriales basi liberae*, *sed valde latae*, *in parte media bi-vel trifurcatae*, *interdum confluentes*.

Frutex cortice albido, *fructibus raris aequaliter sparsis*.

Fructus ramique saepe galliferi. *Ftuctus aegroti globosi parvi dense breviterque setosi*, *setis simplicibus in omnibus partibus prominentibus*.

Gobi, Kuen-Lun, Kaschgar, Keria.

Sect. IV *Calliphysa*.13. *Cal. calliphysum* Bge Del. Sem. Dorp. 1839.

Перевал через Тянь-Шань между Дабан-Ченом и Баин-хо, среди каменистой осьпи 1898 7/IX (Е. Клеменц). Ч. Иртыш левый берег к западу против гор. Черектас, песчаная галечная степь 1914. 11/VI (Сапожников). Джунгария путь из Гу-чена в Зайсан 1876. 26/IX (д-р Пясецкий).

Thian-Schan, Soongoria.


Нанеся на карту местонахождения всех видов *Calligonum*, получаем следующую картину:

Calligonum занимает пустыни и горные склоны Вост. Монголии, Джунгарии, Кашгарии, Алашаня, Ордоса и Цайдама. С севера ареал распространения ограничивается Хангайским хребтом, восточная граница приблизительно проходит по 115 меридиану (Заболотный путь Урга—Калган). На юге граница проходит по Китайской Великой стене, ограничивает Алашань и Ордос, потом спускается на юг по Хуан-хе, идет по провинции Ганьсу, ограничивает Цайдам, и проходит по северной части Куень-Луня; на западе она ограничивает Кашгирию, пересекает Тянь-Шань, проходит по западной части Джунгарии, и пересекает М. Алтай в северной его части.

Таким образом, область распространения монгольских *Calligonum* совершенно раз'единена горными странами от Туркестана и в данное время сообщения между обоими областями нет.

Широко расселенный, весьма пластичный и легко подвергающийся гибридизации род *Calligonum* является весьма интересным материалом для изучения.

Основная черта рода — это его плоды, — с маленьким орешком, но с большими выростами-крыльями и щетинками, которые увеличивают поверхность, делают плод очень легким для перенесения ветром и сохраняют его от засыпания песком. Наиболее приспособленным к жизни в песке является *C. calliphysum* Bge., который благополучно сажают в песке.

Плоды монгольских видов р. *Calligonum*.

1. *C. Klementzii* sp. nov.
2. *C. mongolicum* Turcz.
3. *C. gobicum* (Bge) sp. nov.
4. *C. Koslovi* sp. nov.
5. *C. Potanini* sp. nov.
6. *C. pumilum* sp. nov.
7. а) щетинка.
8. *C. chinense* sp. nov.
9. *C. Przchewalskii* sp. nov.
10. *C. zaidamense* sp. nov.
11. *Roborowskii* sp. nov.

годаря пленке, окружающей плодик, делается еще более легким и песок в него не забивается. Противоположными ему являются представители первой секции, имеющие сравнительно тяжелые плоды и приуроченные к твердым почвам. Эти типы связаны длинным переходом форм, тесно связанных с окружающей их средой. Монгольские виды хорошо это подтверждают. Юго-восточные виды *C. alaschanicum* sp. nov. *C. Przchewalskii* sp. nov. и другие жители подвижных песков, имеют густые длинные щетинки. Западные же формы, с мелкими плодами и редкими щетинками, селятся по склонам, на глинистых почвах; вид

Ареал рода *Calligonum*.

mongolicum Turcz. как и указывалось выше, хорошо иллюстрирует такую связь с местообитанием. Наиболее древними надо считать представителей первых секций, жителей горных стран, спустившихся в пустыни и там изменившихся.

Родоначальниками монгольских *Calligonum* можно считать формы Заилийских песков, которые попали в Монголию через Джунгарские ворота.

Виды *crispum* Bge. и *calliphysum* Bge. пришли из Туркестана вполне сформировавшимися, сами никакого изменения не претерпели, а *C. crispum* Bge. дал *C. Klementzii* sp. nov.

Начало видам 3-й секции дали 2 типа, почему все виды и могут быть разделены на 2 группы. Первая группа с округлыми, крупными сочными плодами, которые при сушке сживаются, и довольно широким орешком, хорошо приспособленные формы к жизни в песке. Вторая группа — формы с продолговатыми мелкими сухими плодами, тонкими редкими, ломкими щетинками — формы к жизни в песке, приспособленные плохо.

Первый тип произошел от Заилийских форм группы *Caput-Medusae* Schrenk. К первой группе отнесем: 1) *C. Roborowskii* sp. nov. вид близкий к формам, собранным О. А. Федченко с Джунгарского Алатау, и определенным, как *C. Caput-Medusae* Schrenk, но несколько отличающимся от западных *C. Caput-Medusae* Schrenk; 2) *C. alaschanicum* sp. nov., который встречается в Алашаньских песках вместе с саксаулом; 3) *C. zaidamense* sp. nov.; 4) *C. chinense* sp. nov., и 5) *C. Przewalskii* sp. nov.

Вторая группа настолько своеобразна, что трудно найти какую-либо связь ее с Туркестаном. По величине плодов можно было бы сравнивать эти виды с *C. elatum* Litw. и *C. microcarpum* Borzh., но в остальном они не совпадают. Ни один Туркестанский вид не обладает столь характерными тонкими и редкими щетинками. Наиболее древним из всей этой группы является *C. mongolicum* Turcz.; его широкое распространение и некоторая изменчивость позволяют сделать подобный вывод: ближайшими к нему являются *C. Potanini* sp. nov. и *C. pumilum* sp. nov. особенный интерес представляет собой последний (*C. pumilum*) из Люкчунской впадины — является ли он изменившимся *C. mongolicum* Turcz. с редуцированными щетинками, или это первоначальный тип, застрявший в Люкчунае, тогда как формы, расселившиеся дальше, приспособляясь к окружающим условиям, превратились в *C. mongolicum* Turcz.

Если считать, что древнейшими формами являются жители твердых почв (I и II секц.) и что приспособления к жизни в песке — признаки вторичные, тогда надо согласиться со вторым предположением.

Виды *Koslovi* sp. nov. и *gobicum* sp. nov. носят следы 2-й группы, видимо здесь имела место гибридизация.

Очень подробно разобрать генетическую связь как между отдельными видами, так и между целыми группами, пока не представляется возможным; можно лишь с уверенностью говорить, что начало монгольским видам дал ряд типов, вышедших из Туркестана, которые сильно размножились и кроме одного (родоначальники группы *C. mongolicum* Turcz.) сохранили свой характер, и что для Монголии этот род является еще молодым, не кончившим своего развития. Более подробные и полные выводы возможны лишь после детальной монографической обработки всего рода и экспериментальной проверки в природе.

Ленинград, 1926 г.
Главный Ботанический Сад.

A. Losina-Losinskaja.

Le genre *Calligonum* en Mongolie.

(Résumé).

Sur toute l'étendue de la Mongolie le genre *Calligónum* se rencontre dans les déserts de la Mongolie centrale, de la Kaschgarie, d'Alaschan, d'Ordos et de Zaidam, où il est représenté par 13 espèces, dont deux se trouvent aussi au Turkestan, tandis que les autres 11 ne sont propres qu'à la Mongolie. L'auteur donne la description de 10 espèces nouvelles, déterminées d'après les herbiers du Jardin Botanique Principal.

Les *Calligonums* de la Mongolie sont originaires du Turkestan et proviennent de deux types, en raison de quoi ils forment deux groupes. Les espèces se rapportant au premier groupe (espèces approchant celle de *C. alaschanicum* sp. nov.) ont beaucoup de ressemblance avec *C. caput medusae* Schrenk. Celles se rapportant au deuxième (espèces proches de *C. mongolicum* Turcz.) sont à un tel point uniformes, qu'on n'en pourrait en indiquer d'espèces tant soit peu similaires au Turkestan.

La rapidité avec laquelle se produisent les nouvelles formes (le genre *Calligonum* est assez récent en Mongolie) ne peut être expliquée que par une plasticité intense par rapport aux conditions écologiques et par une grande faculté d'hybridation.

Leningrad, 1926.

Ю. Н. Воронов.

Новые кавказские виды р. *Pyrus* Linn.

В своей заметке о грушах Кавказского края (Труды по Прикл. Ботан. и Селекц. т. XIV, вып. 3. 1921—25) я установил несколько еще не описанных диких груш из южного Закавказья и для двух из них дал рисунки. В настоящей заметке даются латинские диагнозы этих видов.

Pyrus Raddeana n. sp.

Ramis, ut videtur, inermibus glabris plus minusve dense tomentoso-canis; gemmis glabriusculis vel dorso apiceque parce villoso-tomentosis; foliis oblongo-ellipticis a medio utringue attenuatis, juvenilibus supra araneoso-tomentellis, demum glabris, subtus adultis quoque densiuscule tomentoso-canis, apice acuto, marginibus regulariter minuteque serrulato-denticulatis 6—8 cm. longis, 2—4 cm. latis, petiolis tomentosis 3—4 cm. longis. Flores et fructus ignoti.

Hab. ad. p. Lischk. in prov. Karabagh Transcaucasiae, ubi a. 1871
a cl. G. Radde lecta; typus in herbario Horti Petropolitani (sub-
P. elaeagnifolia?").

A. P. elaeagnifolia Pall., cui indumento foliorum haud dissimilis, differt eorum forma marginaque serrulato-denticulato; a *P. syriaca* Boiss. quae aequo foliis serratis gaudet praeter indumentum foliorum forma, gemmisque non ciliatis distincta; *P. salicifolia* Pall. a nostra indumento adpresso sericeo, foliis integris et forma aliena longius distat.

Об этой груше я упоминаю на стр. 8 и 14 (отд. оттиска) цитированной заметки. Описываемые экземпляры хранятся в кавказском гербарии Главного Ботанического Сада и были определены как „*P. elaeagnifolia* Pall?“. К последнему виду их однако никак нельзя отнести по форме листьев и их опушению; *P. syriaca* Boiss., имеющая также листья с зазубренными краями, лишена опушения (редко сохраняют лишь следы его на нижней стороне листа). К сожалению, экземпляры эти стерильны. Думаю, что сюда же следует отнести грушу, которую Б. Б. Гриневецкий считал за „типичную“ *P. elaeagnifolia* Pall., т. е. его экз. из Лишка и между Гадрутом и Джебрайлом, которых впрочем не видел.

Pyrus oxyprion n. sp.

Ramis spinoscentibus glabris, novellis araneoso-canescens; gemmis villoso-tomentosis; foliis oblanceolatis, supra medium latioribus basin versus sensim in petiolum attenuatis, apice acutiusculis v. obtusis, mar-

gine acute serrulatis, supra tandem glabris, subtus araneoso-villosis v. glabrescentibus, 5—7 cm. longis, 1,5 cm. latis, petiolo 1,5—2 cm. longo villoso-tomentoso, floribus ignotis; pedunculis clavatis in fructum turbinatum triplo breviorum abeuntibus. Arbor mediocris cortice griseo, ramis patentibus.

Hab. in distr. Kaghyzman prov. Kars. (vallis superior fl. Araxis), ubi
in faucibus inter Daghirmān et Zorab-khan a. 1913 cum fruct. junior. legi.
Affinis *P. syriaca* Boiss., a qua differt gemmis non ciliatis,
follis angustis formae distinctae acute serrulatis etc. Typus in herbario
Horti Petropolitani.

Первоначально принимавшаяся за *P. syriaca* Boiss., груша эта описана была мною на стр. 14 цитированной заметки под настоящим названием и изображена на табл. II. Она близка к *P. syriaca*, но хорошо отличается остро-пильчатыми, иной формы, опущенными листьями и др. признаками. Распространение ее вероятно на хребте Агри-даг более широкое.

Pyrus taochia n. sp.

Ramis inermibus, novellis dense cano-tomentosis; gemmis densissime tomentosis; foliis oblongo-lanceolatis ellipticisve apice acuto, margine obsolete denticulatis, basi in petiolum 2-3 plo breviorem attenuatis, usque 9 cm. longis, 2,3 cm. latis, subtus praesertim et ad petiolis dense tomentosis; floribus ignotis; fructibus turbinatis 1,5 cm. diametro, pedunculis valde clavatis fructo longioribus. Arbor mediocris.

Hab. in distr. Artvin inter pp. Ghurdzhan et Khod, ubi a me a. 1911 cum fruct. junior. lecta; adsunt quoque in herb. Horti Petropolitani specimina fructifera a cl. Masalsky ibidem lecta et meis simillimia.

Описание этой груши на русском языке дано на стр. 10 цитированной заметки, а изображение на табл. I. Сравнивая с *P. Kotschyana* Dcne. (*P. elaeagnifolia* v. *Kotschyana* Boiss. Fl. Or. II. 654), наряду с рядом общих признаков: отсутствие колючек, опущенные почки, морщинисто-кольчатые рубцы на укороченных веточках, мы должны констатировать более длинные и узкие листья, более мелкие (у *P. Kotschyana* до 2,5 см.) и иной формы (у *P. Kotschyana* округлые) плоды, более густое опушение почек (у *P. Kotschyana* почки пористые), почему приходится считать эту грушу автономною микроморфою.

G. N. Woronow.

Neue kaukasische Pyrus-Arten.

(Résumé).

(R é s u m é).
Es werden drei neue kaukasische Arten beschrieben und zwar:
P. Raddeana G. Woron. (Prov. Karabagh), P. oxyprion G. Woron.
(Kreis Kaghyzman, oberes Araxes) und P. taochia G. Woron. (Tschorokh-Gebiet). Die beiden erstgenannten Arten gehören zum Verwandtschaftskreis von P. syriaca Boiss. und die letztgenannte ist mit
P. elaeagnifolia Pall. verwandt. Die Diagnosen sind in lateinischer Sprache verfasst.

Ю. Н. Воронов.

Материалы к познанию лилейных (Liliaceae) Кавказского края.

I. Закавказские виды р. *Bellevalia* Lap.

Род *Bellevalia* был установлен в 1808 г. Lapeyrouse'ом (Journ. Phys. LXVII. 1808, 425) и к нему были отнесены два вида—*B. operculata* Lap. и *B. appendiculata* Lap.—оба ныне относимые в синонимику установленного еще Линнеем (Mant. II. 1771, 224) *Hyacinthus romanus* L. Позднейшие авторы—Kunth, Parlatore, Boissier—установили ряд новых видов этого рода, отчасти же перенесли сюда виды ранее относившиеся к р. *Hyacinthus* L. Кроме того, Boissier отнес к этому же роду, под секционным обозначением *Hyacinthella*, ряд видов, едва ли филетически связанных и между собою и с настоящими *Bellevalia* (его секция Eu-*Bellevalia*), создав таким образом, обширный искусственный конгениус, в одной „*Flora Orientalis*“ насчитывающий 20 видов.

Новейшие авторы пошли еще дальше. Engler в Natürl. Pflanzfamilien, отбросив родовое обозначение *Bellevalia*, все относимые раньше к нему виды соединил под родовою формулой *Hyacinthus* L., включивши в него таким образом *Bellevalia* s. str. и *Hyacinthella*, а также и р. *Strangweia* Best. Его примеру следуют и авторы „*Synopsis der Mitteleuropäischen Flora*“ Ascherson и Graebner.

В настоящей заметке роду *Bellevalia* придается первоначальное значение, он следовательно соответствует секции Eu-*Bellevalia* Boiss. (= *Bellevalia* Baker), а собственно *Hyacinthus* L., *Hyacinthella* и *Strangweia* Best. рассматриваются, как самодовлеющие роды.

В частности, что касается группы *Hyacinthella*,—как уже сказано выше, на мой взгляд представляющей весьма гетерогенный агломерат форм, нуждающийся в критической пераработке и новом родовом расчленении, следует заметить, что сюда, ставши на точку зрения Boissier, пришлось бы отнести ряд видов, фигурирующих ныне в числе видов рода *Muscaria* L.—*M. acutifolium* Boiss. *M. ruscanthum* C. Koch., *M. coeleste* Fom. и *M. fornicalatum* Fom.; сюда же мною провизорно отнесено растение с Понтийского хребта, описанное под названием *Hyacinthella Turkewiczii* m.

В принятом таким образом, об'еме род *Bellevalia* характеризуется: трубчато колокольчатым околоцветником с прямыми или

более или менее раскрытыми, но не отвороченными, зубцами его отгиба и без перехвата под зевом (как у *Muscaria*), тычинками приросшими нижнею частью нитей к трубке и кажущимися прикрепленными в зеве околоцветника, концами своих пыльников доходящими почти до его края и часто выставляющимися наружу. Верхушечные цветы часто бесплодны, плодущие же в продолжение цветения испытывают изменение окраски—от беловатой или желтоватой в одних случаях и фиолетовой в других, до разных оттенков бурого цвета к концу цветения.

В конспекте кавказской флоры В. И. Липского (стр. 469) указано 5 видов: *B. ciliata* (Сур.) Nees, *B. glauca* Kunth., *B. macrobotrys* Boiss., *B. montana* (C. Koch.) Boiss. и *B. leucophaea* (Stev.), Boiss. Те же виды находим мы и у А. В. Фомина в „Определителе растений Кавказа и Крыма“ (стр. 266—257, 1909).

Настоящая заметка была мною составлена еще 3 года тому назад, на основании многолетнего изучения живого материала, находившегося в культуре на Кавказском Отделе Тифлисского Ботанического сада. Изучение этого материала привело меня к необходимости совершенно изменить приведенную выше схему В. И. Липского для закавказских видов. Но работа еще не была сдана в печать, как вышла в свет интересная заметка, посвященная этому же вопросу и принадлежащая перу знатока Кавказских Liliaceae, П. И. Мищенко¹⁾. В мою точку зрения названная заметка не вносит изменения, но несмотря на схождение в общем и основном наших взглядов, как видно будет ниже, в деталях мною дается фактам иное толкование и освещение, чем у П. И. Мищенко. Этим, я думаю, оправдывается опубликование моей работы.

Как сказано выше, базируется она главным образом на изучении живого материала, но мною пересмотрен и гербарий Главного Ботанического сада и результаты этого пересмотра включены в текст.

Как и П. И. Мищенко, в цитированной работе (стр. 155) я считаю, что *Bellevalia ciliata* (Сур.) Nees должна быть исключена из списка растений Кавказской флоры, как растение южноевропейское. У нас оно замещено двумя автономными расами, отличными по величине и окраске околоцветника,—предкавказского *B. sagittata* (Pall.) m. (= *Hyacinthus* Pall. Nov. Act. Petr. X 300; Mischenko l. c. 155. 1927) и Закавказского *B. speciosa* m.

Описанный в 1827 г. и изображенный на табл. 1085 Lindley'ем в Bot. Register *Muscaria glaucum* = *Bellevalia glauca* Kunth., равным образом не принадлежит нашей флоре. Оригинал был описан по выращенным в Chiswick'e экземплярам, луковицы которых были доставлены в 1825 г. Henry Willoch'ом. Рисунок этот изображает растение с фиолетовыми бутонами, колокольчатыми цветами с белыми зубцами отгиба и выдающимися из цветка тычинками; в описании указан легкий перехват пониже зева („a little contracted below the faux“); листья широкие, сильно заостренные („acuminate“). Кавказского растения, обладающего совокупностью этих признаков, мне

¹⁾ Труды Кубанского Сельско-Хозяйственного Института, том V. 1927, 149—159.

видеть не приходилось. Кроме того, в трактовке Boissier этот вид (у него *B. ciliata*, *B. glauca* Fl. Or. V. 302) является несомненно сборным понятием. Относимый им сюда в качестве синонима *Hyacinthus purpureus* Griff., изображенный на табл. 275 его „Icones plantarum asiaticarum“ (1851), как совершенно справедливо указывает П. И. Мищенко (стр. 156), совсем не похожее растение с узкими листьями, крупными красно-фиолетовыми цветами, с отогнутыми долями околоцветника и длинно выдающимися тычинками. *Hyacinthus Aucheri* Baker, тоже отнесенный Boissier в число синонимов, мне не знаком, но по исследованию П. И. Мищенко (стр. 156—158), тоже является отличным от *B. glauca* (Lindl.) Kunth.

То что отнесено к *Hyacinthus glaucus* у П. И. Мищенко (стр. 156), на мой взгляд следует считать двумя (а не одною) самостоятельными закавказскими расами, одна из которых была выделена уже Стевеном (Verz. Taur. p. 336, 1857) под названием *Muscaria Wilhelmsii* и должно называться *Bellevalia Wilhelmsii* (Stev.) m., другая описывается мною ниже, как *B. albana* m. В случае если бы оказалось, что последняя должна быть соединена с первою, все же *B. glauca* (Lindl.) Kunth., растение персидское, нашей флоре чуждо.

Мне не удалось выяснить, что такое *Bellevalia montana* (C. Koch, in Linn. XXII, 253 sub *Muscaria Boiss.*), так как подлинников я не видал. Н. И. Мищенко считает его разновидностью *Hyacinthus glaucus* с более мелкими цветами, тонкими цветоножками и короткими листами.

Приводимую Boissier и последующими авторами вплоть до А. В. Фомина (Опред. I. с. для Закавказья *B. macrobotrys* Boiss. П. И. Мищенко считает особым подвидом—ssp. *caucasicus* (стр. 158). Я вполне с ним согласен, но считаю нужным называть ее *B. Fominii* m.

Hyacinthus Auscheri Baker мне остается неизвестным, я не имел случая видеть ни живого ни гербарного материала по этому виду. У П. И. Мищенко в числе синонимов фигурируют: *B. ciliata* var. *stenophylla* Boiss. Fl. Or. V. 302, каковое название относится к южно-персидскому растению, едва ли у нас встречающемуся. На Кавказском отделе Тифлисского Ботанического сада под названием *H. stenophyllum* Mise. культивировалось растение из Мильской степи (уроч. Пейгамбар), мною относимое к *B. Fominii* m. В моих руках были живые экземпляры растения, привезенного из Маку (сев. Персия) А. А. Флоренским, очень подходящие под описание П. И. Мищенко.

Равным образом, мне остается неизвестным и описываемый П. И. Мищенко *H. longistylus* Mise. (стр. 157), согласно автору, распространенный в Персии, Азербайджане, у нас же в Зуванде и в Карабахе у Мигри¹⁾. Подходящего к описанию этого вида материала в моих руках не было.

¹⁾ У П. И. Мищенко собирателем указан для последнего местонахождения Радде, а дата 4. 1843. Между тем сборы Г. И. Радде на Кавказе начинаются с 1864 года. В „Museum Caucasicum“ (стр. 165) под *B. ciliata* цитируются экз. с датой: Araxes Kratky. Не о них ли идет речь?

С своей стороны мне приходится описать два новых вида, которые не подходят ни к одному из указанных для нашего края П. И. Мищенко видов. Один из них—*B. araxina* n. sp., отмеченная уже Е. И. Бордзиловским как *H. ciliatus* var. *grandiflorus* (1915), свойствен долине р. Аракса в южном Закавказье; другой—оригинальная *B. zygomorpha* n. sp. описана по живому материалу Тифлисского Ботанического Сада, привезенному из окр. Эшакчи Ленкоранск. у. Этот последний вид стоит особняком среди остальных закавказских беллевалий строением и окраскою своих цветов. Что же касается *B. araxina* m., то она обнаруживает близкое родство с установленной мною по живому материалу Туркестанского Отдела Тифлисского Ботанического Сада, доставленному из Закаспийской области в 1913 г. В. М. Савичем, и как оказалось, обычной там *B. Sawiczii* m., описание которой я даю ниже. Растение это обычно считалось за *B. glauca* (Lindl.) Kunth, от которого, однако, сразу отличается светлою окраскою и формою (на вершине широко открытого) цветка. У *B. araxina* устройство цветка и его окраска сходные, но цветок почти вдвое крупнее, да и все растение тоже.

Теперь мы можем перейти к более подробному рассмотрению каждого из перечисленных видов.

Bellevalia speciosa n. sp. bulbo magno (5×5 cm. globoso-depresso tunicis nigricantibus; foliis 4—5 glaucescentibus loratis margine angusto cartilagineo ciliato, 140—150 mm. long. 25—30 mm. lati; racemo ca 20 cm. longo multifloro (usque 100—floro), alabastris pulchre lacteis; floribus 8—9 \times 4 mm., tubo fuscato, laciinis flavidis vel. ochroleucis tubo fere duplo brevioribus, exterioribus gibberulis; filamentis (parte libera) antheris violaceis subinclusis aequantibus, pedicellis alabastrorum erectis, sub anthesi arcuato-nutantibus post anthesin horizontalibus, floriferis flore 2—3 plo longioribus, fructiferis valde elongatis; capsulae valvulis emarginatis.

Syn. *Hyacinthus ciliatus* var. *genuinus* Bordz. in Scripta Soc. Natur. Kiew. XXV. 1915. 76.

Bellevalia ciliata Radde. Mus. Cauc. 165 pp.
Hab. in Transcaucasia et Armenia: Kér-oghly supra Tiflin (v. viv.); Culta in Horto Tiflistensi e bulbis prope Matsra prov. Kars a. cl. Michailowskyo lectis.

Vidi specimen sicca in herbario Horti Petropolitani: 1. Inter Alexandropol et Mastara VI. 75 fr. Radde!; Circa Alexandropol VI. Alexandropol et Mastara VI. 75 fr. Radde!; Circa Alexandropol VI. 13 fl. Roop!; 3. Inaclu distr. Etshmadsin. 1300 m. V. 22 fr. Gross-hejm; 4. Circa Kaghyzman prov. Kars in decliv. argillosis V. 14 fl. Turkewicz! Karakurt prov. Kars, in decliv. arenoso-lapidosis V. 14 fl. id. 6. ad p. Kody et Alexandropol Lagowsky (spec. quoad loca dubia!).

Наше растение близко к *B. sarmatica* (Pall.) m., которую, к сожалению, мне не представилось случая наблюдать в живом состоянии, но судя по описаниям растение южной России и Предкавказья отлично от нашего. По Шмальгаузену (II. 497).

... околоцветник грязно-пурпуровый до $1/3$ лопастной, с... желтовато-зелеными вверх стоячими лопастями... По описанию

П. И. Мищенко, „perigonio griseo-fusco, segmentis... albido-lutescentibus... и на той же странице (155) по русски: От итальянского вида *H. ciliatus* Cyr. отличается... грязно-лиловым... околоцветником с беловатыми долями. „Далее, цветоножки у *B. sarmatica* (Pall.) m., по Шмальгаузену горизонтальные“, по П. И. Мищенко — „pedicellis floriferis erecto patentibus“, что не подходит к нашему растению. На последнем признаке я впрочем не настаиваю, т. к. у экз. Рооп из окр. Александрополя карпотропические изгибы цветоножек не выражены отчетливо. Думаю, однако, что тщательное сравнение живых экз. *B. sarmatica* (Pall.) m. с *B. speciosa* m. дает и дальнейшие основания к разделению этих двух рас, в гербариях обычно различимых уже по *habitus*'y.

П. И. Мищенко (стр. 157) пишет: „Более загадочным для меня является *H. speciosus* Worg. (pro *Bellevalia*). Не есть ли это *H. sarmaticus* Pall.?“ Однако, в гербарии Главного Ботанического Сада цитируемые мною выше экз. Padde (Александроволь—Мастара) им определены не за *H. sarmaticus*, а за *H. glaucus*. Да и в своей работе (стр. 155) для *H. sarmaticus* он дает следующее распространение: „Степи и холмы Крымского полуострова! Предкавказье! Закаспийской области!“. Закавказье исключено из его ареала.

Что касается распространения *H. sarmaticus* Pall. в Закаспийской обл. („В Закаспийской степи до Асхабада мы все видим *H. sarmaticus*, а далее в Афганистане, Белуджистане — *H. glaucus*“), с этим я не могу согласиться. *B. sarmatica* к востоку от Ставрополя в гербарии я не видел, все же что определялось из Закаспийской Области за *B. ciliata* (или *B. glauca*), относится к другому виду, по строению и окраске цветов сходному не с *B. sarmatica* (Pall.) m. или *B. speciosa* m., а с описываемой ниже *B. araxina* m. Я имел возможность изучить это растение по живому материалу, доставленному В. М. Савичем из Асхабадского района (Копет-даг, около пограничного поста Чайок на W по пограничной тропе, в рощах древовидного можжевельника на высоте 2600—3300 м.). В гербарии Главного Ботанического Сада хранится обширный материал по этому виду из Закаспийской обл. Описание его я даю ниже.

Мне кажется не совсем правильным указание П. И. Мищенко (l. c.), что *B. sarmatica* является показателем глинисто-солонцеватых почв — думаю, что это первоначально вообще растение склонов — глинистых, каменистых и др., и не всегда солонцеватых, также как и закавказская *B. speciosa* m.; обитания ее в степях, на полях и т. п., вероятно, вторичные для обоих видов.

Bellevalia Saviczii n. sp., bulbo magno late ovato ca 5 cm. lato tunicis griseonigricantibus; foliis 3—4 oblongo-lanceolatis, 15—17 cm. long., 22 mm. lat. supra glaucescentibus, margine anguste cartilagineo aspero; pedicellis floriferis patentibus flore usque duplo longioribus, dein accrescentibus leviter refractis, fructiferis arcuato-patentibus; floribus 9—10 mm. campanulatis albis, mox tubo griseo-fusco, lacinias late expansis, obtusis tubo paullum brevioribus; filamentis basi duplo latoe antheris violaceis exsertis duplo longioribus; ovario oblongo-ovato stylo aequilongo superato ♀.

Hab. in montibus Kopet-dagh Transcaspii supra Askhabad ad fines Persiae, in juniperetis prope Tchajok. alt. 2600—3300 m. s. m.

Descriptio ex speciminibus in sectione turkestanica Horti Tiflisiensis cultis, bulbos W. Sawicz attulit.

Vidi specimina transcaspiaca sicca on herbario horti Petropolitani:

1. Askhabad P. Sintenis a. 1900/01, n °36 (sub *B. ciliata* var. *glaucia*); 2. in fauibus prope Askhabad. Radde!. 3. Anaurt securis fl. Sumbar 1916. n °358. E. Czerniakowskai; 4. Tshildukter, Tshimen-i-bit, Tash-képji, vallis fl. Kushka, fauces Tshuli in montibus Kopet-dagh. 1912 Michelsoni!. 5. inter Kushka et Alexejevka 1916. Androsov!

Из описания явствует, что к *B. sarmatica* закаспийское растение отнести нельзя, а перечень местонахождений показывает, что растение широко распространено в южной части Закаспийской области.

К этому Закаспийскому виду довольно близко стоит, но достаточно отличается рядом признаков.

Bellevalia araxina n. sp. bulbo magno (6 × 5 cm.) ovato-globoso tunicis griseofuscis; foliis usque 7 late oblongo-loratis glaucescentibus margine ciliatis, 4—2,5 × 16 cm.; racemo denso multifloro; floribus campanulatis 11—12 mm. longis, alabastris violascentibus, sub anthesi tubo fuscescente laciniis albidis viridi-vittatis tubo duplo brevioribus, planis vel dorso gibberulis, late expansis, pedicellis flore 2—3 plo longioribus arcuato-nutantibus, dein accrescentibus erecto-patulis fructiferis fere horizontalibus; filamentis parte libera triangulari (3 mm.), antheris alboceruleis exsertis (1 mm.), germine cum stylo aequilongo antheras subaequante 10 mm.; capsulae valvulis apice rotundatis oblongis. Floris structura et colore *B. Saviczii* m. referens, sed flores duplo maiores, folia latiora longius ciliata, capsulae valvulae integrae etc.

Syn. *Hyacinthus ciliatus* var. *grandiflorus* Bordz. in Scripta Soc. Natur. Kiew, XXV. 1915, 76.

Hab. in valle fl. Araxis Armeniae. Descriptio ex speciminibus in Horto Tiflisiensi cultis; bulbos attulit d. A. Grossheim e vicina p. Tumbul prope Nakhichevan anno 1923.

Уже в 1915 году растение это, по экземплярам Т. И. Рооп, из окр. Нахичевани было выделено Е. И. Бордзиловским в качестве разновидности var. *grandiflorus* от *Hyacinthus ciliatus* — *perigonio 10—11 mm. longo...* В 1923 г. большое количество луковиц было доставлено из с. Тумбул А. А. Гросгейном, что дало мне возможность изучить это растение в живом состоянии. Среди других кавказских видов *B. araxina* m. сразу выделяется крупными, широко на вершине раскрытыми цветами с выставляющимися далеко пыльниками и столбиками; бутоны, особенно верхние, бледно-фиолетовые; створки коробочки цельные.

Быть может сюда относятся мигринские экз. Краткого, о которых говорилось выше по поводу *H. macrostylus* Misc., но едва ли этот вид вообще совпадает с *B. araxina* m., насколько можно судить по описанию автора.

Bellevaria albana n. sp. bulbo majusculo vel mediocri (4 × 3,5 cm.) supra ovato-globoso. Tunicis nigricantibus; foliis 3—4, subtus viridibus supra

glaucescentibus margine cartilagineo ciliatis apice cucullatis, 13—14 × 1,2—1,7 см.; racemo laxiusculo; floribus 7—8 mm. longis tubuloso-campanulatis, alabastris sordide violaceis dein sordide fuscis lacinis apice viridi-vittatis tubo 3-plo brevioribus, porrectis vel subexpansis planis vel gibberulis; pedicellis flore 3-plo longioribus dein accrescentibus in alabastris erecto-arcuatis, sub anthesi arcuato-nutantibus, fructiferis arcuato-patentibus; filamentis (parte libera) triangularitatis antheris violaceis sublongioribus (ca 2,5 mm.), germine oblongo medio subinflato stylo aequante (3 mm.); capsulae valvulis emarginatis.

Syn. *B. glauca* auct. fl. cauc. non Kunth.

Hyacinthus glaucus Misč. in Act. Inst. Agr. Kuban. V. 1927, 155 pp. non Baker.

Hab. in collibus siccis Transcaucasiae orientalis. Descriptio e specimenibus e monte Kharami prope Adzhikabul allatis et in sectione caucasica Horti Tiflisiensis cultis. Vidi quoque specimina viva e ditione Aresh.

Specimina sicca vidi in herbario horti Petropolitani: 1. in fauibus Oghrudzha montium Baz.-dagh ditionis Aresh 1908. Schelkownikow; 2. Elisabethpol lg. Frick!

Этот вид у авторов Кавказской флоры (в том числе и у П. И. Мищенко) фигурирует под *B. glauca* Kunth (и ее синонимами), куда они относят и описываемый ниже *B. Wilhelmsii* (Stev.) m. Подобно последнему *B. albana* m. характеризуется фиолетовыми бутонами, но хорошими отличительными признаками между двумя видами является форма створок коробочки и ориентировка плодущих цветоножек (характер их карпотропического изгиба): у *B. albana* m. створки выемчатые и ножки при плодах дуговидно-отстоящие, у *B. Wilhelmsii* (Stev.) m.—створки без выемки и ножки отогнуты вниз. В цветущем состоянии их тоже обычно можно различить: у *B. albana* m. нижние цветоножки значительно длиннее верхних и соцветие имеет из широкого основания пирамидальную форму, у *B. Wilhelmsii*, имеющей вообще более короткие цветоножки, соцветие более узкое конически продолговатое.

П. И. Мищенко предполагает тождественность *B. Wilhelmsii* (Stev.) m. с его *Hyacinthus glaucus*, — как видим, он отчасти прав, ибо в его *H. glaucus* входит и *B. Wilhelmsii* (Stev.) m. и *B. albana* m. Другое его предположение, что *H. glaucus* (Lindl.) Kunth окажется лишь формою (расою) восточного, свойственного Персии, Афганистану, и Белуджистану, как я уже говорил выше, весьма правдоподобно и пока против себя фактов не имеет.

Наконец, у П. И. Мищенко говорится, что он имел случай наблюдать несколько экземпляров, выращенных из луковиц, привезенных ему из Абхазии и отнесенных им с большим сомнением к *H. glaucus*. Тут, вероятно, описка, ибо в Абхазии нет ни *B. glauca*, ни вообще видов этого рода. Правда, в гербарии Главного Ботанического Сада имеются экземпляры Лаговского, якобы из Дальского ущелья (в Абхазии), но фиктивность этикеток этого собирателя давно уже стала „притчей во языцах“. Я отношу их к *B. Wilhelmsii* (Stev.) m. и думаю, что они собраны где-нибудь в долине р. Куры. Ряд экзем-

пляров того же автора с обозначениями: „Кумыкская плоскость“ и „Ставрополь“ относятся к *B. albana* m., но, конечно, местонахождения и здесь фиктивны.

B. albana m. растет на сухих холмах в долине р. Куры, в Ареше и Ширване (древней Албании), занимая по отношению к *B. Wilhelmsii* (Stev.) m. более восточный ареал.

B. Wilhelmsii (Stev.) n. comb., bulbo mediocri (ca 3 cm. lato) ovato-globoso, foliis 3—4 oblongo-lanceolatis glaucescentibus margine cartilagineo asperis v. brevissime ciliatis; racemo multifloro, floribus summis sterilibus; in alabastris sordide violaceis, dein fuscescentibus viridi-vittatis, lacinis conniventibus tubo 3-plo brevioribus; pedicellis floriferis nutantibus dein arcuato-patentibus, fructiferis refractis; capsulae valvulis integris stylo longiusculo. 2.

Syn. *Muscaria Wilhelmsii* Stev. Verz. Taur. 1857, 336.

Bellevalia glauca auct. fl. cauc. p.p.

Hab. in collibus siccis Iberiae. Insignis pedicellis floriferis flore sublongioribus, fructiferis fructo 5—6-plo longioribus nec ut in ceteris multoties longioribus longissimis.

Specimina sicca vidi in Herbario horti Petropolitani: 1. In rupe aprica calcarea ad Ananur d. 7, Apr. 1772. Güttenstedt. 2. *Cassas* (Iberia) Wilhelms. 3. Marienfeld et Norio circa Tiflin. Bayern. 4. In stepposis circa Tiflin 1919 Grossheim—Adsunt quoque specimen *Lagowskiana* quasi in angustiis Dala Abchaziae lecta, sed locus sine dubio fictivus.

Об отличиях этого вида от *B. albana* уже сказано выше. Здесь быть может уместно упомянуть о *Muscaria montanum* C. Koch (*Bellevalia Boiss.*). П. И. Мищенко считает коховское растение разновидностью своего *H. glaucus* (стр. 156). Мне не пришлось видеть подлинника, по описанию же судить не берусь. Но если П. И. Мищенко прав, подчиняя этот вид циклу *H. glaucus*, то возможно, что он совпадет именно с *B. Wilhelmsii* (Stev.) m. и тогда, конечно, коховское видовое название получит приоритет перед стевеновским.

Распространение этого вида ограничивается западной половиной Куринской долины, в восточной части которой он замещен *B. albana* m. Растет на склонах холмов, а также на скалах (ср. выше экз. Гольденштедта).

Bellevalia Fominii n. sp., bulbo mediocri (3 × 3,5 cm.) vel. magno (4 × 5 cm.) tunicis crossiussculis nigricantibus; foliis 3—5 basi attenuatis, apice breviter acutatis 150—200 mm. long., 1—2 cm. latis, margine membranaceo sublaevi; racemo cylindrico laxiusculo; pedicellis floriferis membranaceo subaequantibus, post authesin arcuato-patentibus; alabastris sordide violaceis, floribus fere tubulosis ca 7 mm. livescentibus, lacinis tubo 2-plo brevioribus apice nigricantibus exterioribus, dorso gibberulis, interioribus planis obtusioribus; filamentis (parte libera) triangularibus antheras luteas subaequantibus; capsulae ovato-globosae valvulis emarginatis.. 2.

Syn. *B. macrobotrys* anct. fl. cauc., non Boiss.

Hyacinthus macrobotrys ssp. *caucasicus* Misc. in Act. Inst. Agr. Kuban. V. 1927, 158.

Muscari Clusianum C. Koch. Linn. XXII. 255; Ledb. Fl. Ross. IV. 154.

Hab. in stepposis et collinis Transcaucasiae orientalis.

Descriptio ex speciminiibus in sectione caucasica Horti Tiflisiensis cultis; bulbos attulit e steppa Mil loc. Pejhambar cl. A. Schelcownikow.

Vidi specimen sicca: 1. ad p. Akhsaglar distr. Lenkoran 1907 fr. Ig. Schelcownikow! 2. In monte supra Akh-su, Bayern.

Мищенко (л. с. 158) совершенно правильно отделяет наше растение от более южного (Сирия, Палестина и Египет) *B. macrobotrys* Boiss., но только в качестве подвида, не решаясь квалифицировать его в качестве самостоятельного вида. Я думаю, что для последнего имеется достаточно оснований: желтые, а не красновато-желтые пыльники, выемчатые створки коробочки. П. И. Мищенко, неправильно характеризует коробочку как "non retusa", почти гладкие края листьев и иная окраска цветов.

Несомненно сюда относится в качестве синонима *Muscari Clusianum* C. Koch. in Linnaea. XXII. 253 и. Ledb. Fl. Ross. IV. 154 (non Griseb.): "in schirwanscher Ebene auf Mergelboden". *H. Clusiana* Griseb. Spicil. Fl. Rumel. et Bith. II. 387 = *B. dubia* (Guss.) Röhl. et Schult., отличается от нашего растения более мелкою луковицей, более узкими (0,6—1 см.) листьями, окраскою цветов, болею мелкой (0,8 см., а не 1 см. и крупнее) коробочкою. Очень обыкновенно в степях Восточного Закавказья, где в изобилии встречается на полях, достигая здесь очень крупных размеров на тучных почвах (напр. цитированные экз. Байерна).

Bellevallia zygomorpha n. sp. bulbo majusculo (usque 5 cm. diam.) tunicis nigris; foliis viridibus lanceolato-loratis basin versus attenuatis, convolutis, in vivo manifeste lineatis, margine minute aspero, 20 cm. long., 3.—3,5 cm. latis; racemo oblongo fere cylindraceo, laxiusculo, usque 16 cm. longo; pedicellis sub anthesi nutantibus, fructiferis arcuatis; floribus tubuloso-campanulatis, 10—11 mm. longis, pedicillis subaequilonigis; alabastris violaceis, dein tubo fusco viridi-vittato, lacinulis inaequilongis, superioribus brevioribus-ideo flore manifeste zygomorpho-exterioribus gibberulis; interioribus planis, omnibus apice rotundatis; filamentis (parte libera) linearibus antheras violaceas subaequantibus; capsulae valvulis integris.

Hab. in promontorii stepposis talyschensisibus.

Descriptio e speciminiibus vivis in horto Tiflisiensi cultis et e loco Eshaktshi distr. Lenkoran allatis.

Чрезвычайно интересный и оригинальный вид, сразу отличимый зигоморфными цветами и их окраскою: в бутоне фиолетовые, они постепенно желтеют и буреют от основания к вершине, но сохраняют серединную зеленую полоску вдоль листочеков околоцветника. Лопасти околоцветника на вершине тупо округленные, но будучи сложенными по килю, кажутся острыми. От цветущие цветы плотно прилегают к завязи, образуя повыше ее вершины парехват.

В гербариях этот вид встречать мне не приходилось.

Таким образом для Закавказской флоры мною устанавливается 6 видов рода *Bellevallia*. Если к ним присоединить указываемые П. И. Мищенко *Hyacinthus macrostylus* Misč. и *H. Aucheri* Baker, то их будет 8, а всего для флоры Кавказского края, включив предкавказскую *B. sarmatica* (Pall.) m., мы получим 9 видов настоящих беллевалий, вместо 4 видов, указываемых В. И. Липским. Пятый вид в его конспекте — *B. leucophaea* Boiss. *Hyacinthella leucophaea* Schur., как разъяснено П. И. Мищенко (стр. 151) для Закавказья указывалась ошибочно и должна быть из списка Кавказских видов вычеркнута. Должен, однако, заметить, хотя это относится уже к роду *Hyacinthella*, не входящему в рамки настоящей заметки, что в Араксинской долине встречается, повидимому, один вид, близкий к *H. leucophaea*. Образцы, очень плохие, были мне доставлены весною 1915 г. из окр. станции Шахтахи А. А. Флоренским, но выяснить вид по ним не удалось и на него я попутно обращаю внимание исследователей ранней весенней флоры долины Аракса.

Описанные выше 6 видов, хотя и отличаются часто мелкими признаками, повидимому, все же достаточно постоянны морфологически и имеют определенные ареалы, а потому могут претендовать на роль самостоятельных рас. В гербариях часто их очень трудно различать, но в живом состоянии они отличаются даже в виде бесплодных весенних розеток листьев, как это эффектно наблюдается на Кавказском отделе Тифлисского Ботанического Сада, где все эти виды растут рядом, в смежных лунках.

Что касается истории развития этого рода, она могла бы выясниться лишь на изучении рода в целом. П. И. Мищенко указывает на средиземноморское происхождение рода *Hyacinthus*, который он понимает в широком смысле. Дифференцировка наших рас, вероятно, сравнительно, поздняя и мне она представляется несколько иначе, чем ее рисует П. И. Мищенко (150). Среди *Bellevallia* в узком смысле, нами принятом, горных форм нет строго говоря. Наиболее "горным" является *B. Wilhelmsii* (Stev.) m. Растущая на Карсско-Александровском нагорье *B. speciosa* m. более характерна в долине Аракса и на нагорье проникла вероятно из долины. Все остальные приурочены к холмам Куринской и Араксинской долин и возможно, что это их коренная родина. Здесь, вероятно, на берегах сарматских бассейнов и происходила дифференцировка форм, чем быть может и объясняется их, я не сказал бы, "солевыносливость", а "солевыносливость", о которой говорит П. И. Мищенко по отношению к *B. sarmatica*, и которая еще с большим правом может быть приписана *B. albana* и *B. araxina* (отчасти и *B. speciosa* m.). Степи, конечно, завоеваны ими лишь в позднейшее время.

Совершенно правильно отмечает П. И. Мищенко "гнездовой" характер их распространения. Я думаю, что это можно объяснить также перипетиями их коренного ареала, — морского берега, подвергавшегося многочисленными трансгрессиям и регрессиям поздне-третичных бассейнов и тектоническим процессам, ареной которых были нынешние грабены Куры и Аракса.

Гнездовой характер распространения не только наших Закавказских, но и вообще переднеазиатских форм этого вида, указывая на выдающуюся роль изоляции, часто тесной, как напр., в случае *B. Wilhelmsii*, заставляют думать, что едва ли можно предполагать наличие одних и тех же рас того или другого рода в сильно разобщенных „гнездах“ ареала рода. Наоборот, нужно думать, что эти гнезда автономны не только в Закавказье, но и в и других странах Ближнего Востока и Средиземья и при ближайшем знакомстве с циклами, пока не возбуждающими сомнения в их целостности, обнаружится аналогичное распадение их на тесно локализированные расы — на это дает намеки даже поверхностный пересмотр гербарного материала.

Главный Ботанический Сад.
14 июля 1927 г.

G. N. Woronow.

Beiträge zur Kenntniss der Liliaceen der Kaukasus-Länder. I. Transkaukasische *Bellevalia* Arten.

Résumé.

Es werden 5 transkaukasische und 1 transkaspische *Bellevalia* Art beschrieben. Dem Transkaukasien fehlen die bisher angegebenen *B. ciliata* Nees, *B. glauca* Kunth und *B. macrobotrys* Boiss.

В. И. Кречетович.
Заметки об осоках Ярославской губернии¹⁾.

Настоящие заметки — результат обработки материала по осокам Ярославской губ., собравшегося, к концу 1926 г., в Гербарии Главного Ботанического Сада. Материал этот оказался настолько существенным, что обработка его позволяет дать первое более или менее полное исчисление осок для данного района, — наиболее ценную часть этого материала представляют сборы трех геоботанических экспедиций, имевших место в 1924 и 25 гг., в нынешнем рыбинском округе. Кроме того, были обработаны и критически проверены следующие коллекции: А. С. Петровского (1886), имевшиеся в гербарии Траутфеттера и, не полностью, в гербарии Ботанич. Музея Ак. Наук; А. М. Дмитриева — флора Верхнего Поволжья (1900, 1905) и флора Ярославской губернии (1899) (последняя хранится в Ботанич. Каб. Лнгр. У-та); А. Эльтекова (1914—15), В. И. Смирнова (1922), Э. Гаркави (1923).

Приводимый ниже список, заключает в себе только наиболее интересные виды и формы, — такие обыкновенные для района виды, как *Carex praecox* Schreb, *diandra* Schrank, *paradoxa* Willd и др., если они не представляли уклонений от типа, в этот список не вносились.

Carex pauciflora Ligthf. — дает ряд переходов к выраженной *var. elatior* Kük. et Schuster (ст. 35—50 см. мшч. 6—9 мм. дл.).

Ярославский у: Телищево, болото Змеиное, на сфагнуме 8/VII 24; оз. Глухое. Sphagn. pinosum по сев. бер., Борович. вол. 6/VIII 24; Спасское бол. близ погоста Спас — Рамене 30/VIII 24 г.

До сих пор было показано только для смежных губ.: Костромской, Тверской и Московской. Упоминалось А. С. Петровским в его первой работе „Очерк Ярославской флоры“ (Тр. Яр. Губ. Ст. Ком. 1868), как найденное в болотах лев. бер. Волги, у г. Ярославля, против лицей.

Carex praecox Schreb. var. *laxa* Kük. — в сборе А. Петровского (без обозначения места) — теневая форма.

Carex chordorrhiza Ehrh. — Ярославский у.: Sphagn. pinosum на сев. бер. оз. Глухого, 924; близ Баулова, VII 924.

¹⁾ Ярославск. губ., для большего удобства, понимается в рамках прежнего административного деления.

Иногда очень приближается к var. *sphagnicola* Laestad. — Ярославский у.: Вакорево болото, 19/VIII 24.
Carex vulpina L., var. *subcontigua* Kük (определенено G. Kükenthal'ем) — левый берег Волги, близ с. Княжкова, обрывы, 18/VI 905. А. Дмитриев.

Carex nemorosa Rebent (понимаемая в том толковании, какое этому виду придает Har. Lindberg в *Plantae Finnlandiae exsiccatae sched.*) — Ростов 1899. А. Дмитриев.

Carex contigua Hoppe, var. *remota* F. Schultz. — Рыбинский у. Коротневская лесн. дача на бер. Волги, против с. Нижне-Никульского, 14/VIII 23.

Carex leporina L. var. *typica* Aschers. et Gr. (колоски в 1 см. дл. и более) — обыкновенно.

var. *minor* O. Ktze (колоски 0,4—0,5 см. дл.) — Рыбинский у.: Лыткино, в смеш. лесу, 17/VII 20; близ д. Мхи, 14/VIII 25; опушка леса близ д. Среднёво, 3/VIII 23 (в этом сборе, на одном кусте, стебли с колосками типичными, в 1 см., и не типичными, в 0,4—0,5 см. дл.).

var. *nana* Aschers. et Gr. — Рыбинск, у. Соснов. бор на дюнах у д. Яковской Нижн.-Никульск. вол. 5/VIII 23.

На болотистых местах — переходы к var. *robusta* Fieb, нередко в виде *i. bracteata* Zapal. (с длинн. прицветн. л.) — Мологск. у. Болотце у Святого оз. 26/VIII 25.

Carex Heleonastes Ehrh. — Ростовск. у. Мохов. бол. около оз. Вепрево, 13/VI 902. А. Флеров. (Указание А. Флеровым опубликовано в Проток. СПб. О-ва Естеств. 34,1 (1907) 27).

Carex canescens L. var. *tenuis* Lang (= var. *laetevirens* Aschers). раст. зеленое, слабое с мягкими спутанными листьями и расставленными шарообразными колосками. На первый взгляд похоже на сильно затененную *Carex brunnescens* Poir (как оно и было определено), но мшч. несет типичные для *C. canescens* и, притом, очень сильно превышающие бледные кроющие чш. (этот признак сближает раст с неизвестной мне var. *subtenella* Kük.) — Рыбинский у. Дубинская лесн. дача, по дороге в с. Арефино, невырубленная полоса старого леса, 13/VIII 23.

К этой форме близок сбор А. Дмитриева (17/VI 905, болотист. торфяник близ с. Воскресенского, Мышкинск. у., лев. бер. Волги), но лл. менее мягкие и колодки сближены, продолговатые (влияние более или менее открытого места?).

Интересна форма из под г. Ярослава, — болото возле д. Мостец, 20/VI 24, — с торчащими, жесткими несколько скрученными лл. (близко к var. *strictifolia* Syr., но колоски — продолговатые, многоцветковые).

Carex brunnescens (Pers.) Poir.

Внимательное рассмотрение даже такого небольшого материала, как по одной только Ярославск. губ. невольно наводит на мысль (нуждающуюся, впрочем, в более детальной разработке, чем настоящие заметки) о возможности выделения из *C. brunnescens*, кроме теневой var. *silvatica* Meinh. (= var. *sphaerostachya* (Dew.) Kük.), еще одной формы, — свойственной более или менее открытым местам. Особенно

показательны в этом смысле особи *C. brunnescens*, выставленные на свет на порубах старых лесов, приобретающие ряд признаков смежных с *C. canescens*. Таковы же, и даже еще рельефнее, формы, собранные на окраинах болот и сосновых болотах (здесь, может быть, был постепенный выход на более открытое место, в связи с заболачиванием леса?). Подобные раст. (как с порубов, так и с болот) несут примерно такие признаки: ст. 25—40 см. выс.; лл. зеленые или зеленовато-серые, более или менее жестковатые, большую частью укороченные. Колоски мелкие, расположенные или кверху скученные, шаровидные или яйцевидные (до 0,7 см. дл.), в числе 4—6. Мшч. типичные для *C. brunnescens*, зеленые, большую частью длиннее рыжеватых кр. чш., несущих зеленый киль и бело-перепончатый край.

— Ярославск. у.: бол. по прав. стор. Вологодск. ж. д., после 2-го моста, 7/VI 23 (Э. Гаркави); Рыбинский у.: Николо-Кормск. вол. Еремейцевск. казен. лесн. дача. Вырубка к ю.-з. от д. Петрунино, 13/VI 26; бол. у. д. Мурцево, 2/VI 99. А. Дмитриев (лежит вместе с *C. canescens*); Мологск. у.: с Копорье, у начала бол. идущего к с. Яне 11/VI 899. А. Дмитриев.

В окрестностях г. Ярославля, — Ляпинское бол., среди разработок 2/VIII 24. Э. Гаркави, — собрана форма, несущая большое количество колосков (до 30), расположенных по ст. расставленными ветвистыми скоплениями; количество колосков в скоплении увеличивается по направлению книзу, от 3 до 6, нижнее — в виде многоколосковой веточки в 2 см. дл.

— var. *silvatica* Meinh. — Рыбинский у.: Николо-Кормск. вол. Еремейцовск. каз. лесн. дача. Уроч. Чурилы, 13/VI 24, Л. Рекстин; там же, И. Геккер; Мологск. у.: с. Иловна, опуш. сосн.-елов. леса, 8/VII 24. И. Сапожникова.

Carex caespitosa L. — переходные формы к var. *retorta* Fries. — Тутаевск. у. Варегово бол. окр. д. Першино, 15/VII 23. А. Мацкевич.

Carex aquatilis Wahlb. — Мологск. у.: с. Копорье, сырое место у начала бол. 11/VI 899. А. Дмитриев (лежало, как *C. acuta* L.); Ярославск. у.: Боров. вол., по краю Маделовск. бол. 5/VIII 24.

Carex Goodenovii Gay. var. *curvata* Fleisch и var. *recta* Fleisch — обычны.

var. *fulliginosa* A. Br. — Рыбинск. у. Ник.-Кормск. вол. у с. Борисова, 26/VI 24. И. Геккер.

var. *chlorostachya* Rchb. — Рыбинск. у. Ник.-Кормск. вол. у с. Омляково,

var. *junccea* Fries. — Рыбинский у. Трошинское бол. у с. Каменники Ниж.-Никульск. вол. 15/VIII 23; у д. Середнёво, 6/VII 23.

× *Carex Goodenovii* × *gracilis* Kük. (определенял Р. Поле) — Рыбинск. у. близ с. Воскресенского, берег Волги, болот. бичевник, 17/VI 905. А. Дмитриев.

× *Carex caespitosa* × *Goodenovii* Appel. — Окрестн. г. Рыбинска, у Мариевки, по водоемам у кирпич. заводов, 10/VI 21. Я. Боровикова; там же, И. Сапожникова. (Нужна проверка на месте на наличие *C. caespitosa* L.). Ярославский у. по краю Яковлевского бол. 1/VIII 24; уезд. Берег р. Черемухи, Троскино, 30/V 15. А. Эльтеков.

Carex globularis L.—Рыбинск. у.: Сфагн. бол. около Святого оз. Ниж.-Никульск. в. 13/VIII 23; вырубка горелого леса у д. Середнёво, 4/VIII 23; Ник.-Корминск. вол. Еремейцовск. каз. лесн. дача 13/VIII 24 с. Иловна; опуш. хвойн. леса, 8/VII 24.

Carex pilulifera L.—Рыбинский у.: по склону канавы вдоль Угличск. тракта у д. Омляково, Ник.-Кормск. вол. 26/VI 24. В. Смирнов; небольшое пятно сосн. леса среди пашни и луга на с.-в. от Егорьевск. погоста 16/VII 25 (Н. Шипчинский и Д. Борисова).

Нахождение этого западного, прибалтийского вида в пределах Верхнего Поволжья надо считать особенно интересным. До сих пор, этот вид указывался в Средней России для Московской губ. и то только старыми авторами: Ледебуром (II, 302) и Максимовичем (сп. 223 ех Martius). Достоверность этих показаний настоящей находкой очень веско подкрепляется, так как новые местонахождения для *C. pilulifera* L. лежат значительно восточнее Московской губ.¹⁾.

Carex limosa L. f. *vulgaris* Tausch. (с кр. чш. тупыми, притупленными или островатыми)—Ярославск. у.: болото; Рыбинский у. бол. у д. Мхи.

f. *acuminata* Tausch. (с кр. чш. длинно заостренными,—эту форму легко смешать с *C. irrigua* Sm.,—хорошо отличима по мшч. с отчетливыми жилками и по желобчатым пл.)—Рыбинский у.: торфяники.

Carex irrigua Sm. (*C. magellanica* Lam. var. *planitiae* Aschers. et Gr. В гербарии Траутфеттера—Mis. Petrowski 1886,—как *C. limosa* L.; Ярославск. у.: близ Баулова. VII 24 (А. Федченко).

До сих пор была показана только в смежных губ.: Тверской и Костромской.

Carex sparsiflora (Wahlb.) Steud. (*C. vaginata* Tausch) — Petrowski 1886 (Hrb. Trautvetter) (на одном из гербарн. листов под этим именем оказалась *C. pilosa* Scop., о чем сделал соответствующую заметку еще В. Цингер в Сборн. Св. Не поэтому ли и в Фл. Средн. Росс. Маевского (5 изд.) этот вид вошел с знаком вопроса для Ярославск. губ.?): Рыбинск. у.: Ник.-Кормск. вол. С. Еремейцово,—сосн.-берез. лес 13/VIII 24; у дер. Поповское; Ярославск. у.: бол. Черное, близ тюремн. колонии Крест.-Багор. вол. 23/VII 26; (бывш. Данилов. у.), Боровск. вол. смеш. лес близ бол. Долгий луг. 8/VIII 24; сосн. лес по дороге к Заостровке. 20/VI 23; окр. гор. Ярославля—Э. Гаркави; Мологск. у. заливн. листв. лес по р. Яне 12/VI 899. А. Дмитриев.

Carex pallescens L. var. *elatior* Aschers.—Рыбинск. у.: бол. в верхов. руч. Чога, между дд. Киверники и Власьево; Еремейцовск. каз. лесн. дача; Николо-Кормск. лесн. дача.

Carex rhizina Blytt (*C. pediformis* Auct.)—Рыбинск. у.: Лыткино; сырой хвойн. лес. 23/V 14 (А. Эльтеков); правый бер. Коровли, на склоне, 27/VI 21. И. Сапожникова; Панфиловск. вол. усад. Ливановых,

¹⁾ Вслед за этим, нельзя считать особенно сомнительной или очень случайной и возможность нахождения в губернии *Carex Buxbaumii* Wahlb. Эта осока показана В. Я. Цингером в Сборнике сведений по фл. Ср. России, на основании замечания Ашерсона в Botan. Zeit. (1889, № 52), что доставленное ему А. С. Петровским из Ярославск. губ. растение под именем *C. pediformis* C. A. Mey. есть „*C. Buxbaumii* forma *spicula terminali mascula*“ (= var. *heterostachya* Anderss).

лесист. склон. 5/VI 22. В. Смирнов; имеется в сборе А. Петровского, 1886 (герб. Траутфеттера),—лежит под именем *C. panicea* L.

Carex digitata L. var. *brevifolia* Aschers.—обычно. Иногда в виде f. *pallida* Aschers. et Gr.—Рыбинск. у.: соснов. бор вдоль шоссе от гор. к сел. Мих. Арханг. (на Черемхе) 23/V 22. В. Смирнов; лесист. обрывы к Волге у с. Семеновского, ниже Рыбинска, 29/V 22. В. Смирнов.

Форма близкая к var. *robustior* Kük.—Рыбинск. у. Троскино, смеш. елов.-берез. лес 24/V 14. А. Эльтеков.

Carex flava L.—На лугах, в условиях недостаточного увлажнения, нередки формы близкие к var. *rugosa* Anderss.—Рыбинск. у.: Ник.-Кормск. вол. д. Лебедево, 26/VI 24; Роман.-Борисоглебск. у. западн. окрестн. Варегова бол. у д. Дерунова,—кочки, 15/VI 24.

Carex lepidocarpa Tausch.—Колоски почти в половину меньше, чем у *C. flava* L. Мшч. в 4—4,5 мм. дл., у основ. колоска не так сильно вниз отогнутые, иногда горизонтально отстоящие. Листья ярко зеленая:

Отличаясь рядом более мелких признаков от Прибалтийской расы, наши раст. ближе к var. *septentrionalis* A. Palmgren, изданных из Финляндии (A. Palmgren. Flavellae exsiccatae). Считаю нужным обратить внимание на этот вид (в отдельных экземплярах он имеется в некоторых сборах из Средней, Северной и Западной России), так как полной уверенности в идентичности растений из Ярославск. губ. с *C. lepidocarpa* Tausch. у меня нет,—во всяком случае, они резко отличаются от *C. flava* L. и заслуживают специального изучения, в особенности на местах.

Рыбинский у.: елов. лес. у д. Савинской, 25/VII 25; Ник.-Кормск. вол. луг по р. Крюковке, 26/VI 24; Ярославск. у.: сырье луга у д. Заболотье, 22/VI 900. А. Дмитриев; окр. г. Ярославля, бол. за Корзинкой ф-кой, 924. Э. Гаркави; Лугов. болотце р. Выкуши у Роман.-Борисоглебска, 13/VI 900. А. Дмитриев.

Carex pseudocyperus L.—раст. из окр. г. Ярослава,—бол. у лев. бер. р. Урочь (Э. Гаркави),—ближко к var. *minor* Hampe (колоски до 2,5 см. дл. на очень коротких ножках. Мшч. 4—4,5 (5) мм. дл.).

var. *brachystachys* mihi¹⁾. Раст. низкое. Листья суженные. Колосков—три, на укороченных, почти прямых ножках, 0,7—0,8 см. дл.—малоцветковые, сильно сближенны. Мшч. 4—4,5 мм. дл., длиннее кр. чш.—Ярославск. у. Боровск. вол. по вост. бер. оз. Глухого 5/VIII 24. Е. Бобров.

Carex rostrata Stokes. var. *longipalea* Neuman.—Рыбинск. у. Глебовск. вол. берег Волги, между Глебовым и Захаровым; Ливановка, берег руч. Мологи.

var. *pendulina* Blytt. (по длине кр. чш. дает переходы к предыдущей)—Рыбинск. у. Ник.-Кормск. вол. бол. в Еремейцовск. лесн. даче. Интересны формы близкие к var. *tenuifolia* Zapal. (раст. 20—30 см. выс., с узкими, до 2,5—3 мм. шир., более или менее плоскими пл.

¹⁾ Planta minor. Folia angustata. Spiculae 3, pauciflorae, 0,8—0,7 cm. lg., approximatae, pedunculi spicularum abbreviati, suberecti. Utriculi 4—4,5 mm. lg. squamis longiores.

и с мшч. в 3—3,5 мм. дл.) Рыбинск. у. Иваново оз. на болоте 11/VII. Кондаков.

Интересно также отметить, что наравне с раст., имеющими бурые кр. чш. (var. *typica* Beck.), встречаются формы с бледно покрашенной, иногда белесой кр. чш., — их можно считать за ff. *pallescentes* Zapal.

Carex laevirostris Blytt.—Рыбинск. у. р. Харенец, к ю. от д. Мхи, 4/VIII 25; Ярославск. у., Баулово, болотист. вырубка, 27/VIII 24.

До сих пор было показано только в смежных губ.: Тверской и Костромской.

Carex vesicaria L. var. *umbrosa* Kük.—Канава, вдоль больш. дор. от Рыбинска к Ярославлю, на 5 версте, 29/V 22. В. Смирнов; там же, на 2 версте.

var. *pendula* Blytt.—Ярославский у. в канаве возле Толгского монаст. 11/VI 23. Э. Гаркави.

Переходы к var. *elatior* Anderss.—сирые места по лесным суходолам у д. Данилово, Романовск. у. 7/VIII 900. А. Дмитриев.

× *Carex rostrata* × *vesicaria* Hausskn. super-*rostrata* Kneucker. Бол.-Большое Боровск. вол. 4/VIII 24.

Carex riparia Curt.—Ярославск. у. Телищево. Никольск. опорный пункт. Ольхов. бол. 8/VIII 24.

Carex lasiocarpa Ehrh.—относятся к var. *scabrella* Zapal.

Carex hirta L. var. *hirtaeformis* (Pers.) Kunth.—Рыбинск. у.: Пуг дд. Макарово и Дымовская, 22/VII 25; сырой луг у д. Киверники, в истоках руч. Чога, 20/VII 25; отмель р. Черемхи, у усад. Ливановых, 17/VI 22; окр. г. Ярославля, лес за Корзинкиной ф-кой, 12/VI 24.

var. *villosa* Peterm.—Рыбинск. у. Ник.-Кормск. вол. берег Волги у д. Юрьевец. В. Смирнов.

На основании приведенных заметок и известной до сих пор литературы, для Ярославской губ., в настоящее время, можно считать достоверно установленными 43 вида осок, не считая 3 помесей; из них 5,—*Cc. nemorosa* Rebent, *pilulifera* L., *irrigua* Sm., *lepidocarpa* Tausch., *laevirostris* Blytt., — в настоящих заметках приводятся впервые. Если сюда еще добавить *C. loliacea* L., *tenella* Schkuhr и *acutiformis* Ehrh., которые, до сих пор, еще не показаны для Ярославской губ., но, несомненно, должны найтись в ней, то общее число видов осок возрастет до 46—47.

В заключение несколько слов о двух сомнительных для Ярославской губ. видах: *Carex paniculata* L. и *Carex montana* L.

Carex paniculata L. Находящиеся, в количестве двух листов, в гербарии Траутфеттера (Mis. Petrowski, gub. Jaroslaw, 1886), под этим именем осоки, при ближайшем рассмотрении, оказались *Carices paradoxae* Willd. Этот же вид (очевидно, на основании подобного же гербарного материала) взят под вопрос и в 5 издании Флор. Средн. России Маевского. А. С. Петровский, в своей работе „Флора Ярославской губернии“, 1880, приводит *C. paniculata* L. для Ярославск. у.

(около с. Смоленского) и для южн. ч. Ростовского у. Выяснению этого вопроса может помочь только работа коллекторов в указанных районах, так как, вероятно, и во всех иногородних дублетах сборов А. Петровского лежат теже *C. paradoxae* Willd.

Теоретически нахождение *C. paniculata* L. в Ярославской губ. вполне возможно.

Carex montana L. Образчик этого раст., по указанию В. Я. Цингера (сб. св.) находился в гербарии Н. П. Семенова, хранящемся при СПб. университете. К сожалению, в Ботанич. Каб. Лнгр. У-та этого гербария не оказалось и куда он был передан установить не удалось. Напрашивается предположение — не была ли за *C. montana* L. принята несколько похожая на нее *C. pilulifera* L., тем более, что предел распространения *C. montana* L. к северу, лежит значительно южнее Ярославск. губ.

Carex ornithopoda Willd., — под этим названием в гербарии Траутфеттера (Mis. Petrowski 1886, gub. Jaroslaw) лежит мелкая *Carex digitata* L.

27/XII 26. Главный Ботанический Сад. Гербарий.

W. I. Kreczetowicz.

Einige Anmerkungen über im Gouvernement Jaroslaw auftretenden Riedgrasarten.

Résumé.

Vorliegende Arbeit enthält Daten einer kritischen Bearbeitung der im Gouvernement Jaroslaw vorkommenden Riedgrasarten; diese Bearbeitung ist hauptsächlich, auf Grund des im Herbar des Botanischen Hauptgarten aufbewahrten Materials ausgeführt.

Fünf Arten, nämlich: *Carex nemorosa* Rebent, *pilulifera* L., *irrigua* Sm., *lepidocarpa* Tausch. und *laevirostris* Blytt, sind zuerst für dieses Gouvernement angezeigt.

р. Майхэ, в окр. ст. Муданьцзян и раз. Эхо по долине р. Муданьцзян, в окр. ст. Таолайчжао, Лашагоу по долине р. Сунгари.

Эти коллекции показали, что в пределах Сев. Маньчжурии обитают все виды, установленные А. Ф. Флеровым, а кроме того вид *T. chinensis* Fl., описанный из Китая. Помимо Флеровских видов, также найден *T. Maximowiczi* Korsh. и устанавливаются три новых разновидности водяного ореха, а именно: *T. amurensis* Fl. var. *Komarovii*, var. nov., *T. chinensis* Fl. var. *Flerovi* var. nov. и var. *manschurica* var. nov.

1. *Trapa manschurica* Fl. Растение крупное с листьями на длинных черешках. Пластина листьев почти сердцевидная заостренная, крупно-зубчатая. Черешки листьев более или менее вздуты. Верхняя часть листа ярко зеленая нередко с более темной основной частью. Задняя часть листа волосистая светло-зеленая.

Цветы крупные 1 $\frac{1}{2}$ —2 см. высоты. Столбик прямой в 5 м. длины с булавовидно-расширенным рыльцем. Коронка, окружающая пестик, желтая с 8 лопастями, покрыта короткими волосками. Коронка выделяет мед и привлекает насекомых. Лепестки белые, удлиненные, на вершине закруглены или с выемкой. Цветоножка плотная, волосистая, к развивающейся завязи сильно разрастающаяся.

Чашелистники копьевидные при разростании завязи расходятся в стороны.

Орехи варьируют по форме и величине. Четырех и двухрогие формы растут на разных растениях. Листья двухрогих орехов сходны с листьями четырехрогих.

T. manschurica Fl. самый обычный вид растущий по берегам крупных стариц и озер в долине р. Сунгари.

2. *Trapa amurensis* Fl. Вид этот описан по коллекциям с Амура и типичной формы пока в Сев. Маньчжурии не найдено. Наблюдалось лишь var. *bispinosa* Fl. и новая разновидность var. *Komarovii* var. nov.

Внешний вид растения *T. amurensis* var. *bispinosa* не отличается от *T. manschurica*. В этом отношении оба вида имеют много сходства. Разновидность var. *Komarovii* var. nov. имеет 3—4-х рогие орехи с узкой низкой шейкой. Найдена эта разность у г. Харбина и ст. Таолайчжао.

3. *Trapa chinensis* Fl., был впервые описан по орехам, хранившимся в Глав. Бот. Саду по сборам Т. Н. Потанина из пров. "Szechuan" из Китая. Одни из наших экземпляров относятся к типичной форме этого вида, другие выделяются в новые разновидности этого вида, а именно—var. *manschurica* var. nov. с крупными орехами и небольшими боковыми рогами без бугорков и var. *Flerovi* var. nov. с мелкими ребристыми орехами, с коротким зачатком боковых рогов и также без бугорков.

T. chinensis по сие время обнаружена в окр. ст. Яомынь по долине р. Имахе и у ст. Таолайчжао по долине р. Сунгари.

4. *Trapa japonica* Fl. встречается почти повсеместно, но, в небольшом количестве. Это мелкое растение с довольно крупными листьями, зубчатыми по краям. Поверхность их зеленая или красноватая, чаще пестрая.

Б. В. Скворцов.

К флоре Маньчжурии.

Маньчжурские формы водяного ореха.

Среди различных водяных растений Сев. Маньчжурии род *Trapa* L. следует признать одними из самых интересных и заслуживающих внимания.

Почти до самого последнего времени в бассейне Амура насчитывалось три вида *Trapa*, а именно: *Trapa natans* L., *T. incisa* S. et Z. и *T. Maximowiczi* Korsh. К первому виду относились все формы с четырехрогими орехами, ко второму виду с двухрогими орехами, и наконец к *T. Maximowiczi* растения с очень мелкими плодами весьма своеобразной формы.

В 1925 году вышла из печати работа проф. А. Ф. Флерова "Систематика и ботаническая география рода *Trapa* L. (Изв. Глав. Бот. Сада Т. XXIV, 1925) в которой автор подробно останавливается на всех формах рода *Trapa*, растущих в пределах Европы и Азии. В этой работе он дает описание растения и плодов, собранных в свое время в бассейне рек Амура путешественниками Мааком, Максимовичем, С. Коржинским и В. Л. Комаровым. Материал из Сев. Маньчжурии проф. А. Ф. Флеров изучал по сборам Д. Литвинова, который побывал у нас в 1902 году и собрал плоды и растения по роду *Trapa* в окрестностях ст. Имяньпо, ст. Таолайчжао, ст. Цицикар К. В. ж. д. и около г. Харбина.

По мнению проф. А. Ф. Флерова *Trapa natans* в пределах Азии не встречается и обитает лишь в Европе. Четырехрогие *Trapa* в пределах С. Маньчжурии им выделяются в два самостоятельных вида: *T. amurensis* Fl. и *T. manschurica* Fl. Все двухрогие формы отнесены к нескольким видам; одна форма в качестве разновидности к *T. amurensis*, другая к *T. manschurica*, третья выделена в самостоятельный вид *T. japonica* Fl. Вид *T. incisa* S. et Z. по Флерову синоним *T. japonica*.

Собирая материал по *Trapa* в бассейне р. Сунгари с 1912 года я здесь даю краткое описание имеющихся коллекций.

До сего времени материалы собирались у г. Харбина по долине р. Сунгари, в окр. г. Цицикара в озерах, в окр. раз. Чэн К. В. ж. д. по долине р. Ашихэ, окр. ст. Уцзимихэ, Имяньпо, Яблони в долине

Черешки более вздуты чем у *T. manschurica*. Цветы меньше.
Пестик в 4 м. длины. Лепестки узкие 15 м. длины, 5—8 м. ширины.

Коронка желтая с 8 лопастями с короткими волосками.
Чашелистиков 4, из которых 2 отпадают, а остальные выростают в иглы. Плоды мелкие, хорошо отличимы от других видов.

5 *Trapa Maximoviczi* Korsh. Найден лишь по долине р. Майхэ, в заводях горных речек.

Приводим краткие латинские диагнозы новым разновидностям:

1. *Trapa amurensis* Fl. var. *Komarovii* Skv. nov.
Nux magna, corona brevi, cornua 3—4 basi latissima tuberculis lacunisque sat variabilibus.

2. *Trapa chinensis* Fl. var. *manschurica* Skv. nov.
Nux magna, cornua 2, corona brevis, tubercula nulla.

3. *Trapa chinensis* Fl. var. *Flerovi* Skv. nov.
Nux minor, cornua 2, corona brevis. Lacunis variabilibus.

Таким образом в пределах С. Маньчжурии найдено 5 видов и 4 разновидности рода *Trapa*.

Нахождение в пределах Сев. Маньчжурии девяти различных форм рода *Trapa* должно представлять не малый научный интерес.

Это, повидимому, единственное место на земном шаре, где еще развивается в таком разнообразии форм этот вымирающий третичный род.

Август. 1926

Харбин.

B. W. Skvortzow.

Fragmenta Floraе Manschuriae. II.

Trapa generis formae manshuricae.

Résumé.

Die kleinen Landseen von Manschuria sind reichlich mit *Trapa*-Arten bewachsen, wobei diese Arten im höchsten Grade in Form und Grösse zu varierter pflegen. Deren zahlreiche Formen verteilen sich natürlicherweise auf 1) zweihörnige *Trapa chinensis* Fler. mit zwei Abarten: var. *Flerovi* nova Skw. und var. *Komarovii* nova Skw. T. *japonica* Fler. und *T. Maximoviczii* Korsh und auf 2) vierhörnige *T. amurensis* Fler. und *T. manschurica* Fler.

И. Знаменский.

Влияние алюминия на ксерофитные и мезофитные расы пшеницы.

В настоящее время мы имеем значительное число работ, посвященных алюминию в растениях и влиянию его на тот или иной растительный организм. Литературу вопроса мы находим в работе Pellet et Freibourg, а также в работах Stoclaza, частью в труде G. N. Hoffer и R. H. Carr. Сопоставляя литературные данные, мы видим, что в истории вопроса об алюминии в растениях и о влиянии его можно наметить три точки зрения.

1. Алюминий при анализах золы различных растений в числе найденных элементов не упоминается (Berthier, Peligo, Fresénius), или же, если находится, то в минимальном количестве и только случайно, принесенный чаще всего земляной пылью, приставшей к листьям, стволу и особенно к корням (Müntz et Girard).

2. Алюминий во многих растениях встречается, как постоянный зольный элемент.

Анализы Kratzman'ом 130 растений показали, что алюминий широко распространен в растительном мире. Многие растения (*Lycopodium*, *Vitis*, *Orites*, *Anchusa* и др.) могут быть прямо названы "алюмофилами". По Kratzman'у различные растения могут обладать избирательной способностью в отношении алюминия. Два растения могут поглощать далеко неодинаковые количества алюминия, хотя бы и расли на почве с одним и тем же процентным содержанием его.

3. Более поздние исследования приписывают алюминию или положительное или отрицательное значение в жизненных процессах растений. Так Maze находит, что присутствие алюминия в почве необходимо для нормального развития maize. True, Black и Kelley указывают на высокое содержание алюминия в верхушках стеблей шпината, причем в растениях больных, его более, чем в здоровых. M. Fluri, исследуя нити спирогиры, погруженные в раствор 0,003—0,1% серного, озотного, двухромового и хлористого алюминия, нашел довольно быструю потерю накопившегося в них крахмала, несмотря на хорошее освещение. То же самое наблюдается и на *Elodea canadensis* и *Lemna trisulca*. Опыты с плазмолизом обезкрахмаленных клеток показали, что под влиянием солей алюминия нарушается осмотическое свойство клеток, а именно, раствор селитры, сахара и т. д., вызывающие плазмолиз в нормальных клетках, не вызывает его

в клетках, подвергнутых действию алюминиевых солей.

В 1911 г. мною, по предложению покойного академика В. И. Палладина, в его лаборатории был исследован вопрос о влиянии алюминия на дыхание растений.

Объектами, на которых я определял дыхание, были зародыши пшеницы, полученные из Цюрихской городской мельницы.

Количество CO_2 определялось методом Петтенкоферовских трубок. Зародыши пшеницы, расположенные тонким слоем на фильтровальной бумаге, размачивались один час в 30 к. с. воды или хлорида алюминия, налитого в кристаллизационную чашку тонким слоем. Снятые вместе с бумагой зародыши освобождались от избытка воды на сухой пропускной бумаге. Затем бумага, свернутая трубкой, осторожно переносилась в сосуд. Влажные зародыши хорошо держались на пропускной бумаге.

Способ размачивания был предложен А. А. Рихтером.

Опыты дали следующие результаты.

Опыт № 1.

Три порции зародышей пшеницы по 4 гр. каждая мочены 1 час в 30 к. с. I — воды, II — 0,1% $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$; III — 1% $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.

$T = 18\frac{1}{2}$ °.

Продолжительность опыта в часах	I — вода		II — 0,1% $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$		III — 1% $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	
	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час
20 $\frac{1}{2}$ час.	37,6	1,81	33,2	1,6	10,4	0,5
30 час.	24,8	0,82	13,6	0,45	6,8	0,22

Следующие опыты тем же методом производились с хлоридом алюминия.

Опыт № 2.

$T = 18$ ° С.

Продолжительность опыта в часах	I — вода.		II — 1/50 Н.Р. AlCl_3		III — 1/500 Н.Р. AlCl_3	
	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час
24 $\frac{1}{2}$ час.	28	1,1	4	0,1	22,8	0,9
22 час.	21,6	0,9	1,2	0,06	7,6	0,3

Опыт № 3.

Зародыши пшеницы, убитые толуолом.

Опыт велся тем же методом; порции зарод. — 3 гр.; в коленчатую часть склянки приливалось по 5—6 к. см. толуола.

$T = 17$ ° С.

Продолжительность опыта в часах	I — вода		II — 1/50 Н.Р. AlCl_3		III — 1/500 Н.Р. AlCl_3	
	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час
24 $\frac{1}{2}$ час.	12,8	0,52	3,2	0,12	12	0,49
24 час.	2,4	0,1	0,2	0,008	0,4	0,017

Опыт № 4.

Три порции зародышей пшеницы по 3 гр., обработанные эфиром. В промывалке — толуол.

$T = 18$ ° С.

Продолжительность опыта в часах.	I — вода.		II — 1/50 Н.Р. AlCl_3		III — 1/500 Н.Р. AlCl_3	
	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час	CO_2 в mgr.	CO_2 в 1 час
23 $\frac{1}{2}$ час.	25,2	1,08	4,8	0,16	17,6	0,76
23 $\frac{1}{2}$ час.	9,6	0,41	1,6	0,07	1,6	0,07

Проверенные неоднократными опытами, приведенные данные позволяют заключить:

1. Что алюминий в концентрациях 1/500 норм. раствора и выше является безусловно ядовитым. Дыхание зародышей пшеницы угнетается с повышением концентрации, что вполне естественно, все более и более.

2. На зародыши, обработанные толуолом или эфиром, отрицательное явление его значительнее, чем на живые.

Проф. Стоклаза, давая исторический обзор исследований о присутствии алюминия в растениях, приводит результаты своих работ о содержании алюминия у ксерофитных, мезофитных, гидрофильных и гидрофитных форм. Многие сделанные автором наблюдения и исследования приводят его к выводам, что все органы ксерофитных растений содержат крайне малое количество алюминия, часто даже в следах, что, по мнению автора, объясняется индивидуальными особенностями этих растений, именно тем, что они извлекают крайне малое количе-

ство алюминия из почвы. Что касается гидрофилов и гидрофитов, то у них констатировано большее количество алюминия, причем у более высоко организованных растений алюминий находится главным образом в корневой системе, меньше в надземных частях. Количество окислов алюминия колеблется у большого числа гидрофитов и гидрофилов в корневищах и корнях от 0,104 до 0,766%, а в надземных частях от 0,018 до 0,276%. Автор приходит к выводу, что в экономической жизни гидрофитов и гидрофилов при механике минерального обмена веществ, поступление алюминия в клетку из воды или из почвы является специально необходимым. Физиологические особенности гидрофитов и гидрофилов находятся в зависимости от содержания алюминия в запасном питательном веществе семян.

Исследуя влияние алюминия на прорастание семян и развитие растений проф. Стоклаза на основании наблюдения влияний различных концентраций хлорида алюминия приходит к выводу, что хлорид при концентрации от 0,0001 до 0,0005 атомного веса в гр. влияет, как возбуждающий фактор при процессе прорастания у *Hordeum distichum*, а также *Triticum vulgare*, *Pisum sativum* и *Lepidium sativum*.

Наиболее ясное влияние наблюдалось для *Hordeum distichum*, *Lepidium sativum* и *Pisum sativum* при концентрации 0,0002 ат. в. в гр. алюминия, у *Triticum vulgare* при концентрации 0,0005.

0,001 ат. в. в грам. алюминий вредно отзывается, как на способности прорастания, так и на прорастании.

Наблюдения, проведенные над влиянием алюминия на развитие ксерофитов, гидрофитов и гидрофилов подтверждают результаты предыдущей работы в том смысле, что алюминий — корневой системой гидрофитов и гидрофилов всасывается в большей мере, чем у ксерофитов, и что гидрофиты и гидрофилы переносят более сильные концентрации, чем ксерофиты.

Разница усвоемости алюминия настолько очевидна, что проф. Стоклаза делает вывод о несомненной физиологической функции алюминия у гидрофитов и гидрофилов.

Растительные формы, с которыми оперировал проф. Стоклаза, морфологически были далеко неодинаковы и принадлежали не только к различным видам, родам, но даже и семействам. Так, в качестве типичных ксерофитов брались *Allosurus crispus*, *Stipa pennata*, *Polygonatum officinale*, *Polygonum viviparum* и т. д. гидрофилов и гидрофитов *Cystopteris fragilis*, *Polypodium vulgare*, *Osmunda regalis*, *Carex riparia*, *Carex vesicaria* и т. д.

Интересно было бы произвести наблюдения влияния алюминия на ксерофиты и гидрофиты над растительными формами родственно близкими друг другу, принадлежащими к одному и тому же виду. Имея это ввиду, названная работа и представляет из себя попытку дать материал к широкой постановке вопроса о физиологической реакции на ксерофиты и гидрофиты.

Объектами для наблюдений мною избраны были две разновидности *Triticum vulgare*: *Triticum vulgare ferrugineum* № 81/4 и *Triticum vulgare var. pseudohostianum* № 330/16. Обе эти пшеницы являются чистыми линиями, выделенными Тулуновской опытной станцией — первая из сортов Иркутских пшениц, вторая — из американских гиб-

ридных сортов. Близкие между собою в морфологическом смысле, пшеницы эти по отношению к влажности — противоположны.

Для опытов мною брались семена той и другой пшеницы урожая одного и того же года.

Отобранные семена приблизительно одинакового веса помещались на фильтровальной бумаге в проращивались с дистилированной водой. Когда у зародышей исследуемых пшениц образовался главный корень и боковые, растения осторожно вынимались из проращивателя, промывались стерильной водой и помещались в водяную культуру для дальнейшего развития.

Питательный раствор тот же, что и в работе проф. Стоклазы, т. е. на 1000 к. с. дистилированной воды — 1 гр. KNO_3 , 0,1 гр. $MgSO_4$, 0,3 гр. $Ca_3(PO_4)_2$ и 0,25 ($FePO_4$).

Раствор с алюминием имел тот же состав, только прибавлялось от 0,0005 до 0,001 ат. веса в грам. алюминия в виде сульфата.

Через питательный раствор пропускался воздух каждые три дня, чтобы доставить корневой системе необходимое окисление веществ для диссимиляционных процессов.

Вегетационные стеклянные сосуды имели вместимость в 2500 к. с.

Опыты велись в течение марта, апреля, мая и августа 1926 г.

Каждый опыт повторялся дважды.


Измерение площади листовой поверхности производилось при помощи предварительного отпечатывания листьев на фотографической бумаге, после чего по контурам листа отпечатки тщательно обрезались и взвешивались. Одновременно с листьями отпечатывался квадратик бумаги определенной площади. Исходя из известных соотношений поверхности и веса его, легко определялась по весу отпечатков листьев — их площадь. У подземной части измерялась у каждого из 20 растений наиболее длинная прядь, боковые ответвления не изменились.

Опыт № 1.

По 30 растений, проращенных указанным выше способом, помещались в стеклянные сосуды с питательным раствором, два — 81/4 и 330/16, как контрольные без алюминия, два — с прибавлением 0,001 ат. в. в грам. алюминия в форме сульфата. После 20-дневной вегетации по 20 растений из каждого сосуда сняты, измерена длина надземной и подземной части, площадь листовой поверхности и вес сухого стебля как стеблей, так и корней, высушенных в термостате при 105° С.

Питательный раствор без алюминия.

Сорта пшеницы.	Длина надземной части. Среднее из 20 в см.	Длина подземной части. Среднее из 20 в см.	Вес сухого остатка.		Площадь листовой поверхности.
			Стебли.	Корни.	
81/4	16,3	15,6	0,416	0,1570	18,45
330/16	19,6	18,9	0,5696	0,2148	28,29



Питат. раствор с алюминием 0,0001 ат. в.
Мощное развитие корневой системы.

330/16.

Питат. раствор.

Питательный раствор с алюминием 0,001 ат. в. в граммах на литр сульфата.

Сорта пшеници.	Длина надземной части. Среднее из 20 в см.	Длина подземной части. Среднее из 20 в см.	Вес сухого остатка.		Площадь листовой поверхности.
			Стебли.	Корни.	
81/4	12	5,1	0,0856	0,0385	6,1
330/16	14	8	0,093	0,0541	7,3

Алюминий в количестве 0,001% ат. в. в грам. на. литр. в виде сульфата действует угнетающе, как на пшеницу засухоустойчивого характера, так и на ее антипод.



Питат. раствор с алюминием 0,0005 ат. в.

Питат. раствор.

Питательный раствор с алюминием 0,001 атм. в.

81/4.

Опыт № 2.

Условия те же, что и в предыдущем опыте, с тою только разницей, что содержание алюминия понижено до 0,0005 ат. в. в грам. в форме сульфата.

Питательный раствор без алюминия.

Сорта пшеницы.	Длина надземной части. Среднее из 20 в см.	Длина подземной части. Среднее из 20 в см.	Вес сухого остатка.		Площадь листовой поверхности.
			Стебли.	Корни.	
81/4	20,9	19,7	0,7270	0,2680	33,52
330/16	20,6	18,5	0,766	0,3158	46,99
Питательный раствор с алюминием 0,0005 ат. в. в граммах в форме сульфата.					
81/4	16,2	15,7	0,5382	0,1668	18,57
330/16	22,4	18,8	0,8026	0,3484	48,7

Небольшое угнетение, выражавшееся в замедлении роста, было замечено у 81/4 через семь дней; через четырнадцать дней отставание в росте по сравнению с контрольным опытом значительное, с этого же момента наблюдается хлороз у вновь развивающихся листьев 81/4. Развитие боковых корней у 330/16 — значительное.

Опыт № 3.

Количество алюминия понижено до 0,0003 ат. в. в граммах в форме сульфата. Остальные условия те же, что и в предыдущих двух опытах.

Питательный раствор без алюминия.

Сорта пшеницы	Длина надземной части. Средн. из 20 в см.	Длина подземной части. Средн. из 20 в см.	Вес сухого остатка.		Площадь листовой поверхности.
			Стебли.	Корни.	
81/4	16,1	20,65	0,5672	0,2199	29,6
330/16	22,6	20,4	0,792	0,2884	43,56

Питательный раствор с алюминием 0,0003 ат. в. в грам. в форме сульфата.

Сорта пшеницы	Длина надземной части. Средн. из 20 в см.	Длина подземной части. Средн. из 20 в см.	Вес сухого остатка.		Площадь листовой поверхности.
			Стебли	Корни	
81/4	14,7	16,9	0,5112	0,1998	22,2
330/16	23,7	22,3	0,8043	0,3540	47,7

И в этом опыте наиболее бросающаяся в глаза разница сказывается в более мощном развитии боковых корней у 330/16. То же, что и в предыдущем опыте явление хлороза вновь появляющихся листьев было заметно у 81/4 в присутствии 0,0003% ат. в. алюминия.

Опыт № 4.

Настоящий опыт был поставлен одновременно с предыдущим. Контрольные цифры те же, что и в опыте № 3. Содержание алюминия понижено до 0,0001 ат. в. в грам. в форме сульфата.

Сорта пшеницы	Длина надземной части. Средн. из 20 в см.	Длина подземной части. Средн. из 20 в см.	Вес сухого остатка		Площадь листовой поверхности
			Стебли	Корни	
81/4	15,8	13,3	0,3424	0,1296	24,9
330/16	23,5	22,5	0,8061	0,3620	49,54

Сравнивая количество сухого остатка, как величину наиболее точную, контрольных растений с количеством остатка растений, подвергнутых воздействию сульфата алюминия в концентрации 0,001—0,0001 ат. в. в граммах и переводя на проценты, находим уменьшение веса остатка у 81/4 при всех концентрациях, в то время, как у 330/16 вес остатка уменьшается только при концентрации 0,001 ат. в. алюминия, при всех остальных увеличивается.

Уменьшение веса сухого остатка в %.

Концентрация	0,0001 ат. в.		0,0005 ат. в.		0,0003 ат. в.		0,0001 ат. в.	
	Стебли	Корни	Стебли	Корни	Стебли	Корни	Стебли	Корни
81/4	79,1	75,3	25,9	37,7	9,8	9,1	39,4	41
330/16	83,6	74,3	—	—	—	—	—	—

Увеличение веса сухого остатка в %.

81/4	—	—	—	—	—	—	—	—
330/16	—	—	4,7	10,3	1,6	22,4	1,7	25,5

Интересен вопрос, какое влияние оказывает алюминий, в указанных при опытах с водными культурами на концентрациях, на дыхание тех же испытуемых пшениц. Не имея в запасе солей сульфата, я проделал приведенные ниже опыты с хлоридом. Зерна пшениц прорашивались на фильтровальной бумаге в дистиллиированной воде в течение 1—2 суток при температуре 18—19°C. Затем отобранные и обмытые стерильной водой экземпляры переносились в чашки Петри, где и пребывали в 30 к. с. раствора четыре часа. Освобож-

денные от избытка влаги, зародыши переносились в колбы Эрленмейера с отводной трубкой, где и размещались на фильтровальной бумаге, смоченной стерильной водой.

Определение CO_2 производилось по методу Петтенкоферовских трубок.

Опыт № 1.

Отобранные из проращиваемых одни сутки семян пшениц 81/4 и 330/16 пробы по 100 зерен намачивались каждая 4 часа в 40 куб. см. 0,001 атомн. веса в грам. алюминия в форме хлорида. Контрольные оставались в прращивателе.

$T=15^{\circ}\text{C}$.

Продолжительность опыта	81/4				330/16			
	H_2O		0,001 ат. в. Al.		H_2O		0,001 ат. в. Al.	
	CO_2 в mgr.	1 час						
14½ ч.	14,4	0,99	11,2	0,76	13,6	0,93	12,8	0,81

Те же условия с трехдневными проростками.

$T=17^{\circ}\text{C}$.

Продолжительность опыта	81/4				330/16			
	H_2O		0,0001 ат. в.		H_2O		0,0001 ат. в.	
	CO_2 в mgr.	1 час.						
25 ч.	58,4	2,33	50,4	2,01	67,2	2,7	58,6	2,34

Опыт № 2.

Те же условия опыта. Концентрация понижена до 0,0005 ат. в. алюминия в граммах в форме хлорида.

$T=18^{\circ}\text{C}$.

Продолжительность опыта	81/4				330/16			
	H_2O		0,0005 ат. в. Al.		H_2O		0,0005 ат. в. Al.	
	CO_2 в mgr.	1 час.						
20 ч. 50 м. . .	39,2	1,4	36	1,2	36,3	1,26	40,1	1,9

Те же условия опыта с трехдневными проростками.

$T=17^{\circ}\text{C}$.

Продолжительность опыта	81/4				330/16			
	H_2O		0,0005 ат. в. Al.		H_2O		0,0005 ат. в. Al.	
	CO_2 в mgr.	1 час.						
19½ ч.	47,2	2,39	45,1	2,28	40	2,02	48	2,43
22 ч.	64	2,9	63,8	2,9	60	2,72	64	2,9

Как видно из таблицы, количество выделяемой CO_2 понижается у засухоустойчивой 81/4 пшеницы и повышается у водолюбивой 330/16.

Опыт № 3.

Те же условия, что и в предыдущих опытах. Концентрация алюминия понижена до 0,0001 ат. в. в граммах в форме хлорида.

$T=17^{\circ}\text{C}$.

Продолжительность	81/4				330/16			
	H_2O		0,0001 ат. в.		H_2O		0,0001 ат. в.	
	CO_2 в mgr.	1 час.						
18 ч.	50,4	2,8	44,8	2,49	37,6	2,08	40	2,22
12 ч.	23,2	1,93	21,6	1,8	16,8	1,4	18,9	1,57

Те же условия опыта с двухдневными проростками.

$T=16^{\circ}\text{C}$.

7 ч.	81/4				330/16			
	H_2O		0,0005 ат. в. Al.		H_2O		0,0005 ат. в. Al.	
	CO_2 в mgr.	1 час.						
7 ч.	8,8	1,25	7,4	1,05	6,6	0,94	10,4	1,48
13½ ч.	23,2	1,71	20,8	1,54	16	1,11	19	1,4

Сопоставляя данные всех опытов, как с водными культурами, так и с дыханием пшениц, 81/4 и 330/16 приходим к выводам:

1. Алюминий ядовит для жизнедеятельности обоих пшениц, при концентрации 0,001 ат. в. в граммах в форме сульфата.

2. Понижение концентрации до 0,0005 ат. в. в граммах ведет к различным последствиям; в то время, как ксерофит угнетается, антипод его стимулируется: сухой остаток вещества увеличивается, также как и листовая поверхность.

3. Дальнейшее понижение концентрации до 0,0003—0,0001 ат. в. в граммах алюминия в форме сульфата дает те же результаты, при чем стимулирование у 330/16 идет в области более мощного развития корневой системы.

4. Наблюдение над дыхательным процессом подтверждает данные полученные с водными культурами: являясь токсичными для вышеуказанных пшениц в концентрации 0,001 ат. в. в граммах в форме сульфата, алюминий при понижении концентрации от 0,0005 ат. в. до 0,0001 служит стимулятором дыхательного процесса пшеницы 330/16—мезофита и угнетателем ксерофита 81/4.

5. Рациональной классификации биологических типов растений в отношении водного режима до сих пор нет.

Понятие о ксерофитах, мезофитах и гидрофитах, составленное на основании известных структурных различий в связи с местообитанием достаточно расплывчато.

Произведенные наблюдения влияния алюминия в концентрациях 0,001—0,0001 над двумя пшеницами 81/4 и 330/16, противоположными в отношении водного режима, показывают, что понятие о ксерофитах и мезофитах нуждается в подробном физиологическом анализе.

Отсутствие материала не позволило мне проверить полученные опытные данные на ряде других морфологических близких друг к другу форм, что конечно, необходимо сделать и только тогда возможно говорить об алюминии, как индикаторе на ксерофитизм и мезофитизм.

Необходимо также произвести определение алюминия в стеблевой и корневой части пшениц 81/4 и 330/16 и ряд микрохимических анализов. Отсутствие реактивов не дало мне возможности провести эту работу.

Следовало бы определить концентрацию водородных ионов. В заключение приношу мою искреннюю благодарность профессору В. Т. Шевякову за привезенную им из-за границы для меня литературу и преподавателю А. И. Потапову за некоторые советы, а также и за предоставление возможности выполнить настоящую работу в заведываемой им агрономической лаборатории Восточно-Сибирской сельско-хозяйственной Опытной Станции.

ЛИТЕРАТУРА:

- Pellet et Fribourg. Annales de la science agronomique III Série. Annal. 2. 1907.
 S. Stoelzla. Biochemische Zeitschrift. Band 88. Heft. 4. S. 292.
 S. Stoelzla. Über den Einfluss des Aluminiums auf die Keimung des Samens und die Entwicklung der Pflanzen. Biochemische Zeitschrift. Band 91. Heft. 4.

G. N. Hoffer and R. H. Carr. Accumulation of Aluminium and from Compounds in Corn Plants and its probable Relation to Rootrots.
 A. И. Потапов. Физиологические признаки пшениц — ксерофитов. Сборник материалов к изучению сельского хозяйства Сибири.

J. Znamenskij.

The influence of aluminium on xerophyte and mesophyte wheat.

(Summary).

Observations were made on the influence of aluminium on two varieties of wheat, viz.: "Triticum vulgare ferrugineum, № 81/4" and "Triticum vulgare var. pseudo-hostianum, № 330/16". Both kinds of wheat are "pure lines" and were selected by the Eastern Siberian Agriculture Station. Being morphologically closely related, they diametrically differ with regard to water regime.

The experiments were conducted with culture solution containing aluminium sulphate in concentrations of 0,001, 0,0005, 0,0003 and 0,0001 atomic weight in grams.

Besides this, observations were made on the influence caused by aluminium on the breathing of the seeds (of the above mentioned kinds of wheat) after they had sprouted during one or two days.

These experiments have shown:

1. Aluminium sulphate in concentrations of 0,001 at. w. in gr. is poisonous for the life of both kinds of wheat.
2. The concentration being lowered to 0,0005 at. w. in gr. gives different results; whilst the xerophyte is revealing a state of depression, its antipode shows an increase of activity: its dry substance augments, as well as its leaf surface.

3. A still further lowering of the aluminium sulphate concentration to 0,0003—0,0001 at. w. in gr. leads to the same result, whereat the stimulative action on № 330/16 increases the strength of its root system.

4. Observations made with regard to the breathing process confirm the results, which have been obtained with culture solution. Aluminium chloride in concentrations of 0,001 at. w. in gr. proves a toxic for the wheat under consideration. When lowering the concentration from 0,0005 to 0,0001 it serves as a stimulus in the breathing process of mesophyte wheat (330/16) and becomes a depressant, lowering the breathing activity of xerophyte wheat (81/4).

Л. Н. Гурфейн.

Возможность применения „прямого метода“ С. Н. Виноградского к анализу почв в связи с поглощением почвами бактерий.

(Из Микробиологической лаборатории Ленинградского Университета).

В связи с предложенным С. Н. Виноградским в 1923 г. методом прямого микроскопического анализа почв, методом изящным по своей простоте и быстроте получаемого ответа, возник ряд вопросов, касающихся коллоидального состояния почв и влияния связанных с этим явлений на точность „прямого метода“.

Ряд статей проф. Н. Н. Худякова, Диановой и Ворошиловой и Карпинской говорят о явлении адсорбции почвой бактерий (6, 7, 8, 9, 10). Как указывает Фрейндлих, Дюкло и др. (2, 3, 4) адсорбция обединяет все случаи, когда одно вещество, так сказать, исчезает в другом. Наблюдаемые действия являются действием поверхности, так как адсорбция более или менее заметная всякий раз, как растворенное вещество находится в присутствии твердого тела, имеющего значительную поверхность соприкосновения, этому-то явлению приписывают Карпинская и проф. Худяков наблюдавшееся ими поглощение почвой бактерий (6, 9).

Явления адсорбции крайне изменчивы и зависят, как от адсорбента, так и от адсорбируемого вещества (2—3). Карпинская отмечает, что наблюдаемая ею адсорбция *Bact. prodigiosum* понижалась, как в зависимости от качества и количества почвы, так и от числа бактерий, вводимых ею в ту или иную фракцию.

N. Schillon указывает, что адсорбция вещества должна быть связана с растворимостью его и является ограниченной, последнее подтверждается опытами и в отношении бактерий (10). Что некоторые пористые и порошкообразные вещества обладают способностью поглощать бактерии и так сказать инактивировать их было давно известно в медицине (16, 17, 18) и это явление было использовано с практической точки зрения применением указанных веществ при кишечных заболеваниях, теоретическая же сторона явления осталась неисследованной. В настоящее время разрешение этого вопроса является насущной потребностью для почвенной микробиологии. Согласно явлениям адсорбции, наблюдавшимся в растворах, наибольшей адсорбирующей способностью обладают высоко дисперсные системы.

Наблюдения же Карпинской над адсорбцией бактерий показали, что последние поглощаются не высоко дисперсными системами почв органического или минерального происхождения, как илы, но агрегатами их, получаемыми путем высушивания отмученных предварительно частиц. Следовательно, адсорбция почвой бактерий зависит от количества высокодисперсных систем в почве, могущих коагулировать (в растворах) и давать агрегаты. Естественная почва, как указывает Глинка, является дисперсной твердой средой, почвенные растворы дисперсная фаза „гель“, при отмучивании же с водой получаются „золи“. Таким образом при работе с „прямым методом“ мы получаем золи различной дисперсности, которые при коагуляции их и дают агрегаты поглощающие, согласно наблюдений Карпинской, бактерии. К почвенным суспенциям Глинка относит и бактерий и микрофауну, указывая, что они представляют собой немолекулярные дисперсные вещества (4).

Почвенные суспенции заряжены отрицательно, но частично заряд их может быть понижен до нуля, часть же почвенных коллоидов, заряженных отрицательно может быть перезаряжена положительно в зависимости от концентрации водородных ионов, что имеет влияние и на явление адсорбции (2) и введение каких-либо посторонних солей даже в минимальных дозах как, например, различные разведения бульонных культур бактерий, что было в опытах Карпинской, несомненно, должно было играть ту или иную роль. Длительное промывание дистиллированной водой, применяемое в „прямом методе“ повышает дисперсность почв и понижает коагуляцию, так как чем больше в воде расстояние между частицами (Глинка), тем труднее им соединиться в группы.

Мной был поставлен ряд опытов для выяснения вопроса насколько адсорбция мешает учету бактерий в почве „прямым методом“ Виноградского. „Прямой метод“ мной применялся без изменений, так, как он описан автором (1), а на русском языке Худяковым, Рихтером, Шульгиной и др., так что описание его в данной работе я считаю несущественным.

С. Н. Виноградский указывает, что при анализе почв „прямым методом“ эритрозин не окрашивает спор, спирilli и многих грибков, так что „прямой метод“ является непригодным для учета целого ряда микроорганизмов, на основании чего, как и упомянутой выше адсорбции бактерий „прямой метод“ вызвал недоверие, а в некоторых случаях почти полное отрицание — так Н. Н. Худяков указывает, что „прямой метод“ пригоден лишь для учета зооглейных форм и других крупных кокков и что именно адсорбции почвой бактерий обязан С. Н. Виноградский однообразию состава микрофлоры исследованных им почв. Исходя из этого я брала для своих опытов исключительно формы бактерий, хорошо поглощаемые (согласно опытам Карпинской, Диановой и Ворошиловой) почвами.

Мною приготавливались водные эмульсии из испытуемого вида бактерий путем смывания суточных культур с косого питательного агара. Водные эмульсии приготавливались мной во-первых, чтобы не вводить в испытуемую фракцию посторонних солей, и во-вторых, ввиду того, что посевы в бульоне через сутки дают слабое развитие

с весьма небольшим количеством зародышей на 1 кб. снт., делать же накопление зародышей путем центрофугирования чрезвычайно сложная и неблагодарная задача, тем более, что некоторые очень мелкие и подвижные формы бактерий, не осаждаются даже при длительном центрофугировании.

Культуры же в бульоне мною применялись в тех опытах, где бульон должен был играть роль искусственно вводимого органического вещества для выяснения вопроса — имеют ли значение органические коллоиды при учете бактерий "прямым методом".

По способу Михаэлиса (15) мной приготавливались эмульсии в дистиллированной воде с любым количеством зародышей на кб. снт. Техника такова: в пробирках с широким диаметром суточная культура на косом питательном агаре повторным введением 5 кб. см. дистиллированной воды в стерильных условиях, смывается в стерильную пробирку или колбочку.

Для учета количества бактерий на 1 кб. снт. мною был применен метод прямого счета сухих препаратов, так как для моих опытов необходимо было иметь произвольно большие цифры микроорганизмов, а учет их методом пластинок в больших разведениях дает и большую ошибку.

Калиброванной стерильной пипеткой мной наносилось на стекло 0,02 кб. снт. бактериальной эмульсии, капля тщательно распределялась на поверхности одного квадр. сант., высушивалась, фиксировалась спиртом и скрашивалась эритрозином. Этот метод в свое время был разработан О. Скаром и применен О. Свендеборгом для счета молочно-кислых бактерий (20, 21). Предварительно мною неоднократно было проверено — учет бактерий на сухих препаратах учетом на пластинках путем разливок и было установлено, что небольшие разведения до 1:1000 дают в обоих случаях почти полное совпадение числа зародышей:

ТАБЛИЦА 1

Разведения			Прямой учет сухих препаратов.
1:1	1:10	1:100	
3500	353	29	3400

В этом опыте была взята суточная культура *Bac. tumescens* в бульоне, приготовлены и засеяны в чашки Петри три разведения, а параллельно был проверен счет на сухих препаратах по 0,02 куб. снт. на каждое предметное стекло, как видно из таблицы совпадение тем больше, чем меньше разведение.

Для определения насколько поглотительная способность почвы мешает учету поглощаемых форм "прямым методом" Виноградского мною брались различные образцы почв в естественном их состоянии, так, чтобы по величине частиц они соответствовали приблизительно

искусственно приготовленным по методу Вильямса-Фадеева (5) фракциям. Последний метод вызывает (как указывают Рудзинский и Глинка) в естественной почве настолько большие изменения, что учесть их совершенно невозможно, как невозможно и представить себе, в каком состоянии находятся в ней эти полученные искусственным путем фракции.

Как образец естественной почвы бралась почва, полученная из Киева (Ботанич. Сад) предварительно растертая в течение 5 мин. в фарфоровой ступке и затем простерилизованная в печи Пастера при температуре 130° по два часа, в течение 3-х дней, такая дробная стерилизация дает препараты, приготовленные "прямым методом" совершенно стерильные, т. е. лишенные окрашенных бактериальных клеток, в то же время по структуре и общему виду ничем не отличающиеся от таковых, приготовленных из той же почвы не стерилизованной. Более тонкие фракции каолина — Глуховецкий грубо дисперсной величины частиц 70% от 12 μ и высоко дисперсный Глуховской с величиной частиц 75% от 3,6 μ до ультра микроскопических сами по себе были совершенно стерильны и, наконец, ил из Феодосийской бухты (взят Б. Л. Исаченко) с глубины 17,7 метра, чрезвычайно тонкий, не осаждающийся через 24 часа и не содержащий форм, по морфологии сходных с взятыми мною для опыта.

Для уяснения вопроса, влияет ли присутствие органических частиц на поглотительную способность, бралась та же почва из Киева, но прокаленная до постоянного веса и химически чистая кремневая кислота (SiO_2) 20 mech. Каолины и кремневая кислота были любезно предоставлены мне проф. И. И. Жуковым из лаборатории коллоидной химии Л. Г. У., за что приношу ему глубокую благодарность.

Опыты велись с тремя формами бактерий: кокко-бактерии — *Bact. prodigiosum*, бактерии *Bact. fluorescens liquefaciens* и спороносная форма — *Bacillus tumescens*.

Подсчеты велись в 25 полях зрения в препарате в 1 кв. снт. по диагонали имм. сист. 1/12, ок. 8 и Netzmikrometer Лейтца.

Приступая к исследованию "прямого метода" моей первой задачей было выяснить скрашиваются ли этим методом заведомо мертвые клетки бактерий и насколько интенсивно.

10 кб. снт. эмульсии *Bact. fluorescens liquefaciens* приготовленной вышеизложенным способом были убиты в автоклаве при 120° в течении 20 минут. Из этой убитой эмульсии приготавливались препараты обычным способом и скрашивались эритрозином; посевы на бульон и на агар роста не дали, следовательно эмульсия была действительно убита; 5 кб. снт. этой эмульсии внесены в прокаленную до постоянного веса почву, тщательно с ней размешаны и высушены в термостате при 30° в течении 4-х дней 1 грамм приготовленной таким образом почвы исследовался "прямым методом" и во всех препаратах были обнаружены хорошо окрашенные клетки *Bact. fluorescens liquefaciens*; посевы из нее, также как и предыдущие, роста ни на бульоне, ни на агаре не дали.

Те же результаты получены в подобных же опытах с *Bact. prodigiosum* и *Bact. tumescens*. Исследовалась только качественная

сторона, учет же в этом случае не производился, но никакой заметной адсорбции бактерий почвенными частицами не наблюдалось.

Следующие опыты-проверка влияния адсорбции на учет бактерий "прямым методом" велись следующим образом: в 2 кб. снт. водной эмульсии бактерий вводился 1 грамм того или иного образца почвы и последовательной промывкой приготавливались фракции согласно "прямого метода" Виноградского. Некоторое уклонение от метода было в тех опытах, где имелись высоко дисперсные вещества, как каолины и ил и где разделение на фракции невозможно, в последнем случае препараты делались из хорошо взмученной в 10 кб. снт. дистил. воды взвеси.

Первые опыты были поставлены с различными количествами бактерий (до 1½ миллиардов), а затем вводилось одинаково по 100 миллионов бактерий на 1 грамм каждого образца:

Естественная почва.

ТАБЛИЦА 2

НАЗВАНИЕ ФОРМ	Введен зародыш.	Подсчет прям. методом	Введен зародыш.	Подсчет прям. методом
	(в миллионах)			
B. prodigiosum	586	490—16%	100	120+20%
B. fluorescens	147	130—13%	100	120
B. tumescens	422	430+15%	100	180
B. prodigiosum	926	1065	—	—

Глуховецкий каолин, грубо-дисперсный.

ТАБЛИЦА 3

НАЗВАНИЕ ФОРМ	Введен зародыш.	Подсчит. прям. методом	Введен зародыш.	Подсчит. прям. методом
	(в миллионах)			
B. prodigiosum	586	830+33%	100	90
B. prodigiosum	926	775	—	—
B. fluorescens	1403	1305	100	100
B. tumescens	1430	1137	100	80
"	558	540	—	—
"	422	427	—	—
"	161	192	—	—

Глуховской каолин высокодисперсный.

ТАБЛИЦА 4

НАЗВАНИЕ ФОРМ	Введен зародыш.	Подсчит. прям. методом	Введен зародыш.	Подсчит. прям. методом
	(в миллионах)			
B. prodigiosum	586	830	100	200
B. fluorescens	1403	1900	100	120
B. tumescens	1430	1935	100	110
"	558	517	—	—
"	417	415	—	—
16 "	161	133	—	—

Ил из Феодосийской бухты с гл. 17,7 м.

ТАБЛИЦА 5

НАЗВАНИЕ ФОРМ	Введен зародыш.	Подсчит. прям. методом	Введен зародыш.	Подсчит. прям. методом
	(в миллионах)			
B. prodigiosum	926	860—7%	—	—
B. fluorescens	500	492—10%	—	—
B. tumescens	500	456	—	—

Как видно из приведенных таблиц адсорбция почвой бактерий никакого практического значения при счете сотен миллионов клеток бактерий не имеет. В приведенных опытах мы имели дело с образцами почв и грунтов в их естественном состоянии, со всеми присущими им органическими и минеральными коллоидами.

Дальнейшие опыты велись с образцами почв искусственно лишенными органических частей — прокалённая киевская почва и химически чистый каолин.

Прокаленная почва.

ТАБЛИЦА 6

НАЗВАНИЕ ФОРМ	Введен зародыш.	Подсчит. прям. методом	Введен зародыш.	Подсчит. прям. методом
	(в миллионах)			
B. prodigiosum	926	1065	100	200
B. fluorescens	142	230	100	130
B. tumescens	900	890	100	180

SiO₂.

ТАБЛИЦА 7

НАЗВАНИЕ ФОРМ	Введено зародыш.	Подсчит. прям. методом	Введено зародыш.	Подсчит. прям. методом
	(в миллионах)			
B. prodigiosum	926	1070	100	130
B. fluorescens	1403	1635	100	100
B. tumescens	422	420	100	120
· · · · ·	558	622	—	—

Адсорбция бактерий не наблюдалась и в этих опытах, некоторый же излишек против вводимого количества об'ясняется неравномерным распределением бактерий между частицами почвы, почему всегда возможен их повторный просчет, частицы прокаленной почвы отчасти окрашены в светло-желтый цвет, отчасти же совсем бесцветны, как и частицы кремнев. кислоты, почему можно справедливо заключить, что окраска почвенных частиц в естественных землях в розовый цвет зависит, главным образом, от присутствия органических коллоидов.

В 10 куб. см. суточной бульонной культуры Bac. tumescens было введено 10 гр. прокаленной до постоянного веса киевской почвы и, таким образом, в прокаленную почву было искусственно введено коллоидальное органическое вещество. Адсорбция, как можно судить по таблице, отсутствует.

Прокаленная почва с культурой в бульоне.

ТАБЛИЦА 8

НАЗВАНИЕ ФОРМ	Введено зародыш.	Подсчит. прям. методом
	(в миллионах)	
B. tumescens	48	49
B. tumescens	48	47

Тот же опыт был повторен с каолинами Глуховецким и Глуховским.

ТАБЛИЦА 9

НАЗВАНИЕ ФОРМ	Каолин Глуховской		Каолин Глуховецкий	
	Введено зародыш.	Подсчит. прям. методом	Введено зародыш.	Подсчит. прям. методом
	(в миллионах)			
B. tumescens	250	340	250	248

Из приведенных таблиц явствует, что если адсорбция почвой бактерий существует (6, 7, 8, 9, 10), то поглотительная способность почв невелика и если поглощаются десятки и сотни тысяч, то десятки и сотни миллионов мы свободно можем учесть "прямым методом" С. Н. Виноградского. И именно эти свободные формы, как активные, ибо опыты Карпинской, Диановой и Ворошиловой показали, что адсорбированные бактерии (частью совсем) теряют активность и важны как показатели активности и самой почвы. Можно предположить, что поглощение почвой бактерий на 79—100%, как наблюдалась в опытах Карпинской и др., зависит не только от количества бактерий, вводимых на определенную навеску почвы,— напр., во фракции "ил агрегатный" при навеске в 1 грамм поглощение равнялось 100%, при навеске в 0,02 гр.—52%, ил "пыль средняя"— колебания от 78% (навеска в 1 гр.), до 23% (навеска в 0,02 гр.), но и от посторонних солей вносимых с культурами в бульоне или других питательных средах; в моих опытах последнее исключалось, и процент поглощения бактерий не превышает в среднем 10%, что практически не имеет значения.

Таким образом "прямой метод" С. Н. Виноградского пока является единственным методом, дающим возможность быстро и более или менее точно ориентироваться в активном населении данной почвы, те же микроорганизмы, которые им не учитываются, возможно, находятся в зимогенном состоянии и в момент исследования для данной почвы особой роли не играют.

Выводы:

- I. При внесении в почву сотен миллионов бактерий адсорбция их заметно не наблюдается.
- II. Промывание дистиллированной водой понижает коагуляцию почвенных коллоидов и тем самым понижает и адсорбцию почвой бактерий.
- III. Главный недостаток "прямого метода" невозможность достичь равномерного распределения бактерий и получаемые при этом большие колебания цифр при подсчете различных полей зрения устрашаются подсчетом возможно большего числа полей зрения.
- IV. "Прямой метод" окрашивает мертвые клетки также, как и живые. Работа эта выполнена по предложению проф. Б. Л. Исаченко в его лаборатории, под его руководством.

Л и т е р а т у р а .

1. С. Н. Виноградский. *Annales de l'Institut Pasteur* 1925, Compt. rendu, 180 (1925), 177 (1923), 179 (1924), 178 (1924).
2. Freundlich. *Kapillarchemie*. 1909.
3. Дюкло. Коллоиды. 1924.
4. Глинка, К. Дисперсные системы в почве. 1924.
5. Рудзинский. Изв. Моск. С.-Х. Ин-та, т. IX. 1903.
6. Карпинская, Н. Агрон. журнал. 1926, т. 9.
7. Худяков, Н. Н. Агрон. журнал. 1925.
8. Худяков, Н. Н. Журнал Почвоведение, 1—2. 1925.
9. Худяков, Н. Н. С.-Хоз. Микробиология. 1925.
10. Дианова и Ворошилова. Научно-Агр. журнал. 1924—25.
11. Костычев, Корсакова. Труды Отдела С.-Х. Микробиологии ГИОА. 1926, т. I.
12. Бегак. Труды Отдела С.-Х. Микробиологии ГИОА. 1926, т. I.
13. Домрачева. Труды Отдела С.-Х. Микробиологии ГИОА. 1926, т. I.
14. Рихтер. Ученые Записки Сарат. Ун-та. 1925.
15. Михаэлис. Практикум по коллоидной химии. 1925.
16. Med. Kl. № 13. 1909.
17. Berlin Kl. Wochenschrift. 1918.
18. Kuhn. Med. Kl. № 48. 1915.
19. N. Schilon. Zeitschr. f. physik. Chemie 118, 1925.
20. O. Swedeborg. Zeitschr. f. physik. Chemie 108. 1919.
21. O. Scar. Milchwissenschaft Zentralblatt. 1912.

L. N. Gurfein.

Ueber die Möglichkeit der Anwendung der „directen Methode“ von Winogradsky zu Bodenanalysen, in Zusammenhang mit der Adsorption der Bakterien durch den Boden.

(Aus dem mikrobiologischen Laboratorium der Universität zu Leningrad).

Schlussfolgerungen:

1. Die Adsorption durch den Boden von Hunderte Millionen, in den Boden hineingebrachten, Bakterien durch den Boden ist nicht in einer merklichen Weise beobachtet worden.

2. Die Ausspülung mit destilliertem Wasser reduziert die Koagulation der Bodenkolloide, wobei die Adsorption durch den Boden der Bakterien ebenfalls abgeschwächt wird.

3. Die Mangelhaftigkeit der „direkten Methode“ besteht, hauptsächlich, in der Unmöglichkeit, eine gleichmässige Verteilung der Bakterien zu erreichen; die dabei erhaltenen grossen Zahlenschwankungen werden dadurch beseitigt, dass, beim Abzählen verschiedener Sehfelder, eine möglichst grosse Anzahl von solchen abgezählt wird.

4. Die toten Zellen werden bei der „direkten Methode“ ebenfalls gefärbt, wie die lebendigen.

Vorliegende Arbeit wurde nach dem Vorschlage von Prof. B. L. Issatschenko, in seinem Laboratorium und unter seiner Leitung ausgeführt.

Профессор С. М. ВИСЛОУХ.
(Obituary of S. M. Wislouch 1876—1927).

10 июля в 7 час. вечера в Варшаве в неврологической клинике скончался профессор фармацевтического факультета Варшавского Университета Станислав Михайлович Вислоух.

Покойный С. М. Вислоух окончил С.-Петербургский Лесной Институт и затем в течение нескольких лет занимал различные должности (по управлению казачьими войсками, мин. фин. и т. п.), но в нем чувствовалась любовь к исследовательской работе и когда в Главном Ботаническом Саду освободилась должность нештатного помощника заведывающего станцией для испытания семян, он занял это место, стремясь попасть в научное учреждение, где он мог бы пользоваться ботанической библиотекой, а свободное время отдавать исследованию водных организмов, изучение которых его особенно привлекало.

Работая над техническим анализом семян и изучая методы исследования их он напечатал статью „Натура зерна и ее отношение к абсолютному весу“ и приступил к исследованию о влиянии проправления семян на их всхожесть. В то же самое время вместе с заведующим станцией Б. Л. Исаченко он знакомился с методами исследования низших организмов и помогал ему в его работах по исследованию микроорганизмов. Его аккуратность и точность в работе была поразительная. Прекрасный рисовальщик и чертежник (меняя поприще С. М. пришлось быть чертежником у Вестингауза) был незаменим при всех микроскопических работах.

Когда в Женском Медицинском Институте окрылась вакансия ассистента проф. Г. А. Надсона, он перешел туда, где ему еще легче можно было работать в излюбленной им области изучения микроскопических водорослей. Вскоре ему представилась возможность побывать в Берлине и там у проф. Кольквица С. М. знакомится с биологическим методом оценки воды и делается затем навсегда горячим сторонником и пропагандистом этого метода у нас, печатая в „Общей микробиологии“ С. И. Златогорова „Биологический анализ воды“. Свой познания в этой области ему пришлось применить в работах Комиссии проф. Г. В. Хлопина по исследованию Невской бухты. В 1917 году мне снова пришлось работать с С. М. уже на юге на Сакском озере, где он производил альгологические исследования; трудно было представить более корректного и хорошего товарища как С. М. и лето быстро пролетело для нас за интересной работой в экспедиции П. А. Кашинского.

Работая у проф. Г. А. Надсона он деятельно помогал ведению основанного Г. А. „Журнала Микробиологии“, где им, кроме статей, помещались рефераты выходивших работ. Когда был основан Агрономический Институт, он вошел в его состав как профессор гидробиологии и организовал в Детском Селе гидробиологическую лабораторию. С. М. обладал педагогическими способностями и у него получили усовершенствование и любовь к гидробиологии: Б. В. Перфильев, В. А. Порецкий, О. В. Троицкая и др. С 1919 года С. М. принимал деятельное участие в организации Гидрологического Института, был членом его Президиума и Председателем Гидробиологического Отдела.

В 1922 году С. М. переехал в Польшу и занял кафедру в Варшавском Университете. На родине ему и суждено было заснуть вечным сном, оставив после себя глубокую память, уважение и сожаление о ранней кончине крупного научного работника.

Б. Исаченко.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДЕ.

9 июня 1927 года опубликован по Народному Комисариату Земледелия приказ за № 174, изменяющий конструкцию Главного Ботанического Сада; на подлинном приказе надпись: „Утверждаю“ Нарком Земледелия Смирнов.

1. Цель и задачи:

§ 1. Главный Ботанический Сад в г. Ленинграде является научно-исследовательским и показательно-просветительным учреждением общесоюзного значения (пост. СНК СССР—26/VII—25 г. Собр. Зак. № 76,—ст. 570) и состоит в непосредственном ведении НКЗ.

§ 2. В задачи Главного Ботанического Сада входит:

- а) систематическое ботаническое изучение территории СССР и прилегающих к нему стран,
- б) ботаническое изучение территории других стран мира и акклиматизация растущих на них полезных растений,
- в) решение очередных научных вопросов, стоящих перед мировой ботаникой,
- г) разработка методики ботанических изысканий и исследований,
- д) изучение морфологии, систематики, географии и экологии растений,
- е) изучение основных физиологических функций растений,
- ж) исследование и изучение болезней растений,
- з) научная разработка обще-теоретических вопросов семено-ведения,

и) введение в культуру новых растений,

к) ботаническое изучение микроорганизмов почвы и воды,

л) выяснение мелиорационных вопросов при помощи ботанико-географического метода,

м) практическое применение ботанических достижений и стандартизирование полезных растений, с.-х. продуктов и семян,

н) подбор растений по географическим областям и по биологическим, систематическим или техническим группам и показательная популяризация растений по этим признакам,

о) распространение работ в областях чистой и прикладной ботаники,

п) наблюдение за всеми новейшими достижениями в области ботаники и информация о них научных работников СССР,

р) популяризация ботанических знаний,

§ 3. Для осуществления указанных в § 2 задач Главный Ботанический Сад:

- а) выявляет свою научно-исследовательскую деятельность в сотрудничестве с другими учреждениями, ведущими аналогичные работы,
- б) разрабатывает проекты программ и планов научной и исследовательской деятельности всех учреждений Сада,
- в) организует экспедиционные исследования и коллективные опыты,
- г) проводит стационарные исследования в научных отделах Сада и вспомогательных учреждениях его,
- д) снабжает питомники, рассадники и население — исходным посадочным материалом в целях массового размножения.
- е) пропагандирует и знакомит население с улучшенными приемами культуры растений путем устройства лекций, бесед, чтений и организации экскурсий в свои учреждения,
- ж) устраивает музеи, выставки живых и засушенных растений различных растительных материалов и продуктов и пр., а равно принимает участие в других выставках своими экспонатами,
- з) консультирует плановые и хозяйствственные организации по вопросам, входящим в круг деятельности Сада,
- и) составляет сводки научных отчетов и работ по соответствующим дисциплинам,
- к) издает и распространяет через посредство печати свои труды, отчеты, популярные брошюры и другие печатные произведения по предметам своего ведения,
- л) предоставляет всестороннюю практику учащимся сцец. ВУЗ'ов на основе особых условий, определяемых НКЗ — по всем культурам Сада,
- м) допускает к научным работам ученых и научных работников в различных исследовательских учреждениях.

Примечание: Для допущения к работам ученых деятелей иностранцев требуется разрешение НКЗ.

- н) организует курсы для переподготовки и подготовки специалистов по предметам ведения Сада,
- о) созывает в установленном порядке совещания по специальным вопросам, входящим в программу деятельности Сада,
- п) участвует в О'ездах, конференциях и различных совещаниях по с.-х. опытному делу.

2. Структура и Управление Сада.

§ 5. Соответственно перечисленным задачам, Главный Ботанический Сад в своем составе имеет следующие научные отделы:

1. Отдел живых растений,
2. Гербарий,
3. споровых растений,
4. физиологии растений,
5. фитопатологии,
6. семеноведения,
7. акклиматизации,
8. геоботаники,
9. микробиологии и гидробиологии,
10. Музей,
11. Библиотека.

§ 6. Общее руководство научно-исследовательской деятельностью управление Садом, заведывание всем его имуществом, распоряжение материальными средствами и кредитами, представительство Сада в государственных учреждениях и организациях — принадлежит директору Сада, который назначается Наркомземом и непосредственно несет ответственность за состояние Сада и его деятельность.

Директор Сада приглашает на службу и увольняет Завед. Отделами, научных сотрудников, специалистов, рабочих и служащих в пределах установленных штатов и расписания должностей.

Примечание. Подбор кандидатов на должности завед. Научными Отделами и основных научных сотрудников производится директором путем конкурса, порядок которого устанавливается особыми инструкциями НКЗ.

§ 7. При Директоре Сада состоят два помощника, назначаемые НКЗ. Один из помощников замещает Директора в случае его отсутствия или болезни.

§ 8. При Директоре Сада и под его председательством действует на правах совещательного органа Научный Совет в составе помощника Директора, Заведывающих Научными Отделами Сада, Уполномоч. НКЗ по Сев. Зап. Обл. или его заместителя, а также старших ассистентов и научных сотрудников, ведущих самостоятельную научную работу.

§ 9. Совет Ботанического Сада возглавляется Президиумом в составе Директора Сада, Уполномоченного НКЗ, или его заместителя и Помощника Директора Сада.

§ 10. Научный Совет созывается, по мере надобности, Директором Сада для разработки и обсуждения планов, программ и тем научно-исследовательской деятельности Сада, установления методов его работы, дачи заключений по отдельным специальным вопросам, избрания почетных членов и рассмотрения кандидатур лиц, намечаемых на должности Пом. Директора по научной части, Зав. Научными Отделами и научных сотрудников Сада, имеющих вести самостоятельную научную работу.

Примечание: Избираемые Советом почетные члены утверждаются НКЗ.

§ 11. Для выполнения возложенных задач, Сад имеет необходимый штат сотрудников, утверждаемый на общих основаниях в установленном порядке.

3. Права и обязанности Сада.

§ 12. Главному Ботаническому Саду предоставляется право:

- а) вести и использовать в соответствии с целью и задачами Сада предоставленные ему хозяйства.
- б) устраивать, реорганизовывать и закрывать с разрешения НКЗ вспомогательные производственно-хозяйственные учреждения,
- в) переводить отдельные учреждения Сада из одного хозяйства в другое, а равно открывать и ликвидировать их с разрешения НКЗ РСФСР.

г) производить в установленном законом порядке, в пределах утвержденных годовых планов и приходо-расходных смет, постройки и ремонт зданий и сооружений, а также слом таковых; продажу или ликвидацию излишнего или негодного имущества, специального оборудования и ценного инвентаря, как живого так и мертвого в порядке, установленном законом и в соответствии с инструкцией НКЗ,

д) вступать в сделки и заключать договоры по всем предметам специальной и хозяйственной деятельности Сада в пределах и в соответствии со сметными ассигнованиями и специальными средствами Сада, а также искать и отвечать на суде,

е) сноситься по предметам ведения Сада со всеми государственными и общественными учреждениями и организациями, за исключением высших правительственные учреждений,

ж) открывать, в целях изучения отдельных вопросов, входящих в круг ведения Сада с соблюдением установленных правил и разрешения НКЗ, свои отделения (филиалы), как собственные, так и при других исследовательских учреждениях.

§ 13. В обязанности Главного Ботанического Сада входит:

а) составление и представление на утверждение Наркомзема научно-исследовательских программ и планов своей деятельности, а также сводных научных отчетов и организационно-хозяйственных планов и приходо-расходных смет Сада,

б) выполнение отдельных научных заданий и поручений Наркомзema, входящих в круг деятельности Сада,

в) дача отзывов и заключений по отдельным специальным вопросам, как по требование Наркомзema, так и по просьбе других учреждений и ведомств,

г) ведение по установленным системе и формам бухгалтерии и отчетности,

д) составление и представление в Наркомзем и в местные финорганы бухгалтерских отчетов.

§ 15. Права и обязанности Сада осуществляются его Директором.

4. Средства Сада.

§ 16. Главный Ботанический Сад состоит на госбюджете и содержится:

а) на средства, отпускаемые на содержание Сада по госбюджету по сметам Наркомзema РСФСР (по Управлению Сельского Хозяйства),

б) на специальные средства, образуемые в порядке Постановления СНК РСФСР от 9 июля 1924 года и изданной в развитие его инструкции НКЗ и НКФ от 18/VIII—1925 г. о порядке образования, хранения и расходования спецсредств.

§ 17. Расходование указанных в § 16 средств производится по сметам утвержденным в установленном порядке.

П. п. Нач. Упр. Сел. Хоз. Сенин.

Нач. Админфинуправления. Юльев.

Верно: Ст. делопроизводитель (Вашенко).

ИЗВЕСТИЯ

Главного Ботанического Сада СССР.

под редакцией В. Л. КОМАРОВА.

Том XXVI

B U L L E T I N

D U

Jardin Botanique Principal de l'U.R.S.S.

sous la rédaction de V. L. KOMAROV.

Tome XXVI

ЛЕНИНГРАД.
1927.

ОГЛАВЛЕНИЕ XXVI ТОМА ИЗВЕСТИЙ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА СССР.

Оригинальные статьи:

Абесадзе, К. И. О строении кавказского рододендрона	209
Агамов, см. Сарифек Агамов.	
Алексин, В. В. и Сырейшиков, Д. П. Двадцать пять новых растений Московской флоры	74
Базилевская, Н. А. Очерки растительности юго-восточных Каракумов	130
Бобров, Е. Г. О северной границе дуба в пределах Череповецкой губ.	26
Бобров, Е. Г. Wiedemannia multifida Benth. во флоре Евр. части СССР	174
Богданов, П. Л. Результаты акклиматизации некоторых хвойных пород в акклиматационном питомнике Гл. Бот. Сада в Ленинграде	423
Булавкина, А. А. Материалы по растительности вдоль линии Мурманской ж. д.	154
Вольф, Э. Л. Изменчивость Понтийской Азалии. Rhododendron flavum Don. (Azalea pontica L.)	580
Винтер, Н. А. О роде Trapa	517
Воронов, Ю. Н. Новые кавказские виды р. Pyrus L.	608
Воронов, Ю. Н. Материалы к познанию лилейных Кавказского края. I. Закавказские виды р. Bellevalia Lap.	610
Гаммериан, см. Монтерверде и Гаммерман.	
Гончаров, Н. Ф. К познанию бразильских Passifloraceae. Сборы Риделя и Лангсдорфа	570
Горшкова, С. Г. Обзор видов рода Myricaria SSSR	177
Гурфейн, Л. Н. Возможность применения "Прямого метода" С. И. Виноградского к анализу почв в связи с поглощением почвами бактерий	644

SOMMAIRE du TOME XXVI du BULLETIN du JARDIN BOTANIQUE PRINCIPAL de l'URSS.

Travaux originaux:

Abessadze, K. I. Ueber den Bau des kaukasischen Rhododendron's	222
Agamov - Saribek Agamov.	
Alechin, V. V. et Syreischikow, D. P. Viginti quinque plantarum novarum Floraе Mosquensis	77
Basilevskaja, N. A. Vegetation in the southeastern part of the sand-desert Kara-kum	152
Bobrov, E. G. Ueber die nördliche Grenze der Eiche im Gouvernement Tscherepowetz	30
Bobrow, E. G. Wiedemannia multifida in der Flora des Europäischen Russlands	176
Bogdanoff, P. L. Ergebnisse der Akklimatisation einiger Nadelholzarten in der Akklimatisationsbaumschule des Botan. Hauptgartens in Leningrad	443
Bulavkina, A. A. Die Materiale der Vegetation längs der Murmanischen Eisenbahmlinie	173
Wolf, Egbert, Rhododendronis flavi Don mutabilitas	590
Winter, N. A. Ueber die Gattung Trapa	520
Woronow, G. N. Neue kaukasische Pyrus-Arten	609
Woronow, G. N. Beiträge zur Kenntniss der Liliaceen der Kaukasus-Länder. I. Transkaukasische Bellevalla-Arten	620
Hammermann - Monteverde, N. A. und Hammermann.	
Gontscharow, N. Th. Ad cognitionem Passifloracearum brasiliensium. Passifloraceae ex herbario Riedeliano et Langsdorffiano	576
Gorschkowa, S. G. Uebersicht der in der USSR vorkommenden Arten der Gattung Myricaria	182
Gurfein, L. N. Ueber die Möglichkeit der Anwendung der „directen	

Данилов, А. Н. <i>Isaria virescens</i> Elenk. et Danil. в условиях культуры	1
Данилов, А. Н. Условия пигментообразования у <i>Isaria virescens</i> Elenk. et Danil.	118
Данилов, А. Н. Пигменты грибка <i>Isaria virescens</i> Elenk. et Danil.	193
Знаменский, И. Влияние алюминия на ксерофитные и мезофитные расы пшеницы	631
Ильин, М. М. Растительность Эльтонской котловины	371
Кокина, С. И. К вопросу о влиянии влажности почвы на растение	48
Кречетович, В. И. Заметки об осоках Ярославской губ.	621
Иконников-Галицкий, Н. П. Заметка о <i>Phlomis marrubioidea</i> Rgl.	71
Лозина-Лозинская, А. С. Монгольские виды <i>Atraphaxis</i>	39
Лозина-Лозинская, А. С. Род <i>Calligonum</i> в Монголии	594
Магнуссон, А. Г. Новые лишайники севера СССР	359
Монтеверде, Н. А. и Гаммерман, А. Ф. Туркестанская коллекция лекарственных продуктов Музея Гл. Бот. Сада	291
Назаров, М. И. Адвентивная флора средней и северной части РСФСР за время войны и революции (1916—1921)	223
Паллон, Л. О. Несколько местонахождений липы в Олонецком крае	288
Пояркова, Т. Ф. Очерк растительности хребта Маркотх на Сев. Кавказе	235
Прокоряков, Е. И. Постфлоральные явления и способы роста цветочных побегов у <i>Tussilago farfara</i> L. и <i>Anemone patens</i> L.	9
Рожевиц, Р. Ю. Камчатка как местный центр эндемизма мятликов	285
Савич, Л. И. и Савич, В. П. <i>Bryotheca Rossica</i> . . . I—78; II—184	
Саребек Агамов. К вопросу о кутикулярной транспирации	550
Скворцов, Б. В. О водной растительности зарастающих водоемов долины р. Сунгари в Северной Маньчжурии	268
Скворцов, Б. В. Маньчжурские формы водяного ореха	628
Спирidonов, М. Д. Материалы к изучению растительных ландшафтов в Западной Сибири	473

Methode von Vinogradski zu Bodenanalysen, in Zusammenhang mit der Adsorption der Bakterien durch den Boden	652
Danilov, A. N. <i>Isaria virescens</i> Elenk. et Danil. dans les conditions de culture	8
Danilov, A. N. Les conditions de la formation des pigments chez <i>Isaria virescens</i> Elenk. et Danil	129
Danilov, A. N. Les pigments du champignons <i>Isaria virescens</i> Elenk. et Danil	202
Znamenskij, J. The influence of aluminum on xerophyte and mesophyte wheat	643
Iljin, M. M. The vegetation in the Basin of lake Elton	417
Kokina, S. I. Zur Frage über den Einfluss der Bodenfeuchtigkeit auf die Pflanzen	64
Krzeszowicz, Einige Anmerkungen über im Gouvernement Jaroslaw auftretenden Riedgrasarten	627
Ikonnikov-Galitzky, N. P. Notice sur l'espèce <i>Phlomis marrubioidea</i> Rgl.	73
Losina-Losinskaja, A. S. Die Mongolischen Arten der Gattung <i>Atraphaxis</i>	46
Losina-Losinskaja, A. S. le genre <i>Calligonum</i> en Mongolie	607
Magnusson, A. N. New species of Lichens in the North of USSR	369
Monteverde, N. A. und Hämmermann, A. F. Die Sammlung turkestanischen Drogen im Museum des Bot. Hauptgartens zu Leningrad	353
Nasaroff, M. I. Flore adventive des regions centrale et septentrionale de RSFSR. pendant la guerre et la révolution	233
Pallón, L. O. Einige Fundorte der Linde im Gouvernement Olonetz	289
Pojarkova, T. F. Uebersicht der Vegetation der Gebirgskette Markotch (Kaukasus)	251
Proskorjakov, E. I. Postflorale Erscheinungen und Wachstum-verhältnisse der Blütentriebe bei <i>Tussilago farfara</i> und <i>Anemone patens</i>	24
Roshevitz, R. La péninsule Kamtchatka comme centre local d'indépendance du genre <i>Poa</i>	287
Savicz, Lydia I. et Savicz, V. P. <i>Bryotheca Rossica</i> . . . I.—78; II—184	
Saribek Agamov, Ueber die Cuticulare Transpiration	570

Станков, С. С. Две гибридных формы из Крыма	526
Сукачев, В. Н. О местном винаризме у <i>Rosa cinnamomea</i> s. l.	97
Сырейщиков, см. Алешин и Сырейщиков	
Тупиков М. К вопросу о типах цветка у винограда	528
Уткин, А. А. <i>Valeriana phu</i> на Кавказе	521
Федченко, Б. А. Вертикальное распространение папоротников Туркестанской горной страны	66
Черняковская, Е. Г. Очерк растительности Копет-дага	253
Шенников, А. П. Некоторые данные о флоре напочвенных грибов в различных ассоциациях	205
Шипчинский, Н. В. Урмийская экспедиция	537
Щепкина, Т. В. Влияние концентрации водородных ионов на развитие табака	444
Некрологи.	
Вислоух, С. М.	653
Генкель, А. Г.	535
Мерцбахер, Г.	85
Поле Р. Р.	86
Хроника.	
1. 4-й Международный Конгресс в Итаке	91
2. Palmengarten во Франкфурте на Майне	94
3. Поступления в Оранжереи Гл. Бот. Сада	96
4. Нью-Йоркский Ботанич. Сад	188
5. Дальневосточная экспед. НКЗ	191
6. Хроника Сада	192, 420, 532
7. Отражения (<i>Transcripicio latina alphabeticis rossicis</i>)	290
8. Положение о Главном Ботаническом Саде	654
Les Necrologues.	
Henckel, A. G.	535
Merzbacher, G.	85
Pohle, R. R.	86
Vislouch, S. M.	653

Chronique 91, 188, 290, 420, 532,
654.
Le statut nouvel du Jardin

655



От Редакционного Комитета.

К сведению авторов статей, представляемых к напечатанию в „Известиях Главного Ботанического Сада“.

1. Об'ем статей не может превосходить одного печатного листа, в исключительных случаях $1\frac{1}{2}$ листа.

2. Рукописи должны быть четко переписаны на одной стороне листа. Особенное внимание должно быть обращено на то, чтобы собственные имена и формулы были написаны четко.

Рукописи должны быть совершенно готовы к печати.

3. Подстрочные цитаты должны делаться по следующей форме: фамилия автора и инициалы в разрядку, название статьи без кавычек, точка; название журнала без кавычек (сокращения могут быть произведены и иначе), запятая; номер и том (если том, то римской цифрой и без слова „том“), запятая; год (без слова „год“), запятая; страница.

4. Меры должны употребляться метрические.

5. Технические сокращения допустимы лишь такие, какие понятны всем читателям же, которые понятны только узкому кругу лиц, недопустимы.

6. Латинские названия растений набираются в тексте обычным шрифтом (курсивом), а потому в рукописи не подчеркиваются.

7. Собственные имена авторов упоминаемые в тексте помещаются на языке автора и набираются обычным шрифтом.

8. К статье должно быть приложено краткое резюме (не более 2 страниц) на одном из иностранных языков. Резюме может быть написано по русски, в таком случае Редакция принимает перевод на себя.

9. По желанию автора, ему может быть послана одна корректура. Лица живущие в Ленинграде, должны возвратить корректуру не позже трех дней получения её. По истечении этого срока, в случае неполучения авторских корректур, статьи поступают в печать без них.

10. Адрес для рукописей и корректур: Ленинград, Аптекарский Остров, почтная $\frac{1}{2}$, Главный Ботанический Сад. Редакция „Известий“.

Редакционный Комитет:

Директор Сада Исаченко, Б. Л.

Редактор Известий Комаров, В. Л.

Редактор Трудов Федченко, Б. А.

Ученый Секретарь Савич, В. П.

Le Comité de la Rédaction du Bulletin du Jardin
Botanique Principal:

B. L. Issatchenko le Directeur du Jardin

V. L. Komarov le Rédacteur en Chef du Bulletin.

B. A. Fedtchenko le Rédacteur en Chef des Acta.

V. P. Savicz le Secrétaire scientifique du Jardin.

Цена 1 руб. 50 коп.

Геоботаническая Карта

Европейской части СССР. Лист 14-ый.

(Ветлуга—Сергач—Ульяновск—Казань—Саранск—Красноуфимск—
Уфа—Стерлитамак).

Издана Главн. Ботаничесним Садом СССР.

Цена 2 р. 50 к. без пересылки,
на лучшей бумаге 3 р. 50 к. без пересылки.

Выписывать от Гл. Ботанического Сада, Ленинград.

Вышло и поступило в продажу 2-ое переработанное
и значительно дополненное издание книги:

А. С. БОНДАРЦЕВ

БОЛЕЗНИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ и МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

(ПОЛЕ—ОГОРОД—САД)

Об'ем книги **29** печатных листов (458 стр.) с **426** рисун-
ками в тексте, цена **4 р. 50 к.** без пересылки. При выписке
нескольких экземпляров, в зависимости от количества,
делается скидка от 10 до 20%.

Книга может служить руководством для агрономов, сту-
дентов ВУЗ'ов, техникумов и вообще для всех интересую-
щихся сельским хозяйством.

Заказы и деньги следует направлять по адресу:

Ленинград, Главный Ботанический Сад, Песочная 2.

И З Д А И Е

Главного Ботанического Сада СССР.