

ИЗВЕСТИЯ
Главного Ботанического Сада СССР

под редакцией В. Л. КОМАРОВА

Том XVII


Вып. 2

BULLETIN
DU
Jardin Botanique Principal de l'URSS

sous la rédaction de V. L. KOMAROV

Tome XVII

Livr. 2



ЛЕНИНГРАД
Издание Главного Ботанического Сада СССР
1930

ИЗВЕСТИЯ
Главного Ботанического Сада СССР

под редакцией В. Л. КОМАРОВА

Том XVII

Вып. 2

BULLETIN
DU
Jardin Botanique Principal de l'URSS

sous la rédaction de V. L. KOMAROV

Tome XVII

Livr. 2



ЛЕНИНГРАД
Издание Главного Ботанического Сада СССР
1929

Содержание вып. 3.

Стр.

1. Сарандинаки, В. Н. Материалы для флоры окрестностей г. Феодосии	179
2. Лебедева, Л. А. Грибы Южно-Уссурийского края, собранные В. Л. Комаровым в 1913 г.	246
3. Преображенский, Г. А. Предварительная таблица для определения Крымско-Кавказских видов р. Dianthus L.	252
4. Красноручкая, А. А. Осборах Р. Р. Поле Архангельской и Вологодской г. г.	258

Sommaire fasc. 3.

Pag.

1. Sarandinaki, V. N. Matériaux pour la flore des environs de la ville Theodosie 1	179
2. Löbedeva, L. A. Die von V. L. Komarov im Jahre 1913 in der Süd-Ussurischen Gegend gesammelten Pilze	251
3. Preobraschenskyi, G. A. Eine Tabelle zur Bestimmung der Kaukasischen und Krymschen Arten der Gattung Dianthus L.	252
4. Krassnorutzkaja, A. A. Einige Pflanze, die Dr. R. Pohle in Gouv. Archangelsk und Wologda in den Jahren 1905—1909 und 1911 sammelte	258

~~0218~~

п 5633
Библиотека №
Филиала А. Е.

В. Н. Сарандинаки.

Материалы для флоры окрестностей г. Феодосии.

Часть II.

Окончание ¹⁾.

(Рукопись представлена 10 декабря 1916 г.)

Leguminosae.

Genista L.

G. albida Willd.

1. Феод. лесн. Участок Б₃. По дороге к хутору 23/6 IV/V. 1909. (В. С.).

G. albida Willd. var. *scythica* Pacz.²⁾ (*G. scytica* Paczoski).

1. Феод. леснич. Участок А₁. Скл. NE, гор. 21/22; на целине, единично. 19 IV (2 V) 1909 г. (Опр. В. С.). Там же скл. N, гор. 22/23; 30 IV (13 V) 1904 г. (Вл. Сукачев). Участок А₃. Генуэзская Гора. Скл. SE, гор. 23/24; 14/27 IV 1905 г. (Е. Буш).
2. Окрестности г. Феодосии. На горах. 19 IV (2 V). 1909 г. (В. С.).

Cytisus L.

C. biflorus L'Herit.

1. Городской «Кизильник». Скл. ESE, в средней части на целине, единично. 30 IV (13 V) 1909 г. (Опр. В. С.).
2. На горе Тере-оба близ дачи Вершинского. (26 IV) 9 V. 1909 г. (В. С.).

¹⁾ См. Известия, 1917 г. Том XVII, вып. 1.

²⁾ В гербарии Ботан. Сада имеется один экземпляр *Genista scythica* Paczoski — между Феодосией и часовней Ильи 9 V 1905 N. A. Busch, Iter tauricum.

Ononis L.*O. columnae* All.

1. Феодос. леснич. Участок Б. 9/22 VII 1907 г. (В. С.).

Trigonella L.*T. monspeliaca* L.

1. Балка за Феодос. леснич.; близ дороги. 6/19 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Medicago L.*M. falcata* L.

1. Феодос. леснич. Участок А₁. Пытомник; часто. 27 V (9 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. А₂. Скл. Е, на валу гор. 21, рассеянно. 12/25 V 1909 г. (Опр. В. С.). Уч. А₃. а) Скл. N, гор. 22/23, часто, сорное. 24 IX (7 X) 1906 г. (Н. Буш), б) Скл. NNW, на валу 25 гор. (21 V 3 VI) 1905 г. (Н. Буш). Уч. А₄. Скл. Е, гор. 23/24. Сорное, часто. 26 V (8/VI) 1906 г. (Н. Буш). Уч. Б₁. а) 9/22 VI 1907 г. (В. С.); б) поляна у метеорологической станции. 5/18 VI 1903 г. (Н. Прохоров).
2. Городской «Кизильник». а) 18/31 VII 1907 г.; б) 15/28 V 1909 г.; в) 31 VI (3 VI) 1909 г. и d) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
3. Православное кладбище 9/22 VI 1909 г. (В. С.).
4. Курубаш. 9/22 VI 1911 г. (В. С.).

M. sativa L.

1. Портовая территория. Близ метеорологической станции. Сорная. а) 3/16 VI 1909 г. и б) 27 VII (9 VIII) 1909 г. (В. С.).

M. procumbens Bess. (*M. falcata* L., var. *procumbens*).

1. Феодос. леснич. Участок А₁. Скл. NNW. 5/18 X 1905 г. (Н. Буш).

M. orbicularis Allioni.

1. Балка за Феодос. леснич. 6/19 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

M. minima Bartal.

1. Феодос. лесн. Южный склон балок. 2/15 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Участок А₁. Гор. 19/20, на целине часто, сорное. 29 IV (12 V) 1907 г. и 26 IV (9 V) 1906 г. (Е. Буш). Участок Б₁. Склон NE, гор. 3/4; 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б₂. Скл. NE, гор. 8/9. На целине один экземпляр. 23 IV (6 V) 1909 г. (Опр. В. С.).

M. lupulina L.

1. Феодос. леснич. Участок А₃. Скл. NW, гор. 25/26; часто. 2/15 VI 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б₁. Скл. N; гор. 4/5. Сорное. 17/30 IV 1906 г. (Е. Буш).
2. Портовая территория. Сорное в саду. а) 23/5 V/VI 1909 г. и б) 11/24 VI 1909 г. (В. С.).

Mellilotus Juss.*M. tauricus* Desr.

1. Крым, гора Кара Даг (Феод. уезд) близ станции 5/18 VI 1909 г. (В. С.).

M. officinalis Desr. (*M. pallidus* Bess.).

1. Феод. леснич. Участок А₃. Скл. S, гор. 22/23; горное в 5-ти летн. насаждении. 11/24 VI 1907 г. (Н. Буш). Уч. А₄. Скл. S, гор. 25/26. Сорное, не часто. 27/9 V VI 1907 г. (Н. Буш). Скл. над морем. 24 V (6 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б₂. а) Скл. NE, гор. 19/20, на целине одиночно. 3 V (5 VI) 1909 г. (Опр. В. С.); б) Скл. N, гор. 21/22; 15/28 V 1906 г. (Н. Буш). Уч. Б. 3/16 VII 1908 г. (В. С.).
2. Дорога в «Кизильник». 18/31 VII 1907 г. (В. С.).
3. Городской «Кизильник». 3/16 VII 1911 г. (В. С.).
4. Портовая территория. Сорное в саду. 6/19 VI 1909 г.
5. Карантин. 7/20 VI 1911 г. (В. С.).

Trifolium L.*T. pratense* L.

1. Портовая территория. Сорное в саду. а) 18/31 VIII 1909 г.; б) 8/21 VI 1909 г.; в) 23 V (5 VI) 1909 г. и d) 27 V (9 VI) 1911 г. (В. С.).

T. fragiferum L.

1. Феод. лесн. Тальвер балки за участком Б. 3/16 VII 1903 г. (Н. Прохоров).
2. Болотисто-солончаковая балка в имени Шницберга (Двухкорная бухта) 6/19 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
3. Портовая территория. Близ метеорологической станции. 10/23 VII 1908 г. (В. С.).

T. repens L.

1. Портовая территория. Сорное в саду. Много. 8/21 VI 1909 г. (В. С.).

T. ambiguum MB.

1. Феод. лесн. Участок Б₂. Скл. E, в средней части. Сорное, одиночно. 28 V (10 VI) 1909 г. (Опр. В. С.). Уч. Б₃. а) Скл. NE, часто; 27 V (9 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. ENE, ниже дороги от скотопргона к хутору. 31 V (13 VI) 1905 г. (Н. Буш).

Dorycnium Vill.**D. herbaceum Vill. (D. intermedium Ldb. Fl. Ross).**

1. Феодосийское лесничество. Участок А₁. а) Скл. N, гор. 22/23. На целине часто. 9/22 VI 1906 г. (Н. Буш); б) Скл. NNE, гор. 23/24. На целине единично. 30 V (12 VI) 1909 г. (Опр. В. С.). Уч. А₁. Скл. E, гор. 25/26. На целине часто; 3/16 VI 1907 г. (Н. Буш). Над берегом моря за лесничеством. Скл. SE, часто. 12/25 VI 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б₁. а) 2/15 VII 1907 г. Очень много; б) 3/26 VII 1908 г.; в) 9/22 VII 1907 г. Местами очень много. (В. С.).
2. Городской «Кизильник» а) 31 V (13 VI) 1909 г. (В. С.); б) 26 VI (9 VII) 1904 г. Скл. NE. Часто. (Вл. Сукачев).
3. Кизильник на г. Тете-оба. Дача Вержинского. 21 VI (4 VII) 1909 г. (В. С.).
4. Лысая гора (Паша-Тепе). У подножья горы. Дача Л. Н. Паларуца. 1/14 VII 1907 г. (В. С.).

Lotus L.**L. corniculatus L.**

1. На солонцах в имени Шпицберга (Двужкорная Бухта). 13/26 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
2. Феод. лесн. Участок А₁. Скл. NE, гор. 20/21. На целине единично. 28 V (10 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).
3. Курубаш. 9/22 VI 1911 г. (В. С.).

L. corniculatus L. var. ciliatus Koch

1. Феод. леснич. Участок А₁. Скл. E, гор. 25/26. Сорное, часто. 25 VII (7 VIII) 1906 г. (Н. Буш).

L. siliquosus L. (Tetragonolobus siliquosus Roth—Tetrag. tauricus Bnge).

1. Феод. леснич. Дорога на склоне W за уч. Б. 7/20 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).

Oxytropis DC.**O. pilosa L. (Astragalus pilosus L.).**

1. Феод. леснич. Участок Б₁. а) Скл. N, гор. 1/2. 24 IV (7 V) 1906 г. (Н. Буш); б) Скл. NE, выше гор. I. На целине рассеяно. 2/15 V 1909 г. (Опр. В. С.). Уч. Б₃. Скл. N, гор. 17/18; 9/22 V 1907 г. (Н. Буш).

Astragalus L.**A. striatellus Pall.**

1. Скл. к морю за часовой св. Ильи 12/25 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

A. utriger Pall. (Myobroma Henningii Stev.).

1. Гора св. Ильи 30 V. (12 VI) 1912 г. (В. С.).
2. Феодосийское лесничество. Участок Б₃. Скл. NW, гор. 10/11. На целине один экземпляр. 25 IV (8 V) 1900. Проверил В. И. Липский. (Опр. В. С.).
3. По склону горы Тете-оба (на вершине за балкой близ конденсатора 20 IV (3 V) 1909 г. Всего один экземпляр был найден на этом склоне (близ дороги) (В. С.).

A. tauricus Pall. (A. scoraeiformis Led.).

1. Феодос. леснич. Участок А₁. а) Скл. NNE, гор. 16/17. На целине единично. 4/17 V 1909 г. (Опр. В. С.). Проверил В. И. Липский; б) Скл. N на Генуэзской горе 2/15 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б₂. Скл. NE, в густом насаждении 19 V (1 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Городской «Кизильник» 12/25 V 1909 г. (В. С.).
3. Кизильник на г. Тете-оба. Дача Вержинского. 21 VI (4 VII) 1909 г. (В. С.).
4. Православное кладбище 9/22 VI 1900 г. (В. С.).

A. onobrychis L.

1. Феодосийское лесничество. Участок А₂. Скл. E, гор. 22/23; 20 V (2 VI) 1907 г. (Е. Буш). Уч. Б₂. Скл. NE, часто. 19 V (1 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); Уч. Б₃. Скл. ENE, гор. 11/12; 9/22 V 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник». 11/25 V 1909 г. (В. С.).
3. Приморские пески близ станции Сарыголь. 7/20 V 1909 г. Очень много. (В. С.).

A. dolichophyllus Pall. (A. diffusus W.).

1. Феодос. леснич. Уч. Б₁. а) Скл. E, высший пункт. На целине один экземпляр 22 IV (13 V) 1909 г. и б) Скл. ESE, гор. 6/7; 21 IV (12 V) 1909 г. На целине единично. (Опр. В. С., проверил В. И. Липский).

A. testiculatus Pall.

1. Феодос. леснич. Участок Б₁. Склоны N и NNE, гор. 3/4. На целине единично 27 IV (10 V) 1908 г. (Е. Буш).

A. rupifragus Pall.

1. Феодос. леснич. Участок Б₃. В канаве гор. 10. Один экземпляр. 19 IV (1 V) 1909 г. (Опр. В. С., проверил В. И. Липский).

A. corniculatus MB.

1. Обрывы около часовни св. Ильи. 7/20 V. 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феодос. леснич. Участок А₃. а) Скл. WNN, гор. 23/24; около дороги 27 IV (10 V) 1905 г.; б) Скл. Е, Генуэзская гора гор. 23/24; 27 IX (10 X) 1905 г. (Е. Буш). Уч. А₄. Скл. ESE. 19 IV (2 V) 1905 г. (Е. Буш). Там же и на склоне S к морю за военным кладбищем. 9/22 VII. 1909 г. (В. С.). Участок Б₃. По дороге к хутору. 23 IV (6 V) 1909 г. (В. С.).
3. Городской «Кизильник» 11/24 V 1909 г. (В. С.).

A. vesicarius L.

1. Феодос. леснич. Участок А₁. Скл. NE, гор. 9/10; 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Участок А₂. Скл. Е, на валу гор. 21-й; 28 III (11 IV) 1906 г. (Н. Буш). Участок А₃. а) Скл. NE, гор. 19/20; 5/18 X. (Е. Буш); б) Скл. NW, Генуэзская гора, гор. 24/25; 4/17 X, 1905 г. Сорное в 3-х летнем насаждении (Е. Буш). Уч. А₄. Скл. SE, гор. 25/26; 19 V (1 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б. 3/16 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б₁. Высота 126 саж. над ур. моря. На целине близ старых сосен. 2/15 V 1909 г. (В. С.). Уч. Б₂. Скл. Е, выше гор. 8-ой. По дороге Вещицкого на целине. Один экземпляр. 22 IV (5 V) 1909 г. (Опр. В. С.). Уч. Б₃. Скл. N, гор. 10/11, не часто 25 III (7 IV) 1906 г. (Н. Буш).

A. cruciatus Link. (A. stellatus MB; A. asteris Stev.)

1. Феодос. лесн. Участок А₃. Скл. NNW, гор. 32/33; 8/21 V 1905 г. (Е. Буш).

Coronilla L.**C. varia L.**

1. Феодос. леснич. Участок А₁. Скл. N, на валу 21-й гор. единично 3/16 VI 1907 г. (Е. Буш). Уч. А₄. Скл. Е, гор. 23/24; 26 V (8 VI) 1906 г. Сорное часто. (Е. Буш). Уч. Б. 9/22 VII 1907 г. (В. С.). Уч. Б₁. Поляна у метеорологической станции; часто. 5/18 VI 1903 г. (Н. Прохоров). Уч. Б₃. Скл. NE, гор. 17/18; на целине единично, 24 V (6 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник». а) 3/16 VI 1909 г.; б) 31 V (12 VI) 1909 г.; в) 11/24 VII 1908 г. (В. С.).
3. Гора-св. Ильи (в кустарниках). 5/18 VI 1911 г. (В. С.).

Hedysarum L.**H. tauricum Pall.**

1. Феодос. лесн. Участок А₁. а) Скл. NE, гор. 14/15; часто. 19 V (1 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. N, гор.

- 15/16, на целине единично. 12/25 V 1909 г. (Опр. В. С.); в) Скл. N, гор. 15/16, на на целине часто. 15/28 V. 1906 г. и d) Там же, гор. 21/22; Сорное в однолетнем насаждении 27 V (9 VI) 1906 г. (Е. Буш). Участок Б. а) 3/16 V. 1904 г. (Вл. Сукачев); б) 9/22 VII 1907 г. Очень много. (В. С.).
2. Городской «Кизильник». Очень много. а) 18/31 VII 1907 г. б) 31 V (13 VI) 1909 г.; в) 12/25 V 1909 г. и d) 15/28 V 1909 г. (В. С.).
3. Склоны S за часовней св. Ильи; 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

H. candidum MB.

1. Скл. к морю за часовней св. Ильи. 5/18 VI 1911 г. (В. С.).
2. Феодос. леснич. Участок А₁. Скл. N, гор. 17/18; на целине единично. 12/25 V 1909 г. (Опр. В. С.).
3. Православное кладбище (в верхней части). Довольно много. 9/22 VI 1909 г. (В. С.).
4. Городской «Кизильник». а) 11/24 VII 1908 г. Плоды. б) 12/25 V 1909 г. Цветы. в) 15/28 V. 1909 г. Цветы. д) 3/16 VI 1911 г. На полянках (В. С.).

Onobrychis Adans.**O. viciaefolia Scop. (O. sativa Lam.); (var. gracilis Bess.?)**

1. Феодос. лесничество. Участок Б. а) 2/15 VII 1907 г. и б) 9/22 VII 1907 г. (В. С.). Уч. Б₃. Скл. NE, гор. 8/9; на целине единично. 24 V (6 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник». а) 31 V (13 VI) 1909 г. и б) 3/16 VI 1909 г. (В. С.).
3. Кизильник на г. Тете-оба близ дачи Вержинского. 21 VI (4 VII) 1909 г. (В. С.).
4. Курубаш. 10/23 VI 1911 г. (В. С.).

O. Pallásii MB.

1. Склоны S за часовней св. Ильи. 5/18 VI 1911 г. (В. С.).
2. Городской «Кизильник». а) 11/24 VII 1908 г. изредка и б) 31 V (13 VI) 1909 г. (В. С.).

Vicia L.**V. sativa L.**

- а) I. var. *angustifolia* Ser. (*V. cordata* Wulf. v. *angustifolia* Benth.).
1. Феодосийское лесничество. Участок А₁. Скл. NNE, гор. 19/20, на целине единично; 23 IV (6 V) 1909 г. (В. С.).
2. Склон к морю 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

b) *II. var. cordata* (Wulf) Trautv. (*V. angustifolia* Roth var. *cordata* (Wulf) Schmalh.

1. Феодос. лесн. Участок А₁. Скл. S, гор. 24/25, на целине часто; 24 IV (7 V) 1906 г. (Е. Буш).

c) *III. var. pilosa* Trautv. (*Vicia pilosa* MB., var. *pilosa* Schmalh.; var. *angustifolia* Roth.).

1. Феодос. леснич. Мергелистый склон к морю; 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Участок А₂. Скл. NE, гор. 23/24; 27 IV (10 V) 1905 г. (Н. Буш). Уч. Б₁. Скл. N, гор. 2/3; 1/14 V 1907 г. (Н. Буш). Уч. Б₂. Скл. N; гор. 14/15; 10/23 IV 1906 г. (Н. Буш).

V. tenuifolia Roth.

1. Городской «Кизильник». Скл. NW (в средней части Кизильника). На целине, единично 17/30 V 1909 г. (В. О.).

Lathyrus L.

L. hirsutus L.

1. Скл. к морю за Феодос. лесн. 21 V (6 VI) (Вл. Сукачев).
2. Городской «Кизильник». 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

L. tuberosus L.

1. Феодос. лесн. Участок А₂. а) Скл. N, в питомнике на целине; 3/16 VI 1907 г.; б) там же, выше дома в питомнике; не часто. 12/25 VI 1904 г. (Н. Буш).
2. Городской «Кизильник». а) Скл. N, 9/22 VI 1907 г. (Н. Буш) и б) 31 V (13 VI) 1909 г. (В. С.).
3. Курубаш. 10/23 VI 1911 г. (В. С.).
4. На вершине г. Тете-оба в балке за немецкой колонией Герценберг. Скл. S. (В самом глубоком месте балки болотце и кустарники). 16/29 VI 1914 г. (В. С.).

Geraniaceae.

Geranium L.

G. pusillum L.

1. Феодосия. Склон к городу. 8/21 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феодос. лесн. Участок А₁. Скл. NE, в питомнике сорное, единично. 21 V (3 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).

G. dissectum L.

1. Феодос. леснич. Участок Б₁. Скл. N, гор. 1/2; не часто 2/15 V 1906 г. (Н. Буш).

G. columbinum L.

1. Феодос. лесн. Участок А₁. Скл. N, гор. 21/22, сорное в однолетнем насаждении. 29 V (11 VI) 1907 г. (Н. Буш).

Участок А₂. Скл. N, гор. 22/23, на целине единично (Н. Буш). Участок Б₁. а) высший пункт 24 IV (7 V) 1906 г. (Е. Буш); б) Скл. N, гор. 4/5, сорно в 7-ми летнем насаждении; 14/27 V 1907 г. (Н. Буш). Участок Б₂. Скл. E., в средней части. Сорное. Один экземпляр 5/18 VI 1909 г. (Опр. В. С.).

2. Городской «Кизильник» а) на влажном месте 6/19 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

G. tuberosum L.

1. Феод. лесн. Участок А₂. Скл. NE, ниже гор. 9; между питомником и дорогой Вещицкого. Сорное. Один экземпляр 18 IV (1 V) 1905 г. (Опр. В. С.).

Erodium L'Herit.

E. cicutarium L'Herit (*Murhino inodora* Rupr.).

1. Феодос. лесн. Участок А₂ а) Скл. E, гор. 22/23, сорное часто. 26 IV (9 V) 1906 г. и б) Скл. NE, выше гор. 22-й (Генуэзская гора), под флюгером. 1/14 V 1905 г. (Н. Буш).
2. Городской «Кизильник». Близ виноградника 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
3. Скл. N между питомником и гор. 18 в уч. А. Сорное. Один экземпляр. 17/30 IV 1909 г. (Опр. В. С.).
4. Портовая территория. Сорное в саду а) 21 V (3 VI) 1909 г. и б) 20 V (2 VI) 1909 г. (В. С.).

E. ciconium Willd.

1. Феодос. лесн. Участок А₂. а) 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев); б) там же. Скл. ENE. Питомник. Сорное; один экземпляр 25 IV (8 V) 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник». Скл. N, в тени, часто 27 IV (10 V) 1906 г. (Н. Буш).

Linaceae.

Linum L.

L. tauricum Willd (*L. flavum* L. β. *tauricum*.—*L. urcainicum* Czern. см. Шмальгаузен, т. I 182—183).

1. Близ часовни св. Ильи. 3/16 VI 1911 г.
2. Феодос. лесн. Участок А₁. а) Скл. NE, гор. 15/16 (2/22) V 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. NNW, гор. 13/12, на целине рассеянно; 6/19 V 1909 г. (Опр. В. С.). Участок А₂. Скл. E, гор. 22/23, на целине часто. 23 IV (6 V) 1906 г. (Е. Буш). Уч. А₂. Генуэзская гора. а) Скл. S, гор. 22/23. На целине часто. 6/19 V 1907 г. (Е. Буш);

- b) Скл. NE, гор. 23/24; сорное в 3-х летнем насаждении; 21 IV (4 V) 1905 г. (Н. Буш); c) Скл. N, гор. 23/24; 30 IV (13 V) 1904 г. (Вл. Сукачев) Уч. Б 16/29 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Участок Б₁. а) Скл. N, гор. 3/4, сорное 24 IV (7 V) 1906 г. (Е. Буш); b) Скл. NE, гор. 6/7; на целине одиночно, 30 IV (13 V) 1909 г. (Опр. В. С.); c) 2/15 V 1909 г. Много (В. С.). Уч. Бз. а) Скл. NNE; гор. 9/10; 30 IV (13 V) 1905 г.; b) Скл. N, гор. 15/16; 4/17 V 1907 г. (Е. Буш); c) там же. 2/15 V 1909 г. Много (В. С.).
2. За лесничеством на вершине г. Тете-оба. 2/15 V 1909 г. (В. С.)
3. Городской «Кизильник». а) 12/25 V 1909 г.; b) 11/24 V 1909 г.; c) 15/28 V 1909 г.; d) 11/24 VII 1908 г. (Плоды). (В. С.); e) 24 IX (7 X) 1905 г. Верхняя часть Кизильника. Скл. N (Н. Буш).

L. hirsutum L.

1. Скл. к морю за Феодос. леснич. 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феодос. леснич. Участок А₂. Скл. N, гор. 18/19, на целине часто. 27 V (9 VI) 1907 г. (Н. Буш). Участок А₃. а) Скл. NE. 30 V (12 VI) 1905 г. (Н. Буш); b) Скл. NE (Генуэзская гора), гор. 23/24, часто 30 V (12 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев). Участок А₁. Скл. E, гор. 23/24. Сорное, часто 26 V (8 VI) 1906 г. (Н. Буш). Участок Б; 2/15 VII 1907 г. (В. С.). Участок Б₁. Скл. NE, высший пункт. Сорное; одиночно. 16/29 V 1909 г. (Опр. В. С.).
3. Городской «Кизильник» а) 31 V (13 VI) 1909 г.; b) 18/31 VII 1907 г.; c) 26 V (8 VI) 1907 г. Скл. W. (Н. Буш).
4. Курубаш. 10/24 VI 1911 г. (В. С.).

L. nervosum W. K.

1. Городской «Кизильник» 11/24 VII 1907 г. (В. С.).
2. Кизильник на г. Тете-оба. а) Скл. N над немецкой колонией Герценберг 26 VII (8 VIII) 1909 г. (В. С.); b) Скл. N близ дачи Вержинского 26 IV (9 V) 1909 г. и 21 VI (4 VII) 1909 г. (В. С.).

L. tenuifolium L.

1. Феодосийское лесничество. Участок Б: а) 9/22 VII 1907 г. (В. С.); b) 15/18 V 1904 г. (Вл. Сукачев, Уч. Б₁. Поляна у метеорологической станции, одиночно; 5/18 VI 1903 г. (Н. Прохоров). Уч. Б₃. Скл. NE, гор. 10/11; сорное, одиночно 25 V (7 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник»: а) 31 V (13 VI) 1909 г.; b) 11/24 VII 1908 г.; c) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

L. perenne L. a) var. austriacum L. и b) var. squamulosum Rud.

1. Скл. NE около часовни св. Ильи, 9/22 VIII 1903 г. (Н. Прокофьев).
2. Феодос. леснич. Участок А₁. 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. А₃. Генуэзская гора: а) Скл. ESE, гор. 23/24; 1/14 V 1905 г. (Е. Буш); b) Скл. S, гор. 23/24 на целине часто 26 IV (9 V) 1906 г. (Н. Буш). Уч. Б₁. Скл. NE, высший пункт. 15/28 IX 1905 г. (Н. Буш). Уч. Б₁. На щебенчатой почве у Кирпичного завода 3/16 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
3. Городской «Кизильник»: а) Скл. NNE, средняя часть 24 IX (7 X) 1905 г. (Е. Буш); b) 18/31 VII 1907 г. c) 11/24 VII 1908 г.; d) 9/22 VII 1907 г.; e) V 1909 г. (В. С.).
4. На г. Тете-оба близ дачи Вержинского 18/31 VII 1907 г. (В. С.).
- a) var. austriacum L.
1. Феод. леснич. Участок А₁. Скл. N. 20 IX (3 X) 1905 г. (Н. Буш).

Zygophyllaceae.**Peganum L.****P. harmala L.**

1. Окрестности гор. Феодосии: а) на горах близ города. Местами очень много. Сорное 18/31 VII 1907 г. Плоды; и b) там же 9/22 VII 1907 г. плоды. (В. С.).
2. По дороге к горе св. Ильи. Очень много близ города. Сорное: а) 9/22 VI 1909 г. и b) 26 VI (9 VII) 1907 г. цветы (В. С.). На горе св. Ильи 5/18 VI 1911 г. Сорное. (В. С.).
3. Симферопольское шоссе. Близ города у шоссе и дальше (вне города). Очень много. Сорное. 5/18 VI 1909 г. (В. С.).
4. Керченское шоссе и близ станции Сарыголь. Много. Сорное. 25 V (7 VI) 1909 г. (В. С.).
5. Православное кладбище. Много. Сорное. 9/22 VI 1909 г. (В. С.).
6. Сорное у города. 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
7. Степь за городом и за лагерем (Керченский полуостров). 14/27 VI 1910 г. (В. С.).

Zygophyllum L.**Z. fabago L.**

1. Скл. к морю у часовни св. Ильи. 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

2. У мыса св. Ильи. 20 VII (2 VIII) 1908 г. (В. С.).
3. На развалинах Генуэзской башни св. Константина на стене (в городе): 18/31 VIII 1909 г. и 19 VII (1 IX) 1909 г. (В. С.).
4. На камнях у моря близ дачи Суворина. 23 V (5 VI) 1909 г. (В. С.).
5. Православное кладбище 9/22 VI 1909 г. (В. С.).
6. За карантинном на берегу моря 7/20 VI 1911 г. (В. С.).

Tribulus L.

T. terrestris L.

1. Портовая территория; а) Сорное близ метеорологической станции 17/30 VIII 1909 г.; б) Сорное в саду 18/31 VIII 1909 г. (В. С.).

Rutaceae.

Ruta L.

R. graveolens L. (R. divaricata Ten.).

1. Феодосийское лесничество. Участок Б 8/21 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б₃. Скл. NNE, гор. 14/15 на целине, единично 22 V (3 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник». а) Скл. N, 15/28 VI 1906 г. (Е. Буш); б) Там же 27 VI (9 VII) 1904 г. часто (Вл. Сукачев); в) 3/16. 1909 г. цветы; д) 11/24 VII 1908 г. плоды; е) 18/31 VII 1907 г. Плоды. (В. С.).

R. Biebersteinii Neir. (Haplophyllum suaveolens Ledeb. H.; Biebersteinii Spach.; Ruta suaveolens DC).

1. Феодос. лесн. Участок А₁; а) Скл. NE, гор. 22/23; сорное единично 11/24 V 1909 г. (Опр. В. С.). б) Скл. NE, питомник 21 V (2 VI) 1904 г. часто (Вл. Сукачев).

R. taurica Stev. (Haplophyllum tauricum Jaub et Spach).

1. Обрыв к морю близ часовни св. Ильи 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Dictamnus.

D. fraxinella Pers. (D. albus L.).

1. На горе Тете-оба близ дачи Вержинского. 10/23 VI 1912 г. (В. С.).

Simarubaceae.

Ailanthus Desf.

A. glandulosa Desf.

1. Феодосия. Веаде очень много. В садах сорное дерево. На бульварах 18/31 VII 1907 г. Плоды. (В. С.).
2. Близ дачи Суворина. Много. Дико или одичало 8/21 VI 1909 г. Цветы. (В. С.).

Polygalaceae.

Polygala L.

P. major Jacq.

1. Феодосийское леснич. Участок А₁; а) Скл. N, гор. 17/18; на целине часто 28 V (9 VI) 1907 г. (Е. Буш); б) Скл. N, гор. 20/21; не часто 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев); в) Скл. N, гор. 16/17; на целине 21 IV (4 V) 1906 г. (Е. Буш); д) Там же, гор. 18/19; 4/17 V 1906 г. (Е. Буш); е) Там же, гор. 25/26; 6/19 V 1907 г. (Е. Буш); ф) Скл. NE, в насаждении около питомника 15/28 V 1905 г. (Е. Буш); г) Там же, гор. 17/18, на целине один экземпляр 22 IV (4 V) 1909 г. (Опр. В. С.). Участок Б. 3/16 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б: а) 2/15 VII 1907 г.; б) 3/16 VII 1908 г.; в) 9/22 VII 1907 г.; д) 2/15 V 1909 г.; высота 126 саж. над уров. моря. Много на целине. е) 23 IV (6 V) 1909 г. (В. С.); ф) Высший пункт 138 саж. над уров. моря 29 X (11 XI) 1906 г. (Н. Буш); г) Скл. N, гор. 3/4 (4/17) V. 1907 г. и 24 IV (7 V) 1906 г. (Е. Буш); h) Скл. NE, гор. 5/6, не часто 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев); i) Поляна у метеорологической станции 5/18 VI 1903 г. часто (Н. Прохоров); j) Скл. NNE, гор. 4/5. На целине единично 22 IV (4 V) 1909 г. (Опр. В. С.). Участок Б. а) Скл. NE, 19 V (1 VI) 1904 г. Не редко (Вл. Сукачев). б) Скл. ENE, 21 V (3 VI) 1905 г. (Е. Буш). Участок Б₃: а) Скл. ENE, ниже дороги от скотопргона к хутору. 22 V (3 VI) 1905 г. (Е. Буш); б) Около ворот на скотопргоне; гор. 8/9; нередко. 20 V (1 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Городской «Кизильник»: а) Скл. NNW, верхняя часть, 24 IX (7 X) 1905 г. (Е. Буш); б) 20 IV (3 V) 1909 г. Много; в) 11/24 VII 1908 г. д) 15/28 V 1909 г.; е) 12/25 V 1909 г. Много; ф) 14/27 V 1911 г. (В. С.).

3. Кизильник на г. Тете-оба. Скл. N, близ дачи Вержинского 26 IV (9 V) 1909 г. Много 21 VI (4 VII) 1909 г. (В. С.).

Euphorbiaceae

Mercurialis L.

M. perennis L.

1. Кизильник на горе Тете-оба близ дачи Вержинского. В густых зарослях Кизильника 26 IV (9 V) 1909 г. (В. С.). (Там же Polygonatum, Arum и др. тен. виды).

M. annua L.

1. Портовая территория. Сорное в саду 11/24 VI 1909 г. и 23 V (5 VI) 1909 г. (В. С.).

Euphorbia L.

E. perlis L.

1. Окрестности г. Феодосии. На приморских грубых песках у дер. «Камыши». VIII 1903 г. (Н. Прохоров).

E. falcata L.

1. Портовая территория. Сорное в саду 12/25 VIII 1908 г. (В. С.).

E. Gerardiana Jacq.

1. Гора св. Ильи 27 VI (10 VII) 1907 г. (В. С.).
2. Склоны S горы Тете-оба. На бурых почвах 9/22 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
3. На солянцах в имени Шпицберга в Двукорной Бухте. 11/24 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
4. За лесничеством на вершине г. Тете-оба близ конденсатора 5/18 VIII 1908 г. (В. С.).
5. Феодос. леснич. Участок Б. 2/15 VII 1907 г. Участок Б₁. Поляна у метеорологической станции, часто; 5/18 VI 1903 г. (Н. Прохоров). Уч. Б₄. а) Скл. N, на валу 21 гор.; 10/23 V 1906 г. (Н. Буш). б) Там же гор. 24/25; 26 V (8 VI) 1907 г. (Н. Буш). Феодос. лесничество. Мергелистые обнажения около города 8/21 V 1908 г. (Вл. Сукачев). Близ французского завода. Сорное 10/13 VII 1908 г. (В. С.).
6. Городской «Кизильник»: а) 3/16 V 1909 г. и б) 15/28 V 1909 г. (В. С.).

E. petrophila C. A. M.

1. Скл. к морю около часовни с. Ильи: а) 7/20 V 1908 г. (Вл. Сукачев); б) 5/18 VI 1911 г. (В. С.).
2. Близ часовни св. Ильи. Много. 9/22 VII 1909 г. (В. С.).

3. Гора св. Ильи: а) 16/29 VI 1909 г. Очень много (В. С.); б) 9/22 VII 1909 г. Очень много. Рассеянно. (В. С.); в) 27 VI (10 VII) 1907 г. Много. (В. С.).
4. Скл. ESE к морю ниже уч. А₃ 21 IV (4 V) 1905 г. (Н. Буш).
5. Феодос. леснич. Уч. А₃. Скл. NNW; гор. 25/26; 1/13 IV 1905 г. (Н. Буш). Участок А₂. Скл. E гор. 20/21; 25 IV 8 V 1909 г. (Опр. В. С.).
6. Курубаш. 9/22 VI 1911 г. (В. С.).

E. leptocaula Boiss.

1. Феодос. леснич. Уч. А₁. Скл. NE, между гор. 16 и питомником, на целине, единично. 19 IV (1 V) 1909 г. (Опр. В. С.). Уч. А₂. Скл. E, гор. 22/23. Сорное в трехлетнем насаждении. 6/19 V 1907 г. (Н. Буш). Уч. А₃: а) Скл. WNW, гор. 23/24, около дороги, 28 IV (10 V) 1905 г. б) Скл. N, гор. 23/24. Сорное в 2-х лет. насаждении. 20 IV (11 V) 1906 г. (Н. Буш). Уч. Б: а) 5/18 V 1908 г. (Вл. Сукачев); б) 2/15 VII 1907 г. (В. С.); в) 20 IV (3 V) 1909 г. (В. С.). Уч. Б₁. Скл. NE; гор. 4/5. На целине, единично. 3/16 V 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Скл. S к морю ниже участка А₂. 22 IV (4 V) 1905 г. (Н. Буш).
3. Близ ограды виноградника в имени Шпицберга в Двукорной Бухте. 6/19 VIII 1903 г. (Н. Буш).
4. Православное кладбище. 9/22 VI 1909 г. (В. С.).

E. virgata W. K.

1. Гора св. Ильи 16/29 VI 1909 г. (В. С.). Близ часовни св. Ильи 16/29 VI 1909 г. (В. С.).
2. Феодос. леснич. Участок Б. 8/21 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
3. Городской «Кизильник»: а) 18/31 VII 1907 г. и б) 3/16 V 1909 г. (В. С.).

Anacardiaceae

Cotinus Scop.

C. coggyria Scop. (Rhus cotinus L.).

1. Балка за Феод. леснич. Скл. к морю 4/17 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Кизильник на горе Тете-оба: а) Скл. N; 31 V (13 VI) 1909 г. и б) Скл. N; 21 VI (4 VII) 1909 г. Близ дачи Вержинского; в) Над немецкой колонией Герценберг. Скл. N. 31 V (13 VI) 1909 г. 26 VII (8 VIII) 1909 г. Местами много. (В. С.).

Rhamnaceae.

Rhamnus L.

R. cathartica L.

1. Городской «Кизильник» 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Кизильник на горе Тете-оба над немецкой колонией Герценберг. 26 VII (8 VIII) 1909 г. Плоды. (В. С.).

Paliurus Juss.

P. aculeatus Lam. «Держи-дерево».

1. Феодос. леснич. а) В питомнике. 7/20 VI 1909 г. Цветы и 10/23 VIII 1908 г. Плоды. (В. С.).

Malvaceae.

Althaea L.

A. cannabina L.

1. Феодос. лесничество. Участок А₁. Скл. SE. 26 IX (10 X) 1905 г. (Н. Буш).
2. Городской «Кизильник»: а) Скл. N. 15/28 VII 1907 г. (Е. Буш); б) 11/24 VII 1908 г. и в) 18/31 VII 1907 г. (В. С.).

A. hirsuta L.

1. Феодосия. За Карантином между дорогой и дачей Чураева. Скл. NE. 24 V (6 VI) 1904 г. Не часто. (Вл. Сукачев).
- 2) Феодос. леснич. Участок А₂: а) Скл. NE, питомник 2/15 VI 1904 г., не часто (Вл. Сукачев); б) Скл. E., гор. 23/24; сорное не часто 24 VII (7 VIII) 1906 г. (Н. Буш). *) У ч. А₁. Скл. SSE. 1/14 VI 1905 г. (Н. Буш). У ч. Б₃ Скл. N, на валу гор. 12-й 15/28 V 1906 г. (Н. Буш).
3. Городской «Кизильник» 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев). *) У ч. А₂. Скл. E., на Генуэзской горе, гор. 23/24, сорное, единично 30 V (12 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).

A. rosea Cav.

1. Феодос. леснич. У ч. А₁. Скл. ESE. 17/30 VII 1905 г. (Н. Буш).

A. ficifolia Cav.

1. Феодос. леснич. Участок Б₃. Близ дороги к хутору, высота 84 саж. над ур. моря. 28 VII (10 VIII) 1909 г. (В. С.).

Malva L.

M. silvestris L.

1. Портовая территория. Сорное в саду. 11/24 VI 1909 г. (В. С.).
2. Карантин 7/20 VI 1911 г. и 19 V (2 VII) 1911 г. (В. С.).

M. neglecta Wallr. (M. vulgaris Fr.; M. rotundifolia Ldb. Fl. Ross.)

1. Портовая территория. Сорное в саду: а) 2/15 X 1909 г. б) 8/21 VI 1909 г. и в) 11/24 X 1910 г. (В. С.).
2. Феодос. леснич. У ч. А₁. Скл. NNE, гор. 19/20. Сорное, единично. 30 V (12 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).

Guttiferae.

Hypericum L.

H. ponticum (Lipsky) Woron.

1. Городской «Кизильник» 11/24 VII 1908 г. (В. С.).

H. perforatum L. (H. veronense Schrank).

1. Феодос. леснич. Участок А₂. Скл. E, гор. 19/20, на целине единично; 23 IV (6 V) 1909 г. (Опр. В. С.). У ч. А₂. Скл. N, гор. 24/25. На целине часто. 25 VII (7 VIII) 1906 г. (Е. Буш). У ч. А₁. Скл. S, гор. 25/26. На целине не часто. 27 V (9 VI) 1907 г. (Е. Буш). Скл. SE, к морю ниже уч. А₁. 14/27 VI 1905 г. (Е. Буш). У ч. Б₁: а) Скл. N, гор. 3/4; 10/23 VI 1906 г. (Е. Буш); б) 3/16 VII 1908 г. (В. С.).
2. Городской «Кизильник» 11/24 VII 1908 г. (В. С.).

Cistaceae.

Helianthemum Adans.

H. salicifolium Pers.

1. Скл. SE к морю за Феодос. лесничеством. 3/16 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

H. marifolium Mill. (по гербарию Бот. Сада). (H. oelandicum Whlbg. f. tomentosum Koch., H. vineale Pers., Cistus marifolius MB., H. canum Dun.—Шмальгаузен. т: I).

1. Феодос. лесн. Участок Б₃. Скл. NNE, гор. 10/11; на целине единично. 4/17 V 1909 г. (Опр. В. С.). У ч. Б по дороге в город между гор. 10 и 11, на высоте 105—108 саж. над ур. моря. 5/18 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

П. 5622
 Библиотека Главного
 Ботанического сада
 Файл: А.Н. С. 0209

Fumana Spach.

F. procumbens Gren. et Godr. (*F. fumana* Mill; *F. procumbens* Dup.—Шмальгаузен т. I).

1. Городской «Кизильник». Скл. NNE, верхняя часть. 24 XI (7 X) 1905 г. (Н. Буш).

Violaceae.**Viola L.**

V. hirta L. (*V. inodora* Andr.—Шмальгаузен т. I).

1. Феодос. лесн. Участок А₁. а) Скл. NNW. Сорное в питомнике. 22 IX (5 X) 1905 г. (Е. Буш); б) Скл. N, гор. 14/15, сорное в однолетнем насаждении. 23 IV (6 V) 1907 г. (Н. Буш). Уч. А₂. Скл. NE, гор. 23/24, сорное в трехлетнем насаждении 3/16 IV 1905 г. (Е. Буш). Уч. Б₁. Скл. E, гор. 3/4; 14/27 III 1906 г. (Е. Буш). Уч. Б₂. Скл. N, гор. 11/12; 3/16 IV 1907 г. (Е. Буш).

V. campestris MB. (*V. ambigua* W. et K., *V. hirta* var. *campestris*—Шмалг. т. I).

1. Феодос. лесн. Участок А, Скл. N, гор. 25/26; 7/20 IV 1904 г. (Вл. Сукачев), Уч. А₁. Скл. NNE, гор. 17/18; на целине, расселино. 20 III (2 IV) 1909 г. (Опр. В. С.).

V. Kitaibeliana R. et Schult. var. prostrata Kupffer.

1. Феодос. лесн. Уч. Б₂ в средней части, скл. E, Сорное. Один экземпляр. 5/18 VI 1909 г. (Опр. В. С.—Проверено по гербарии Ботан. Сада. Опред. Купффер).

V. arvensis Murr. (*V. tricolor* L. var. *arvensis* Koch).

1. Феодос. лесн. Участок А₁, скл. S, гор. 25/26; (9/22) IV 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. А₂, скл. E, гор. 22/23. Сорное в трехлетнем насаждении 23 IV (6 V) 1907 г. (Е. Буш). Уч. А₃, скл. NNE, по дороге Вещицкого. 21 IV (4 V) 1905 г. (Е. Буш). Уч. А₁, скл. E, гор. 22/23; на целине часто 29 III (11 IV) (Е. Буш). Уч. Б₁: а) Высший пункт, часто 10/23 IV 1906 г. (Опр. Н. Буш); б) Скл. N, гор. 2/3; сорное, часто 31 III (13 IV) 1906 г. (Е. Буш).
2. Городской «Кизильник». Скл. N, часто 10/23 IV 1907 г. (Е. Буш).

Umbelliferae.**Eryngium L.**

E. campèstre L.

1. Феодос. лесн. Уч. А₃, скл. NW, гор. 24/25, сорное в двухлетнем насаждении, часто. 1904 г. (Вл. Сукачев).

Уч. Б₁, 2/15 VII 1907 г. очень много (В. С.). Уч. Б₄ сорное при дорогах и около города. 1909 г. (Опр. В. С.).

2. Склоны S к морю за Феодос. лесн., часто 24 VI (7 VII) 1907 г. (Е. Буш).
3. На вершине г. Тете-оба. На скл. S, около высшего пункта лесничества, близ виноградника 17/30 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
4. По дороге в «Кизильник». Близ кирпичного завода. Много. Сорное 11/24 VII 1908 г. (В. С.).
5. На песках за станцией Сарыголь ближе к дороге 24 VII (6 VIII) 1909 г. (В. С.).

E. maritimum L.

1. Феод. лесн. Скл. NE 4/17 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
2. Приморские пески близ станции Сарыголь—(главный вокзал) очень много: а) 24 VII (6 VIII) 1909 г. цветы (В. С.); б) 7/20 V 1909 г. там же много, листья (В. С.); в) 16/29 VI 1911 г. (В. С.).

Anthriscus Hoffm.

A. vulgaris Pers.

1. Феодос. лесн. Уч. Б₁, Скл. N, гор. 4/5, часто. 2/15 V 1906 г. (Н. Буш). Уч. Б₃, скл. N, в канаве гор. 11; 1/14 V 1907 г. (Н. Буш).

Scandix L.

S. pecten veneris L.

1. Феод. леснич. Уч. А₂ Скл. E, в питомнике на целине 24 IV (7 V) 1906 г. (Е. Буш); Уч. Б₃ Скл. NNE, гор. 9/10; 31 IV (13 V) 1905 г. (Н. Буш). Уч. Б₄, Скл. N, гор. 26/27; (17/30) IV 1906 г. (Н. Буш).

S. australis L.

1. Скл. к городу. 8/21 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

S. grandiflora L.

1. Склоны, прилегающие к городу 8/21 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Torilis Adans.

T. anthriscus Gmel.

1. Феодос. лесн. Участок А₂. Скл. E, в питомнике на целине единично. 15/28 IV 1906 г. (Н. Буш). Уч. Б₂. Скл. N, в густом насаждении 16/29 VI 1906 г. (Н. Буш).

Caucalis L.**C. daucoides L.**

1. Феодос. леснич. Участок А1: а) Скл. NE, в насаждении 10/23 V 1905 г. (Н. Буш); в) Скл. NE, гор. 19/20, питомник 20 V (2 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. А2: 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б1. Скл. NE, гор. 4/5. Сорное, единично 9/22 V 1909 г. (Опр. В. С.).
2. По дороге в Коктебель 31 V (13 VI) 1909 г. (В. С.).
3. Курубаш 9/22 VI 1911 г. (В. С.).

C. latifolia L. (Turgenia latifolia Hoffm.).

1. Феодос. леснич. Участок А1: а) Скл. NE, в насаждении 12/25 V 1905 г. и б) Скл. N, гор. 22/23. Сорное, в однолетнем насаждении 20 V (2 VI) 1907 г. (Н. Буш). Уч. А2: а) в посадках близ дороги 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев); в) Скл. E, в питомнике на целине часто 4/17 V 1906 г. (Н. Буш); с) Скл. SE, гор. 22/23, сорное, единично 14/27 V 1909 г. (Опр. В. С.).
2. По дороге в Коктебель а) в посевах у шоссе 5/18 VI 1909 г. (В. С.).
3. Степь за лагерем (Керченский полуостров). 12/25 VI 1910 г. (В. С.).

C. nodosa Scop.

1. Скл. к морю за Феодос. леснич. Не часто: а) 11/24 V 1904 г. и в) 24 V (6 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).

Coriandrum L.**C. sativum L.**

1. Скл. N E к морю за Феод. леснич. 24 V (6 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феод. леснич. Уч. А2. 27 V (9 VI) 1904 г. Питомник (Вл. Сукачев).

Bifora Hoffm.**B. radians MB.**

1. Феод. леснич. Участок А1. Скл. N, 21/22 Сорное 20 V (2 VI) 1907 г. (Е. Буш). Уч. А2. Скл. N, в питомнике на целине, часто. 4/17 V 1906 г. (Е. Буш). Уч. А3. Скл. E, гор. 23/24; Сорное в 3-х летнем насаждении, 3/16 VI 1907 г. (Н. Буш). Уч. Б3: а) Скл. NE, гор. 11/12, на целине единично 21 V (3 VI) 1909 г. (Опр. В. С.), б) Скл. N, гор. 17/18; 2/15 V 1906 г. (Е. Буш).
2. Курубаш. В канавах при дороге 10/23 VI 1911 г. (В. С.).
3. Городской «Кизильник» 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

Physospermum Cuss.**P. aquilegifolium All.**

1. Городской «Кизильник» 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Кизильник на г. Тете-оба близ дачи Вержинского 26 IV (9 V) 1909 г. (В. С.).

Conium.**C. maculatum L.**

1. Феодосия. Карантин. На берегу моря у стены. Много 7/20 VI 1911 г. (В. С.).

Bupleurum L.**B. rotundifolium L.**

1. Гора св. Ильи. По дороге к часовне; в канаве единично 16/29 VI 1909 г. (В. С.).
2. Феод. леснич. Уч. А1. Скл. E, гор. 23/24, сорное, часто, 26 V (8 VI) 1906 г. (Н. Буш). Уч. Б1. 2/15 VII 1907 г. (В. С.). Уч. Б3: а) Скл. NE, на валу гор. 10; единично 25 V (7 VI) 1909 г. (Опр. В. С.); б) Скл. ENE на валу гор. 9; 17/30 VI 1905 г. (Е. Буш); с) 14/27 VI 1910 г. (В. С.).
3. Городской «Кизильник» 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
4. Портовая территория. Сорное в саду: а) 14/27 VI 1910 г. и в)? VII 1911 г. (В. С.).

B. baldense Host.

1. Феод. леснич. Уч. Б1. 2/15 VII 1907 г. Очень много. (В. С.) Уч. Б3: а) Скл. N, в канаве гор. 9, часто. 21 V (3 VII) 1907 г. (Е. Буш). б) Скл. NNE, гор. 10/11; на целине рассеянно; 11/24 VI 1909 г. (Опр. В. С.); с) Скл. NE, гор. 12/13, не часто, 30 VI (13-VII) (Вл. Сукачев).

Trifolia Hoffm.**T. Hoffmanni MB. var. hispida Hoffm.**

1. Феод. леснич. Участок Б. 3/16 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Falcaria Host.**F. vulgaris Bernh. (Rivini Host.).**

1. Феод. лесн. Уч. Б. 8/21 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Городской «Кизильник»: а) Скл. W. 15/28 1907 г. (Н. Буш); в) Там же 11/24 VII 1908 (В. С.); с) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

Pimpinella L.**P. tragiium Vill.**

1. Феод. леснич. Уч. А1. Скл. NNW, в насаждении около питомника 2/15 VII 1905 г. (Е. Буш). Уч. А2. Скл. Е, гор. 22/23. На целине часто. 17/30 IX 1906 г. (Е. Буш). Уч. А3. Скл. NNW, гор. 26/27; (7/20) VIII 1905 г. (Е. Буш). Скл. ESE ниже уч. А1. 1/14 VI 1905 г. (Е. Буш).
2. По дороге к бывшему имению Шпицберга в Двужорной Бухте. Скл. Е. 4/17 VIII 1903 г. (Н. Буш). Участок Б1. Феод. лесничества: а) Скл. NNE, гор. 3/4 (15/28) IX 1905 г. (Е. Буш); б) Скл. NE, гор. 3/4, на целине, единично-17/30 VI 1909 г. (Опр. В. С.); в) 2/15 VII 1907 г.; д) 9/22 VII 1907 г. Очень много. (В. С.).

Seseli L.**S. dichotomum Pall.**

1. Гора св. Ильи. Скл. S к морю за часовней 16/29 VI 1909 г. (В. С.).
2. За лесничеством ниже Уч. А1. Близ дороги на каменной степке к склону S. 9/22 VII 1909 г. (В. С.).

S. gummiferum Pall.

1. Берег моря ниже часовни св. Ильи 9/22 V 1904 г. (прошлогодний сухой экземпляр). (Вл. Сукачев).
2. Скл. S к Двужорной Бухте 3/16 VIII 1903 г. (Н. Прохоров) (проверено по гербарию Ботан. Сада, где сохранился экземпляр *S. gummiferum* Smith., собр. Н. Прохоровым в окр. г. Феодосии в 1903 г.—В гербарии Феод. лесн. сохранилась только этикетка, растения не было. В. С.).
3. В балке между Генуэзской горой и горой св. Ильи. Местами много. 28 VIII (10 IX) 1914 г. Цветы. (В. С.).

S. tortuosum L.

1. Феод. леснич. Участок А2. Скл. NNW; гор. 25/26; 19 IX (2 X) 1905 г. (Н. Буш).

Peucedanum L.**P. Biebersteinii Schmalh.**

1. Феод. городской «Кизильник» 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Daucus L.**D. carota L.**

1. Феод. леснич. Уч. А1. Скл. S, гор. 24/25, на целине часто. 25 VII (7 VIII) 1906 г. (Е. Буш). Уч. Б1: а) Скл. N,

- в канаве гор. 2. Часто. 14/27 VII 1906 г. (Е. Буш); б) Скл. NE, около хутора часто. 30 VI (13 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев); в) Скл. NE, гор. 5/6, на целине единично. 1/14 VII 1909 г. (Опр. В. С.); д) 2/15 VII 1907 г. и е) 9/22 VII 1907 г. местами много (В. С.).
2. На вершине г. Тете оба близ высшего пункта 5/18 VIII 1909 г. (В. С.).
 3. Городской «Кизильник»: а) 18/31 VII 1907 г. (В. С.); б) 26 VI (9 VII) 1904 г. Скл. NE, часто. (Вл. Сукачев); в) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

Heracleum L.**H. sibiricum L.**

Окрестности г. Феодосии. Степь за лагерем (Керченский полуостров). 12/25 VI 1910 г. (В. С.).

Cornaceae.**Cornus L.****C. mas L.—Кизиль.**

1. По дороге к часовне Св. Ильи. 5/18 IV 1909 г. Цветы (В. С.).
2. Близ часовни Св. Анны ниже уч. Б1. 16/29 IV 1909 г. Цветы (В. С.).
3. Городской Кизильник: а) 5/18 IV 1909 г. Цветы; б) 20 IV (3 V) 1909 г.; в) 11/25 VII 1908 г. Много. Плоды (В. С.); д) Скл. N, 3/16 IV 1907 г. (Н. Буш); е) 31 III (13 IV) 1909 г. (Опр. В. С.).
4. Кизильник на г. Тете-оба близ дачи Вержинского и над немецкой колонией Герценберга. Скл. N, 26 VII (8 VIII) 1909 г. (В. С.).

Primulaceae.**Androsace L.****A. maxima L.**

1. Феод. леснич. Участок А1. Скл. N, гор. 25/26; часто. 31 III (13 IV) 1906 г. (Н. Буш). Уч. А2. Скл. N, в питомнике на целине часто. 26 IV (9 V) 1906 г. (Н. Буш). Уч. А4. Скл. E, гор. 23/24. На целине единично. 3/16 IV 1906 г. (Н. Буш). Уч. Б. 3/16 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б1. Скл. ENE; гор. 3/4; 22 IV (5 V) 1905 г. (Е. Буш). Уч. Б2: а) Скл. NE. 10/23 IV 1904 г. (Вл. Сукачев); б) 20 IV (3 V) 1909 г. Сорное между посадками. Местами очень много (В. С.).

2. Городской «Кизильник»: а) Скл. N, 10/23 IV 1907 г. (Н. Буш); б) Скл. SSE, в средней части. На целине рассеянно. 29 III (11 IV) 1909 г. (Опр. В. С.).

Anagallis L.

A. arvensis L., var. coerulea Schreb.

1. Феод. леснич. Уч. А1: а) Скл. N, гор. 19/20; сорное в однолетнем насаждении 29 V (11 VI) 1907 г. (Н. Буш); б) Скл. NNE в питомнике, сорное 30 V (12 VI) 1905 г. (Н. Буш). Уч. Аз: а) Скл. S, Генуэзская гора, гор. 23/24. Сорное рассеянно 19 V (1 VI) 1909 г. Опр. (В. С.); б) Скл. NNW, гор. 26/27; 19 IX (2 X) 1905 г. (Е. Буш). Уч. А1. Скл. S, гор. 24/25. Сорное, часто. 26 IV (9 V) 1906 г. (Н. Буш). Уч. Б1: а) Скл. N, гор. 1/2. Сорное. 14/27. VII 1906 г. (Н. Буш); б) 9/22 VII 1907 г. и с) 21 VII (3 VIII) 1908 г. Много. (В. С.).
2. Портовая территория. Сорное в саду с весны до осени. 1909 г. (В. С.).

Plumbaginaceae.

Statice L.

S. Gmelini Willd.

1. Скл. S к морю за Феод. лесничеством. 30 VII (12 VIII) 1906 г. на целине часто. (Е. Буш).
2. Скл. SE над морем. 12/25 VII 1904 г. (Вл. Сукачев).
3. Феод. леснич. Участок Бз. Скл. N, гор. 16/17; 31 VII (13 VIII) 1907 г. (Н. Буш).

S. Gmelini Willd. var. latiflora Boiss. (S. scoraria MB.; S. Meyeri Boiss.).

1. На солонцах в имении Шпицберга в Двужорной Бухте. 13/26 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).

Oleaceae.

Ligustrum L.

L. vulgare L.

1. Городской «Кизильник»: а) 6/19 V 1904 г. (Вл. Сукачев); б) 5/18 VIII 1909 г. (В. С.); с) 11/24 VII 1908 г. Плоды (В. С.); д) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
2. Кизильник на г. Тете-оба. Скл. N над немецкой колонией Герценберг 26 VII (8 VIII) 1909 г. (незрелые плоды) (В. С.). Там же близ дачи Вержинского 26 IV (9 V) 1909 г. (молодые листья и прошлогодние плоды). (В. С.).

Syringa.

S. vulgaris L.

1. Городской «Кизильник» средняя часть. Скл. N. Дико или одичало между кустами кизила 5/18 VIII 1909 г. Листья и 30 IV (13 V) 1909 г. Цветы. (В. С.).

Gentianaceae.

Erythraea Borkh.

E. spicata Pers.

1. Затененные места в болотистой балке в бывшем имении Шпицберга в Двужорной Бухте 6/19 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).

Apocynaceae.

Vinca L.

V. herbacea Waldst. et Kit.

1. Феодосийский городской «Кизильник»: а) 10/23 V 1904 г. Под тенью кизила (Вл. Сукачев); б) Скл. N. 14/27 V 1907 г. и 27 IV (10 V) 1908 г. (Н. Буш); с) Верхняя часть Кизильника. Полянка между кустарниками, ближе к тени. 20 IV (3 V) 1909 г. Местами много. (В. С.); д) Скл. NNW (Средняя часть). 30 IV (12 V) 1905 г. (Е. Буш); е) Скл. E. (нижняя часть), на целине единично. 31 IV (13 V) 1909 г. (Опр. В. С.).

Ardisium L.

A. venetum L.

1. Склоны к морю у мыса св. Ильи 20 VII (2 VIII) 1908 г. (В. С.).
2. Склоны S к морю за часовней св. Ильи 5/18 VI 1911 г. (В. С.).
3. На берегу моря за лесничеством на песке 22 VII (4 VIII) 1907 г. (Е. Буш).

Asclepiadaceae.

Cynanchum L.

C. acutum L.

1. Скл. к морю за лесничеством. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
- Скл. NE к морю 12/25 VII 1904 г. (Вл. Сукачев).

- Скл. SE; на берегу моря, не часто. 12/25 VII 1904 г. (Вл. Сукачев). Каменный берег моря за лесничеством, не часто. 12/25 VI 1906 г. (Е. Буш). Берег моря за лесничеством; на песке 24 VI (7 VII) 1907 г. (Н. Буш).
2. Берег моря в бывшем имении Шпицберга в Двукорной Бухте. 6/19 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
 3. На песках у моря близ станции Сарыголь. Много. 24 VII (6 VIII) 1909 г. (В. С.).

Convolvulaceae.

Cuscuta L.

C. planiflora Ten.

1. Феод. лесничество. Участок Аз. скл. NW, гор. 24/25; сорное в двухлетнем насаждении. 21 VI (4 VII) 1904 г. (Паразитирует на Astragalus) (Вл. Сукачев).

C. europaea L.

1. Феод. леснич. Участок А1. скл. N, гор. 23/24; на целине. 11/24 VI 1907 г. (Е. Буш).
2. Городской «Кизильник». Скл. E, 18/31 VII 1907 г. (Е. Буш). (Паразитирует на Artemisia maritima).

C. sp.

1. Феод. городской «Кизильник». 11/24 VII 1908 г. (на Teucrium chamaedrys) (В. С.).
2. Гора св. Ильи. 27 VI (10 VII) 1907 г. (на Euphorbia в злаках) (В. С.).

Convolvulus L.

C. pineatus L.

1. Гора св. Ильи. Близ часовни. 16/29 VI. 1909 г. (В. С.).
2. Феод. леснич. Уч. А1. скл. N, гор. 19/20, на целине часто. 19 V (1 VI) 1906 г. (Н. Буш). Уч. А4. скл. E, гор. 23/24; сорное, часто. 26 V (8 VI) 1906 г. (Н. Буш). Уч. Б1. 9/22 VII 1907 г. Местами очень много. (В. С.). Уч. Бз. скл. NE, гор. 10/11, на целине единично. 19 V (1 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).
3. Городской «Кизильник». 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

C. arvensis L.

1. Феод. лесн. Участок А1: а) Скл. NE, в насаждении 19 V (1 VI) 1905 г. (Н. Буш); б) Скл. E, в питомнике. Сорное, рассеяно. 12/25 V 1909 г. (Опр. В. С.); Уч. Аз. Скл. E, гор. 22/23; сорное, часто. 20 V (2 VI) 1907 г. (Е. Буш); Уч. Аз. скл. N, гор. 26, часто. 2/15 VI 1904 г. (Вл. Сукачев); Уч. А4. скл. S, гор. 23/24, сорное, часто. 26 V (8 VI) 1906 г. (Н. Буш); Уч. Б1: а) 9/22 VII 1907 г. (В. С.); б) Скл. N, на валу гор. 8; 10/23 V 1906 г. (Е. Буш);

- с) Поляна близ метеорологической станции в лесничестве 6/19 VI 1903 г. часто (Н. Прохоров); Уч. Бз. скл. N, гор. 12/13; сорное в старом насаждении. 18/31 V 1907 г. (Н. Буш).
2. Городской «Кизильник»: а) 18/31 VII 1907 г. и б) 11/24 VII 1908 г. (В. С.).
3. Портовая территория. Сорное в саду: а) 20 VI (3 VII) 1911 г. (В. С.); б) в течение всего лета 1909 г. (В. С.).
4. Сорное близ города 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
5. Склон S к морю близ часовни Св. Ильи 5/18 VI 1911 г. (В. С.).

C. holosericeus MB.

1. Склон S за часовней св. Ильи 5/18 VI 1911 г. (Собр. и опр. В. С., проверил И. Палибин).

Borraginaceae.

Heliotropium L.

H. ellipticum Ldb. var. littorale (Stev.).

1. У подножья Лысой горы (Паша-тепэ). Сорное в саду Л. Н. Папарупа 28 VII (10 VIII) 1907 г. (Было опред., как Heliotropium europaeum L. var. Stevenianum Andrz. (В. С.).

Cynoglossum L.

C. officinale L.

1. За карантинном около дачи Чураева. Скл. NE, 24 V (6 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. У ворот Караимского кладбища 9/22 VII 1909 г. Плоды (В. С.).
3. Феодос. леснич. Уч. А2: а) Скл. NE, питомник, 2/15 VI 1904 г. часто. (Вл. Сукачев); б) Скл. E, гор. 22/23; на скалистой почве 4/17 V 1906 г. (Е. Буш); Уч. Б. по дороге к лесному хутору. 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б1. скл. N, гор. 1/2; 2/15 V 1906 г. (Е. Буш); уч. Бз. скл. NE, гор. 9/10; на целине мелкими группами; 4/17 V 1909 г. (Опр. В. С.).
4. Городской «Кизильник». а) Скл. N, 14/27 V 1907 г. (Е. Буш); б) Скл. над городом 12/25 V. 1909 г. (В. С.).

Lappula Moench.

L. barbata Gürke. (Echinopspermum barbatum Lehm.; Myosotis barbata MB.).

1. Феодос. леснич. Участок Б1. скл. N, на валу гор. 2. 14/27 VII 1906 г. (Н. Буш).

L. saxatilis (Pall) Ksnz.

1. Феод. леснич. Уч. А₁. Скл. ENE, на целине одиночно 6/19 1909 г. (Собр. Як. Никитась. Teste prof. Kusnezow). Уч. Б₂. Скл. NE, на целине одиночно 9/22 V 1909 г. (Teste prof. Kusnezow).
2. Городской «Кизильник». 3/16 VI 1911 г.
3. Курубаш 10/23 VI 1911 г.
4. Вблизи часовни св. Ильи 5/18 VI 1911 г.

Собр. В. С.
Teste prof.
Kusnezow.

L. saxatilis (Pall) Ksnz. var. *virgata* Ksnz.

1. Феод. лесн. Уч. А₂. скл. N, в питомнике, на целине часто. 15/28 V 1906 г. (Было определено П. Буш, как *Lithospermum arvense* L.).

L. echinata Gilib. var. *triserialis* (Trautv.) Ksnz.

1. Курубаш 10/23 VI 1911 г. (Собр. В. С. опр. Н. Kusnezow).

Asperugo L.*A. procumbens* L.

1. Феод. лесничество. Уч. А₁. Скл. NE, гор. 19/20. Сорное одиночно; 11/24 V 1909 г. (Опр. В. С.); уч. А₂. Ниже гор. 18 между питомником и дорогой Венцицкого. Скл. NE. Сорное, группами. 18 IV (1 V) 1909 г. (Опр. В. С.), уч. Б₁. скл. N, гор. 3/4; сорное в 7-ми летнем насаждении а) 1/14 V 1907 г. и б) 4/17 V 1907 г. (П. Буш);
2. Сорное в городе около деревьев на улице 17/30 V 1911 г. (В. С.).
3. Вблизи дачи Суворина на берегу моря. 23 V (5 VI) 1909 г. (В. С.).

Anchusa L.*A. ochroleuca* MB.

1. Феод. лесничество. Уч. А₁. скл. NNE, в питомнике. Сорное. 12/25 VI 1905 г. (П. Буш).

A. italica Retz.

1. Вблизи часовни св. Ильи. Скл. S. а) 3/16 VI 1909 г. б) 16/29 VI 1909 г. (В. С.).
2. Феод. леснич. Уч. Б₁. гор. 1/2; Скл. E. На целине один экземпляр 16/29 V 1909 г. (Опр. В. С.).
3. Городской «Кизильник» 3/16 VI 1911 г. и 31 V (13 VI) 1911 г. (В. С.).
4. Между Феодосией и Коктебелем 31 V (13 VI) 1911 г. (В. С.).
5. Курубаш. 10/23 VI 1911 г. (В. С.).

Проверил
проф.
Н. И.
Кузнецов.

A. thessala Boiss et Spr.

1. Курубаш. 10/23 VI 1911 г. (Собр. В. С. Опр. проф. Кузнецов)

A. stylosa MB. var. *major* DC.

1. Феод. леснич. Уч. Б₁. Скл. N, На целине один экземпляр 29 IV (12 V) 1909 г. (Собр. Як. Никитась. Опр. проф. Кузнецов).

A. leptophylla R. et Sch.

1. Городской «Кизильник» 31 V (13 VI) 1909 г. (Собр. В. С. Опр. проф. Н. И. Кузнецов).
2. Курубаш. (Между св. склоном Тете-оба и Лысой Горой холмистая возвышенность) 10/23 VI 1911 г. (Собр. В. С. Опр. проф. Н. И. Кузнецов).

A. officinalis L.

1. Феод. лесн. Уч. А₂. Скл. NE, гор. 19/20; сорное в однолетнем насаждении. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₁. Скл. S, гор. 24/25; сорное в 3-х летнем насаждении; 3/16 VI 1907 г. (Н. Буш). Уч. Б₁. скл. NE, гор. 4/5; на целине рассеянно 3/16 V 1909 г. (Опр. В. С.).

Lycopsis L.*L. arvensis* L.

1. Феод. леснич. Уч. А₂. Скл. N, гор. 25/26; 6/19 V 1907 г. на целине. (Н. Буш); уч. Б₁. а) Скл. N, гор. 3/4. Сорное в семилетнем насаждении 16/29 IV 1907 г. (Н. Буш). б) Скл. N, гор. 6/7; на целине один экземпляр, 15/28 IV 1909 г. (Опр. В. С.).

L. arvensis L. var. *flexuosa* Ksnz.

1. Феодосия. Сорное вблизи дачи Суворина на берегу моря. 23 V (5 VI) 1909 г. (Собр. В. С. Опр. проф. Н. И. Кузнецов).

Nonnea Moench.*N. pulla* DC. (*Lycopsis pulla* L.).

1. Феод. леснич. Уч. А₁. а) Скл. NNE, гор. 19/20; сорное рассеянно; 7/20 IV 1909 г. (Опр. В. С.); б) Скл. N, гор. 20/21; на целине 23 IV (6 V) 1907 г. (Н. Буш); уч. А₂. Скл. NE, питомник 27 V (9 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₃. Скл. NE, Генуэзская гора, гор. 23/24; сорное в двухлетнем насаждении; 15/28 IV 1904 г. и 18/31 III 1906 г. (Вл. Сукачев); уч. А₁. Скл. SSE. 10/23 V 1905 г. (Н. Буш). Уч. Б₁. 2/15 V 1909 г. Очень много (В. С.);

- уч. Б₁. Скл. NE, выше гор. 1; 20 IV (3 V) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б₃ а) Скл. NE, гор. 9/10; 20 IV (3 V) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. N, гор. 15/16; 16/29 IV 1907 г. (Н. Буш); в) По дороге к хутору 20 IV (3 V) 1909 г. Много. (В. С.); уч. Б₁. Скл. NNE, выше часовни св. Анны Пророчицы 2/15 IV 1905 г. (Н. Буш).
2. Близ часовни св. Анны, не высоко на горах 16/29 IV 1909 г. (В. С.).
 3. Кизильник на горе Тете-оба, близ дачи Вержинского. Скл. N. 26 IV (9 V) 1909 г. (В. С.).
 4. Лысая гора (Паша-Тепэ). На вершине горы распаханное поле. Много. Сорное 6/19 IV 1909 г. (В. С.).

N. pulla DC. var. taurica (Ledeb.) O. Ktze.

1. Скл. S за часовней св. Ильи 5/18 VI 1911 г. (Собр. В. С.).
2. Вершина г. Тете-оба близ конденсатора 3/16 VI 1911 г. (Собр. В. С.).
3. Лесничество. По дороге к хутору. Много. 20 IV (3 V) 1909 г. (В. С.).
4. Лысая гора на вершине. Сорное 6/19 IV 1909 г. (В. С.).
5. Городской «Кизильник». 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
6. Близ часовни св. Анны. 16/29 IV 1909 г. не высоко на горах (В. С.). (Все эти экземпляры определены проф. Н. И. Кузнецовым).
7. На г. Тете-оба близ дачи Вержинского. Скл. N: а) 27 V (9 VI) 1912 г. (В. С.); б) там же 26 IV (9 V) 1909 г. (В. С.); в) там же 10/23 VI 1912 г. (В. С.).

Myosötis L.

M. sparsiflora Mikan.

1. Городской «Кизильник». В тени; 6/19 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

M. intermedia Link.

1. Городской «Кизильник»: а) Скл. W. 27 IV (10 V) 1906 г. (Н. Буш) часто; и б) Скл. N, часто 26 IV (9 VI) 1907 г. (Н. Буш).

Lithospermum L.

L. officinale L.

1. Феод. лесн. Уч. А₁. а) Скл. S, гор. 26/27, на целине часто; 4/17 V 1906 г. и 25 VII (7 VIII) 1906 г. (Н. Буш); б) Скл. E, гор. 26/27, на целине, не очень часто. 20 V (2 VI) 1907 г. (Н. Буш); уч. Б₂. Скл. NE, 18/31 V 1907 г. (Е. Буш).

2. Городской «Кизильник». Верхняя часть. Скл. NW, на целине единично. 16/29 V 1909 г. (Опр. В. С.).

L. purpureo-coeruleum L.

1. Феод. леснич. Уч. Б₃. Скл. E, гор. 16/17; 15/28 V 1906 г. (Е. Буш).
2. Городской «Кизильник»: а) Скл. N, в тени; 27 IV (10 V) 1906 г. (Е. Буш); б) Скл. NE, на целине, единично; 27 IV (10 V) 1908 г. (Е. Буш); в) Скл. NE, нижняя часть, рассеянно 30 IV (13 V) 1909 г. (Опр. В. С.); д) Влажная тенистая низина 6/19 V 1904 г. (Вл. Сукачев); е) 15/28 V 1909 г. (В. С.).

L. arulum L.

1. Феод. лесн. Уч. А₃. Скл. S, гор. 23/24; на целине мелкими группами, 17/30 IV 1909 г. (Опр. В. С.); уч. Б₁. Скл. NE, выше гор. 1; в трехлетнем насаждении, 20 IV (3 V) 1904 г. (Вл. Сукачев).

L. arvense L. (Сравнить с Lappula saxatilis (Pall.) Ksnz. var. viegata Ksnz.).

1. Скл. S, к морю за леснич. 26 IV (9 V) 1906 г. на целине, часто. (Н. Буш). Скл. S к морю ниже уч. А₂. 21 IV (4 V) 1905 г. (Е. Буш).
2. Феодос. леснич. Уч. А₁: а) Скл. NNW, в питомнике 27 IV (10 V) 1905 г. (Н. Буш); б) Скл. ENE, 10/23 V 1905 г. в насаждении (Н. Буш); в) Скл. NNW, гор. 28/29; 30 V (12 VI) 1905 г. (Е. Буш); д) Скл. N, сорное часто; на целине: 1) гор. 20/21; 29 V (11 VI) 1907 г.; 2) гор. 29/30; 24 IV (7 V) 1906 г.; 3) гор. 17/18; 29 V (11 IV) 1907 г. (Е. Буш). Участок А₂. а) Скл. NE, питомник. Сорное, единично 25 IV (8 V) 1909 г. (Опр. В. С.); б) Скл. N, в питомнике на целине часто 15/28 V 1906 г. (Н. Буш); в) Скл. NE, 12/25 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. А₁. Скл. ESE, 8/21 V 1905 г. (Е. Буш). Уч. А₃. Генуэзская гора, выше гор. 22-й. Сорное 24 IV (7 V) 1906 г. (Н. Буш). Уч. Б₁. а) Скл. N, на валу гор. 3; часто 27 IV (10 V) 1906 г. (Н. Буш); б) Скл. NE, на поляне метеорологической станции 16/29 IV 1907 г. и 9/22 V 1907 г. (Е. Буш). Уч. Б₂. Скл. N, 1/14 V 1907 г. (Е. Буш); уч. Б₃. Скл. NE, гор. 11/12; на целине, единично. 9/22 V 1909 г. (Опр. В. С.)
3. Городской «Кизильник» 20 IV (3 V) 1909 г. (В. С.).

Onosma L.

O. stellulatum W. K.

1. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. N, на валу гор. 10. 21 IV (4 V) 1906 г. (Н. Буш). Уч. А₃. Скл. S, гор. 22/23, на целине

- часто 6/19 V 1907 г. (Е. Буш). Леснич., часто; 2/15 V 1904 г. (Вл. Сукачев); перевал за уч. Б. Скл. SW, 27 IV (10 V) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б₁. а) Скл. NE, гор. 2/3; 27 IV (10 V) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. N, гор. 7/8, на целине единично; 9/22 V 1909 г. (Опр. В. С.); 20 IV (3 V) 1909 г. (В. С.); уч. Б₃ а) Скл. ENE, гор. 9/10; 30 IV (13 V) 1905 г. (Н. Буш); б) 23 IV (6 V) 1909 г. Много. (В. С.); в) 9/22 VII 1907 г. (В. С.).
2. Городской «Кизильник»: а) 31 V (13 VI) 1909 г.; б) 15/28 V 1909 г. (В. С.); в) Скл. E, в нижней части. На целине рассеянно 30 IV (13 V) 1909 г. (Опр. В. С.). д) Скл. N, часто; 4/17 V 1907 г. (Е. Буш).
 3. Кизильник на г. Тете-оба близ дачи Верхинского Скл. N; 26 IV (9 V) 1909 г. (В. С.).
 4. Гора св. Ильи; 5/18 VI 1911 г. (В. С.).
 5. Карантин 7/20 VI 1911 г. (В. С.). (Проверено проф. Н. И. Кузнецовым).

Cerinth L.*C. minor* L.

1. Феод. лесн. Участок А₃. а) Скл. SE, гор. 26/27; 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. W, на валу гор. 23, не часто; 20 V (2 VI) 1907 г. (Н. Буш); уч. Б. 9/22 VII 1907 г. (В. С.); уч. Б₂. Скл. NE, 8/21 V 1905 г. (Н. Буш); уч. Б₃. Скл. N, гор. 13/14; 15/28 V 1906 г. часто. (Н. Буш).
2. Городской «Кизильник»: а) Скл. N, в средней части, на целине единично; 17/30 V 1909 г. (Опр. В. С.); б) 18/31 VII 1907 г. Много. (В. С.). По дороге в «Кизильник» 18/31 VII 1907 г. Много. (В. С.).

Echium L.*E. altissimum* Jacq. (*E. italicum* Lehm., *E. pyramidatum* DC.).

1. На г. Тете-оба 31 V (13 VI) 1909 г. (В. С.).
1. Феод. лесничество. Уч. Б₂. Скл. NE, 16/29 IX 1905 г. (Н. Буш).

E. vulgare L.

1. За карантинном возле больницы, в балке. Скл. NE, 9/22 VIII 1903 г., единственный экземпляр. (Н. Прохоров).
2. Феод. лесн. Уч. А₁. а) Скл. ENE, в насаждении около питомника, 14/27 VI 1905 г. (Е. Буш); б) Скл. N, гор.

- 9/10; на целине не часто 19 V (VI) 1906 г. (Е. Буш); уч. А₂. а) 29 V (11 VI) 1907 г. в питомнике на целине (Е. Буш); б) Скл. NNE, ниже гор. 16; Сорное единично 25 V (7 VI) 1909 г. (Опр. В. С.); в) Скл. NE, питомник, не часто 27 V (9 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₃. Скл. NNE на дне канавы сор. 12, 2/15 VII 1905 г. (Е. Буш); уч. Б₁. а) Поляна у метеорологической станции часто, 6/19 VI 1903 г. (Н. Прохоров); б) 2/15 VII 1907 г. Очень много (В. С.); Уч. Б₂. Скл. N, гор. 11/12, единично, 15/28 V 1906 г. (Е. Буш).
3. Городской «Кизильник»: а) Скл. N, 14-27 VII 1906 г. (Н. Буш); б) 3/16 VI 1909 г. (В. С.).
 4. Кизильник на г. Тете-оба над немецкой колонией Герценберг 26 VII (8 VIII) 1909 г. (Очень маленький экземпляр). На вершине горы. (В. С.).
 5. Портовая территория. а) Сорное между амбарами 27 VII (9 VIII) 1909 г. (В. С.); б) Сорное близ метеорологической станции (молодой экземпляр) 13/26 V 1909 г. (В. С.).

E. rubrum Jacq.

1. Засоленный участок в имени Шницберга в Двужкорной Бухте; 6/19 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).

Rochelia Rehb.*R. dispersa* Wettst. *R. stellulata* Rehb.; *Lithospermum dispersum* L.; *Lithosp. retortum* Pall.; *Rochelia retorta* Lipsky

1. Балка за Феод. лесничеством, близ дороги 6/19 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Verbenaceae.

Verbena L.*V. officinalis* L.

1. Феод. леснич. Уч. А₃. Скл. NNW, гор. 25/26; 27 IX (10 X) 1905 г. (Н. Буш).

Labiatae.

Ajuga L.*A. chia* Schreb. (*Teucrium chia* Poiret).

1. Феод. леснич. Уч. А₃. а) Скл. NNW, на валу гор. 23; 19 IX (2 X) 1905 г.; б) Скл. NW, гор. 23/24; сорное в трехлетнем насаждении 6/19 V 1905 г. (Е. Буш); в) гор. 23/24; сорное в двухлетнем насаждении, часто;

- 2/15 VI 1904 г. (Вл. Сукачев); d) Скл. S, гор. 23/24, 17/30 IV 1909 г. на целине один экземпляр. (Опр. В. С.).
Уч. Б. 5/18 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Бз. Скл. NNE, гор. 11/12; 9/22 V 1909 г. Сорное один экземпляр. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник». Скл. N, 4/17 V 1907 г. часто (Н. Буш).
 3. Близ дачи Вержинского на г. Тете-оба. Скл. N. 27 V (9 VI) 1912 г. Между кустарниками. (В. С.).

A. chamaerifolius Schreb.

1. У виноградника в балке за уч. Б. Феод. лесничества 17/30 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
2. Дно оврага за уч. Б. Феод. леснич. Скл. NE. 3/16 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).

A. Laxmannii Benth. (Teucrium Laxmannii L.).

1. Феод. леснич. Уч. Б₁. Ниже гор. 5, у стенки по границе городского «Кизильника» 31 V (13 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Городской «Кизильник». 5/18 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
3. Склон N на г. Тете-оба близ дачи Вержинского. Кизильник 27 V (9 VI) 1912 г. (В. С.).

A. genevensis L.

1. Феод. леснич. Уч. А₂. Скл. E, гор. 22/23. Сорное в 3-х летнем насаждении (Е. Буш); уч. А₃ а) Скл. W, гор. 22/23; на Генуэзской горе. 18/31 III 1906 г. (Е. Буш); б) Скл. NNE, гор. 24/25; 7/20 IV 1905 г. (Е. Буш); уч. А₁. Скл. N, гор. 23/24; на целине. 3/16 IV 1906 г. (Е. Буш); уч. Б₁. Скл. NNW, гор. 1/2; 22 IV (5 V) 1905 г. (Е. Буш).
2. Городской «Кизильник» а) Скл. NW, 27 IV (10 V) 1908 г. На целине и б) Скл. N, 19 IV (2 V) 1907 г. (Е. Буш).

A. orientalis L.

1. Феод. лесн. Скл. S, 6/19 IV 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₁. Скл. E, гор. 21/22, на целине один экземпляр. 8/21 IV 1909 г. (Опр. В. С.); уч. Б. Выше дороги к хутору. 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Городской «Кизильник» 20 IV (3 V) 1909 г. (В. С.).
3. Скл. N горы Тете-оба за леснич., (за балкой). Кустарниковая степь. 20 IV (3 V) 1909 г. Много. (В. С.).

Teucrium L.**T. polium L.**

1. Гора Св. Ильи 27 VI (10 VII) 1907 г. Много. (В. С.).
2. Скл. S к морю за Феод. лесничеством. 25 VI (7 VII) 1907 г. на целине часто. (Е. Буш).

3. Феод. леснич. Уч. А₁. Скл. NE, гор. 9/10. Сорное, в трехлетнем насаждении; 21 VI (4 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₂. гор. 22/23, на целине, часто; 17/30 IX 1906 г. (Н. Буш); Уч. А₃. скл. NNW, гор. 23/24; сорное в трехлетнем насаждении; 2/15 VII 1905 г. (Н. Буш); уч. Б₁. а) Скл. NE, гор. 4/5, на целине единично 29 VI (12 VII) 1909 г. (Опр. В. С.). б) 2/15 VII 1907 г. Очень много; с) 6/19 VII 1907 г.; d) 9/22 VII 1907 г. (В. С.).
4. Кизильник на г. Тете-оба близ дачи Вержинского Скл. N, 21 VI (4 VII) 1909 г. и над немецкой колонией Герценберг 26 VII (8 VIII) 1909 г. (В. С.).

T. chamaedrys L.

1. Склоны к морю за Феод. леснич. а) Скл. SE, 12/25 VI 1904 г. (Вл. Сукачев) и б) Скл. ESE, 3/16 VI 1905 г. (Н. Буш).
2. Феод. леснич. Участок А₂. Скл. E, гор. 23/24, сорное, часто 24 IX (7 X) 1906 г. (Н. Буш); Уч. А₃: а) Скл. NW, гор. 23/24, часто 30 VI (13 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. W, гор. 23/24; на целине, часто 11/24 VI 1907 г. (Н. Буш); уч. А₁. скл. E, гор. 24/25, на целине, часто 9/22 VI 1906 г. (Н. Буш); уч. Б. а) 2/15 VII 1907 г.; б) 9/22 VII 1907 г. и с) 21 VII (3 VIII) 1908 г. (В. С.); уч. Б₁. а) Скл. NE, 6/19 VI 1903 г. Поляна у метеорологической станции (Н. Прохоров); б) Скл. NE, гор. 1/2; 15/28 IX 1905 г. (Н. Буш); уч. Б₂. Скл. N, 16/29 VI 1906 г. в густом насаждении, часто. (Н. Буш); уч. Б₃: а) Скл. NE, гор. 8, в густом насаждении, 7/20 VI 1903 г. (Н. Прохоров); б) Скл. N, гор. 9/10; на целине, 11/24 VI 1909 г. (Опр. В. С.). Городской «Кизильник», 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

Scutellaria L.**S. orientalis L.**

1. Скл. SE, к морю за Феод. лесничеством. 12/25 V 1904 г. часто (Вл. Сукачев).
2. Феод. леснич. 2/15 V 1904 г. часто. (Вл. Сукачев); уч. А₃: а) Скл. NE, гор. 25/26 часто; 2/15 VI 1904 г. и б) Скл. SE, гор. 26/27; 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

S. orientalis L. var. chamaedryfolia Rchb.

1. Феод. леснич. Участок А₂. а) Скл. NNW, на валу гор. 26-й 6/19 V 1905 г. и б) Скл. E, гор. 23/24 на целине часто; 20 V (2 VI) 1907 г. (Н. Буш); Уч. Б. 9/22 VII 1907 г. (В. С.) и склоны S к морю за часовой Св. Ильи 5/18 VI 1911 г. (В. С.). (Проверены

по гербарии Импер. Ботан. Сада. В. С.); уч. Б₃: а) Скл. N, гор. 9/10; часто, 2/15 V 1906 г. (Н. Буш) и б) Скл. ENE, гор. 11/12 на целине единично; 8/21 V 1909 г. (Опр. В. С.).

Marrubium L.

M. praecox Janka.

1. Феод. леснич. Уч. А, Скл. N, гор. 20/21; сорное в однолетнем насаждении 28 V (11 VI) 1907 г. (Н. Буш); уч. А₃. Генуэзская гора а) Скл. SE, сорное, в 2-х летнем насаждении 12/25 VI 1904 г. (Вл. Сукачев); Скл. S, гор. 12/23; на целине единично, 28 V (11 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).

M. peregrinum L.

1. Феод. леснич. Уч. Б, 2/15 VII 1907 г. (В. С.).
2. Городской «Кизильник» 11/24 VII 1908 г. (В. С.).
3. На берегу моря за станцией Сарыголь и у Керченского шоссе 10/23 VII 1907 г. (В. С.).

Sideritis L.

S. montana L.

1. Скл. к морю за Феод. лесничеством. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феод. леснич. Уч. А₃: а) Скл. SE. Генуэзская гора, гор. 23/24; 12/25 VI 1904 г. часто. Сорное в двухлетнем насаждении. (Вл. Сукачев); б) Скл. NW, гор. 24/25. Сорное в однолетнем насаждении, 2 15 VI 1904 г. (Вл. Сукачев); в) Скл. N на валу гор. 26; 9/22 V 1906 г. (Н. Буш); уч. А₄. Скл. N, гор. 23/24, сорное 26 V (8 VI) 1906 г. (Н. Буш); уч. Б, а) 21 VII (3 VIII) 1908 г. (В. С.); б) 9/22 VII 1907 г. (В. С.); уч. Б₃. Скл. ENE, гор. 11/12; сорное, единично. 19 V (1 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).

S. taurica MB.

1. Балка за Феод. леснич., скл. S к морю, 4/17 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Nepeta L.

N. ucrainica L.

1. Феод. леснич.; участок А₃. 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Glechoma L.

G. hederacea L.

1. Феод. леснич. Уч. А₃. скл. NNW, гор. 35/36; 26 III (8 IV) 1905 г. (Н. Буш); уч. Б₁. скл. N, гор. 3/4; 16 29 IV 1907 г. (Н. Буш).

Brunella L.

B. alba Pall.

1. Феод. леснич. Участок Б, Скл. NNW, на целине единично, гор. 5 6; 5/18 VI 1911 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник» 3 16 VI 1911 г. (В. С.);

Phlomis L.

Ph. pungens Willd. (Ph. herba-venti L.).

1. Скл. SE к морю за Феод. леснич. 12/25 VI 1904 г. Не часто. (Вл. Сукачев).
2. Феод. лесн. Уч. Б, скл. NE, гор. 1, 7/20 VI??
3. Городской «Кизильник» а) 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев) и б) 11/24 VII 1908 г. (В. С.).
4. Курубаш. 9/22 VI 1911 г. (В. С.).

Ph. tuberosa L.

1. Феод. леснич. Участок Б, Скл. NNE, гор. 3/4; на целине единично; 24 V (6 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник». Скл. N, 9/22 VI 1907 г. (Н. Буш).

Lamium L.

L. amplexicaule L.

1. Феод. леснич. Уч. А₁. а) Скл. NE, гор. 22/23; сорное, 29 V (11 VI) 1907 г. (Н. Буш); б) Скл. ESE, питомник, 27 III (9 IV) 1909 г. Сорное, мелкими группами. (Опр. В. С.); уч. Б₂ а) Скл. NNW, между питомником и гор. 18. Сорное единично 18 V (1 VI) 1909 г.; б) Скл. N, гор. 10/21, сорное часто. 8 21 IV 1906 г. (Н. Буш); в) Скл. N, гор. 20/21, сорное, часто 23 IV (6 V) 1907 г. (Н. Буш); д) 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₃ а) Скл. NE, Генуэзская гора, гор. 23/24. Сорное в 2-х летнем насаждении. 15/28 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. NNE, гор. 25/26; 4/17 IV 1905 г. (Н. Буш); в) Скл. NNW, гор. 35/36; 7/20 IV 1905 г. (Н. Буш); уч. А₁ а) Скл. S, гор. 25/26; 9/22 IV 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б₁.

а) Высший пункт. Сорное, часто 27 III (9 IV) 1906 г. (Н. Буш); б) Скл. N, гор. 3/4; сорное, часто. 1906 г. (Н. Буш); в) Скл. NE, гор. 1/5, густо. 10/23 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б₂. Сорное между посадками 20 IV (3 V) 1909 г. Очень много. (В.-С.) уч. Б₃. а) Скл. N, гор. 13/14, часто. 14/27 III 1906 г.; там же гор. 15/16, часто 26 III (8 IV) 1907 г. (Н. Буш).

1. Близ часовни Св. Анны 16/29 1909 г. (В. С.).
3. По дороге к часовне Св. Ильи 19 IV (2 V) 1909 г. (В. С.).
4. «Кизильник» на г. Тете-оба близ дачи Вержинского. Скл. N. 26 IV (9 V) 1909 г. (В. С.).

L. maculatum L.

2. Феод. леснич. Уч. А₁. а) Скл. S, гор. 25/26. Сорное в однолетнем насаждении. 20 V (2 VI) 1907 г. (Н. Буш).

Ballota L.

B. nigra L.

1. Феод. лесничество. Уч. А₂. а) Скл. E, питомник. Сорное. 17/30 VI 1907 г. и б) Там же 9/22 VI 1906 г. (Е. Буш).
2. Городской «Кизильник»: а) Скл. W, 15/28 VII 1907 г. часто. (Е. Буш) и б) 11/24 VII 1908 г. (В. С.).

Stachys L.

S. germanica L.

1. Феод. лесничество. Уч. А₃. а) Скл. N, гор. 26/27 на целине 3/16 1907 г. (Н. Буш); уч. Б. Скл. N, в густом насаждении часто. 16/29 VI-1906 г. (Е. Буш); Б₁. Скл. N, на целине на хуторе, один экземпляр; 5/18 VI 1909 г. (Опр. В. С.) Уч. Б₃. Скл. NE, 17/30 VI 1905 г. Ниже дороги от скотопргона к хутору (Е. Буш).
2. На гребне г. Тете-оба близ высшего пункта (у стенки за лесничеством), 5/18 VIII 1909 г. (В. С.).

S. lanata Jacq. (*S. cretica* Sibth et Sm.). (Nota critica N. Popoff 1915 г. Герб. Им. Бот. Сада).

1. Феод. лесничество. Уч. Б₂. Скл. NE, по дороге от скотопргона к хутору, часто. 21 VI (4 VII). (Вл. Сукачев).
2. Городской «Кизильник»: а) 11/24 VII 1908 г. (у дороги) (В. С.); б) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
3. Курубаш. 9/22 VI 1911 г. (В. С.).

S. recta L.

1. Скл. к морю за лесничеством. 24 V (6 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феод. леснич. уч. А. Около дороги Вещицкого. Сорное. 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Участок Б. 9/22 VII 1907 г. (В. С.).
3. Городской «Кизильник». Скл. N, на целине, единично. 16/29 V 1909 г. (В нижней части «Кизильника»). (Опр. В. С.).
4. На г. Тете-оба близ дачи Вержинского. Склон N. Кизильник 10/23 VI 1912 г. (В. С.). Там же 17/30 VI 1912 г. (В. С.).

S. annua L.

1. Феод. леснич. Уч. А₂. а) Скл. E, гор. 23/24. Сорное. 25 VII (7 VIII) 1906 г. (Е. Буш); уч. Б₁. Скл. S. 4/17 X 1906 г. (Н. Буш).

Salvia L.

S. scabiosaefolia Lam. (*S. pinnifolia* Pall.; *S. taurica* Habl.; *S. Hablitziana* Willd.).

1. Скл. E в имени Шпидберга в двукорной Бухте. 13/26 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
2. Феод. леснич. Уч. А₂. Скл. NE около сада Сурина. Часто 24 V (6 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев), в гербарии сохранилась только этикетка; растения не было; уч. Б₁. Скл. ESE, на высшем пункте 17/30 V 1909 г. На целине один экземпляр. (Опр. В. С.). (Проверено по гербариям Ботан. Сада, Собрано между Феодосией и часовней св. Ильи. 9 V 1905 г. Н. Буш).

S. aethiopsis L.

1. Сорное около г. Феодосии. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Гора св. Ильи. У канавы военного кладбища. 16/29 VI 1909 г. (В. С.).
3. Дорога в имение Шпидберга за Феод. леснич. в Двукорной Бухте. 6/19 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
4. Феод. леснич. Уч. А₂. Скл. E, гор. 23/24; на целине часто 9/22 VI 1906 г. (Н. Буш); уч. Б. 9/22 VII 1907 г. (В. С.); уч. Б₁. Скл. N, гор. 3/4; 4/17 VI 1907 г. (Н. Буш); уч. Б₂. Скл. NNE, гор. 10/11 Сорное, единично; 25 V (7 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).
5. Виноградник Мустафы. 6/19 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
6. Городской «Кизильник»: а) 11/24 VII 1908 г.; б) 15/28 V 1909 г.; в) 31 V (13 VI) 1909 г.; д) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

7. На вершине г. Тете-оба́ близ конденсатора 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
8. Курубаш. 9/22 VI 1911 г. (В. С.).

S. pratensis L.

1. Феод. лесничество. Участок Б₂. Скл. NE, гор. 8/9; часто сорное в пасадках 1901 года. 6/19 VI 1903 г. (Н. Прохоров).

S. pratensis L. var. dumetorum (Andrz.); S. virgata Act. сравнить с S. nemorosa L.

1. Скл. S к морю за Феод. лесничеством. На целине, часто: а) 29 VII (12 VIII) 1906 г. и б) 12/25 VI 1906 г. (Н. Буш).
2. Феод. лесничество. Уч. А₁. Скл. N, гор. 20/21. Сорное в четырехлетнем насаждении 29 V (11 VI) 1907 г. (Н. Буш); уч. А₂. Скл. N, в питомнике на целине 27 V (9 VI) 1907 г. (Н. Буш); уч. А₁. Скл. S, гор. 24/25, на целине 9/22 VI 1906 г. (Н. Буш); уч. Ба. Скл. NE, гор. 8/9. На целине единично. 24 V (6 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).
3. Городской «Кизильник»: а) Скл. N; 15/28 VI 1906 г. (Е. Буш); б) Скл. NE, нижняя часть 22 IX (5 X) 1905 г. (Н. Буш); в) 11/24 VII 1908 г. (В. С.).

S. nemorosa L.—S. silvestris auct. Fl. Ross.).

1. Скл. к морю за Феод. леснич. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Скл. SE к морю за Феод. лесн. 12/25 VI 1904 г. (Вл. Сукачев).
3. За Карантиной слободкою около дачи Чураева Скл. EN. 24 V (6 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).
4. Феод. лесн. Уч. Б₁. 3/16 VI 1909 г. (В. С.).
5. Городской «Кизильник»: а) 3/16 VI 1909 г. и б) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
6. Гора св. Ильи 5 18 VI 1911 г. (В. С.).
7. Курубаш. 9/22 VI 1911 г. (В. С.).

S. nutans L.

1. Феод. леснич. Уч. А₁. а) Скл. EN, гор. 15/16 часто, 19 V (1 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. N, гор. 22/23. Сорное часто. 20 V (2 VI) 1907 г. (Е. Буш); уч. Б₂. а) Скл. NNE, гор. 10/11. На целине, единично, 9/22 V 1909 г. (Опр. В. С.); б) Скл. NE, гор. 11, часто. 21 V (3 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Городской «Кизильник»: а) Скл. N, 14/27 V 1907 г. часто. (Е. Буш); б) 18/31 VII 1908 г. Много; в) 15/28 V 1909 г.; д) 31 V (13 VI) 1909 г.; е) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

Satureja L.**S. clinopodium Caruel. (Clinopodium vulgare L.—Calamintha Clinopodium Spenngr.).**

1. Феод. лесничество. Уч. Б₂. Скл. NE, 16/29 IX 1905 г. (Н. Буш). Уч. Б₂, выше гор. 8; Скл. NNE, на целине, единично. 5/18 VI 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник» 11/24 VII 1908 г. (В. С.).

S. acinos Scheele. (Thymus acinos L.; Calamintha acinos Clairv.; Cal. alpina Beketow non Benth.).

1. Феод. лесничество. Участок Б. а) 5/18 V 1904 г. (Вл. Сукачев); б) 9/22 VII 1907 г. (В. С.); уч. Б₁, Высший пункт. Скл. ENE, сорное, рассеяно 17/30 V 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник» 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
3. Окрестности г. Феодосия. Сорное 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

S. rotundifolia Briq. (Thymus graveolens MB.; Calamintha graveolens Benth.).

1. Феод. леснич. Уч. А₂. а) Скл. N, гор. 24/25; не часто. 2/15 VI 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Окраины полей. Близ лагеря. 16/29 V 1912 г. (В. С.).

Thymus L.**Th. hirsutus MB.**

1. г. Тете-оба́. а) 23 VIII (5 IX) 1903 г. (Н. Прохоров).
2. Феод. леснич. Уч. А₁. а) Скл. N, гор. 17/18, часто. 12/25 VI 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. NE, гор. 24/25; 3/16 VI 1903 г. (Н. Прохоров); уч. А₂: а) Скл. SE, гор. 26/27; 9/22 V 1904 г.; б) Скл. NW, гор. 24/25; часто. 2/15 VI 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б. 9/22 VII 1907 г. (Собр. В. С. опр. В. А. Дубянский).
3. Скл. к морю за часовой св. Ильи 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Гора св. Ильи близ часовни 5/18 VI 1911 г. (Собр. В. С. опр. В. Дубянский).
4. Городской «Кизильник»: а) 11/24 VII 1908 г.; б) 15/28 V 1909 г.; в) 31 V (13 VI) 1909 г.; д) 3/16 VI 1909 г.; е) 10/23 V 1904 г. (Собр. Сукачев); ф) 3/16 VI 1911 г. (Собр. В. С. опр. Вл. А. Дубянский).

Th. Callieri Borb.

1. Феод. лесничество. Участок А₁. Скл. N, гор. 28/29; на целине; 9/22 V 1906 г. (опр. Дубянский); уч. А₂

- Скл. Е, гор. 21/22 на целине единично, 12/25 V 1909 г. (Опр. Дубянский; уч. Б. 9/22 VII 1907 г. (Собр. В. С. Опр. Дубянский); уч. А, а) Скл. SSE, 10/23 V 1905 г. п б) Скл. N, гор. 25/26, на целине часто 20 V (2 VI) 1907 г. (Н. Буш); уч. Б, а) Скл. N, гор. 26/27; 18/31 V 1907 г. п б) Скл. N, гор. 27/28; 10/23 V 1906 г. (Н. Буш). На вершине горы Тете-оба за лесничеством а) 23 IV (6 V) 1909 г. п б) 3/16 VI 1911 г. (Собр. В. С. Опр. Дубянский).
2. Городской «Кизильник»: а) 11/24 VII 1908 г. и б) 3/16 VI 1911 г. (Собр. В. С. Опр. Вл. Дубянский).
 3. Кизильник на горе Тете-оба близ дачи Верхинского. Скл. N, 21 VI (4 VII) 1909 г. (Собр. В. С. Опр. Вл. Дубянский).
 4. Православное кладбище 9/22 VI 1909 г. (Собр. В. С. Опр. Дубянский).
 5. Гора св. Ильи близ часовни 5/18 VI 1911 г. (Опр. Дубянский).
 6. Курубашь. 9/22 VI 1911 г. (Опр. Дубянский).

Thymus Callieri Borb. × Thymus humillimus Celak.

1. Городской «Кизильник». 31 V (13 VI) 1909 г. (Собр. В. Н. С. Опр. Вл. Дубянский).

Thymus Callieri Borb. × Thymus hirsutus MB.

1. Феодосийское лесничество. Участок Б, 9/22 VII 1907 г. (Собр. В. С. Опр. Вл. Дубянский).

В гербарии лесничества находится два экземпляра *Thymus*, опред. как *Thymus serpyllum* L. и *Th. serpyllum* L. var. *odoratissimus* MB. У Дубянского для Крыма эти виды не указаны.

Solanaceae.

Lycium L.

L. barbarum L.

1. Феодосия. Близ города 8/21 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. По дороге в Кизильник 11/24 VII 1908 г. (В. С.).
3. Православное кладбище. 9/22 1909 г. (В. С.).
4. У стезь Генуэзских развалин близ Карантина. Много. VI 1911 г. (В. С.).

Hyoscyamus L.

H. niger L.

1. Феод. лесничество. Участок А, ниже гор. 16. Сорное 29 IV (12 V) 1907 г. (Е. Буш); уч. А, Скл. NE, гор. 18.

- Сорное в однолетнем насаждении, часто 19 V (1 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. Е, гор. 19/20. Сорное, единично; 2/15 V 1909 г. (Опр. В. С.); уч. Б, а) Скл. NE, гор. 9; часто 21 V (3 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Вершина на г. Тете-оба за лесничеством. Сорное близ виноградника. 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
 3. Портовая территория. Сорное в саду. 8/21 VI 1909 г. (В. С.).

Solanum L.

S. nigrum L.

1. Феод. лесн. Уч. А, Скл. N, в питомнике, сорное часто. 19 VIII (1 IX) 1906 г. (Н. Буш); уч. Б, а) Скл. N, гор. 1/2, сорное 4/17 X 1906 г. и б) 29 VIII (11 IX) 1906 г. Там же. (Н. Буш).
2. Приморские грубые пески у дер. «Камыши». 13/26 VIII 1903 г. (Н. Буш).
3. Портовая территория. Сорное в саду: а) 18/31 VIII 1909 г.; б) 20 VI (3 VII) 1909 г.; в) 19 VIII (1 IX) 1909 г.; д) 12/25 VIII 1908 г. Плоды красные. (В. С.).

Datura L.

D. stramonium L.

1. Феод. леснич. Скл. S в балке за уч. Б. около виноградника 17/30 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).

Scrophulariaceae.

Verbascum L.

V. phlomoides L.

1. Феод. леснич. Участок А, Скл. SE, гор. 25; не часто 22 VII (4 VIII) 1904 г. (Вл. Сукачев).

V. ovalifolium Don. V. (compactum MB.).

1. Феод. леснич. Уч. 2, в питомнике, сорное. 11/24 VI 1907 г. (Е. Буш).
2. Городской «Кизильник». Скл. N. 15/28 VI 1906 г. (Н. Буш).

V. pyramidatum MB.

1. Городской «Кизильник» Скл. E, редко. 19 VI (2 VII) 1907 г. (Е. Буш).

V. pinnatifidum Vahl.

1. Портовая территория. Сорное близ метеорологической станции. 24 VI (7 VII) 1909 г. (В. С.).

Linaria Juss.**L. vulgaris Mill.; Antirrhinum Linaria L.**

1. Феод. леснич. Уч. А₁. Скл. Е, гор. 24/25; 17/30 IX 1906 г. (Н. Буш).

L. macroura MB.

1. Феод. леснич. Уч. А₂: а) Скл. N, в питомнике, сорное единично 11/24 VI 1907 г. (Е. Буш); б) Скл. NE, около дома в питомнике. 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₁, скл. SE, 20 VII (2 VIII) 1905 г. (Е. Буш); уч. Б, 6/19 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б₂, скл. E, в верхней части. На целине, рассеянно. 28 IV (11 V) 1909 г. (Опр. В. С.). Уч. Б₂, Скл. N, на валу гор. 17, единично. 9/22 V 1907 г. (Е. Буш).

L. genistaefolia Mill. (L. italica auct.; L. petraea Stev.; L. Steveni Nym.; Antirrhinum genistifolium L.).

1. Скл. SE, на берегу моря, не часто 12/25 VI 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феод. леснич. Уч. А₁. Скл. N, гор. 24/25; на целине, единично. 11/24 VI 1907 г. (Е. Буш); уч. А₂. Скл. E, гор. 20/21; на целине часто; 9/22 VI 1906 г. (Е. Буш); уч. А₂, скл. N, гор. 23/24; на целине: а) 25 VII (7 VIII) 1906 г. и б) Там же, 26 IX (9 X) 1906 г. (Е. Буш); в) Скл. NNW, гор. 25/26; 19 IX (2 X) 1905 г. (Е. Буш); д) Скл. SE, Генуэзская гора, гор. 26, не часто. 30 V (12 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); е) Скл. S, Генуэзская гора, гор. 22/23 на целине, единично 15/28 VI 1909 г. (Опр. В. С.) уч. Б. 9/22 VII 1907 г. (В. С.).
3. Городской «Кизильник»: а) 11/24 VII 1908 г. и б) 18/31 VII 1907 г. (В. С.).

Veronica L.**V. spuria L.**

1. Феод. леснич. уч. Б₁. Скл. ENE, гор. 3/4, на целине один экземпляр 23 VI (6 VII) 1909 г. (Опр. В. С.); уч. Б₂, скл. N, 16/29 VI 1906 г. в густом насаждении (Н. Буш); уч. Б₂, скл. NNE, гор. 8/9; 16/29 IX 1905 г. (Е. Буш).

V. polita Fries.

1. Феод. леснич. Уч. А₂. Скл. NNE, гор. 24/25; 10/23 IV 1905 г. (Н. Буш) уч. Б₁, гор. 4/5. Сорное в 7-ми летн. насаждении 10/23 IV 1907 г. (Н. Буш); уч. Б₂: а) Скл. NE, между хутором и гор. 8; на целине единично 29 III (11 IV) 1909 г. (Опр. В. С.); б) Скл. N, гор. 16/17; 26 III (8 IV) 1907 г. (Н. Буш).
2. Окр. г. Феодосии. Дача Домбровской. Много. Сорное. 13/26 IV 1909 г. (В. С.).

V. Tournefortii Gmel.

1. Феод. леснич. Уч. А₂. Питомник, часто, 26 VI (9 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев).

V. cymbalaria Bodard.

1. Феод. леснич. Уч. Б. Скл. N, на полянке около метеорологической станции, 2/15 IV 1909 г. единично. (Опр. В. С.) уч. Б₁, Скл. ENF, гор. 3/4; 22 IV (5 V) 1905 г. (Н. Буш).

V. hederifolia L.

1. Феод. леснич. Уч. Б₂. Скл. ENE, сорное, рассеянно. 20 III (2 IV) 1909 г. (Опр. В. С.).

V. teucrium L.

1. Феод. лесн. Уч. А₁, Скл. SSE, 20 V (2 VI) 1905 г. (Н. Буш).

V. austriaca L.

1. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. NE, гор. 18/19; 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев) уч. А₂. Скл. NE, выше питомника. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев) уч. Б₂. Скл. NE, 19 V (1 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б₂. Скл. NE, гор. 8/9, на целине единично; 5/18 V 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник»: а) Скл. N; 27 IV (10 V) 1906 г. (Н. Буш); б) 15/28 V 1909 г. Много; в) 12/25 V 1909 г.; д) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

V. orientalis Mill.

1. Склоны к морю ниже уч. А₄. Скл. SSE; 15/28 V 1905 г. и скл. ESE, 21 IV (4 V) 1905 г. (Е. Буш).
2. Феод. леснич. Уч. А₂: а) Скл. NW, гор. 23/24; сорное в трехлетнем насаждении, 1/14 V 1905 г. (Е. Буш); б) Скл. N, гор. 24/25. На целине, 3/16 IV 1906 г. (Е. Буш); в) Скл. S, гор. 23/24, на целине, один экземпляр; 17/30 IV 1909 г. (Опр. В. С.); д) Скл. NE, гор. 26/27; 30 IV (13 V) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₂, скл. NE, около

- дома стражника 11/24 V 1904 г. и е) Скл. NE, 27 IV (10 V) 1905 г. (Вл. Сукачев); уч. А₁; Скл. N, гор. 19/20 не часто, 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. N, гор. 22/23; сорное в однолетнем насаждении, 29 IV (12 V) 1907 г. (Н. Буш); уч. Б₁; Скл. NE, гор. 2/3; сорное в четырехлетнем насаждении, 27 IV (10 V) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б₁; Скл. N: а) на валу гор. 26; 26 IV (9 V) 1907 г. и б) гор. 26/27; 5/18 IV 1906 г. (Н. Буш) уч. Б₂; 20 IV (3 V) 1909 г. Очень много. (В. С.)
3. В окрестностях г. Феодосии. Не высоко на горах. Много. 19 IV (2 V) 1909 г. (В. С.)

Melampyrum L.

M. arvense L.

1. Кизильник на г. Тете-оба близ дачи Вержинского. Скл. N, очень много. 21 VI (4 VII) 1909 г. (В. С.)

Orphantha Kern.

O. lutea Kern. (Euphrasia lutea L.; Odontites lutea Rehb.)

1. Феод. леснич. Уч. А₂; Скл. NE, гор. 262/7 не часто; 25 VIII (7 IX) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б₁; Скл. NE, гор. 1/2, 15/28 IX 1905 г. (Н. Буш)

Odontites Pers.

O. serotina Rehb. (Euphrasia odontites L.; Odontites rubra Pers.;

O. littoralis Fr.)

1. Феод. лесн. Уч. Б₁; скл. NNE, гор. 3/4; 15/28 IX 1905 г. (Н. Буш); уч. Б₂; скл. NE, 16/29 IX 1905 г. (Н. Буш)

Orobanchaceae.

Orobanche L.

O. major L.

1. Скл. SSE к морю ниже уч. А₁; 20 V (2 VI) 1905 г. (Собр. Дм. Моризнов).
2. Гора св. Ильи 30 V (12 VI) 1910 г. (В. С.)
3. Склоны за часовней св. Ильи. 31 V (13 VI) 1912 г. (В. С.)

Plantaginaceae.

Plantago L.

P. tenuiflora Kit.

1. Феод. лесн. Уч. А. Солончак около дороги Вещицкого 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев)

P. media L.

1. Феод. леснич. Уч. А₁; а) Скл. NE, гор. 11/12, около дороги Вещицкого. 12/25 V 1904 г. часто. (Вл. Сукачев); б) Скл. N, гор. 22/23; сорное часто; 20 V (2 VI) 1907 г. (Е. Буш); в) Скл. WNW, гор. 16/17, на целине единично; 12/25 V 1905 г. (Опр. В. С.); уч. А₁; Скл. SE, гор. 26/27, часто. 19 V (1 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б. а) 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев) и б) 9/22 VII 1907 г. (В. С.); уч. Б₂; Скл. NE, гор. 8; в густом насаждении, часто. 7/20 VI 1903 г. (Н. Прохоров). За лесничеством на вершине г. Тете-оба. 3/16 VI 1911 г. (В. С.)
2. Городской «Кизильник»: а) Скл. N, 14/27 V 1907 г. часто. (Е. Буш); б) 3/16 VI 1909 г. (В. С.)
3. Карантское кладбище. 9/22 VII 1909 г. (В. С.)

P. lanceolata L.

1. Болотистая солонцеватая балка в имени Шпицберга в Двукорной Бухте. 6/19 VIII 1903 г. (Н. Прохоров)
2. Балка за Феод. леснич. на вершине г. Тете-оба; Скл. SW 4/17 V 1908 г. (Вл. Сукачев)
3. Портовая территория: а) Сорное в порту 13/26 V 1909 г.; б) Сорное в саду 23 V (5 VI) 1909 г. (В. С.)
4. Карантин. На берегу моря. 7/20 VI 1911 г. (В. С.)

P. ramosa Achers. (P. arenaria W. et K.)

1. Скл. S. г. Тете-оба. 6/19 VIII 1903 г. (Н. Прохоров)
2. Портовая территория. Сорное между амбарами 24 VI (7 VII) 1909 г. и 13/26 VII 1909 г. (В. С.)

Rubiaceae.

Scherardia L.

Sch. arvensis L.

1. Склон к морю за Феод. лесничеством. 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев)

Asperula L.**A. cynanchica L.**

1. Феод. леснич. Уч. А₁, скл. N, гор. 20/21; на целине единично; 3/16 VI 1907 г. (Е. Буш); уч. А₂; а) Скл. E, гор. 21/22 на целине часто 25 VII (7 VIII) 1906 г. (Е. Буш); б) Скл. SSW; 16/29 IX 1905 г. (Е. Буш); в) Скл. E, гор. 22/23, на целине рассеянно 30 V (12 VI) 1909 г. (Опр. В. С.); уч. А₂, скл. N, гор. 23/24 на целине 17/30 IX 1906 г. (Е. Буш); уч. А₁, скл. ESE; 1/14 VI 1905 г. (Е. Буш); уч. Б₁; а) Поляна у метеорологической станции, единично 6/19 VI 1903 г. (Н. Прохоров); б) Скл. NE, высший пункт около флюгера; 15/28 IX 1905 г. (Е. Буш).
2. Городской «Кизильник» (нижняя часть): а) Скл. NE, 22 IX (5 X) 1905 г. (Е. Буш); б) 18/31 VII 1907 г. и в) 11/24 VII 1908 г. (В. С.).
3. У подножья Лысой горы 28 VII (10 VIII) 1907 г. (В. С.).

A. cynanchica L. B. supina MB. (A. cretacea Schlecht.)

1. За лесничеством на вершине г. Тете-оба; у конденсатора. 5/18 VIII 1908 г. (В. С.).

A. glauca Bess. (A. galioides MB.; Galium glaucum L.)

1. Склоны S к морю за часовней св. Ильи: а) 5/18 VI 1911 г. и б) 16/29 VI 1909 г. склоны к морю ниже уч. А₁: а) Скл. E, 20 V (2 VI) 1905 г. и б) Скл. SE, 1/14 VI 1905 г. (Н. Буш).
2. Феод. леснич. Уч. А₁, Скл. N, гор. 21/22, на целине часто. 29 V (11 VI) 1907 г. и 3/16 VI 1907 г. Сорное. (Е. Буш); уч. Б₁, Скл. NE по дороге от скотопргона к хутору. 30 V (12 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б₂: а) Скл. NE, гор. 13/14; на целине единично, 12/25 VI 1909 г. (Опр. В. С.); б) Скл. NNE, гор. 9/10; на целине единично. 30 V (12 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).
3. Городской «Кизильник» 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
4. Православное кладбище; 9/22 VI 1909 г. (В. С.).

A. humifusa MB.

1. Склон к морю за часовней св. Ильи 16/29 VI 1909 г. (В. С.). Скл. SE над берегом моря за лесничеством 12/25 VI 1904 г. Изредка. (Вл. Сукачев).
2. Феод. лесничество. Уч. А₁, скл. NE, гор. 21/22; на целине один экземпляр 28 V (10 VI) 1909 г. (Опр. В. С.); уч. А₂, скл. E, гор. 20/21. Сорное, часто. 17/30 VI

1907 г. (Е. Буш); уч. А₂; а) Скл. NNW, 20 IX (3 X) 1905 г. (Н. Буш); б) Скл. NW; гор. 23/24, на целине единично. 13/28 VI 1909 г. (Опр. В. С.) уч. Б, 9/22 VII 1907 г. (В. С.).

3. Городской «Кизильник»: а) 18/31 VII 1907 г. при дорогах. Много. (В. С.); б) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
4. Кизильник на г. Тете-оба над немецкой колонией Герленберг. Скл. N, 26 VII (8 VIII) 1909 г. (В. С.).
5. Окрестности г. Феодосии: а) Близ города на сорных местах. 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Сорное близ города 1909 г. (В. С.); в) Близ дачи Суворина у полотна железной дороги. Местами много. 5/18 VII 1908 г. (В. С.).
6. Портовая территория. Сорное в порту 12/25 VI 1908 г. (В. С.).

A. setulosa Boiss.

1. Скл. SE над берегом моря за Феод. лесничеством 12/25 VII 1904 г.; редко. (Вл. Сукачев).

Galium**G. mollugo L. (G. rubioides L. var. geniculatum Reem. et Sch.)**

1. Феодос. лесничество. Поляна у метеорологической станции 14/27 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
2. Городской «Кизильник»: Скл. N, 15/28 VII 1907 г. (Е. Буш).
3. На г. Тете-оба близ дачи Вержинского. Склон N. 10/23 VI 1912 г. (В. С.).

G. verum L.

1. Скл. S к морю за Феодос. леснич. 12/25 VI 1906 г. на целине. (Н. Буш); Скл. NE балки за уч. Б Феод. леснич. Около кампеломни 17/30 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
2. Феод. леснич. Уч. Б₁, Скл. N, гор. 4/5; 10/23 VI 1906 г. (Н. Буш).

G. spurium L. (G. aragone L.)

1. Феод. леснич. Уч. А₁, а) Скл. NNE, в насаждении около питомника. 15/28 V 1905 г. (Е. Буш); б) Скл. N, гор. 22/23, на целине 23 IV (6 V) 1907 г. (Е. Буш); уч. А₂, Скл. N, гор. 23/24 26 V (8 IV) 1905 г. (Е. Буш); уч. Б₁, Скл. N, гор. 2/3; 14/27 V 1907 г. (Е. Буш); уч. Б₂, Скл. N, гор. 9/10 Сорное, часто. 17/30 IV 1906 г. (Е. Буш).
2. Городской «Кизильник»: а) Скл. N, в верхней части в тени, на целине, единично 30 IV (13 V) 1909 г. (Опр. В. С.); б) 6/19 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

G. tenuissimum MB.

1. Склоны S к морю за часовой св Ильи 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Скл. NE к морю за Феод. леснич. 24 V (6 VI) 1904 г. Редко. (Вл. Сукачев).

G. verticillatum Danth.

1. Склоны к морю за часовой св. Ильи 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

G. coronatum Sibth et Sm.

1. Скл. ESE к морю ниже уч. А₁. Феод. лесн. 9/22 IV 1905 г. (Н. Буш).
2. Феод. лесн. уч. А₃. Скл. N, Генуэзская гора, гор. 23/24. Сорное в 2-х летнем насаждении. 9/22 VIII 1903 г. (Н. Прохоров) уч. Б₂: а) 2/15 V 1909 г. Много. (В. С.); б) 9/22 VII 1907 г. (В. С.).
3. Кизильник на г. Тете-оба над немецкой колонией Герценберг 26 VII (8 VIII) 1909 г. (В. С.).
4. Окрестности г. Феодосии: а) Везде на горах много 31 V (13 VI) 1909 г. (В. С.); б) Близ часовни св. Анны 16/29 IV 1909 г. (В. С.).

G. cruciata Scop.

1. Феод. леснич. Уч. А₁. Скл. N, гор. 22/23, на целине часто, 29 IV (12 V) 1907 г. (Е. Буш); уч. А₂. Скл. NNE, по дороге Вещицкого 21 IV (4 V) 1905 г. (Е. Буш); уч. Б₃. Скл. E, гор. 17/18; 5/18 IV 1906 г. часто. (Е. Буш).

G. vernum Scop. var. cruciata Scop.

1. Феод. леснич. Уч. А. Склон Генуэзской горы 2/15 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₁. Скл. N, гор. 20/21, часто 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₂. Скл. NE, питомник, часто; 27 V (9 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₃. Скл. ESE, гор. 23/24; на целине, единично 17/30 IV 1909 г. (Опр. В. С. по гербарию лесничества); уч. Б₁. Скл. NW, гор. 2/3 на целине, часто 27 IV (10 V) 1908 г. (Е. Буш); уч. Б₂. Скл. NE, гор. 9/10; 18/31 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

G. pedemontanum All.

1. Вершина г. Тете-оба. Склон N, над немецкой колонией Герценберг. Между кустарниками местами много 27 V (9 VI) 1912 г. (В. С.) (Растение очень маленькое, несколько см.; стебель очень тонкий).

Caprifoliaceae.**Lonicera L.****L. tatàrica L.**

1. Феод. лесничество. Уч. Б₁. Близ тропинки к конденсатору. 2/15 V 1909 г. Одичало старые посадки. (В. С.).

Valerianaceae.**Valerianella Moench.****V. locuata Betcke. (V. olitoria (W.) Moench).**

1. Вершина горы Тете-оба. Склон N. Над немецкой колонией Герценберг 27 V (9 VII) 1912 г. (Собр. В. С. опр. В. Липский).

V. costata Krok.

1. Феодос. лесн. Уч. Б₁. Скл. ENE, гор. 3/4; 22 IV (5 V) 1905 г. (Собр. Я. Никитась, опр. В. Липский).

V. Morisonii Koch. (V. dentata Pall.).

1. Феод. лесн. Уч. Б₁. Скл. NE, гор. 3/4; 10/23 V 1904 г. единично. (Вл. Сукачев).

V. Morisonii (var.) lasiocarpa Boiss.

1. Вершина горы Тете-оба. Склон N. Над немецкой колонией Герценберг 27 V (9 VI) 1912 г. (Собр. В. С. опр. В. Липский).

V. eriocarpa Krok. var. muricata Krok. (V. truncata Betcke).

1. Феод. леснич. Уч. Б₂. Скл. N, гор. 13/14, не часто 27 IV (10 V) 1906 г. (Собр. Я. Никитась, Опр. В. Липский).
2. Городской «Кизильник» (в нижней части); Скл. SE, на целине рассеянно 30 IV (13 V) 1909 г. (Собр. Я. Никитась, Опр. Вл. Липский).

V. carinata Lois.

1. Городской «Кизильник»: а) Скл. N, 26 IV (9 V) 1907 г. (Собр. Я. Никитась, Опр. Вл. Липский).
2. Вершина г. Тете-оба. Склон N. Над немецкой колонией Герценберг 27 V (9 VI) 1912 г. (Собр. В. С. Опр. В. Липский).

V. turgida Betcke var. puberula.

1. Городской «Кизильник». Скл. N, в тени, часто 27 IV (10 V) 1906 г. (Собр. Я. Никитась, Опр. Вл. Липский).

V. lasiocarpa Fisch et Mey.

1. Феод. леснич. уч. А₁. Около дороги в питомник 29 IV (12 V) 1905 г. (Собр. Я. Никитась, Опр. Вл. Липский);

уч. Аз. Скл. NE, гор. 23/24; 27 IV (10 V) 1905 г. (Собр. Я. Никитасъ. Опр. Вл. Липский).

2. Вершина г. Тете-оба. Склон N. над немецкой колонией Герценберг 27 V (9 VI) 1912 г. (Собр. В. С. Опр. В. Липский).

3. Окраины полей близ лагеря 16/29 V 1912 г. (Собр. В. С. опред. В. Липский).

V. tridentata (Stev.) Bas.

1. Окраины полей. Близ лагеря 16/29 V-1912 г. (Собр. В. С. опред. В. Липский).

Dipsacaceae.

Cephalària Schrad.

C. transilvanica Schrad.

1. Феод. лесничество. Уч. Аз. Скл. SSE. 16/29 IX 1905 г. (Е. Буш).

2. Дно балки по дороге в имение Шпицберга в Двужорной Бухте. 3/16 VIII 1903 г. (Н. Прохоров); уч. Бз. Скл. NE, высший пункт 11/24 X 1905 г. (Н. Буш); б) Скл. N, гор. 4/4; часто; 14/27 VII 1906 г. (Е. Буш).

3. Городской «Кизильник» 18/31 VII 1907 г. (В. С.).

4. Кизильник на г. Тете-оба над немецкой колонией Герценберг. Скл. N, 26 VII (8 VIII) 1909 г. Очень много. (В. С.).

Knautia L.

K. arvensis Coult.

1. Феод. леснич. Уч. Аз. скл. NNE, в питомнике, 30 V (12 VI) 1905 г. (Н. Буш).

Scabiòsa L.

S. columbària L.

1. Скл. SSE к морю за Феод. лесничеством. 3/16 VI 1905 г. (Н. Буш).

2. Феод. лесн. Уч. Бз.: а) Скл. NE, гор. 14/15; часто 30 VI (13 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) 2/15 VII 1907 г.; в) 9/22 VII 1907 г.; д) 18/31 VII 1907 г.; е) 21 VII (3 VIII) 1908 г.; ф) 27 VI (10 VII) 1907 г. (В. С.); уч. Бз. Скл. NNE, гор. 9/10 на целине единично 10/23 VI 1909 г. (Опр. В. С.).

3. Городской «Кизильник»: а) 11/24 VII 1908 г. Очень много; б) 18/31 VII 1907 г. (В. С.).

4. Кизильник на горе Тете-оба близ дачи Вержинского. 21 VI (4 VII) 1910 г. (Высокая, очень больших размеров. (В. С.).

S. ucrainica L.

1. Гора св. Ильи; Генуэзская гора; лесничество уч. Аз. Рассеянно. Очень много. 9/22 VII 1909 г. (В. С.).

2. По дороге к ч. св. Ильи. Очень много, рассеянно. 9/22 VII 1909 г. (В. С.).

3. Скл. SE к морю; ниже уч. Аз. 14/27 VI 1905 г. (Н. Буш).

4. Феод. лесн. Уч. Б. 2/15 VII 1907 г. (В. С.); уч. Бз. Скл. NE, гор. 1. На щебенистой почве, часто. 7/20 VI 1903 г. (Н. Прохоров).

5. Городской «Кизильник»: а) Скл. N, часто в тени 26 VI (9 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. NE, нижняя часть; 22 IX (5 X) 1905 г. (Н. Буш); в) 11/24 VII 1908 г.; д) 18/31 VII 1907 г. (В. С.).

6. Православное кладбище 9/22 VI 1909 г. (В. С.).

7. Курубаш. 9/22 VI 1911 г. (В. С.).

S. micrantha Desf.

1. Феод. леснич. Уч. Аз. Скл. NE, питомник, не часто 27 V (9 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев). По дороге Вещицкого 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Бз. Скл. E. На высоте кирпичного завода; на щебенистом демуви; 3/16 VIII 1903 г. (Н. Прохоров); Уч. Бз. Скл. E, Сорное; единично 24 V (6 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).

2. Городской «Кизильник»: а) На полянках, не часто 3/16 VI 1911 г. (В. С.); б) Скл. SSE, средняя часть, на целине единично (молодой экземпляр) 17/30 V 1909 г. (Опр. В. С.).

3. Гора св. Ильи. Скл. к городу 5/18 VI 1911 г. Цветы (В. С.).

4. Курубаш. 9/22 VI 1911 г. Плоды. (В. С.).

?S. rotata MB.

1. Феод. леснич. Уч. Бз. скл. NE, гор. 8; 7/20 VI 1903 г., в густом насаждении; часто. (Н. Прохоров).

Campanulàceae.

Campanula L.

C. sibirica L.

1. Скл. к морю, ниже, уч. Аз. Феод. леснич. 20 V (2 VI) 1905 г. (Е. Буш).

2. Феод. леснич. Уч. Аз. Скл. N; гор. 25/26; на целине часто 3/16 VI 1907 г. (Н. Буш); уч. Бз. Скл. NNE, гор.

21/22 на целине один экземпляр 24 V (6 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).

2. Городской «Кизильник»: а) Скл. W, 15/28 VI 1906 г. (Е. Буш); б) Верхняя часть, местами много 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
3. Кизильник на г. Тете-оба́ близ дачи Вержинского 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

C. sibirica L. var. *divergens* W.

1. Феодос. лесн. Уч. Бз. Скл. ENE, гор. 10/11, на целине единично. 29 V (11 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).

C. bononiensis L.

1. Феод. лесн. Уч. Б. 9/22 VII 1907 г. (В. С.); уч. Бз. Скл. NE, гор. 12/13, не часто 30 VI (13 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А1. Скл. N, гор. 13/14, сорное. 17/30 VI 1907 г. (Н. Буш);
2. Городской «Кизильник»: а) Скл. N, 18/31 VII 1907 г. (Н. Буш); б) 14/27 VII 1906 г. (Н. Буш); в) 11/24 VII 1908 г.; д) 18/31 VII 1907 г. (В. С.).

Compositae.

Aster L.

A. linosyris Bernh. (*Linosyris vulgaris* Cass.).

1. Феод. лесн. Уч. А1: а) Скл. NNE, гор. 9/10 около флюгера 7/20 VIII 1905 г. (Е. Буш); б) Скл. NNW, в насаждении 10/23 X 1905 г. (Е. Буш); уч. А2: а) Скл. N, гор. 16/18. Сорное в 2-х летнем насаждении 5/18 VIII 1903 г. (Н. Прохоров); б) Скл. E, в питомнике на целине часто, 17/30 IX 1906 г. (Н. Буш); уч. А3: а) Скл. NNE, гор. 26/27; 19 IX (2 X) 1905 г. (Е. Буш); б) Скл. N, гор. 22/23, на целине часто 24 IX (7 X) 1906 г. (Н. Буш); уч. А4. Скл. SE, на вновь перекопанной под лесные посадки полосе; сорное часто 8/21 VIII 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б. Поляна у метеорологической станции, 7/20 VIII 1903 г. (Н. Прохоров); уч. Б1: а) Скл. N, гор. 5/6, часто; 4/17 X 1906 г. (Е. Буш); б) Скл. NE, гор. 1/2; 15/28 IX 1905 г. (Е. Буш).

A. villosus Benth et Hook. (*Linosyris villosa* DC.; *Aster cinereus* Korsh.).

1. Феод. леснич. Уч. Аз. Скл. NW. Сорное в 2-х летнем насаждении, часто 24 VIII (4 IX) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А1: а) Скл. E, гор. 25/26; на целине, часто, 17/30 IX 1906 г. (Н. Буш); б) Скл. SE, 4/17 X 1905 г. (Е. Буш); уч. Б1. Скл. NE, гор. 1/2; 15/28 IX 1905 г. (Е. Буш);

уч. Б. Много на горах; выс. 137 саж. над уровнем моря 2/15 VII 1907 г. (В. С.).

2. Городской «Кизильник» 18/31 VII 1907 г. (В. С.).

Micropus L.

M. erectus L.

1. Скл. SE к морю за Феод. леснич. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Helichrysum Vail.

H. arenarium Moench. (*Gnaphalium arenarium* L.).

1. Феод. лесн. Уч. А1. Скл. NE, гор. 9, часто. 21 VI (4 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А2. Скл. E, гор. 24/25, около дороги 11/24 VI 1907 г. (Е. Буш); уч. А. Дорога Вещицкого 14/27 VI 1909 г. (В. С.); уч. Б1. а) Высший пункт. 10/23 VI 1906 г. (Е. Буш); б) Скл. NNE, на валу гор. 2-ой; 15/28 IX 1905 г. (Е. Буш); в) Скл. E, гор. 2/3; на целине, единично; 2/15 VI 1909 г. (Опр. В. С.); д) 9/22 VII 1907 г. (В. С.); уч. Б2. Скл. NE, 31 V (13 VI) 1905 г. (Н. Буш).
2. Городской «Кизильник»: а) 11/24 VII 1908 г.; б) 18/31 VII 1907 г.; в) 3/16 VI 1909 г.; д) (31 V 13 VI) 1909 г. (В. С.); е) Скл. NE, часто. 26 VI (9 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев).
3. Скл. SW к балке за лесничеством на вершине г. Тете-оба́ близ конденсатора. 5/18 VIII 1909 г. (В. С.).

Inula L.

I. ensifolia L.

1. Скл. S к морю за Феод. леснич. На целине часто, 12/2 5VI 1906 г. (Е. Буш).
2. Феод. лесн. Уч. Б1: а) 21 VII (3 VIII) 1909 г.; б) 9/22 VII 1907 г. (В. С.).

I. oculus christi L. (*I. montana* auct fl. taur.).

1. Склоны к морю за Феод. лесн.: а) Скл. SE, 12/25 VI 1904 г. часто (Вл. Сукачев); б) Скл. S; 3/16 VI 1905 г. (Е. Буш); Уч. А2: а) Скл. E, гор. 22/23, 11/24 VI 1907 г. (Е. Буш); б) Скл. NNW, в насаждении около питомника 17/30 VI 1905 г. (Е. Буш); уч. А4. Скл. E, гор. 23/24; сорное, часто. 26 V (8 VI) 1906 г. (Е. Буш); уч. Б1. а) Скл. NE, гор. 5/6; на целине, единично; 4/17 VI 1909 г. (Опр. В. С.); уч. Б2. Скл. E, 16/29 VI 1906 г. Часто. (Е. Буш).

2. Городской «Кизильник». Скл. NE, 26 VI (9 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев);

I. salicina L.

1. Феод. лесн. уч. А: а) скл. NE, гор. 9/10, около дороги 17/30 VI 1905 г. (Е. Буш); уч. А₃. Скл. S, гор. 23/24, на целине часто 11/24 VI 1907 г. (Е. Буш); уч. Б₁. Скл. N, гор. 5/6, часто 10/23 VI 1906 г. (Е. Буш).
2. Городской «Кизильник» скл. NE, 26 VI (9 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев).

I. cordata Boiss. (Inula salicina var. aspera).

1. Феод. лесн. Уч. Б₁. Скл. NW, гор. 6/7, на целине, единично 5/18 VI 1909 г. (Опр. В. С.).

I. squarrosa Led.

1. Феод. лесн. Уч. Б. Поляна у метеорологической станции, часто 6/19 VI 1903 г. (Н. Прохоров).

Xanthium L.**X. strumarium L.**

1. Портовая территория. Сорное близ метеорологической станции а) 19 VII (1 IX) 1909 г. (В. С.); б) 18/31 VIII 1909 г. (В. С.).

X. spinosum L.

1. Портовая территория сорное близ метеорологической станции 16/29 VIII 1909 г. (В. С.).
2. Сорное в городе; близ станции Сарыголь; на сорных местах. 1909 г. (В. С.).

Anthemis L.**A. tinctoria L.**

1. Феод. лесн. Уч. Б: а) 3/16 VI 1909 г. и б) 2/15 VII 1907 г. (В. С.); уч. Б₁: Скл. NE, гор. 1, часто; 7/20 VI 1903 г. (Н. Прохоров); б) Скл. NE, гор. 3/4. На целине рассеянно, 28 V (10 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник»: а) 3/16 VI 1909 г.; б) 18/31 VII 1907 г.; 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

A. tinctoria L. var. rigescens W. (A. Triumphetti Led. Fl. Ross.).

1. Феод. лесн. Уч. А: а) Скл. N, гор. 16/18; редко. 19 V (1 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. NE, в питомнике на гряде, единично, 2/15 V 1909 г. (Опр. В. С.).

A. arvensis L.

1. Курубаш 9/22 VI 1911 г. (В. С.).

A. arvensis L. var. ruthenica MB.

1. Феод. лесн. Уч. А₂ Скл. N, питомник, на целине очень часто 3/16 VI 1907 г. (Е. Буш); уч. Б₁: а) Скл. N, гор.

- 1/2; 9/22 V 1907 г. и б) Скл. N, гор. 4/5; 2/15 V 1906 г. (Е. Буш).

2. Сорное около города 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Achillea L.**A. millefolium L.**

1. часовни св. Ильи. 9/22 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
2. Феод. лесн. Уч. А₂ Скл. E, гор. 22/23; 27 V (9 VI) 1907 г. (Е. Буш); уч. А₃ Скл. ENE, Генуэзская гора, гор. 23/24; сорное в 3-х летнем насаждении; 4/17 IV 1905 г. (Н. Буш); б) в котловине на Генуэзской горе 10/23 VIII 1903 г. (Н. Прохоров). Уч. Б. Поляна у метеорологической станции 5/18 VI 1903 г. часто (Н. Прохоров); уч. Б₁. Высший пункт 6/19 VIII 1903 г. (Н. Прохоров); уч. Б₂. Скл. NE, 26 V (8 VI) 1907 г. (Е. Буш).

A. millefolium L. var. magna L.

1. Карантии; 7/20 VI 1911 г. (В. С.).

?A. millefolium L. var. setacea W. K.

1. Феод. лесн. Уч. Б₃ Скл. NE, гор. 10/11; на целине единично 21 V (3 VI) (Опр. В. С.).

A. nobilis L.

1. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. NE, гор. 12/13; 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев); Уч. А₃. Скл. N, гор. 21/22; 20 V (2 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).
3. Городской «Кизильник»: а) 31 V (13 VI) 1909 г. и б) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

?A. Gerberi MB. var. leptophylla MB.

1. Феод. лесн. Уч. Б. Поляна у метеор. станции 5/18 VI 1903 г. единично. (Н. Прохоров).

Matricaria L.**M. inodora L. (Chrysanthemum inodorum L.).**

1. Феод. лесн. Участок А₂. Скл. N, в питомнике сорное; 9/22 VI 1906 г. (Е. Буш); уч. Б₃. Скл. NE, гор. 8/9; на целине, единично; 4/17 V 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник». Скл. NE, 26 IV (9 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев).
3. Портовая территория. Сорное в саду 4/17 VI 1911 г. (Достигает больших размеров, более 1 1/2 арш. (В. С.).

M. chamomilla L.

1. Сорное около города 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. На песках у моря за станцией Сарыголь близ Керченского шоссе; 10/23 VII 1907 г. (В. С.).
3. Карантии. Сорное во дворе и близ бактериологической станции. Много. 7/20 VI 1911 г. (В. С.).

*Pycëthrum.**P. millefoliatum* Willd.

1. Склон к морю у часовни св. Ильи. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Artemisia L.*A. maritima* L.

1. Скл. S к морю за часовой св. Ильи. Много. 16/29 VI 1909 г. (В. С.). Гора св. Ильи, близ часовни. Много. 16/29 VI. 1909 г. (В. С.).
2. Солонцы в пмени Шпицберга в Двужкорной Бухте. 13/26 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
3. Феод. лесн. Уч. Б.: а) Скл. NNE, 11/24 X 1905 г. (Е. Буш); б) 21 VII (3 VIII) 1908 г.; в) 2/15 VII 1907 г. (В. С.).
4. Городской «Кизильник»: а) 18/31 VII 1907 г. б) 31 V (13 VI) 1909 г. много. (В. С.); в) 11/24 VII 1908 г. Много у дороги за кирпичным заводом. (В.С.). По дороге в «Кизильник», много. 5/18 VIII 1909 г. (В. С.).
5. Кизильник на г. Тете-оба близ дачи Вержинского Скл. N, 26 IV. (9 V) 1909 г. (В. С.).

A. maritima L. var. *nütans* Willd.

1. Склон к морю за леснич. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

A. maritima L. var. *incana* DC.

1. Солонец в имени Шпицберга в Двужкорной Бухте. 13/26 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).

A. lanata Willd. (*A. alpina* Pall. *A. caucasica* Willd.).

1. Гора св. Ильи, около часовни. Много: а) 27 VI (10 VII) 1907 г. (В. С.); б) 16/29 VI 1909 г. очень много. (В. С.); в) 5/18 VI 1911 г. (В. С.).
2. Скл. SE к морю за лесничеством 20 V (2 VI) 1905 г. (Н. Буш).
3. Феод. лесн. уч. А₁. Скл. N, гор. 10/11 на целине, 27 V (9 VI) 1907 г. (Н. Буш); уч. Б.: а) 2/15 VII 1907 г. (В. С.); уч. Б₃. Скл. E, гор. 11/12 на целине, единично. 8/21 V 1909 г. (Опр. В. С.). Склон балки за леснич. на вершине г. Тете-оба. 3/16 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
4. Городской «Кизильник»: а) 15/28 V 1909 г. Много. (В. С.); 18/31 VII 1907 г. местами очень много. (В. С.).

Tussilago L.*T. farfara* L.

1. Скл. к морю за леснич. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феод. леснич. Уч. А₁. Скл. E, на валу 25 гор., один экземпляр. 13/26 IV (Опр. В. С.).

3. Городской «Кизильник» Скл. N. 23 III (5 IV) (Н. Буш).
4. В балке между скотопрогоном и кирпичным заводом (за Форштатом и татарским кладбищем. VI 1911 г. (В. С.).
5. Около нового Лесперовского шоссе в Дурантовской балке. Местами много. 5/18 IX 1914 г. (В. С.).

Senecio L.*S. vernalis* Waldst et Kit. (*S. incanus* Gil.; *S. chrysanthemifolius* Poir.; *S. latifolius* DC.).

1. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. N, гор. 12/13; сорное 21 IV (4 V) 1906 г. (Н. Буш); уч. А₁. Скл. SE, гор. 26/27; часто; 19 V (1 VI) (Вл. Сукачев); уч. Б₁: а) Скл. NE, высший пункт под флюгером. 29 IV (12 V) 1905 г. (Н. Буш); б) Скл. N, гор. 5/6. Сорное часто. 29 X (11 XI) 1906 г. (Н. Буш); уч. Б₃. гор. 9/10. Сорное; 16/29 IV. 1907 г. (Н. Буш).

S. jacobaea L.

1. Скл. ESE к морю ниже уч. А₁. 14/27 VI 1905 г. (Е. Буш).
2. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. S, гор. 25/26. Сорное. 9/22 VI 1906 г. (Е. Буш); уч. А₃. Скл. NW, сорное в двухлетнем насаждении, часто. 21 VI (4 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев); Уч. А₂: а) Скл. E, гор. 23/24, сорное часто 11/24 VI 1907 г. (Е. Буш); б) 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₁. Скл. E, гор. 13, близ дороги. 5/18 VIII 1906 г. (Н. Прохоров); уч. Б.: а) 2/15 VII 1907 г. и б) 21 VII (3 VIII) 1908 г. (В. С.); уч. Б₁: а) Скл. NE, гор. 1/2; 10/23 V 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. NE, гор. 1/2; 15/28 IX 1905 г. (Н. Буш); Уч. Б₃. Скл. NE, гор. 11/12; сорное, единично 14/27 VI 1909 г. (Опр. В. С.).
3. Городской «Кизильник». 18/31 VII 1907 г. (В. С.).

Senecio sp?

1. Феод. лесн. Уч. А₂. Скл. NE, питомник 27 V (9 VI) 1904 г. (экземпляр слишком ненормально развит, чтобы можно было определить точно вид). (Вл. Сукачев).

Echinops L.*E. ritro* L.

1. Скл. S к морю за Феод. лесн.: а) 12/25 VI 1906 г. на целине единично. (Е. Буш); б) 9/22 VII 1909 г. У стенки за лесн. в уч. А₁ близ дороги. (В. С.).
2. Феод. лесн. Уч. А₁. 9/22 VII 1909 г. близ дороги. (В.С.); уч. А₂. Скл. E. Генуэзская гора, гор. 24/25, часто; 22 VII (4 VIII) 1904 г. (Вл. Сукачев).

3. Дно балки за уч. Б. Феод. лесн. в 50 саж. от моря. 4/17 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
4. Городской «Кизильник». 18/31 VII 1907 г. (В. С.).
5. Дорога в «Кизильник» близ кирпичного завода. 5/18 VIII 1909 г. Много. Рассеянно (В. С.).

E. ritro L., foliis supra arachnoideis.

1. Скл. S, к морю за Феод. лесн. 30 VII (12 VIII) 1906 г. на целине, часто. (Н. Буш).

Xeranthemum L.**X. annuum L. (X. radiatum Lam.).**

1. Скл. S к морю за Феод. леснич.: а) 24 VI (7 VII) 1907 г.; б) 12/25 VI 1906 г. (Н. Буш).
2. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. E, гор. 24/25, на целине 17/30 IX 1906 г. (Н. Буш); уч. А₂. Скл. E; гор. 21/22; Сорное в четырехлетнем насаждении 17/30 VI 1907 г. (Н. Буш); уч. А₁: а) Скл. NNW, в питомнике и в насаждении около него; б) 11/24 X 1905 г.; с) 2/15 VII 1905 г. (Е. Буш); Там же, Скл. NW, питомник гор. 18. Редко 22 VI (5 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б₁. Скл. N, гор. 3/4; - 10/23 VI 1906 г. (Н. Буш); уч. Б₂. Скл. N, гор. 14/15; не часто 20 VI (3 VII) 1907 г. (Н. Буш).
3. Городской «Кизильник»: а) 18/31 VII 1907 г. Местами очень много. (В. С.); б) 11/24 VII 1908 г. Очень много. (В. С.).
4. Кизильник на г. Тете-оба близ дачи Вержинского Скл. N, 26 VII (8 VIII) 1909 г. (В. С.).
5. Лысая гора. У подножья горы. Дача Л. Н. Папарупа. 1/14 VII 1907 г. Много. (В. С.).

X. cylindraceum Sibth et Sm.

1. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. NNW, выше гор. 9; 2/15 VII 1905 г. (Е. Буш); уч. Б₂. Скл. NE, ниже дороги от скотопргона к хутору, 17/30 VI 1905 г. (Н. Буш); уч. Б₂. Скл. E, в средней части, сорное, единично 2/15 VII 1909 г. (Опр. В. С.).

Jurinea Cass.**J. stoechadifolia DC.**

1. Склоны к морю за Феод. леснич. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феодос. леснич. Уч. А₁. Скл. NE, гор. 8/9; 30 VI (13 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев).
3. Городской «Кизильник» 183/1 VII 1907 г. (В. С.).

J. mollis Rchb.

1. Скл. ESE к морю ниже уч. А₁. 21 IV (4 V) 1905 г. (Е. Буш).
2. Феод. лесн. Уч. А₂. Скл. W, гор. 22/23; на целине, часто 6/19 V 1907 г. (Е. Буш). Уч. А₂. Скл. NE, питомник, часто 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. А₁. Скл. NE, гор. 9/10; 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б.: а) 5/18 V 1904 г. (Вл. Сукачев); б) 23 IV (6 V) 1909 г. Много. (В. С.); уч. Б₁. Скл. ENE, гор. 1/2; сорное, единично 30 IV (13 V) 1909 г. (Опр. В. С.).
3. Городской «Кизильник»: а) 12/25 V 1909 г.; б) 15/28 V 1909 г. много и с) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
4. Кизильник на г. Тете-оба близ дачи Вержинского. Скл. N, 26 IV (9 V) 1909 г. Очень много. (В. С.).
5. Окрестности г. Феодосии. На горах очень много. 20 IV (3 V) 1909 г. (В. С.).

Carduus L.**C. nutans L. (C. macrocephalus Desf.; C. Thoermeri Weinm).**

1. Гора св. Ильи. 30 V (12 VI) 1912 г. (В. С.).
2. Феодос. лесн. Уч. А₁. Скл. N, гор. 21/22. Сорное, часто. 20 V (2 VI) 1907 г. (Е. Буш). Уч. А₂. Скл. NW. Сорное в двухлетнем насаждении. 21 VI (4 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев). Уч. Б. 9/22 VII 1907 г. (В. С.).
3. Городской «Кизильник». Верхняя часть, близ лесничества 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
4. На вершине г. Тете-оба за лесничеством. Сорное 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
5. Близ станции Сарыголь. Сорное в канавах по Керченскому шоссе 25 V (7 VI) 1909 г. (В. С.).

C. acanthoides L.

1. Сорное в саду на портовой территории. 29 VII (11 VIII) 1909 г. (В. С.).

C. crispus L.

1. Сорное около часовни св. Ильи. 11/24 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

C. hamulosus Ehrh.

1. Окрестности г. Феодосии 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феодос. лесн. Уч. А₁. Скл. NE, гор. 20/21; Сорное единично. 12/25 V 1909 г. (Опр. В. С.).
3. Городской «Кизильник» 3/16 VI 1911 г. (В. С.) По дороге в «Кизильник» 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
4. Курубаш-9/22 VI 1911 г. (В. С.).

Cirsium Scop.**C. acarna Moench. (Picnoman Acarna Cass. Шмальгаузен).**

1. Первый овраг к морю за Феод. лесн. 4/17 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
2. Гора св. Ильи. 20 VII (2 VIII) 1907 г. (В. С.).
3. Феод. лесн. Уч. А₃. Скл. NW, Генуэзская гора, сорное в 2-х летнем насаждении. 22 VII (4 VIII) 1904 г. часто. (Вл. Сукачев); Уч. Бз. Близ дороги к хутору, выс. 79 саж. над уровнем моря. 28 VII (10 VIII) 1909 г. (В. С.).
4. Караимское кладбище. 9/22 VII 1909 г. (В. С.).
5. Симферопольское шоссе (по дороге в г. Старый Крым). 11/24 VII 1907 г. (В. С.).
6. Керченское шоссе. Близ города у дороги. 10/23 VII 1907 г. (В. С.).
7. Степь за лагерем (Керченский полуостров). 14/27 VI 1910 г. (В. С.).

C. arvense Scop. (Serratula arvensis L.).

1. Феод. лесн. уч. А₂: а) Скл. Е, гор. 23/24; сорное часто. 11/24 VI 1907 г. (Н. Буш); б) Скл. Е, гор. 21/22; сорное, рассеянно. 15/28 VI 1909 г. (Опр. В. С.); уч. А₃. Скл. NNW, в канаве гор. 22; 17/30 VI 1905 г. (Е. Буш); уч. А₄. Скл. Е, гор. 23-24; сорное, часто. 26 V (8 VI) 1906 г. (Н. Буш); уч. Б.: а) 9/22 VII 1907 г.; б) 3/16 VII 1908 г. (В. С.); уч. Б₁. Скл. N, на валу гор. 1. 19 VI (2 VII) 1907 г. (Н. Буш).

C. arvense Scop. var. incana Fisch.

1. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. Е, гор. 13; 5/18 VIII 1903 г. (Н. Прохоров). Уч. А₂. Скл. W, Генуэзская гора, гор. 23/24. Сорное в 2-х летнем насаждении. 21 VI (4 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев); Уч. А₃ и А₄. Близ дороги. Очень много. Сорное в насаждении. 9/22 VII 1909 г. (В. С.); уч. Б₁. 3/16 VI 1909 г. (В. С.).
2. Караимское кладбище. 9/22 VII 1909 г. (В. С.).

C. lanceolatum Scop.

1. Городской «Кизильник» (у дороги): а) 11/24 VII 1908 г. (В. С.); б) 18/31 VII 1907 г. (В. С.).
2. Дорога в Кизильник 18/31 VII 1907 г. (В. С.).
3. Близ станции Сарыголь сорное у дороги. 24 VII (6 VIII) 1909 г. (В. С.).
4. Торговая территория сорное в порту 16/29 VIII 1909 г. (В. С.).

Onopordon L.**O. acanthium L.**

1. Гора св. Ильи. 26 VI (9 VII) 1907 г. (В. С.).

Crupina Cass.**C. vulgaris Cass.**

1. Склон к морю за Феод. леснич. около Двужерной Бухты. 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. NNW, в насаждении около питомника. 15/28 V 1905 г. (Н. Буш); уч. А₂: а) Питомник 20 V (2 VI) 1907 г. на целине. (Е. Буш); б) Скл. Е, гор. 22/23; сорное рассеянно. 12/25 V 1909 г. (Опр. В. С.); уч. А₃. Скл. NW, Генуэзская гора. 28 V (10 VI) 1904 г. редко. (Вл. Сукачев). Уч. Б. 9/22 VII 1907 г. (В. С.).
3. Городской «Кизильник»: а) 11/24 VII 1908 г. (В. С.); б) Скл. N, 14/27 V 1907 г. (Н. Буш); в) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

Centaurea L.**C. stérilis Stev.**

1. Склоны к морю за Феод. лесн.: а) 7/20 V, 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. SE ниже уч. А₁. Феод. лесн. 17/30 VII 1905 г. (Е. Буш).
2. Городской «Кизильник» 3/16 VI 1909 г. (В. С.).

C. picris Pall. (Acroptilon picris C. A. M.).

1. Православное кладбище. 9/22 VI 1909 г. (В. С.).
2. Близ Лысой горы по Симферопольскому шоссе сорное. (Засоряет поля, огороды, виноградники). VI 1911 г. (В. С.).

C. trinervia Steph. (Phaeorappus trinervius Boiss.).

1. Феод. леснич. V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Скл. S к морю за Феод. лесн., на целине, часто. 24 VI (7 VII) 1907 г. (Е. Буш).
3. Феод. лесн. Уч. Б₁. Скл. Е, выше гор. 1, на целине один экземпляр. 24 V (6 VI) 1909 г. (Опр. В. С.).

C. ovina Pall.

1. Близ ст. Сарыголь у дороги, единично. 24 VII (6 VIII) 1909 г. (В. С.).

C. arenaria MB.

1. Сарыголь. Приморские пески. 28 VI (11 VII) 1912 г. (В. С.).

C. arenaria MB. var. *Besseriana* DC.

1. Феод. лесн. Уч. А. Скл. N, питомник; редко 30 VI (13 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев).

C. diffusa Lam.

1. Гора св. Ильи. 27 VI (10 VII) 1907 г. (В. С.).
2. За уч. А₄ у дороги 9/22 VII 1909 г. (В. С.).
3. На солонцах в имении Шпидберга в Двужорной Бухте. 13/26 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).
4. Феод. лесн. Участок А₁. Скл. N, питомник, редко. 30 VI (13 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Аз. Скл. S, Генуэзская гора, гор. 22/23 на целине, единично; 15/28 VI 1909 г. (Опр. В. С.); уч. Б. 2/15 VII 1907 г. (В. С.); уч. Б₁. Скл. N, на валу гор. 5; 18/31 VII 1907 г. (Н. Буш).
5. Городской «Кизильник». Скл. NE; нижняя часть 22 IX (5 X) 1905 г. (Н. Буш). По дороге в «Кизильник»: а) Около кирпичного завода 18/31 VII 1907 г. (Окраска лиловая) (В. С.); б) 11/24 VII 1908 г. (В. С.).

C. scabida L. var.

1. Феод. леснич. Уч. Б. на хуторе, Скл. N, 3/16 VII 1909 г. Один экземпляр. (Опр. В. С.).

C. orientalis L.

1. Скл. S, к морю. На целине часто. 24 VI (7 VII) 1907 г. (Е. Буш).
2. Феод. лесн. Уч. Б. 2/15 VII 1907 г. (В. С.).
3. За леснич. на вершине горы Тете-оба близ конденсатора. Скл. W: а) 5/18 VIII 1909 г. (В. С.); б) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).
4. Городской «Кизильник»: а) 18/31 VII 1907 г. и б) 3/16 VI 1911 г. (В. С.).

C. solstitialis L.

1. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. N; питомник. 30 VI (13 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. По дороге между посевами за лагерем (Керченский полуостров). 14/27 VI 1910 г. (В. С.).

C. leucolepis Led.

1. Скл. S к морю за Феод. леснич. 12/25 VI 1906 г. На целине, единично. (Е. Буш).

Cichorium L.*C. intybus* L.

1. Феод. леснич. Уч. Б₁: а) Скл. N, гор. 6/7, на целине единично. 12/25 VI 1909 г. (Опр. В. С.); б) 2/15 VII 1907 г. (В. С.).

2. Портовая территория. Сорное в саду. 15/28 VIII 1909 г. (В. С.).
3. Окрестности г. Феодосии сорное при дорогах местами часто и много. Летом. (В. С.).

Leontodon L.*L. asper* Rchb. var. *biscutellifolius* DC. (*L. biscutellifolius*).

1. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. NE, гор. 10/11; 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Аз: а) Скл. NNE, гор. 25/26; 17/30 VI 1905 г. (Е. Буш); б) Склон Генуэзской горы. 2/15 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б₁: а) Скл. N, гор. 1/2; 2/15 V 1906 г. (Н. Буш); б) Скл. N, гор. 3/4; 10/23 V 1906 г. (Н. Буш); уч. Б₂. Скл. NE, 19 V (1 VI) 1904 г. часто. (Вл. Сукачев); уч. Б₃: а) Скл. NE, гор. 10, часто: 21 V (3 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. N, гор. 8/9; 9/22 1907 г. (Е. Буш); в) Скл. NE, гор. 8/9; на целине единично. 5/18 V 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник»: а) 20 IV (3 V) 1909 г.; б) 3/16 VI 1911 г.; в) 11/24 VII 1908 г. (В. С.).

Tragopogon L.*T. major* Jacq.

1. Городской «Кизильник». 6/19 V 1904 г. вблизи города. (Вл. Сукачев).

T. pratensis L. var. *undulatus* Jacq.

1. Гора Тете-оба. Плато против дачи Вержинского. 7/20 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).

Scorzonera L.*S. laciniata* L. (*Podospèrmum laciniatum* DC.).

1. Феод. лесн. Уч. Б₁. Скл. N, гор. 5/6; 24 IV (7 V) 1906 г. (Н. Буш). Мергелистые обнажения близ дороги из Феод. лесничества в город. 5/18 V 1904 г. (Вл. Сукачев); лесн. уч. Аз., гор. 22/23. Скл. NE; сорное единично 14/27 V 1909 г. (Опр. В. С.).
2. Городской «Кизильник». Скл. N; V 1907 г. (Н. Буш).
3. Православное кладбище. 9/22 VI 1909 г. (В. С.).

S. mollis MB. (*Podospèrmum mollè* F. et M.).

1. Скл. к морю около часовни св. Ильи. 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феод. лесн. Уч. А₁: а) Скл. E, гор. 14/15, на целине единично. 22 IV (5 V) 1909 г. (Опр. В. С.); б) Скл. NW, гор. 17/18; 9/22 V 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Аз. Скл.

NNW, Генуэзская гора, гор. 23/24; сорное, 21 IV (4 V) 1905 г. (Н. Буш); уч. Б₃. Скл. NE, по дороге к хутору; в густом насаждении. 30 IV (13 V) 1904 г. (Вл. Сукачев).

3. Городской «Кизильник». 20 IV (3 V) 1909 г. (В. С.).

Pterotheca Cass.

P. orientalis Boiss. (*P. bifida* F. et M.: *P. caspica* Pacz.; *Lagoseris orientalis* Boiss.).

1. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. NE, гор. 16/17; 30 IV (13 V) 1904 г. (Вл. Сукачев); б) Скл. NNE, в насаждении около питомника 21 IV (4 V) 1905 г. (Е. Буш); уч. А₂. Скл. N, гор. 22/23, на целине. 29 IV (12 V) 1907 г. (Н. Буш); уч. Б₁. Скл. E, гор. 1/2, сорное единично 17/30 V 1909 г. Высота над ур. моря 139 саж. (Опр. В. С.); уч. Б₂. Скл. E, в средней части, единично. Сорное. 23 IV (6 V) 1909 г. (Опр. В. С.).

Taraxacum Boehm.

T. serotinum.

1. Феод. лесн. Уч. А₂. Скл. N, гор. 23/24 на целине 17/30 IX 1906 г. (Н. Буш); уч. Б₁: а) Скл. NE, гор. 17/2; 15/28 IX 1905 г. (Н. Буш); б) Скл. NE, около могилы Вещицкого. 13/26 VIII 1904 г. (Вл. Сукачев); уч. Б₃: а) Скл. NE, гор. 13. 1/14 VIII 1903 г. (Н. Прохоров); б) Возле дороги, от хутора к скотопрогону. 23 VIII (5 IX) 1905 г. (Н. Буш).

T. laevigatum DC.

1. Феод. лесн. Уч. Б₃, гор. 8/9, единично. 6/19 VI 1903 г. (Н. Прохоров).

T. officinale Wigg.

1. Феод. лесн. Участок А₁. Скл. NE, гор. 18/19; на целине единично. 9/22 IV 1909 г. (Опр. В. С.); уч. А₂. Скл. NE, на валу гор. 26. 7/20 IV 1905 г. (Е. Буш).
2. Балка за леснич. на вершине горы Тете-оба. 6/19 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
3. Городской «Кизильник» Скл. N: а) 31 III (13 IV) 1906 г. и б) 3/16 IV 1907 г. (Е. Буш).

Mulgedium Cass.

M. tatàricum DC.

1. На берегу моря за Феод. леснич. 17/30 VII 1905 г. (Н. Буш).
2. Каменистый берег моря за леснич. 12/25 VI 1906 г. (Н. Буш).

3. Городской «Кизильник». Нижняя часть. Скл. NE. 22 IX (5 X) 1905 г. (Е. Буш).

Sonchus L.

S. asper Vill.

1. Феод. лесн. Уч. А₂. Скл. E, гор. 23/24, Генуэзская гора. Сорное в 3-хлетнем насаждении. 17/30 VII 1905 г. (Н. Буш). Уч. Б₁ при дороге. 9/22 VII 1907 г. (В. С.).

Lactuca L.

L. scariola L.

1. Городской «Кизильник»: а) 18/31 VII 1907 г.; б) 11/24 VII 1908 г. у дороги. (В. С.).

L. saligna L.

1. Скл. S балки к морю, где сад Ребрикова, за уч. А₁. Феод. лесн. 4/17 VIII 1903 г. (Н. Прохоров).

Crèpis L.

C. foetida L. var. *rheodifolia*.

1. Феод. лесн. Уч. А₂. Скл. W, Генуэзская гора, гор. 23, часто. 30 VI (13 VII) 1904 г. (Вл. Сукачев).

Hieracium L.

H. pilosella L.

1. Склон NE балки за уч. Б₁. Феод. лесн. Среди щебенки в камеломне. VIII. 1903 г. (Н. Прохоров).

H. auricula L.

1. Феод. лесн. Участ. А₂. Скл. NE, питомник, редко. 27 V (9 VI) 1904 г. (Вл. Сукачев).

H. pratense Tausch.

1. Скл. к морю за Феод. леснич. 7/20 V 1904 г. (Вл. Сукачев).
2. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. N, гор. 24/25. На целине часто. 20 V (2 VI) 1907 г. (Е. Буш).
3. Городской «Кизильник». Скл. N, 14/27 V 1907 г. (Е. Буш).

H. praealtum Vill.

1. Феод. лесн. Уч. А₁. Скл. N, гор. 22/23. Сорное, часто. 29 V (11 VI) 1907 г. (Е. Буш).

H. magyàricum N. P.

1. Феод. лесн. Уч. Б₁. 7-20 V 1904 г. (Вл. Сукачев).

Hymenomycetinae.

Thelephoraceae.

2. *Peniophora lilacina* (B. et Br.) Cooke in Grevill. VIII, p. 20, t. 123, f. 5; *Corticium lilacinum* B. et Br., Ceylon (Twaites); Sacc. Syll. Fung. VI, p. 642. На гнилом дереве в смешанном лесу; бассейн р. Суйфуна, верховье р. Супутинки у перевала к р. Майхе, 11 VI.

Плодовое тело гриба распростертое, тонко-корковидное, в трещинах, состоит из обособленных, легко отделяющихся друг от друга коростинков, от 0,3 до 0,5 см в диам., с блестящей, шелковистой, ярко-лиловой окраской и резко отграниченным по периферии белым краем мякоти.

При микроскопическом исследовании были обнаружены, глубоко залегающие в толще гимениального слоя, неправильно конической формы цистиды, типа рода *Peniophora*. Что касается базидий, то, вероятно, вследствие недостаточной зрелости материала, собранного в начале июня, они не были найдены.

По литературным данным *Peniophora lilacina* указана для Цейлона. В существующих в Ленинграде микологических гербариях образцов этого гриба не оказалось, вследствие чего гриб определен исключительно на основании сходства в систематических признаках с диагнозом *P. lilacina*, который имеется у Saccardo.

3. *Peniophora violaceo-livida* Bres. Sacc. Syll. Fung. VI, p. 627. На сухих ветвях лиственных пород, долина р. Лефу, селение Новониколаевское, 17 VI.

Коростинки довольно плотные, в глубоких трещинах; гимениальный слой неровный, буровато-фиолетовый с сероватым оттенком. Мякоть белая. Базидиоспоры еще не развились.

Гриб сверен с эксиккатным материалом Exs. Rabenh.—Wint. (Fung. europ.), № 2822, где он описан под названием *Xerogagarus violaceo-lividus* Karst.; сходство оказалось полным.

4. *Hymenochaete tabacina* (Sow.) Lév. Ячевск. Определ. гриб., I, стр. 532; Mig. Krypt. Fl. Deutschl. B. III, p. 99. На сухих ветвях, бассейн р. Суйфуна, смешанные горные леса по р. Супутинки, 6 VI.

Плодовое тело кожистое, бархатистое, по краю отстающее от питающего субстрата. Окраска гимениального слоя на собранном материале темно-коричневая. Мякоть тонкая желтоватая.

H. tabacina весьма обыкновенный, всюду встречающийся вид.

5. *Stereum hirsutum* (Willd.) Pers. Mig. Krypt. Fl. Deutschl. B. III, p. 95; Ячевск. Определ. гриб., I, стр. 550. На ветвях березы, бассейн р. Суйфуна, 9 VI; на сухих ветвях, очевидно, рябины, бассейн р. Даубихе (Уссури), хут. Хомяковка, смешанные горные леса по р. Угдинцае, 8 VII.

Л. А. Лебедева.

Грибы Южно-Уссурийского края, собранные В. Л. Комаровым в 1913 г.

Auriculariales.

1. *Hirneola cochleata* Fr. Ячевск. Определ. гриб., I, стр. 510; Sacc. Syll. Fung. VI, p. 765. Бассейн р. Даубихе, сел. Известка, смешанные горные леса, 29 VI; р. Даубихе, смешанные горные леса, р. Угдинца, 8 VIII; р. Даубихе, хут. Хомяковка, смешанные горные леса, 9 VII.

Большая часть собранных образцов этого гриба представляется в виде твердых, хрящеватых, неправильно раковинообразных, или плоско распростертых по питающему субстрату образований, достигающих от 5 до 15 см в диам. Кроме того, имеются экземпляры с берега р. Угдинца, они уховидной формы, от 4 до 5 см в диам., сидящие на боковой, короткой, книзу суженной ножке, которые по своему внешнему облику несколько напоминают дискомицетные грибы из рода *Otidea*. Гимениальный слой этого гриба складчатый, или морщинистый, красновато-коричневый. Наружная поверхность плодовых тел покрыта густым слоем сероватых волосков.

Необходимо при этом также указать, что некоторые авторы описывают данный грибной организм под названием *Hirneola cochleata*, тогда как другие причисляют его к роду *Auricularia*, оставляя первоначально присвоенное ему видовое название «*cochleata*». Подобное разногласие при определении данного гриба объясняется не только весьма близким сходством родов *Hirneola* и *Auricularia*, а также и почти полным отсутствием какой либо существенной разницы в их систематических признаках.

Hirneola cochleata оказывается съедобным грибом и в пределах Китая и Японии находит для себя соответствующее применение в кулинарии. Этот гриб растет на живых, а также отмерших стволах, главным образом, дуба, часто целыми колониями, покрывающими почти сплошь всю поверхность стволов деревьев.

Hydnaceae.

6. *Hydnum adustum* Schwein. Sacc. Syll. Fung. VI, p. 444. Бассейн р. Лефу, селение Орловка, долинный смешанный лес по р. Сандуган, 27 VI.

Американский вид, до сих пор обнаруженный в Северной Америке близ Нью-Йорка, а также в штатах Огйо и Каролина. На собранных образцах форма плодовых тел варьирует от почковидной до веерообразной, достигая от 3 до 5 см в диам. Мясо сухое, гибкое, тонкое, почти белое. Окраска верхней поверхности гриба обычно светло-бурая, на перезрелых образцах серо-оливковая, с более или менее ясно выраженной зонистостью и темным, почти черно-коричневым наружным краем. Гимениальный слой образуется из плотностоящих, ровных, тонких, коричнево-бурых шипов. Шляпки гриба обычно с латеральной ножкой. Кроме того, найден двойной, сросшийся экземпляр гриба, из которых один почковидный, с латеральной ножкой, тогда как другой грибок имеет воронковидную шляпку с правильно расположенной центральной ножкой.

7. *Irpex lacteus* Fr. Mig. Krypt. Fl. Deutsch. B. III, p. 171; Ячевск. Определ. гриб. I, стр. 587. На сухих ветвях урема (ясень), бассейн залива Восток, селение Душкино, 23 VIII.

Собраны весьма типичные образцы этого вида *Irpex*. Плодовые тела распростерты по субстрату с отвернутым наружу краем. Верхняя поверхность волосистая, беловато-желтоватая, зонистая. Гимениальный слой образован из удлиненных, по краю рассеченных выступов, желтоватой окраски. Базидиоспоры отделяются на собранных образцах в изобилии. Размеры их колеблются между 4—5 μ дл. и 2—3 μ шир.

Polyporaceae.

8. *Poria Friesiana* Bres. Annal. Mus. 1908, p. 40. На дубах, бассейн р. Майхе, сел. Майхинское, 15 VIII; бассейн р. Суйфуна, смешанные горные леса по р. Супутинке, перевал к сел. Королевец, 11 VIII.

Гимениальный слой образуется из косо поставленных трубочек с сизоватым оттенком. Мякоть гриба плотная, деревянистая, на разрезе коричневая, от 0,4 до 0,6 см толщ.

9. *Fomes annosus* Fr. Mig. Krypt. Fl. Deutsch. B. III, p. 190. Ячевск. Определ. гриб. I, p. 623. Бассейн р. Майхе, сел. Королевец, смешанный лес по хребту, 9—10 VIII.

Плодовое тело этого гриба неправильной, весьма различной формы, желто-коричневое, поражает основание стволов и корни лиственных и хвойных древесных пород.

10. *Fomes connatus* Fr. Mig. Krypt. Fl. Deutsch. B. III, p. 190; Ячевск. Определ. гриб. I, стр. 623.

Найдено два экземпляра этого гриба, в бассейне р. Майхе, по хребту, близ сел. Королевец, 9 VIII.

Верхняя поверхность плодовых тел сплошь заросла мхом, что является чрезвычайно характерным для этого вида гриба. Как оказалось при исследовании, произведенном бриологом Л. И. Савич, на собранных образцах найдены следующие мхи: *Anomodon minor* (Palis.) Fühnr., *Haplodadium longinerve* (Lindb.) Bröth. и, затем, один какой-то недоразвитый печеночник.

11. *Fomes carneus* Nees. Neum., The Polypor. of Wisconsin, p. 72. На стволах хвойных пород, бассейн р. Суйфуна, с. Ковдра-тенко, смешанный лес, 8 VIII.

Плодовые тела гриба располагаются друг над другом черничато. Они имеют полукруглую форму, твердые, деревянистые, многолетние, около 8—10 см в диам. Верхняя поверхность гриба темно-коричневая, с красноватым оттенком, более заметным по краю; мякоть темно-красновато-коричневая, трубочки гименофора округлые, мелкие частые, красновато-коричневые. Необходимо также добавить, что наружная поверхность гриба не совсем ровная, несколько бугристая, в радиальных складках и морщинах.

Местом обитания *F. carneus* являются восточная и юго-восточная Азия, а также Америка и Австралия. По внешнему облику этот трутовик очень сходен с *Fomes roseus* Fr., от которого он отличается более тонким мясом, а также несколько более темной окраской плодовых тел.

12. *Polystictus hirsutus* Fr. Mig. Krypt. Fl. B. III, p. 226. Залив Восток, с. Душкино, на ясени—*Fraxinus manshurica*, 23 VIII.

13. *Polystictus subdealbatus* Murr. На сухих ветвях, лиственных древесных пород, бассейн р. Суйфуна, смешанные горные леса по р. Супутинке, перевал к лесу Королевец, 11 VIII.

P. subdealbatus очень красивый грибок с блестящей, шелковистой, светло-желтой, тонкомясистой шляпкой, от 3 до 6 см в диам. Плодовые тела гриба при основании довольно резко переходят, в округло-цилиндрическую ножку от 2 до 3 см дл. и 0,4—0,6 см толщ., которая при основании заканчивается вздутием, или же расширением. По окраске ножка одноцветна с шляпкой. Мякоть очень тонкая, почти белая. Трубочки гименофора мелкие, тонкостенные, иногда косо поставленные.

Гриб определен путем сравнения с гербарными, имеющимися в Институте Спорных Растений образцами, собранными неизвестным лицом в конце прошлого столетия на Филиппинских островах, с которыми он оказался вполне сходен, как по внешнему облику, так и по микроскопическому строению. Однако, необходимо при этом отметить, что базидиоспор ни в Уссурийских, ни в гербарных образцах совсем не оказалось. Что касается формы и размеров

базидий, а также строения субгимениального слоя, то в обоих случаях они оказались вполне тождественными.

14. *Polystictus versicolor* Fr. Sacc. Syll. Fung. VI, p. 253. Mig. Krypt. Fl. B. III, p. 225. Смешанные горные леса, по р. Сузуньке, перевал к с. Королевец, 11 VIII; смешанные горные леса, бассейн р. Даубихе, Хомяковский хутор, 9 VII; бассейн Уссурийского залива, дубовый лес, VIII; Уссурийский залив, Петровка, дубовый лес, 19 VIII; на стволах лиственных пород, Приморская область, долина р. Монгуая, Барабаш, 1909 (В. П. Савич).

15. *Trametes Dickinsii* Berk. Sacc. Syll. Fung. IX, p. 196. Дубовый лес, залив Восток, селение Новолитовское, 25 VIII. Шляпки гриба полукруглые, серовато-бурые, с резко выраженными, concentрическими зонами, с наружной поверхности с небольшими вздутиями и выступами, от 5 до 10 см в диам. Мякоть желтовато-бурая, плотная, Гимениальный слой образуется из слоя толстостенных округлых пор, одноцветных с верхней поверхностью шляпки.

Местом обитания для *T. Dickinsii* указана Япония и Северная Америка. Гриб живет на стволах и ветвях различных лиственных пород. По внешнему своему облику *T. Dickinsii* имеет сходство с *Daedalea confragosa* Pers., встречающейся преимущественно в Северной Америке. Однако, как оказалось при сравнении Уссурийских образцов *T. Dickinsii* с весьма типичными образцами *Daedalea confragosa*, собранными 10 X 1925 В. Валенковой в Приморской Области, Владивост. у., близ с. Заречье и присланными в Институт Спорных Растений для определения, эти грибы легко различаются, несмотря на сходственные внешние признаки. Так, напр., верхняя поверхность *Tr. Dickinsii* значительно темнее и при том уже с заметно более интенсивно выраженной зонистостью, чем у *D. confragosa*. Затем, мякоть гриба *D. confragosa* несколько светлее и вдвое толще по сравнению с мякотью *T. Dickinsii*. Кроме того, гименофор *D. confragosa* образуется из тонкостенных, лабиринтообразных, иногда глубоко расщепленных ходов, тогда как у *T. Dickinsii* он состоит из округлых траметоидных, утолщенных пор.

16. *Daedalea quercina* Fr. Mig. Krypt. Fl. B. III, p. 237. В дубовом лесу, Уссурийский залив, VIII.

17. *Daedalea styracina* Henn. Бассейн залива Америка. с. Находка на горном гнилом дереве, 30 VIII.

Плодовое тело распростертое, светло-бурое, с сероватым оттенком, от 10 до 12 см дл. и 5 см в диам. Ходы сильно-извилистые, короткие, лабиринтообразные. Край плодового тела тупо-округлый, буро-коричневый, несколько отстает наружу от питающего субстрата.

Японский вид. Определен по имеющимся в Отделе Микологии и Фитопатологии им. А. А. Ячевского, образцам *D. styracina* гербария Bresadola, которые были собраны в Японии в 1910 г.

18. *Daedalea unicolor* Fr. Mig. Krypt. Fl. B. III, p. 236. Уссурийский залив, VIII; бассейн р. Майхе, с. Королевец, смешанный лес, 10 VIII.

19. *Lenzites tricolor* Fr. Mig. Krypt. Fl. B. III, p. 239. Уссурийский залив.

Очень красивый гриб, с черепчатой расположенными, красновато-коричневыми плодовыми телами, зоны которых не совсем ясно выражены. Пластинки гименофора радиальные, с неровным, расщепленным краем.

Agaricaceae.

20. *Panus rudis* Fr. Mig. Krypt. Fl. B. III, p. 373. Бассейн р. Даубихе (Уссури), хут. Хомякова, смешанные горные леса, по р. Угединце, 9 VII; бассейн р. Даубихе, сел. Известка, смешанные горные леса, 29 VI.

Собран обильный материал этого гриба. Плодовые тела весьма разнообразной формы, варьирующей от почковидной до широко воронкообразной, сухие, с лохмато-волосистой поверхностью, с завернутым наружу краем, светло-желто-бурые, достигающие от 3 до 7 см в диам. Пластинки гименофора нисходящие, частые, узкие, одноцветные с шляпкой. Ножка латеральная, у некоторых экземпляров почти центральная, сильно волосистая, при основании часто расширенная. Как оказалось при микроскопическом исследовании базидиоспоры отделяются в изобилии. Кроме того, при анализе волосков покровных тканей было обнаружено, что они состоят из вертикально поднимающихся, светло-бурых грибных гиф, которые соединяются в довольно плотные конической или цилиндрической формы пучки, от 1 до 2 мм дл. 0,3—0,5 мм шир. при основании. По периферии их отделяются короткие концы гиф, от которых пучки кажутся лохматыми.

L. A. Lebedeva.

Die von V. L. Komarov im Jahre 1913 in der Süd-Ussurischen Gegend gesammelten Pilze.

(Resumé).

Vorliegendes Verzeichniss enthält 21 Pilzarten. In dieser Anzahl soll das Vorhandensein der *Hirneola cochleata* Fr. auf Eichenstämmen hervorgehoben werden. Ausserdem ist auch das Vorhandensein folgender Pilze wichtig: *Fomes carneus* Nees, *Polystictus subdealbatus* Murr., *Trametes Dickinsii* Berk. und *Daedalea styracina* Henn., da bis jetzt blos Japan, China und America als deren Fundort angegeben worden waren.

3. Листья сравнительно большие, ланцетные, широкие, при основании сужены в широкий короткий черешок. Цветки скучены в густые щиткообразные соцветия окруженные зелеными верхними листьями.

D. barbatus L.

— Листья узкие линейные, или линейно-ланцетные; если же листья относительно широкие, то они маленькие (около 5—7 мм. ширины при длине в среднем 15—18 мм.). Цветки в рыхлом соцветии, или если сближены в густые головки, то окружены более или менее кожисто-пленчатыми верхними листьями 4

4. Пластинки лепестков более чем до одной трети их ширины рассечены на длинные бахромки. Сросшиеся влагалища листьев не бывают очень длинными. Цветки не скучены в густые головки (редко сближены по три на верш веточек) 5

— Пластинки лепестков не рассечены на бахромки, но цельнокрайные или чаще более или менее глубоко зубчатые 8

5. Пластинки лепестков глубоко-зубчатые почти бахромчатые, крупные белые или розоватые. Прицветники овальные, стянутые в относительно длинные до половины длины чашечки остроконечия.

D. fragrans M. B.

— Пластинки лепестков бахромчатые, т. е. глубоко рассеченные и вообще комплекс признаков иной 6

6. Прицветники кожистые, твердоватые, широкие, обратно-овальные, с ланцетными отогнутыми и твердыми, резко ограниченными от основной широкой части прицветника остроконечиями. Пластинка лепестков бледная, но внутри близ зева с красными точками, втрое короче чашечки, до середины бахромчатая.

D. libanotis Labill.

— Прицветники прижатые, не бывают особенно твердыми 7

7. Пластинка лепестков маленькая, розовая, до середины бахромчатая, чаще перисто-бахромчатая (а не пальчато, как всегда у следующего вида). Прицветников 6—8. Растение внизу заметно древеснеющее.

D. orientalis Sims.

— Пластинка лепестков средней величины, белая, почти до основания рассеченная на многочисленные длинные бахромки, (всегда голая). Прицветников 4—6. Растение при основании древеснеющее, но обыкновенно менее предыдущего вида.

D. crinitus Sm.

Г. А. Преображенский.

Предварительная таблица для определения Крымско-Кавказских видов р. *Dianthus L.*

Preobrashensky, G. A.

Eine Taibelle zur Bestimmung der Kaukasischen und Krymschen Arten der Gattung *Dianthus L.*

1. Растения однолетние или двухлетние (монокарпические); более или менее опушенные. Верхние листья травянистые. Цветки обыкновенно скучены в более или менее плотные щиткообразные соцветия. Листья узкие линейные или линейно-ланцетные 2

— Растения многолетние. Цветки одиночные или в рыхлом, раскидистом соцветии, или если сближены в густые головчатобразные соцветия, то окружены более или менее кожисто-пленчатыми верхними листьями; если же верхние листья окружающие плотное густое соцветие зеленые, то стеблевые листья широкие к основанию суженные в короткие черешки 3

2. Стебель опушен очень жесткими короткими и густыми волосками, на ощупь сильно шероховатый. Чашечка 10—15 мм. длины. Прицветники большей частью резко оттянуты в длинные остроконечия.

D. pseudarmeria M. B.

— Стебель более или менее шерстистый, т. е. опушен мягкими, часто изогнутыми, 0,5—1 мм. длины волосками. Чашечка длиннее чем у предыдущего вида 16—20 мм. длины. Прицветники более или менее постепенно оттянуты в длинные остроконечия.

D. armeria L.

8. Пластинки лепестков белые, желтоватые, или розовые, по внешнему краю цельнокрайные или зубчатые, всегда голые, т. е. лишенные волосков у зева. Цветки на стеблях одиночные или в рыхлых соцветиях 9

— Пластинки лепестков кирпично-красные, красные, или розовые или белые; по внешнему краю зубчатые; по внутренней поверхности особенно близ зева опушенные волосками. Цветки в рыхлом соцветии, или скучены в головки, в последнем случае лепестки могут быть иногда и голыми 16

9. Пластинки лепестков сверху белые, снизу зеленоватые, желтоватые или грязно-желтоватые 10

— Пластинки лепестков сверху и снизу одинаковой окраски, белые, розоватые или розовые 12

10. Чашечка длинная 20—30 мм. длины, относительно узкая и правильно цилиндрическая, реже к концу цветения по средине длины утолщенная 11

— Чашечка короткая 10—15 мм. длины, ниже середины толще, а кверху сужена. Пластинка лепестков 6—7 мм. длины и 3—4 мм. ширины.

D. pallens Sibth. et Sims.

11. Пластинка лепестков равна по длине почти всегда половине длины ноготка. Лепестки сверху чисто белые (Предкавказье и Дагестан).

D. leptopetalus Willd.

Пластинка лепестков равна по длине одной четверти длины ноготка. Лепестки сверху грязно-палевые (Долина Чороха).

D. tschorochensis G. Preobr.

12. Пластинка лепестков глубоко зубчатая, почти бахромчатая 13

— Пластинка лепестков зубчатая, реже цельно-крайная, или почти цельнокрайная 14

13. Пластинка лепестков маленькая в четыре раза короче чашечки, узкая с 4—6 бахромчатообразными зубчиками. Прицветники постепенно заостренные, обычно короче половины длины чашечки. Стебли ветвистые.

D. floribundus Boiss.

— Цветки более крупные, чем у предыдущего вида; чашечка около 25 мм. Пластинка лепестков обычно с большим, чем у предыдущего вида числом бахромчатообразных зубчиков. Прицветники удлинненно-яйцевидные с шпловидными остроконечиями равными по длине половине чашечки, редко доходящими до ее зубцов. Стебли простые или мало ветвистые.

D. fragrans M. B.

14. Прицветники овальные усеченные, наверху с весьма маленьким острием, или совсем без него; длина прицветников приблизительно равна одной четверти длины чашечки.

D. elongatus C. A. M.

— Прицветники более или менее постепенно вытянуты в остроконечия длиной до половины длины чашечки, или длиннее (иногда короче до одной трети). Если же острия резко отграничены от основной части прицветника, то эти острия длинные 15

15. Пластинка лепестков белая, по внешнему краю довольно глубоко зубчатая. Чашечка длинная (в среднем около 30 мм. длины). Стебелевые листья широко-линейные 5—7 нервные, верхние не уменьшенные, превышающие цветок.

D. talyschensis Boiss. et Buhse.

Пластинка лепестков белая или розовая цельнокрайная или по внешнему краю слегка городчато-зубчатая. Чашечка разнообразной длины. Листья узколинейные одно или трехнервные; листья верхних пар укороченные.

D. Liboschitzianus Ser.

16. Цветки одиночные или в рыхлом, раскидном соцветии, или если несколько иногда сближены то верховые листья зеленые. Сросшиеся влагалища листьев короткие 17

— Цветки скученные в более или менее плотные ложноголовчатые соцветия, окруженные при основании более или менее кожисто пленчатыми верхними листьями. Сросшиеся влагалища листьев длинные 23

17. Растения образующие дерновинки. Прицветников или два (высокогорный вид), или если больше (4—6), то или листья маленькие и сравнительно широкие (примерно 5—7 мм. ширины при длине 15—18 мм.), или при основании растения пучки линейно-шпловидных почти колючих растопыренных листьев. 18

— Растения с относительно узкими и длинными листьями; при основании не бывает упомянутых пучков шиловидных, почти колючих листьев. Прицветников не менее четырех (4—8) . . . 20

18. Листья ланцетные, короткие, но широкие (средние стеблевые около 5—7 мм. ширины и 15—18 мм. длины. Прицветники (их большей частью четыре) формой и консистенцией довольно напоминают листья. Цветки похожи на *D. chinensis* subsp. *montanus*, но лепестки с менее развитым опушением.

D. sp. nova Markovitsch.

— Листья относительно узкие и длинные. Если растение высокогорное, то прицветников два. 19

19. Растение ксерофильное: при основании пучки растопыренных линейно-шиловидных, килеватых, почти колючих листьев. Прицветников 4—6.

D. humilis Willd.

— Растение высокогорное. Листья более или менее плоские, мягкие. Прицветников два.

D. Raddeanus Vierh.

20. Цветки в диаметре сравнительно крупные, на ветвях одиночные, или нередко более или менее сближенные, иногда даже с слегка окутывающими их верхними листьями. Чашечка сравнительно широкая 3—5 мм. ширины.

D. chinensis L. subsp. montanus (D. C.)

— Цветки в диаметре менее крупные нередко совсем мелкие; обыкновенно или одиночные на стеблях или всего чаще в рыхлом, раскидном соцветии; если же цветки несколько сближены на концах стеблей, то чашечки узкие и длинные (17—20 мм.) и прицветники с остроконечиями, доходящими до зубцов чашечки . 21

21. Чашечка длинная 17—20 мм. длины. Прицветники с остроконечиями доходящими до зубцов чашечки.

D. campestris M. B. subsp. guttatus (M. B.) Schmlh.

— Чашечка короче 8—17 мм. длины. Прицветники в два—четыре раза короче чашечки 22

22. Цветки маленькие, большей частью белые или реже розоватые. Чашечка длиной 8—13 мм.

D. campestris M. B. subsp. pallidiflorus Ser.

— Цветки средней величины. Чашечка длиной около 10 мм. Венчик большей частью розовый, или красноватый, редко белый.

D. campestris M. B. s. stricto.

23. Влагалища верхних листьев расширенные, даже как бы вздутые. Как верхние листья сильно окутывающие головку, так и прицветники с широкой основной частью большей частью сразу стянутой в зеленое остроконечие. Пластинка лепестков вдвое короче ноготка.

D. capitatus Balb. (in DC.)

— Влагалища верхних листьев не вздуты, и не расширены особо. Прицветники разнообразны по форме, чаще иные чем описанные у предыдущего вида 24

24. Пластинка лепестков розовая, красная или пурпуровая, равна по длине по крайней мере половине длины чашечки, или иногда длиннее половины длины чашечки 25

— Пластинка лепестков в 3—4 раза короче ноготка, ярко кирпично-красная. Прицветники сразу стянуты в остроконечия большей частью (хотя не всегда) короче половины длины чашечки.

D. calocephalus Boiss.

25. Прицветники сверху постепенно суженные, по длине приблизительно равные чашечке. Пластинка лепестков едва зубчатая. Сросшиеся влагалища листьев относительно не длинные (только раза в 3 длиннее диаметра стебля). Самые листья не длинные.

D. carmelitarum Reuter (in Huet)

— Прицветники обычно сразу стянуты в остроконечия, или последние вообще мало выражены, но тогда прицветники вдвое-втрое короче чашечки. Сросшиеся влагалища листьев в 4—8 раз длиннее поперечника стебля (или листа) 26

26. Прицветники бурые или буро-красные, сразу стянутые в тонкие остроконечия, т. е. прицветники резко разграничены на основную обратно-овальную часть и сравнительно длинное острие. Вместе с острием прицветники обычно до половины длины чашечки или длиннее.

D. carthusianorum L.

— Прицветники большей частью бледные, желтоватые или зеленоватые, пленчатые или пленчато-окаймленные, с коротким острием (или иногда совсем без него), вместе с которым прицветники до одной трети или до половины длины чашечки.

D. polymorphus M. B.

А. А. Красноруцкая.

О сборах Р. Р. Поле в Архангельской и Вологодской г.г.

Krassnorutzkaja A. A.

Einige Pflanze, die Dr. R. Pohle in Gouv. Archangelsk und Wologda in den Jahren 1905—7, 1909 und 1911 sammelte.

Обработывая в гербарии Ботанического Сада под руководством проф. Б. А. Федченко дублетные сборы Р. Р. Поле за 1905—1907, 1909 и 1911 гг. и, ознакомившись с его же сборами, имеющимися в основном отделении гербария, я выделила некоторые редкие для Архангельской и Вологодской губ. (где производились сборы) растения и список их привожу ниже:

1. *Stellaria longifolia* Mühlenb. (St. Friesiana Ser.). Собрано в 1905 г. 7 VI на р. Мыле. Для северо-востока Архангельск. губ. ранее не было указано.

2. *Cerastium davuricum* Fisch. Собрано в 1907 г. 19 VIII на р. Щугор Вологодской губ. Ранее указывалось лишь для Усть-Сысольского у. Вологодской губ. и Тиманского края. (Иваницкий, Перфильев).

3. *Cerastium arvense* L. var. *angustifolium* Fenzl. Найдено на р. Щугор в 1907 г. 9 VIII. Существует указание лишь для г. Грязовец Вологодской губ.

4. *Cerastium Fischerianum* Ser. Найдено на р. Щугор в 1905 г. 22 VII, близ Тельпос-из 1907 г. 1 VIII. Является редкостью для губернии и было собрано без точного указания местонахождения «по р. Печере и притокам» (Перфильев и Ширяев «Флора Вологды и ее окрестностей»).

5. *Sagina Linnaei* Presl. На р. Слеже близ Повенца в 1909 г. и в 1907 г. 13 VIII близ Тельпос-из. Не южнее Кольского полуострова указывает Hjelt. В восточной части Вологодской губ. найдено Поле впервые.

6. *Alsine verna* Bartl. var. *hirta* Led. Найдено по р. Щугору в 1907 г. 7 VIII. Перфильев указывает для Урала, без более точного указания места сбора. Иваницкий и Бекетов указывают не южнее г. Холмогоры.

7. *Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl. Собрано в 1905 г. 8 VI на р. Мыле и 7 VI на р. Суле (67° с. ш.). Самое северо-восточное местонахождение.

8. *Melandrium pratense* Roehl. (*Lychnis alba* Mill., *L. pratensis* Spreng). По рр. Суле и Сейде в 1905 г. 3 VI и 29 VII. Для северо-восточной части Архангельской губ. ранее не указывалось.

9. *Melandrium apetalum* (L.) Fenzl. (*Lychnis apetala* L.). Собрано по р. Уссе в 1905 г. 17 VIII (66° с. ш.). Указывалась для Урала и ранее, но не южнее 68° с. ш.

10. *Ranunculus natans* C. A. M. (*R. Pürschii* Hooker). Собрано в 1905 г. 16 V на р. Печере (ст. Сосновская) и 1 VIII у хребта Янганынай (57° с. ш.). Найдено было Н. И. Кузнецовым у Шенкурска (62° с. ш.), где и была проведена его северная граница. Согласно сборам Поле эта граница в восточной части Архангельской губ. может быть отмечена на 5° севернее.

11. *Ranunculus sulphureus* Soland. (*R. nivalis* var. *sulphureus* Ldb). Собрано Поле на Урале: Пай-яр в 1905 г. 7 VIII и Тельпос-из в 1907 г. 13 VIII; указывается для крайнего севера, р. Онеги и близ Вологды (последнее указание дается Перфильевым с отметкой «собирал сам»).

12. *Thalictrum kemense* Fries. Собрано близ г. Вельска Вологодской губ. Для губернии является редкостью. Имеется лишь одно указание для Ухтенского района.

13. *Sibbaldia procumbens* L. Селение Усть-Щугор Вологодск. губ. в 1905 г. 2 VII. Для этой губернии является первым указанием, хотя отмечается для Архангельской и Пермской губ. (Урал).

14. *Sanguisorba officinalis* L. var. *polygama* Nyl. Гора Тельпос-из (64° с. ш.). Южнее 66° 45' для Урала не было указано.

15. *Epilobium alpinum* L. Усть-Щугор Вологодской губ. в 1905 г. 29 VII. Для этой губернии ранее не указывалось.

16. *Epilobium latifolium* L. Найдено на р. Щугор в 1905 г. 2 VII. Для Вологодской губ. не указывается.

17. *Cornus suecica* L. Собрано в 1907 г. на р. Щугор. Самое восточное указание для Вологодской губ. для которой Перфильев под сомнением указывает Усть-Сысольск.

18. *Gentiana detonsa* Rottb. (*G. serrata* Gunn.). Усть-Щугор в 1905 г. 29 VII Вологодской губ. Для Урала указывается не южнее 66° с. ш., т. е. для Архангельской губ. Для Вологодск. губ. указывается впервые.

19. *Limosella aquatica* L. Найдено на р. Лыже (приток Печеры) в 1907 г. 29 VIII и на р. Уссе 28 VIII 1905 г. До этого для восточной части Архангельской губ. указано не было.

20. *Pedicularis compacta* Stephan. 1907 г. 16 VIII близ Усть-Сысольска, тогда как вообще указывается для альпийской области Урала.

21. *Rumex fennicus* Murb. 1906 г. Вельск Вологодской губ. Для губернии является редкостью, т. к. имеется лишь одно указание Перфильева для Вологды («собирал сам»).

22. *Senecio campestris* D. C. Собрано в 1905 г. 29 VII у селения Усть-Шугор. Для Вологодской губ. указывалось лишь в западной части Усть-Сысольского уезда.