

АСТА
HORTI PETROPOLITANI.

ТОМУС XXI.

ТРУДЫ
ИМПЕРАТОРСКАГО
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО БОТАНИЧЕСКАГО САДА

ТОМЪ XXI.

(Изданъ подъ редакціей В. И. Липснаго.)

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-литографія „Герольдъ“ (Вознесенскій пр. № 3).
1903.

СОДЕРЖАНИЕ.

Выпускъ I.


- Krylov P., Plantae altaicae novae. I. (tab. I — V) 1 — 12
Krylov P., Plantae altaicae novae. II 13 — 18
Pohle R., Pflanzengeographische Studien über die Halbinsel
Kanin und das angrenzende Waldgebiet. Mit 4 Karten
und 2 Abbildungen. Theil I, Cap. I — III 19 — 130

Выпускъ II.

- Вольфъ Э. Л., Материалы для изучения ивь Азиатской
России. I. (Съ рис. въ текстѣ) 131 — 197
Палибинъ И. В., Материалы для флоры Гуань-дунского полу-
острова. (Palibin I., Mater. ad floram peninsulae
Guan-dun) 199 — 232

Выпускъ III.

- Федченко О. А., Флора Памира. Собственный изслѣ-
дований 1901 г. и сводъ предыдущихъ. (Съ картой
Памира) 233 — 471
Index alphabeticus specierum et synonymorum tomii XXI. 473 — 493
Corrigenda (опечатки) 495



АСТА
HORTI PETROPOLITANI.

TOMUS XXI.
FASCICULUS III.

ТРУДЫ
ИМПЕРАТОРСКАГО
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО БОТАНИЧЕСКАГО САДА.

ТОМЪ XXI.
ВЫПУСКЪ III.

СОДЕРЖАНИЕ:

Федченко О. А., Флора Памира. Собственные изслѣдованія 1901 г. и сводъ предыдущихъ. (Съ картой Памира)	233—471.
---	----------

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-литографія „Городъ“ (Вознесенскій пр. № 3).
1903.

ФЛОРА ПАМИРА.

Собственные изслѣдованія 1901 года

и

сводъ предыдущихъ.

О. А. Федченко.

п2778

п 5692

Библиотека Императорского
Филиала АН СССР

Печатано по распоряжению Императорского СИБ. Ботанического Сада.

Предисловие.

Предлагаемый трудъ составленъ на основаніи данныхъ трехъ родовъ: въ 1-хъ) сводки тѣхъ указаний, которыя имются для флоры Памира въ ботанической литературѣ, во 2-хъ) обработки того гербарного материала, собраннаго другими, который я могла изслѣдовать, и въ 3-хъ) личныхъ наблюдений на мѣстѣ, во время своего путешествія на Памиръ и въ Шугнанъ въ 1901 году.

Литературия дания состоять изъ нѣсколькихъ небольшихъ списковъ Памирскихъ растеній и изъ отдѣльныхъ указаний, встречающихся въ монографическихъ и критическихъ работахъ по флорѣ Туркестана. Такихъ списковъ издано три, и четвертый печатается.

1. Первымъ по времени появился въ 1896 году списокъ Франше (A. Franchet, Note sur une collection de plantes, rapportées du Pamir en 1894 par M. E. de Poncins („Bull. du Muséum d'Histoire naturelle“, Paris, 1896, № 7, p. 342—347).

Въ немъ перечислено 106 видовъ изъ четырехъ мѣстностей, изъ которыхъ одна (перевалъ Талдыкъ въ Алайскомъ хребтѣ, исключительно на немъ собрано 33 вида) не относится, однако, къ Памиру, а другая (перевалъ Кизылъ-артъ) относится къ нему лишь отчасти: съверный склонъ перевала, съ болѣе богатой растительностью — алайскій, а южный — памирскій. Этотъ же списокъ, съ добавленіемъ одного вида, повторенъ въ „Chasses et explorations dans la région des Pamirs, par le Vicomte Edmond de Poncins“, Paris 1897.

2. Второй списокъ, *Duthie, A list of the plants collected on the Pamirs (in Alcock, Report on the natural-history results of the Pamir Boundary Commission"*, p. 72—83), вышедши въ 1898 г. въ Калькуттѣ, заключаетъ 106 видовъ, изъ которыхъ только для $\frac{1}{5}$ указаны мѣстности; для большинства же приводится только высота или общее обозначение „Памиръ“, „Большой и Малый Памиръ“. Цѣнины въ этомъ спискѣ указания на характеръ мѣстностей, въ которыхъ собраны образцы растений.

3. Третій списокъ, вышедши въ 1900 г., *Б. Федченко, Материалъ для флоры Памира и Алайскаго хребта* (Приложение къ „Землевѣдѣнію“ 1900 г., кн. 1) значительно полнѣе предыдущихъ: онъ заключаетъ 226 номеровъ, изъ которыхъ одна треть алайскихъ, и двѣ трети, до 150 видовъ, памирскихъ. Растенія, въ немъ перечисленныя, собраны въ 1892 г. П. С. Назаровымъ. Мѣстонахожденія большую частью обозначены, и только Бордаба, лежащая на сѣверномъ склонѣ Заалайскаго хребта, то есть еще на Алаѣ, и Сарыташъ не вѣро отнесены къ Памиру.

4. Наконецъ, четвертый списокъ (печатается): *О. Федченко, Растенія Памира, собранныя Б. А. и О. А. Федченко въ 1901 г. („Материалы къ познанію фауны и флоры Российской Имперіи“, Ботанический выпускъ 5-й)*, содержитъ 260 видовъ, въ томъ числѣ нѣсколько мховъ, лишайниковъ и водорослей.

Изъ коллекцій памирскихъ растеній первою по времени является гербарій полковника А. А. Кушакевича, ботаника Ферганской Ученой Экспедиціи 1878 года, состоявшей подъ начальствомъ Н. А. Сѣверцова и таکъ много сдѣлавшей для ботаническаго изслѣдованія Памира, что она можетъ съ одинаковымъ правомъ называться Памирской. Кушакевичъ пробылъ на Памирѣ $1\frac{1}{2}$ мѣсяца (съ 22. VII. по 8. IX.); кроме него собирали растенія его помощникъ — Юндашъ Ашурбаевъ, отчасти г. Козловскій и сотникъ И. И. Скорняковъ, препараторъ Сѣверцова. Скорняковъ мало времени провелъ собственно на Памирѣ, но много работалъ въ окрестныхъ горахъ, особенно въ Алайскомъ хребтѣ, а также въ равнинной части Ферганы, гдѣ ботанический сборъ его начался еще съ марта. При предварительной раз-

(4)

боркѣ гербарія Ферганской Экспедиціи въ Императорскомъ Ботаническомъ Саду, на большинствѣ растеній писалось: „Pamir, Kuschakewicz“, что часто противорѣчило подлиннымъ этикеткамъ Кушакевича и Скорнякова и повело ко многимъ ошибкамъ, проникшимъ въ печать (въ работы Huth'a, К. Винклера, Э. Регеля, В. Комарова). Гербарій Кушакевича былъ большей частью не обработанъ и я очень счастлива, что могла включить его данные въ настоящій трудъ.

Гербарій Горнаго Инженера (нынѣ Начальника Иркутскаго Горнаго Управленія) Д. Л. Иванова невеликъ по числу видовъ (около 150 видовъ съ Алая и Памира вмѣстѣ), но интересенъ и по времени сбора (1883 г.), какъ одинъ изъ первыхъ для Памира, и по обширности пройденного авторомъ маршрута, и по точному указанию мѣстонахожденій. Онъ принадлежитъ Императорской Академіи Наукъ; я могла воспользоваться изъ него для настоящей работы лишь нѣсколькими семействами.

Въ 1888 и 1889 гг. былъ на Памирѣ капитанъ (нынѣ генераль-маиръ) Б. Л. Громбѣцкій, собравшій нѣсколько растеній, которые находятся въ Императорскомъ Ботаническомъ Саду.

Еще важнѣе для насъ маршрутъ капитана К. А. Брѣзинскаго, исколесившаго въ 1891 и 1892 гг. Памиръ по всѣмъ направлениямъ и заходившаго на Гиндукушъ. Его гербарій принадлежитъ Императорскому Ботаническому Саду и вошелъ въ настоящую работу.

Въ 1892 г. былъ на Памирѣ П. С. Назаровъ; гербарій его, обработанный Б. Федченко (см. выше), я видѣла весь и данными его воспользовалась; онъ принадлежитъ Императорскому Московскому Университету.

Въ 1893 г. собирая растенія на Памирѣ Roncins; обработалъ ихъ Франше (см. выше). Гербарій этотъ принадлежитъ Музею Естественной Исторіи въ Парижѣ.

Въ 1895 г. посѣтила Памиръ экспедиція графа А. А. Бобринскаго; при этомъ зоологъ экспедиціи, Н. В. Богоявленскій, собралъ нѣсколько растеній, также вошедшихъ въ настоящій списокъ.

Въ 1895 же году былъ на Памирѣ въ первый разъ академикъ С. И. Коржинскій, и провелъ тамъ 3 дня (8—11

(5)

юля); часть собранного материала обработана имъ самимъ и опубликована въ его „Очеркахъ растительности Туркестана“ (Записки Импер. Акад. Наукъ. Физ.-мат. отд., томъ IV, № 4, стр. 112 + 2 табл. рис., 1896 г.).

Въ томъ же 1895 г. работала на Памиръ русско-англійская разграничительная Комиссія; растенія собирались Alcock, находившійся при англійскомъ отрядѣ; обработаны ихъ Duthie (см. выше).

Въ 1897 году С. И. Коржинскій посѣтилъ Памиръ вторично; на этотъ разъ онъ пробылъ тамъ не менѣе трехъ недѣль (8—23 юля и въ концѣ августа). Ботаническіе результаты этого путешествія отчасти опубликованы имъ самимъ (*Korshinsky, Fragmenta florae Turkestaniae. Plantae novae vel minus cognitae Turkestaniae describuntur*, въ „Извѣстіяхъ Импер. Акад. Наукъ“ 1898, декабрь, т. IX, № 5, стр. 399—424). Гербарій Коржинскаго представляетъ очень цѣнныи материалъ для флоры Памира, какъ по полнотѣ и прекрасному состоянію растеній, такъ и по точности указанія мѣстонахожденій и характера мѣстностей. Часть дублетовъ его принадлежитъ Императорскому Ботаническому Саду, весь же гербарій — Академіи Наукъ; изъ гербарія Академіи Наукъ я имѣла возможность включить въ настоящій трудъ лишь нѣсколько первыхъ семействъ (*Ranunculaceae*—*Caryophylleaceae*).

Въ 1898 и 1899 гг. на Памиръ была Датская экспедиція О. Олусена; растенія, собранныя при этомъ Наульсеною, обрабатываются разными специалистами. До сихъ поръ опубликованы *Caryophyllaceae*, обработанные Винклеромъ (*Caryophyllaceas in Asia centrali a cl. Ove Paulsen lectas determinavit Dr. Hubert Winkler, in „Vidensk. Medd. fra den naturh. Foren. i Kjobenhaven, 1901, стр. 47—54)* и *Ranunculaceae*, обработанные Остенфельдомъ (*C. H. Ostenfeld, Ranunculaceae collected by Ove Paulsen during the Danish Expedition to Asia Media in 1898—1899. January 1902, in „Vidensk. Medd. fra den naturh. Foren. i Kjobenhaven, 1901*).

Въ 1899 же году составленъ небольшой гербарій (около 60 видовъ) Надеждой Вельманъ, дочерью доктора Памирскаго отряда, Э. Г. Вельманъ. Растенія собраны ею частично дорогой изъ Маргелана на Памирской пость, главнымъ же образомъ около самого Памирскаго Поста.

(6)

Въ 1901 году удалось, наконецъ, и миѣ попасть на Памиръ, для изслѣдованія его флоры, по порученію Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, совмѣстно съ Б. А. Федченко, командированнымъ въ Туркестанъ Ими. Русскимъ Географическимъ Обществомъ и Ими. Ботаническимъ Садомъ. Участникъ нашей экспедиціи, кандидатъ Московскаго Университета, студентъ Сельско-хозяйственнаго Института М. И. Тулиновъ, главной задачей которого было изслѣдованіе почвъ и мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ условій, отчасти собираясь также при этомъ растенія и фотографировалъ. Обширный гербарій и личные наблюденія, собранные во время пребыванія нашего на Памирѣ, въ связи съ предыдущими изслѣдованіями, и дали миѣ возможность приступить къ изданію „Флоры Памира“.

Маршрутъ нашей экспедиціи былъ слѣдующій: мы вышли изъ Оша, Ферганской области, 25 юля и, черезъ перевалъ Чигирчикъ, прибыли 27 юля въ Гульшу; оттуда, черезъ перевалъ Талдыкъ (1 юля), въ уроціще Сарыташъ въ верхней (восточной) части Алай, и затѣмъ, 2-го юля, въ Бордабу, на сѣверномъ склонѣ Заалайского хребта. 3-го юля, черезъ перевалъ Кизыль-артъ (14.600'), вступили на Памиръ (Памиръ-Харгоши, т. е. заячий). Ночевали въ уроціщѣ Маркансу; 4-го юля перешли на озеро Кара-куль, гдѣ пробыли до 6-го. 6-го юля мы были на покрытой снѣгомъ рѣкѣ Мусколъ и ночевали въ рабатѣ того же имени. 7-го сдѣлали маленький переходъ до подошвы перевала Акъ-Байталъ, гдѣ чрезвычайно интересный сборъ (между прочимъ новый видъ *Androsace*) былъ сдѣланъ на берегу небольшой рѣчки, текущей изъ лѣдника; 8-го юля перешли черезъ Акъ-Байталъ (15.700'), альпийская растительность которого въ это время сдво тронулась въ ростъ, и дошли до уроціща Гурумды. 9-го были въ уроціщѣ Чичкты, и 10-го прибыли на Памирской пость (эта часть Памира называется Памиръ-Серезъ). Тамъ сдѣлали нѣсколько интересныхъ экскурсій на кочкарныхъ болотахъ по берегу р. Мургабъ и въ каменистой степи; 15-го черезъ уроціще Джаманъ-талъ на р. Карабу (единственномъ мѣстѣ на Памирѣ, гдѣ насы встрѣтилась древесная растительность — кусты *Salix*), перешли въ уроціще Карабу, и на слѣдующій день, 16-го юля, черезъ высокий (14.300'), но отлогій перевалъ Найза-

(7)

ташъ¹), перешли и въ урочище Чатырь-ташъ на р. Аличуръ (на Памиръ-Аличуръ). 17-го июля дошли до горько-соленаго озера Сассыкъ-куль (вонючее озеро), а 18-го до озера Яшиль-куль² (зеленое озеро). 19 июля пришли въ урочище Ходжа-Назаръ, гдѣ сборъ производился на берегу рѣчки, очень богатой рыбой, оказавшейся, по определению Никольского, обыкновеннымъ на Памиръ видомъ, *Schizopygopsis Stoliczkae Steud.* 20-го июля поднялись на перевалъ Кой-тезекъ (15.100'); Б. А. Федченко сдѣлалъ при этомъ боковую экскурсию, которая дала нѣсколько интересныхъ образцовъ съ альпийскихъ лужаекъ и каменистыхъ розсыпей, лежащихъ выше перевала Кой-тезекъ, до 16.000'. На перевалѣ Кой-тезекъ мы застали полный расцвѣтъ весенней растительности (*Primula*, *Chorispora*, *Draba*); мѣстами лежалъ снѣгъ и около него цвѣла *Gagea*. Съ перевала мы спустились въ ущелье Учъ-коль, лежащее уже въ предѣлахъ Шугана, гдѣ по мѣрѣ спуска растительность стала мѣняться и вскорѣ показались первые кусты ивняка. Пройдя далѣе въ Шуганъ по Гунту до Хорога и до Ишкашима на Пянджѣ, 1-го августа мы вернулись на Памиръ черезъ тотъ же перевалъ Кой-тезекъ, гдѣ къ этому времени уже все отцвѣло. 2-го августа, не заходя на Яшиль-куль, перешли изъ Ходжа-Назара прямо на Сассыкъ-куль; 3-го дошли до Чатырь-таша, 4-го черезъ перевалъ Найза-ташъ, до урочища Карасу, и 5-го августа прибыли на Памирскій постъ; 7-го августа были въ Гурумдахъ и 8-го снова на перевалѣ Акъ-Байталъ; на этотъ разъ мы застали тутъ полный расцвѣтъ растительности и Б. А. Федченко поднимался выше перевала, до 16.400', для сбора альпийскихъ растений; 9-го августа мы дошли до озера Кара-куль и 10-го, черезъ перевалъ Кизылъ-артъ, вышли изъ предѣловъ Памира и ночевали въ Бордабѣ, откуда, съ небольшими измѣненіями прежняго маршрута, чрезъ озеро Купланъ-куль въ Алайскомъ хребтѣ, вернулись 16-го августа въ Ошъ.

¹) Съ которымъ не слѣдуетъ смѣшивать другой памирскій перевалъ Найза-ташъ (близъ р. Шинда), лежащий далѣе на юго-востокъ и посѣщенный въ 1891 году Бражецкимъ.

²) Отъ которого надо отличать другое озеро Яшиль-куль, въ Карагинѣ (Горной Бухарѣ), посѣщенное въ іюнѣ 1889 года Б. Л. Громчевскимъ (осенью того же года онъ же былъ на памирскомъ Яшиль-куль).

Нѣкоторыя подробности о посѣщенныхъ нами мѣстностяхъ будуть приведены въ другомъ мѣстѣ, здѣсь же я привожу, послѣ списка растеній, сравнительную таблицу памирской флоры съ флорой другихъ странъ. Рисунки видовъ, характерныхъ для Памира и его растительности, будутъ приложены къ отдельнымъ оттискамъ настоящей статьи. Высоты, приводимыя мною во „Флорѣ Памира“ для нашего сбора, основаны на наблюденіяхъ, произведенныхъ во время нашей экспедиціи 1901 года Б. А. Федченко, тремя анероидами, и вычисленныхъ благодаря любезному содѣйствію Ю. М. Шокальскаго. Изъ показаній другихъ лицъ я помѣщала тѣ высоты, въ футахъ или метрахъ, какія они сами даютъ въ печатныхъ трудахъ или на этикеткахъ гербарія. Даты привожу по старому стилю. Если данный видъ указанъ для Памира невѣрно, или мѣстность неправильно отнесена къ Памиру, или неточно опредѣленіе, онъ приводится въ моей работе не жирнымъ шрифтомъ, а простымъ (въ разбивку). Послѣ названія вида и цитать изъ тѣхъ авторовъ, которые дали его описание, изъ флоръ Ледебура (*Flora Rossica*), Буасье (*Flora Orientalis*) и Гукера (*Flora of British India*) и изъ монографій, я привожу (подъ рубрикой „указ. для Памира“ и ссылки на тѣ сочиненія, въ которыхъ онъ указанъ для Памира (если есть такія указанія); если указаніе невѣрно, привожу тутъ же поправку. Мѣстонахожденія, для удобства пользованія, привожу въ хронологическомъ порядкѣ. Географическое распространеніе привожу подъ буквою а) для Туркестана, и б) для другихъ мѣстностей.

Границы собственно Памира принимаются различными авторами различно. Пространство, принимаемое за область нашей флоры, обозначено на прилагаемой карте.¹)

Высота мѣстности (12.000'—23.000') надъ уровнемъ моря, малое количество осадковъ, сухость климата, постоянный вѣтеръ, палиющіе лучи солнца, морозы, продолжающееся, по ночамъ по крайней мѣрѣ, большую часть года — вотъ условія, при которыхъ развивается растительность Памира, по своему ксерофильному характеру имѣющей много общаго съ тибет-

¹) Съ любезнаго согласія И. А. Эфрана, карта взята изъ издаваемаго имъ Энциклопедического Словаря.

ской; это, по большей части, многолетние травы или полукустарники, образующие прижатые к земле подушки, низкорослые, съ толстыми корнями, съ листьями узкими, колючими или покрытыми густыми волосками, уменьшающими испарение. Воздѣ воды, по берегамъ рѣкъ и озеръ, она смыняется тоже травянистыми растеніями, свойственными солонцеватымъ кочкарнымъ болотамъ, и только изрѣдка по руслу рѣкъ встречаются жалкие кустики тамариска (*Myricaria*), и въ видѣ исключенія, въ хорошо защищенныхъ мѣстахъ, кусты ивняка. Растительность въ общемъ очень бѣдна и однообразна: за 4 недѣли своего пребыванія на Памире мы вдвое сбрали лишь 260 видовъ, тогда какъ въ сбѣднемъ Шугнанѣ, за 12 дней, число собранныхъ нами видовъ достигло 315.

Въ опредѣленіи растеній нашего собственнаго гербарія приняло участіе нѣсколько ботаниковъ (какъ это изложено подробно въ предисловіи къ „Растеніямъ Памира“ и въ соответственныхъ мѣстахъ „Флоры Памира“). Гербаріи Кушакевича и другихъ авторовъ опредѣлены мною, за исключеніемъ семейства *Papilionaceae*, которое обработано Б. А. Федченко. Какъ и для другихъ работъ за послѣдніе три года, я имѣла постоянную возможность, благодаря Директору Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада, А. А. Фишеру фонъ Вальдгейму, пользоваться богатой библиотекой и обширнымъ гербаріемъ Сада. Только при этихъ условіяхъ я могла выполнить принятую на себя задачу и считаю долгомъ еще разъ выразить здесь признательность лицамъ, оказавшимъ мнѣ свое содѣйствіе.

Ольга Федченко.

С.-Петербургъ,
7-го марта 1903 г.

I. Ranunculaceae.

I. Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. — *Clematis tangutica* (Maxim.). *Korshinsky, Fragmenta florae Turkestaniae* p. 399, № 1. — *Clematis orientalis* L. var. *tangutica*. *Maximowicz, Flora Tangutica fasc. 1*, p. 3. — *Cl. tangutica* (Max. var.) Korsh., *Федченко, О. и Б., Ranunculaceae Русскаго Туркестана* p. 28, № 4.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Материалъ для флоры Памира и Алайскаго хребта, р. 3, № 1 (*Cl. tangutica* Korsh.). — *Korshinsky, Fragmenta* p. 399 (*Cl. tangutica* Maxim.). — *Федченко О.*, Растенія Памира р. 6 № 1 (*Cl. tangutica* Korsh.). — *Ostenfeld, Ran. coll. by Ove Paulsen*, p. 318, № 33 (*Clematis orientalis* L. var. *tangutica* Maxim.).

1878. Въ предгорьяхъ съвернаго прибрежья Каракуля 30. VII; по среднему течению Акъ-Байтала 10. VIII; на Аксу 16. VIII; по дорогѣ отъ Карасу къ Джаманъ-талу и по низовьямъ Карасу 17. VIII (*Кушакевичъ!*). — 1878. У озера Каракуль, на полуостровѣ, 2. VIII (*Скорняковъ!*). — 1883. На озерѣ Малый Кара-куль (Кашгарскій Памиръ) 1. VII цв. (*Д. Л. Ивановъ!*). — 1891. На этикеткѣ гербарія указывается для р. Ваханъ-дарья, но собрано на р. Бай-кара, до 11,000' — уже въ Памире, 25. VII (*Брюселицкий!*). — 1892. Въ верховьяхъ Аличура!; на Акъ-Байталь!; на Карасу; (*Назаровъ!*). — 1897. Близъ озера Рангъ-куль 13. VII цв.; на Памирскомъ Посту 17. VII, цв.; по р. Балынъ-кінкъ 27. VIII, пл. и цв.; (*Боржинский!*). — 1898. Шаджанъ, 3800 метр., 12. VII, цв. и мол. пл. (*Ралисен; non vidi*). — 1901. Р. Мургабъ, осини (*Тулинковъ!*). — 1901. На Памирскомъ Посту 12,650', 11. VII цв.; между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ 12,650—12,450', пл. 12. VII; между Памирскимъ Постомъ и Карасу 12,650—13,100', цв. и пл. 15. VII и 5. VIII пл.; между Карасу и Чатыръ-ташемъ 13,100—14,000', 16. VII (*Б. и О. Федченко!!*). Цвѣты крупные, желтые.

Растетъ на каменистыхъ склонахъ, на крутыхъ берегахъ или между камнями въ сухихъ руслахъ рѣкъ.

Геогр. распр.: а) Встрѣчается, кромѣ Памира, также на Тяньшанѣ, гдѣ собрана въ IX. 1878 г. въ плод. Фетисовымъ (Юлдузъ)! и 11. IX. 1879 г. въ пл. А. Регелемъ (Верхн. Алгой 8000')! и Красновымъ (съ пер. Бедель). — б) Амдо, Цайдамъ, сѣв. и южный Тибетъ, Монголія.

2. *Clematis orientalis* L. — *Linné*, Sp. plant. 543. — *Ledeb.*, Fl. Ross. I p. 3, № 6. — *Boiss.*, Fl. Or. I p. 3. — *Hook.*, Fl. Br. Ind. I p. 5, № 14. — *Федченко О. и Б.*, Ranunculaceae Русскаго Туркестана, р. 26, № 3.

var. *acutifolia* Hook. f. and Thoms. — *Hook.*, l. c. — *Федченко, Ran.* l. c. p. 27.

Указ. для Памира: *Ostenfeld*, Ranunculaceae coll. by Ove Paulsen, p. 318, № 33.

1898. Возлѣ озера Яшиль-куль, на выс. 3800 м., цв. 5. VIII (Паульсенъ; non vidi).

Другіе экземпляры *C. orientalis* var. *acutifolia* собраны тѣмъ же Паульсеномъ въ Ваханѣ, следовательно уже въ Памира въ моемъ смыслѣ.

Геогр. распр.: а) Кромѣ Памира и Вахана, встрѣчается также на Памиро-алаѣ, въ Джунгарскихъ степяхъ и горахъ, Тяньшанѣ, въ сѣв. Туркменіи, въ Кульджѣ, въ степяхъ между Ураломъ и Эмбой, въ Хивѣ и въ Закаспійской области. — б) Афганістанъ, южная Россія, Кавказъ, Перея, зап. Гималаи, зап. Тибетъ, сѣверо-западная Индія, Белуджистанъ, Манджурія, Алтай, Монголія. — Въ Китаѣ var. *intricata* Maxim.

Разновидность var. *acutifolia* Hook. et Thoms. встрѣчается въ Туркестанѣ въ Таласскомъ Алатау, въ бассейнѣ Сыръ-Дары, въ Заравшанской долинѣ, Маргандѣ, Шуганѣ, Ферганской области и по рр. Хайтассу и Сарысу въ Джунгаріи.

3. *Thalictrum alpinum* L. — *Linné*, Species plantarum, edit. I p. 545. — *Ledeboir*, Fl. Ross. I p. 6. — *Boiss.*, Fl. Or. I p. 6. — *Hooker*, Flora of British India, I p. 12. — *Lecoyer*, Monographie du genre *Thalictrum* p. 193. — *Федченко О. и Б.*, Ranunculaceae Русскаго Туркестана, р. 29, № 7.

Указ. для Памира: *Franchet*, Note sur une collection de plantes rapportées du Pamir par Poncins, p. 346. *Федченко О.*, Растенія Памира, р. 6 № 2.

1893. На Кизылъ-артѣ (Poncins; non vidi). — 1901. Между уроцищемъ Ходжа-Назаръ и переваломъ Кой-тезекъ, на аль-

пійскихъ лужайкахъ, до 16,000', 20. VII въ цв. и съ молодыми плодами (*Б. и О. Федченко!*).

Геогр. распр.: а) Встрѣчается на Памирѣ, Памиро-алаѣ (Малый Алай, 13,000'!), въ Тарбагатайѣ, въ Джунгарскомъ Алатау и въ алтайской области Тяньшана. — б) Распространено на Алтаѣ и въ арктической и алтайской областяхъ всего сѣверного полушарія.

4. *Thalictrum isopyroides* CAM. — *C.A.Meyer* in *Ledeb.*, Fl. alt. II, 346. — *Ledeboir*, Fl. Ross. I p. 7, № 7. — *Boissier*, Fl. or. I p. 6. — *Lecoyer*, l. c. p. 196. — *Федченко, О. и Б.*, Ranunculaceae, p. 30, № 8.

Указ. для Памира: *Комаровъ*, Мат. къ флорѣ Туркест. нагорья, р. 47.

Thalictrum isopyroides CAM., хотя и указывается Комаровымъ (l. c.) для Памира, гдѣ будто бы собрать Кушакевичемъ, въ дѣйствительности на Памирѣ до сихъ поръ никѣмъ не найденъ. Два роскошныхъ экземпляра собраны, очевидно, въ Алайскомъ хребтѣ И. И. Скорняковымъ: подлинный ярлыкъ „Р. Акъ-су-гурунды 4. VII 1878 г.“ писанъ его рукой. Хотя на ярлыкѣ и стоитъ „*Pamir, ad flumen Aksu-gurundi. Kuschakewicz*“, но уже другимъ почеркомъ (Э. Регеля), и этому указанію нельзя придавать значенія, потому что большинство растеній Ферганской экспедиціи 1878 года обозначается въ гербаріи Имп. Спб. Бот. Сада словами „*Pamir, Kuschakewicz*“, хотя очень многія изъ нихъ собраны Скорняковымъ, маркируясь котораго далеко не всегда совпадалъ съ маршрутомъ Кушакевича, и собраны преимущественно не на Памирѣ, а въ Заалайскомъ и Алайскомъ хребтахъ и даже въ равнинной части Ферганской области (Наманганѣ, Андижанѣ и т. д.). 4 июля 1878 г. никто и не могъ собирать на Памирѣ, куда Кушакевичъ прибылъ только 23 июля, а Скорняковъ еще позже. — Цвѣты блѣдые.

Геогр. распр.: а) Джунгарскія степи и горы, Тяньшань, Памиро-Алай, (Шугнанъ, Бухара, Заравшанъ!), Закаспійская область. — б) Арmenія, Сирія, Персія, Афганістанъ, Белуджистанъ, Алтай, Гималаи, Монголія.

5. *Thalictrum minus* L. — *Linné*, Sp. plant., 546. — *Ledeb.*, Fl. Ross. I p. 8, № 9. — *Boiss.*, Fl. Or. I p. 8. — *Hook.*, Fl. Br. Ind. I p. 14, № 18.

var. *elatum* (Jacq.) Lecoyer.

Указ. для Памира: *Ostenfeld, Ranunculaceae coll. by Ove Paulsen*, p. 318, № 27.

Растение это собрано Паульсеномъ не на Памирѣ, а въ Ваханѣ, и слѣдовательно къ числу памирскихъ растеній не относится.

Геогр. распир. вида: а) Ваханъ, Омскъ, Арабо-каспийская и Джунгарская степи, Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Памироалай.—б) Европа, Кавказъ, Сибирь, Монголія, Японія, Гималаи и западный Тибетъ, Абиссинія, сѣв. Африка, сѣв. Америка (Аляска).

6. *Pulsatilla Albana* (Stev.) Spreng. Syst. veg. II p. 663.—*Anemone albana* Stev., Cat. des plantes rares ou nouvelles, obs. pendant un voyage autour du Caucase oriental („Mém. d. la Soc. d. Nat. d. Moscou“ III, 1812, p. 264).—*Pulsatilla Albana* Spreng., Ledb., Fl. Ross. I p. 22, № 7.—*Anemone Albana* Stev., Федченко О. и Б., Ran. Русского Турк. р. 36, № 26.—*Anemone Albana* Stev., Boiss. Fl. Or. I p. 10.—A. Albana Stev., Hook., Fl. Br. Ind. I p. 7, № 1.—A. Albana Stev., Maximowicz, Fl. Mong. p. 12, № 22.

1895. Вахдженъ 1. VII цв. (*Богоявленский!*).

Геогр. распир.: а) Встрѣчается на Памироалай (Джиптысь!!), Заравшанъ), въ Джунгарскомъ Алатау и, очень часто, въ Тяньшанѣ. Для Памира мы имѣемъ только указание Н. В. Богоявленскаго и еще одно, несомнѣнно неизвѣрное: хотя въ герб. Имп. Спб. Бот. Сада и стоять: Памиръ, Ак-су 23. VIII 1878 (*Кушакевичъ!*), но Кушакевичъ въ этотъ день быть на озерѣ Яшиль-куль; б) Кавказъ, Закавказье, Алтай, Даурія, сѣв. Азія отъ Америки до Байкала, Персія, зап. Тибетъ, Монголія, Китайскій Туркестанъ.

7. *Anemone biflora* DC. Syst. I 201.—*Anemone biflora* DC., Boiss. Fl. or. I p. 12.—A. biflora DC. Hooker, Fl. br. Ind. I p. 7, № 2.—*Anemone Gortschakowii* Kar. et Kir. Ledb., Fl. Ross. I p. 727, № 1*.

Указ. для Памира: Федченко О., Мат. фл. Пам. р. 3, № 3. (*Anemone Tschernaevi*).

1892. Озеро Большой Кара-куль (*Назаровъ!*).

Геогр. распир. а) Въ степяхъ и горахъ всего Туркестана.—б) Персія, Афганістанъ, Кашмиръ, Белуджистанъ, Индія.

8. *Anemone Kostytszewi* Korsh. — Коржинскій, Очерки растит. Туркест. р. 87, № 1, tab. I.

Собрана Скорняковымъ и Коржинскимъ на Алай и по ошибкѣ указаны (О. и Б. Федченко, Ranunculaceae русского Туркест. р. 37, и таблица) для Памира; слѣдуетъ: Памироалай.—Цвѣты красные.

Геогр. распир.: Алай, Карагенинъ.

9. *Anemone narcissiflora* L. Sp. plant. edit. I p. 542 (по ошибкѣ: A. narcissifolia).—ed. II p. 763 (A. narcissiflora).—Ledb. Fl. Ross. I p. 18, № 15.—Boiss., Fl. Or. I p. 14.—Hook., Fl. Br. Ind. I p. 10, № 13.

Указ. для Памира: Franchet, Note sur une coll. d. pl. rapp. par Poncins, p. 346.

Собрана Poncins на перевалѣ Талдыкъ въ Алайскомъ хребтѣ и ошибочно указывается Franchet для Памира.

Геогр. распир.: а) Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Памироалай (Ягиобъ, Заравшанъ).—б) Альпы Европы, Пиренеи, Македонія, Арменія, Кавказъ, Ураль, Персія, Кашмиръ, Монголія, Алтай, Камчатка, сѣв.-зап. Америка, Китай.

10. *Ranunculus aquatilis* L. var. *pantothrix* Ledb., Fl. Ross. p. 27.—R. aquatilis L. var. *pantothrix* Ledb. Федченко О. и Б. Ran. русск. Турк. р. 41, № 37.—*Ranunculus trichophyllus* Chaix. Boiss., Fl. Or. I p. 23.—R. aquatilis L. var. *trichophyllus*, Hooker, Fl. br. Ind. I p. 16.—*Ranunculus paucistamineus* Tausch.

Указ. для Памира: Федченко О. и Б., I. c. (R. aquatilis L. var. *pantothrix* Ledb. и var. *trichophyllus* Chaix.).—Duthie in Alecock, Report on the Natural history results of the Pamir boundary Comission, p. 18 (R. aquatilis L. var. *trichophyllus* Chaix.).—Ostenfeld, Ran. coll. by Ove Paulsen p. 313, № 12 (R. paucistamineus Tausch.).—Федченко О., Растенія Памира, p. 6, № 3.

1878. Въ озерѣ Яшиль-куль 23. VIII (*Кушакевичъ!*).—1895. Въ озерѣ Викторіи (Зоръ-куль) и соседнихъ озерахъ, 13—14,000', и въ болотахъ по р. Аксу (Алесок; non vidi).—

1898. Въ озерѣ Яшиль-куль, 3800 м., 15. VIII цв.; въ озерцахъ близъ озера Булунъ-куль, 3800 м., 24. VIII цв. и пл.; (кромѣ того въ Ишкашимъ, который уже не относится къ Памиру); (Паульсъ; non vidi).—1901. Въ озерѣ Яшиль-куль,

12,500', 19. VII въ цв.; образуетъ густыя заросли возлѣ берега, гдѣ растетъ вмѣстѣ съ *Ceratophyllum* и *Myriophyllum* (*B. и О. Федченко!!*).—Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: а) Кромѣ Памира, встрѣчается въ Заравшанской долинѣ, въ Бухарѣ, Омскѣ, въ Джунгарскомъ Алатау и, довольно рѣдко, въ Тяньшанѣ, въ Закаспійской области.—б) Европа, вся Россія съ Кавказомъ и Сибирью, Монголія, Персія, Афганістанъ, Гімалаи, Пенджабъ, Белуджистанъ, съв. Америка, южная Африка, Австралія.

II. Ranunculus Sewerzowi Rgl. Descr. pl. nov. fasc. V („Acta H. Petr.“ V p. 221, № 4).—Федченко О. и Б., Ranunc. russk. Турк. р. 45, № 49.

Указ. для Памира: Комаровъ, Матеріаль по флорѣ Туркест. нагорья, р. 58.

Ошибочно указывается Комаровымъ для Памира: собрано это растеніе не Кушакевичемъ, а Скорняковымъ, и мѣстность „Арча-булакъ“ находится не на Памирахъ, а въ Алайскомъ хребтѣ.

Геогр. распр.: а) Горы Карагату, Ташкентъ, Ходжентъ, Алайский хребетъ, Гиссарь, Бальджуанъ.—б) Внѣ Туркестана не найденъ.

12. Ranunculus Aucheri Boiss. Ann. d. sc. nat. 1841, p. 351.—Boiss., Fl. Or. I p. 34 et Suppl. p. 8.

Указ. для Памира: Федченко О., Растенія Памира, р. 7, № 4 (f. minor). Ostenfeld, Ran. coll. by Ove Paulsen p. 316 № 18.

1897. У перевала Кой-тезекъ 22. VII (*Коржинский!*) (f. minor).—1898. На сырыхъ мѣстахъ въ горахъ близъ Чатыръ-таша, 4200 м., 15. VII въ цв. (Паульсенъ; non vidi).—1901. На альпійскихъ лужайкахъ близъ Ходжа-Назара до 16,000' и на щебневыхъ розсыпяхъ на перевалѣ Кой-тезекъ, 15,100', (границѣ Памира и Шугнана), въ цв. и пл. 20. VII; (*О. и Б. Федченко!!*) (f. minor). Наше растеніе совершенно тождественно съ экземплярами Aitchison'a изъ Афганістана, которые я видѣла въ гербаріи Спб. Ботаническаго Сада. У обоихъ, однако, опущеніе состоится изъ отстоящихъ волосковъ (а не прижатыхъ, какъ сказано въ описаніи Буссье). Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Кромѣ Памира, видъ этотъ встрѣчается въ Шугнанѣ (f. minor), гдѣ онъ собранъ нами на

(16)

спускѣ съ перевала Кой-тезекъ, на крутыхъ горныхъ склонахъ, 20. VII въ цв.!! — б) Южная Персія, Афганістанъ.

13. Ranunculus flexicaulis Kom. Комаровъ, Мат. по флорѣ Турк. нагорья, р. 55, № 25.—Федченко О. и Б., Ran. russk. Турк., р. 44, № 44.

1897. Въ верховыхъ р. Лянгарь-су 18. VIII въ цв. (№ 3614; *Коржинский!*).

Геогр. распр.: Встрѣчается на альпійскихъ лугахъ въ западномъ Тяньшанѣ и западномъ Памироалай. Для Памира указывается впервые.

14. Ranunculus pulchellus CAM. in Ledb. fl. alt. II p. 333.—Ledb., Fl. Ross. I p. 33, № 21 (R. pulchellus CAM) и 20 (R. longicaulis CAM).—Boiss., Fl. or. I, p. 52.—Hooker, Fl. Br. Ind. I p. 17. Федченко О. и Б., Ran. russk. Турк. р. 48, № 60.

var. *pseudo-hirculus* (Schrenk.) Trautv.—*Ranunculus pseudo-hirculus* Schrenk. in *Fisch. et Mey.*, Enum. altera pl. Schrenk., p. 65.—R. pulchellus CAM. var. *pseudo-hirculus* Trautv. Enumeratio plantarum a cl. Schrenk lectarum („Bull. de Moscou“ 1860 p. 62).—R. pulchellus CAM. var. *pseudo-hirculus* Trautv. Комаровъ, Мат. по фл. Турк. наг. р. 60.

Указ. для Памира: Duthie in Alcock, I. c. p. 18, № 2.—Ostenfeld, Ran. p. 314, № 14.—Федченко О., Раст. Памира, р. 7, № 5.

1878. Прибрежье озера Каракуль, 28. VII; Акъ-байталъ 3. IX; (*Кушакевичъ!*).—1891. Р. Шинда, Найза-ташъ 20. VII (*Бржезинский!*); имъ же, на этикеткѣ гербарія указывается для р. Аксу и р. Вахдиръ).—1895. У озера Кара-куль, на влажныхъ луговинахъ, 10. VII цв. (*Коржинский!*).—1897. Тамъ же, 10. VII цв. и мол. пл. (№№ 2034 и 2035); на р. Мусколъ 11. VII цв.; у озера Рангъ-куль 13. VII цв. (№ 2130); (*Коржинский!*).—1898. Въ сырыхъ мѣстахъ по р. Аличуру близъ Босалы, 3900 м., 16. VII цв.; на берегу озера Булунъ-куль, 3800 м., 30. VIII цв. (Паульсенъ, non vidi).—1899. Памиръ (*Н. Вельманъ!*).—1901. Отъ Маркану до Кара-куля, 13,100—13,800', на луговинѣ у ручья, 4. VII въ цв.; между Мусколомъ и Акъ-байталомъ, 14,100—14,400', 7. VII въ цв.; на Акъ-Байталѣ, 14,400—15,700', 8. VII въ цв., на Памирскомъ Посту, 12,650', 10 и 14. VII плоды; отъ Памирского Поста до Карасу, 12,650—13,100', 15. VII цв.; отъ Карасу до Чатыръ-таша на альпійскихъ лужайкахъ ниже перевала

(17)

Найза-ташъ, 13,800', 16. VII цв.; между Сассыкъ-кулемъ и Яшиль-кулемъ, 13,100—12,500', 18. VII цв.; между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ 19. VII цв.; между урочищемъ Ходжа-Назаръ и переваломъ Кой-тезекъ, 13,800—15,100', 20. VII цв.; между Ходжа-Назаромъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13,800—13,100', 2. VIII цв.; между озеромъ Сассыкъ-куль и урочищемъ Чатыръ-ташъ, 13,100—13,540', по берегу рѣчки, 3. VIII цв.; (*O. и Б. Федченко!!*) — 1901. Мургабъ, сырьи луга (*Тулиновъ!*).

var. longicaulis (CAM) Trautv.

Указ. для Памира: Duthie in *Alcock*, I. c. p. 18, № 2 (переходная форма къ var. *pseudo-hirculus* Trautv.). — *Ostenfeld*, *Ran.* p. 314, № 14.

1878. Карасу 29. VIII (*Кушакевичъ!*). Растеніе, собранное Кушакевичемъ, представляетъ переходную форму къ var. *pseudo-hirculus*: стебли у него длинные, но цветы не мелкие, какъ это должно бы быть у var. *longicaulis*. — 1895. На Большомъ и Маломъ Памирахъ, до 14,000' (*Alcock*, non *vidi*); переходная форма къ var. *pseudo-hirculus*). — 1898. Въ ямѣ съ водой близъ Памирского Поста, 3800 м., 8. VII цв. и пл. (*Паульсенъ*, non *vidi*).

var. tridentata O. Fedtsch. nova var.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Растенія Памира, p. 7, № 5.

1901. Отъ Кара-куля до Мускола, 13,400—14,100', на луговинѣ вдоль ручья, 6. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Гурумдами, 12,650—14,000', 7. VIII въ цв. — Между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13,540—13,100', 17. VII въ цвету (*f. parviflora*) (*Б. и О. Федченко!!*). —

Ranunculus pulchellus самый обыкновенный изъ всѣхъ видовъ лютиковыхъ, встрѣчающихся на Памире. Растетъ по берегамъ рѣчекъ и на кочкиахъ болотистыхъ луговъ. Цветы золотисто-желтые.

Геогр. распр.: а) Встрѣчается на Памире и Памиро-алаѣ (въ Шугнанѣ, Алайскомъ хребтѣ: перевалъ Кафарага!!, Дживитыкъ!!, Караказукъ!!) въ Тяньшанѣ и Джунгарскомъ Алатау. — б) Алтай, Даурія, Байкаль, Монголія, Тибеть, Афганистанъ, Гималаи, Китай:

15. *Ranunculus plantaginifolius* Murr. in Nov. Comment. goetting. VIII p. 39, t. 2. — *Ledeb.*, Fl. Ross. I p. 33. — *Федченко О. и Б.*, *Ran.* русск. Турк. p. 49, № 61 и таблица.

(18)

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 346.

Указано Poncins только на перевалѣ Талдыкѣ (въ Алайскомъ хребтѣ) и потому изъ числа памирскихъ растеній исключается, какъ и другія растенія, собранныя имъ на Талдыкѣ.

Геогр. распр.: а) Кромѣ Памироалаї, встрѣчается также въ равнинахъ близъ Тарбагатая. — б) Сибирь (Алтай, Забайкалье, Даурія), съв. Китай, Монголія.

16. *Ranunculus Cymbalariae* Pursh, Flora boreali-americana II p. 392. — *Ledb.*, Fl. Ross. I p. 34. — *Boissier*, Fl. Or. I p. 52. — *Hooker*, Fl. Br. Ind. I p. 17. — *Федченко О. и Б.*, *Ran.* русск. Турк. p. 49, № 62.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам. р. 3, № 4. — *Федченко О.*, Раст. Памира р. 8, № 6.

1878. Суокъ-Чубыръ (Памиръ-Харгоши) 7—8. VIII (*Кушакевичъ!*; var. *alpinus* Koch. — 1892. Мургабъ (*Назаровъ!*; var. *minor* B. Fedtsch.). — 1895. Около озера Кара-куль, на влажныхъ луговинахъ у рѣчки 9. VII цв. (*Коржинскій!*). — 1897. Возлѣ озера Рангъ-куль 13. VII цв. и пл. (№ 2091; *Коржинскій!*). — 1901. На болотистыхъ кочкиахъ у Памирского Поста 10, 11 и 14. VII цв. и пл., 12,650'. Между Сассыкъ-кулемъ и Яшиль-кулемъ 13,100—12,500', 18. VII цв. и пл. (типическая форма и var. *alpinus* Koch.); (*Б. и О. Федченко!!*). Цветы желтые.

Геогр. распр.: а) Встрѣчается, кромѣ Памира, въ долинѣ Заравшана; въ Джунгаріи; на Тяньшанѣ, какъ въ высокогорной, такъ и въ болѣе низкихъ областяхъ, а также въ Омекѣ и въ Семипалатинской области. Не рѣдкое растеніе. — б) Зап. Сибирь, Алтай, Байкаль, Даурія, Тибеть, Китай, горы съв. и южной Америки, Европа, съв. Персія, Афганистанъ, Монголія.

17. *Ranunculus hyperboreus* Rottb. Acta hafn. X, 458. — *Hooker*, Fl. br. Ind. I p. 18. — *Федченко О. и Б.*, *Ran.* русск. Турк. p. 49, № 63.

var. *natans* (CAM.) Rgl. — *Regel*, Plantae Raddeanae I 43. — *Regel*, Enum. pl. a cl. Semen. lectarum p. 14, № 23. — *Ranunculus natans* CAM. in *Ledeb.*, fl. alt. II p. 315.

Указ. для Памира: Duthie in *Alcock*, I. c. p. 18, № 3 (*R. hyperboreus* Rottb. var. *natans*). — *Ostenfeld*, *Ran.* coll. by Ove Paulsen p. 314, № 13 (*R. natans* CAM.). — *Федченко О.*, Раст. Памира, p. 8, № 7.

(19)

1891. Въ верховьяхъ Мургаба, до 12,000' (*Брюсницкий!*).
— 1895. У озера Рангъ-куль, 13. VII цв. и пл. (*Коржинский!*).
— 1895. Въ болотахъ по р. Аксу, 13—14,000' (Alcock; non vidi). — 1897. У Памирского Поста 16. VII (№ 2202 и 2203; *Коржинский!*). — 1898. У Памирского Поста, 3800 м., 8. VII цв. и пл.; въ озерѣ Яниль-куль, 3800 м., 15. VIII цв. и пл. (Паульсенъ; non vidi). — 1899. Памиръ (*H. Великан!*). — 1901. На болотистомъ лугу близъ Памирского Поста въ ямахъ съ водой, между кочками, 12,650', 10, 11 и 14. VII цв. и пл.; въ озерцахъ между Сассыкъ-кулемъ и Яшиль-кулемъ, 13,100—12,500', 18. VII цв. и пл. (*B. и O. Федченко!!*). — 1901. Мургабъ, сырьи луга (*Тулиновъ!*).

var. *parvispatulus* (Bruhl).

Указ. для Памира: Duthie in Alcock, I, c. p. 18, № 3.

1895. На песчаномъ берегу озера Виктории (Зорь-куль), 13—14,000' (Alcock; non vidi). — Цвѣты желтые.

Геогр. распир.: Встрѣчаются на Памирѣ и Памиро-алаѣ, въ Джунгарскомъ Алатау, Тарбагатай и Тяньшанѣ; Ханъ-тengri.—б) Арктическая область и горы сѣверного полушарія.

18. *Ranunculus Pamiri* Korsh., Fragmenta Florae Turkestanicae p. 401, tab. II, fig. 8. — Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. pp. 14 и 50, № 64.

1897. У озера Сассыкъ-куль, 21. VII цв. (*Коржинский!*). Геогр. распир.: Памиръ.

19. *Ranunculus sulphureus* Soland. — *Ranunculus sulphureus* Soland. in Phipps, Voy. 202.—*Ranunculus altaicus* Laxm. Descriptionum plantarum sibiricarum continuatio in Novi Comment. Academ. Sc. Petropol. XVIII (pro anno 1773) 1774, p. 533.—*R. altaicus* Laxm. Ledb., Fl. Ross. I p. 37, № 31. — *R. altaicus* Laxm. Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. p. 50, № 66. — *R. frigidus* Willd. Крыловъ, Флора Алтая и Томск. губ. p. 27, № 38.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 346 (*R. altaicus* Laxm.).

1893. Кизыль-артъ (Poncins; non vidi).

Весьма вѣроятно, что видъ этотъ собранъ Poncins на сѣверномъ (алайскомъ) склонѣ перевала Кизыль-артъ, который гораздо сырѣе и богаче растительностью, чѣмъ южный (памирский). Ни иами, ни другими путешественниками, про-

шедшими тѣмъ же путемъ, онъ на памирскомъ склонѣ не найденъ.

Геогр. распир. видѣ: а) Встрѣчаются въ Тяньшанѣ, гдѣ не рѣдокъ, на Тарбагатай и въ Джунгарскомъ Алатау.—б) Арктическая Норвегія, аркт. Россія, аркт. Ураль и Сибирь; горы южной Сибири, Монголія, сѣв. Америка.

var. *Alberti* (Rgl. et Schmalh.) Maxim. *Ranunculus sulphureus* Soland. var. *Alberti* Maxim. Fl. Mongol. p. 19, № 34.—*Ranunculus Alberti* Rgl. et Schmalh., Regel, Descr. pl. nov. fasc. VI („Acta H. Petr.“ V. 1. 1877 p. 223).

1895. Вахджеиръ, 1. VII въ цв. (*Богоявленский!*).

Геогр. распир.: Тяньшань, Юлдузъ.

20. *Ranunculus songoricus* Schrenk. Fischer et Meyer, Enum. altera plant. nov. a cl. Schrenk lectarum, 1842 p. 67. — Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. p. 51, № 69.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins p. 346.

1893. Кизыль-артъ (Poncins; non vidi). — По всей вѣроятности, Poncins собирали этотъ видъ на сѣверномъ склонѣ Кизыль-арта, т. е. не на Памирѣ, а въ Заалайскомъ хребтѣ. По крайней мѣрѣ, тамъ (по рѣкамъ Кизыль-агынъ и Кизыль-артъ, на алайскихъ луговинахъ, 11—11,500') собирали его 8. VII. 1895 *Коржинский!*. — 1897. Въ верховьяхъ р. Лянгаръ-су, 18. VIII цв. (*Коржинский!*). — По Комарову (I, c. p. 64) видъ этотъ собранъ на Памирѣ Кушакевичемъ, но это невѣрно: указанная мѣстность, Арчаты-сай (не Аргаты-сай), гдѣ собирали его Кушакевичъ, лежить въ Алайскомъ хребтѣ, едѣдовательно уже виѣ Памира.—Цвѣты желтые.

Геогр. распир.: а) Джунгарія, Тяньшань, Памироалай (горы Ферганы, Шугнанъ). б) — Монголія.

21. *Ranunculus rubrocalyx* Rgl. in Комаровъ, Мат. по фл. Туркест. нагорья p. 62, sp. ined. — Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. p. 52, № 71.

Указ. для Памира: Ostenfeld, Ran. coll. by Ove Paulsen p. 316, № 20.

1878. По дорогѣ къ р. Карасу 28. VIII (*Кушакевичъ!*; очень плохіе экземпляры), (testo Regel). — 1898. Вмѣстѣ съ *R. rufosepalus* Franchet, на сырьи мѣстахъ въ ущельяхъ близъ Яшиль-куля, 3900 м., 11. VIII цв. (Paulsen; non vidi).

Геогр. распр.: Бухара, Ферганская область — съдовательно Памироалай, на высотѣ отъ 10,000—11,000', и Памирь.

22. *Ranunculus rufosepalus* Franchet, plantes du Turkestan, mission Capus, p. 216. — Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. р. 53, № 75.

Указ. для Памира: Duthie in Alcock, l. c. p. 18, № 4.— Ostenfeld, Ran. coll. by Ove Paulsen p. 116, № 19. — Федченко О., Растения Памира, р. 8, № 8.

1895. Въ сырыхъ мѣстахъ, до 15,000' (Alcock; non vidi). — 1897. На перевалѣ Кизыль-джинъ, 15,000', 12. VII цв.; у перевала Кой-тезекъ 22. VII цв.; у истоковъ р. Лянгарь-су, 18. VIII пл.; на перевалѣ Тахта-горумъ 26. VIII; (Коржинскій!). — 1898. На сырыхъ мѣстахъ въ горахъ близъ Чатыръ-тана, 4200 м., 15. VII. цв.; на сырыхъ мѣстахъ въ ущельяхъ близъ Яшиль-куля, 1 и 11. VIII, цв. и пл. (Паульсeinъ; non vidi). — 1901. Между Ходжа-Назаромъ и Кой-тезекомъ 13,800—15,100', 20. VII цв. и на щебниевыхъ розсыпяхъ на самомъ перевалѣ Кой-тезекъ, 15,100', 1. VIII въ цв. и пл. (Б. и О. Федченко!!). — Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Встрѣчается, кромѣ Памира, также на Памироалаѣ и Тяньшанѣ (Фетисовъ, Федченко!!). — б) — эндемическое.

23. *Oxygraphis glacialis* (Fisch.) Bge., Enum. alt. p. 35.— *Ficaria glacialis* Fisch. in DC. Prodromus I, 44. — *Oxygraphis glacialis* Bge. Ledb., Fl. Ross. I p. 47. — *O. glacialis* Bge. Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. р. 58, № 90.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 346.— Ostenfeld, Ran. coll. by Ove Paulsen, p. 317, № 24.

1893. На перевалѣ Кизыль-артъ (Poncins; non vidi). — 1898. Съверный Памирь; Кизыль-куль, 4000 м., 17. VI съ мол. плодами (Паульсeinъ; non vidi). — Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: Въ предѣлахъ Туркестана встрѣчается исключительно въ высокогорной области: въ Тяньшанѣ, Джунгарскомъ Алатау и на восточной окраинѣ Алайскаго хребта: перевалъ Кавукъ (О. Федченко 1871 г.!!), Тенгизъ-бай (Коржинскій) и на Памирѣ. — б) Алтай, Даурія, Камчатка, альпийская область Гималаевъ.

24. *Callianthemum alatavicum* Freyn.— Freyn, Ueber neue und bemerkenswerthe orientalische Pflanzenarten

(„Bull. de l'Herb. Boiss.“ 15. Nov. 1898 p. 882). — *Callianthemum alatavicum* Freyn, Witasek, die Arten der Gattung *Callianthemum* („Verh. der zool.-bot. Gesellsch. in Wien“, 1899 p. 345, № 9). — *Callianthemum rutaefolium* CAM. (ex parte), Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. р. 58, № 91.

Указ. для Памира: Комаровъ, Мат. фл. Турк. нагорья р. 67 (*Callianthemum rutaefolium* CAM.).

Мѣстность, которую приводить Комаровъ — истоки рѣки Кизыль-су — (Скорняковъ въ герб. Ими. Бот. Сада!). лежитъ на съверномъ склонѣ Заалайскаго хребта и съдовательно къ Памиру не относится. — Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Памироалай. — б) Монголія.

25. *Trollius songoricus* Rgl.— Tr. dschungaricus E. Regel, Supplementum ad fasc. VII. Deser. plantarum („Acta H. Petrop.“ VII, 383) 1880. — Tr. europaeus L. var *songoricus* E. Regel, suppl. II pl. Semenov. № 35a, 1870. — Tr. altaicus v. *latilobus* Rupr., Sert. tiansch. p. 37. — Tr. europaeus L. var. *songoricus* Rgl., Maxim., Enum. plant. Mongol., p. 24.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам. р. 3, № 5 (*Trollius dschungaricus* Rgl. var. *alpinus*). — Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. р. 60, № 97 (подъ именемъ *Trollius patulus* Salisb.).

Собрано въ 1892 г. Назаровы.иц (!) въ Бордабѣ, то есть не на Памирѣ, а на съверномъ склонѣ Заалайскаго хребта, гдѣ и мы видѣли это растеніе въ 1901 г., гдѣ его собирались и Коржинскій! (12. VII 1895 г., по рѣкѣ Кизыль-артъ); но на Памирѣ оно не найдено.

Геогр. распр.: а) Встрѣчается на Тяньшанѣ на высотѣ отъ 5000—12,000', въ Джунгарскомъ Алатау и на Памироалаѣ. — б) Сибирь, Ураль, Китайский Туркестанъ.

26. *Trollius altaicus* CAM. Ind. cauc. p. 200. — Ledb. Fl. Ross. I p. 50, № 3. — Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. р. 59, № 95.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins p. 346.

Собрано Poncins на перевалѣ Талдыкъ, т. е. въ Алайскомъ хребтѣ, а не на Памирѣ.

Геогр. распр.: а) Тарбагатай, Памироалай, Тяньшань. — б) Сибирь (Алтай, Нерчинскъ, Якутскъ).

27. *Isopyrum anemonoides* Kar. et Kir. Enum. plant. song. № 55. — Ledb., Fl. Ross. I p. 735. — Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. р. 61, № 101. — *Isopyrum thalictroides* Hooker, Fl. Br. Ind. I p. 23, № 2.

Указ. для Памира: Ostenfeld, Ran. coll. by Ove Paulsen p. 311, № 4.

1898. Въ сырыхъ мѣстахъ, въ трещинахъ скаль, въ горахъ близь Яшиль-куля, 3900 м., 29. VII цв. (Паульсенъ; non vidi).

var. *brevistylum* Korshinsky in sched. herb. Acad. Petrop.

1897. Кокджаръ, въ трещинахъ скаль 25. VIII пл. (№ 3845; Коржинский!).

Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: а) Памиръ, Памироалай (Алайскій хребтъ), Джунгарскій Алатау, Тяньшань. Растетъ въ трещинахъ скаль въ алтайской области и особенно въ полосѣ арчи, отъ 5000' и выше. — б) Западные Гималаи, Афганистанъ, Китай, Китайскій Туркестанъ, Амдо, Тибетъ.

28. *Isopyrum grandiflorum* Fisch. in DC., Prodromus, 48. — Ledb., Fl. Ross. I p. 53. — Hooker, Fl. Br. Ind. p. 23, № 3. — Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. р. 61, № 100.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам. р. 3, № 6. 1892. Мургабъ; Аличуръ (*Назаровъ!*). Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: а) Памироалай, Джунгарскій Алатау, Тяньшань: на Тяньшанѣ встречается часто, на высотѣ отъ 8000—12,500' (въ особенности между 10—12,000'), въ трещинахъ скаль, — б) Китай, Алтай, алтайская и субальпийская область Байкала, алтай. обл. западныхъ Гималаевъ, Тибетъ, горы южной Монголіи.

29. *Delphinium dasyanthum* Kar. et Kir. Enum. plant. song. № 22. — Ledb., Fl. Ross. I p. 738, № 13a. — Huth, Monographic d. Gattung Delphinium, p. 396, № 49. — Комаровъ, Мат. фл. Турк. паг. р. 73. — Федченко О. и Б., Ran. русск. Турк. р. 71, № 124. — Maxim., Enum. plant. Mongol. p. 28, et in sched. herb. Acad. Petrop. — D. speciosum M.B. var. bracteosum Huth. Monogr. p. 416. — D. caucasicum var. bracteosum Schrenk. — D. speciosum, Ostenfeld, Ran. p. 312, № 7.

1883. Ущелье Бахмаль, 25. VII (*Д. Ивановъ!*). — 1897. Тагаркакты, 21. VII цв. (*Коржинский!*): D. speciosum M.B. var. dasyantha f. Tagarkaktenis Korsh. in herb. Н. Petrop. —

D. speciosum f. Tagarkaktenis Korsh. in herb. Acad. Petrop.) — На перевалѣ Лянгаръ 18. VIII цв. (*Коржинский!*: D. Brunonianum, Korsh. in sched. herb. Horti Petrop. et Acad. Petrop.).

Сюда же, можетъ быть, относятся два экземпляра *Delphinium*, собранные Козловскимъ (!) на Каръ-артъ 2. VIII и такъ плохо сохранившіеся, что монографъ этого рода, Huth, оставилъ ихъ неопределеными и не включилъ въ свою монографію. Хотя они и отличаются отъ типичнаго *D. dasyanthum* Kar. Kir. болѣе длиннымъ широпцемъ, но это признакъ, повидимому, измѣнчивый: на экземплярахъ Коржинскаго длина широпца варьируетъ и онъ то короче, то длиннѣе чашелистиковъ.

Кромѣ того, въ герб. Имп. Сиб. Бот. Сада есть очень плохой экземпляръ, названный Huth'омъ *Delphinium speciosum* Boiss. Собранъ онъ Сѣверцовымъ въ верховыи р. Карасу 27. VIII 1878 г. По общему habitus'у — росту, листьямъ, опушению — онъ очень похожъ на экземпляръ Куниакевича изъ ущелья Арчаты 14. VII 1878 г. (въ Алайскомъ хребтѣ), и можетъ быть собранъ вовсе не на Памирѣ, а на какой нибудь другой изъ многихъ туркестанскихъ рѣкъ Карасу.

var. *undulatum* Huth, Monogr., p. 396, № 49.

Указ. для Памира: Huth, I. c. — Комаровъ, I. c. p. 73. — Ostenfeld, Ran. p. 312, № 7 (D. speciosum M.B.). — Федченко О., Раств. Памира, р. 9, № 9.

1878. Близь Булунъ-куля по дорогѣ къ Сассыкъ-кулю 26. VIII (*Ю. Ашурбаевъ!*). — 1898. На сыромъ мѣстѣ въ долинѣ близь Булунъ-куля, 3800 м., VIII, въ цв. (Паульсенъ; non vidi; подъ именемъ D. speciosum M.B.). — Остенфельдъ (I. c.) приводить признаки, которыми собранное Паульсеномъ растеніе отличается отъ типичнаго D. speciosum, и изъ этого описанія ясно, что оно тождественно съ Ашурбаевскимъ и нашимъ, собранными въ той же мѣстности. — 1901. Между Ходжа-Назаромъ и Сассыкъ-кулемъ 13,800—13,100', на глинистыхъ склонахъ, вмѣстѣ съ *Neogaya simplex* Meisn., 2. VIII въ цвѣту (Б. и О. Федченко!!).

Huth (I. c.) и Комаровъ (I. c.) указываютъ разнovidность для р. Джегенъ на Памирѣ; но р. Джегенъ, гдѣ собирались ее А. Регель, лежить въ Памира (А. Регель на Памирѣ вовсе не былъ). — Цвѣты синие.

D. dasyanthum Kar. Kir. очень близокъ къ *D. speciosum* M.B. и признакъ, которыми они различаются по таблицѣ Huth'a, не устойчивъ: у нашихъ экземпляровъ, собранныхъ вмѣстѣ и несомнѣнно относящихся къ одному виду, прицвѣтники то отстоять отъ цвѣтовъ, какъ это должно быть у *D. dasyanthum*, то смежны съ ними, что должно отличать *D. speciosum*. Новѣйшие авторы (Бунтъ, во флорѣ Кавказа) не указываютъ *D. speciosum* для Туркестана.

Геогр. распр.: а) Встрѣчается на Памирѣ, Памироалайѣ, въ Джунгарскомъ Алатау и на Тяньшанѣ. — б) Сѣв.-зап. Индіи.

30. *Delphinium Brunonianum* Royle, Illustr. Himal. 56 (1839). — *Huth*, Monogr. p. 392, № 43. — *Delphinium Jacquemontianum* Camb. in *Jacquemont*, Voyage dans l'Inde, T. IV, p. 7, Paris 1844. — *Delphinium Brunonianum* Royle var. *Jacquemontianum* (Camb.), *Huth*, Mon. p. 392. — *Delphinium cashmirianum* Royle var. *Jacquemontianum* (Camb.), *Федченко О. и Б.*, Ranunc. русск. Турк. р. 69, № 121. — *Delphinium cashmirianum*; *Ostenfeld*, Ran. p. 311, № 6. — *Delphinium Brunonianum* Royle, *Hooker*, Fl. Br. Ind. I p. 27, № 13.

Указ. для Памира: Duthie in *Alecock*, I. c. p. 18, № 5 (*D. cashmirianum* Royle var. *Jacquemontianum* (Camb.)). — *Ostenfeld*, I. c. (*D. cashmirianum*; „differs from the type“).

1888. Перевалъ Каинъ (на картѣ Каликъ) 12, VIII цв. (*Громбчевскій!*). — 1891. Подъ переваломъ Бенкъ, до 13,000', 21. VII цв. (*Брэссенскій!*). — 1895. Рѣдокъ; собранъ только разъ на каменистой почвѣ на берегу ручья, въ защищенномъ мѣстѣ, не менѣе 15,000' (*Alecock*; non vidi). — 1898. Въ сухомъ ложѣ маленькаго ручья близъ Яшиль-куля, на выс. 3000 м., 8. VIII въ цв. и пл. (*Паульсенъ*; non vidi).

Называя растеніе Паульсена *D. cashmirianum*, Остенфельдъ (I. c.) приводить отличія его отъ типической формы: прицвѣтники супротивные и сидятъ у самыхъ чашелистиковъ; шпорцы лишь немного короче чашелистиковъ. На этомъ основаніи, я отношу растеніе, собранное Паульсеномъ, къ *D. Brunonianum* Royle.

Оба названные вида, *D. Brunonianum* Royle и *D. cashmirianum* Royle, очень близки между собою и отличаются положениемъ прицвѣтниковъ, которые у *D. Brunonianum* супротивные и сидятъ у самыхъ цвѣтовъ, а у *D. cash-*

mirianum очередные и болѣе или менѣе удалены отъ цвѣтовъ; (кромѣ того, они отличаются длиною шпорца и цвѣтомъ бородки на нижней губѣ). Экземпляры Громбчевскаго представляютъ переходную форму: прицвѣтники то супротивные и сидящіе близко отъ цвѣтовъ, даже у самыхъ цвѣтовъ, то очередные и болѣе или менѣе удалены отъ нихъ; бородка же на нижнемъ лепесткѣ желтая, какъ это должно быть у *D. Brunonianum* (и *Jacquemontianum*; у *D. cashmirianum* она бѣлая).

Что касается до *D. Jacquemontianum* Camb., то уже при самотъ описаніи этой формы авторъ сомнѣвался въ самостоятельности ея, какъ вида. Затѣмъ, другіе авторы, какъ Duthie, стали причислять ее, какъ разновидность, къ *D. cashmirianum*; Huth въ своей монографіи рода *Delphinium* (I. c.) относить ее, какъ разновидность, къ *D. Brunonianum*, что мнѣ кажется уже болѣе правильнымъ; Hooker (I. c.) же относить ее къ *D. Brunonianum*, какъ синонимъ. Цвѣты синіе, свѣтлѣе и крупнѣе, чѣмъ у предыдущаго вида.

Геогр. распр.: а) Памиръ. — б) Зап. Гималаи, Тибетъ и Афганистанъ.

31. *Aconitum rotundifolium* Kar. et Kir., Enum. pl. songor. № 46. — *A. rotundifolium* Kar. et Kir., Ledb., Fl. Ross. I p. 740, № 16a. — *A. rotundifolium* Kar. et Kir., *Федченко О. и Б.*, Ran. русск. Турк. р. 80, № 155. — *A. Napellus* L. var. *rotundifolium*, *Hooker*, Fl. Br. Ind. I p. 29, № 6. — *Aconitum tianschanicum* Ruprecht, Sertum tianschanicum in Mém. Ac. St. Petersb. 1869 p. 38,

1878. Каръ-артъ, 2. VIII въ цв. (*Козловскій!*). — 1897. Въ верховьяхъ р. Лянгаръ-су 18. VIII (№№ 3605, 3606, 3607 и 3608; *Коржинскій!*). Есть также въ памирскомъ гербариѣ 1899 года *Н. Вельманъ!*, но безъ указанія мѣстности, и по всейѣ вѣроятности собранъ єю по пути на Памирь, на Алаѣ или въ Бордабѣ (въ Заалайскомъ креѣ, но на сѣверномъ склонѣ), гдѣ и мы собирали его въ 1901 году. Цвѣты голубые, зеленоватые.

Геогр. распр.: а) Памиръ, Памироалай, Джунгарскій Алатау, Тяньшань. — б) Гималаи.

II. Papaveraceae.

32. *Papaver alpinum* L. Sp. plant. p. 507.—*Ledb.* Fl. Ross. I, pp. 87 et 743.—*P. nudicaule* L. *Boiss.* Fl. Or. I, p. 107.—*P. nudicaule* L. *Hooker* Fl. Br. Ind. I, p. 117.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. *Poncins*, p. 346.

1893. Кизылъ-артъ (*Poncins*; non vidi).—1897. Pamir, ad traj. Liangar 18. VIII ил. (*Коржинский!* въ герб. Ак. Н.). var. *croceum* *Ledb.* l. c.

Указ. для Памира: *Duthie*, *Alcock's* pl. p. 19. (*P. nudicaule* L. var. *rubro-aurantica* *Fischer*).

1878. Кизылъ-артъ (*Кушакевич!*).—1883. Ad. fl. Pamir prope lacum magnum 24. VII. (*Д. Ивановъ!*).—1891. р. Суксур-равать, виѣ Памира, 26. VII въ цв. (*Брэзезинский!*), до 14,000' (имъ же указывается, на этикетахъ въ герб. Сиб. Б. С., для Памира: р. Марджанай, р. Мургабъ, р. Каинды).—1895. Карасу, въ цв. (*Боголюбенский!*). Выше 14,000' (*Alcock*; non vidi).—1897. Памирь, у перевала Ляигарь (*Коржинский!*) *P. alpinum* L. fl. *aurantiacis* въ герб. Сиб. Б. С.) 17. VIII, незрѣл. пл.

var. *croceum* *Led.* forma *parviflora*.

Указ. для Памира: *Федченко* О., Растенія Памира, р. 9, № 10.

1897. Pamir, in loco Kara-su' 18. VII цв. (var. *aurantiacis* f. *micrantha*, *Коржинский!* въ герб. Ак. Наукъ).—1901. Между уроцищемъ Ходжа Назаръ и переваломъ Кої-тезекъ на альпийскихъ лужайкахъ, до 16,000', 20. VII въ цв. (*Б. и О. Федченко!*).—Цвѣты оранжевые, мелкие.

Papaver alpinum L., собранный на Кизылъ-артъ *Poncins* (см. *Franchet*, pl. *Poncins* p. 346) и var. *croceum* *Ledb.*, собранная тамъ же Кушакевичемъ, вѣроятно, всѣ взяты на сѣверномъ склонѣ перевала (для некоторыхъ растеній Кушакевича это обозначено на этикетахъ гербарія), слѣдовательно уже виѣ Памира; можетъ быть оттуда же экземпляръ (безъ мѣстности), собранный въ 1899 г. Н. Вельманъ (см. *О. Федченко*, Растенія Памира, приложение). Собственно на Памирѣ видъ этотъ рѣдокъ; онъ чаще встречается на Памиро-алайѣ, въ Джунгарскомъ Алатау и въ особенности на Тяньшанѣ, откуда доставленъ цѣлымъ рядомъ лицъ.

По Линнею, *P. alpinum* (*soliis bipinnatis*) отличается отъ *P. nudicaule* (*foliis simplicibus pinnato-sinuatis*); но различие это не существенно и не постоянно.

Геогр. распир.: var. *croceum* *Led.*: а) Памиро-алай (пер. Мура 12,000'!!; ледники Щуровского 10,730'!! и Карака-зукъ 12,200'!!; Шугианъ!!), Памирь, Тяньшань, Джунгарский Алатау, Тарбагатай.—б) Сибирь, Алтай, Забайкалье, Даурія.

Геогр. распир. вида: Арктическая область Европы, Азіи и Америки, горы сѣв. и ср. Европы, Ураль, сѣв. Азія, Китай, Монголія, зап. Тибетъ, Афганистанъ, Гималаи.

III. Fumariaceae.

33. *Corydalis stricta* Steph.¹⁾ in DC. Syst. II, p. 123.—*Ledb.* Fl. Ross. I, p. 102, № 18.

Указ. для Памира: *Duthie*, *Alcock's* pl. p. 19 (*C. stricta* Steph.).—*Федченко* О., Растенія Памира, р. 9, № 11.

1878. Акъ-Байталъ 8. VIII (*Кушакевич!*).—1883. Koschagyl (affl. Aksu) 3. VII въ цв.; fl. Oi-Balgyn (affl. Gezi borealis) 25. VI въ цв.! (*Д. И. Ивановъ*).—1895. Близъ Джарты Гумбаза на выс. около 13,500' (*Alcock*; non vidi).—1897. Мусколъ, каменистые склоны, 11. VII (*Коржинский!*).—1899. Памирь (*Н. Вельманъ!*).—1901. Между озеромъ Каракуль и Мусколомъ, на сланцахъ, 6: VII въ цвѣту, 13,400—14,100; на Акъ-Байталъ, 14,500—15,000', 8. VII въ цв. и 8. VIII въ цв.; между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13,100—12,500', на каменистыхъ склонахъ, 18. VII въ цв. (*О. и Б. Федченко!*).—1901. Р. Акъ-Байталъ, сырой лугъ (*Туиновъ!*).—Цвѣты золотисто-желтые.

Геогр. распир.: а) Памирь, Тяньшань.—б) Зап. Тибетъ, Монголія, Алтай, страна Тангутовъ.

34. *Corydalis Gortschakowii* Schrenk in Fisch. et Mey., Enum. (I) pl. nov. a cl. Schrenk lectarum p. 100.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 746, № 18a.—Non *C. Gortschakowii* *Hooker*, Fl. Br. Ind. I, p. 125, № 14, quae ad *C. thrysiflora* Prain refertur.

1895. Яшиль-куль, въ цв. (*Боголюбенский!*). Для Памира

¹⁾ Въ гербаріи Имиер. Сиб. Ботаническаго Сада есть также *Corydalis Ledebouriana* Kar. Kir., собр. 24.VI, 1889 г. на Яшиль-куль, 3800 м., Громчевскимъ. Но онъ собранъ не на Памире, а на Яшиль-куль, где Громчевский былъ лишь поздней осенью (въ октябрѣ) 1889 года, а на другомъ озере того же имени, лежащемъ въ Горной Бухарѣ, и следовательно къ числу памирскихъ растеній не относится. Яшиль-куль значитъ—зеленое озеро.

(р. Найза-ташъ, р. Каинды, до 13000') указывается также (на этикетке в герб. Сиб. Бот. Сада) Бржецикимъ, но собранный имъ экземпляр взятъ въ ущельи Агачъ-артъ (въ Алайскомъ хребтѣ) и весьма возможно, что указаніе его относится къ другому виду того-же рода, *C. stricta* Steph., довольно распространенному на Памиръ и по видѣнию виду очень сходному съ *C. Gortschakowii* Schrenk.

Геогр. распир.: Джунгарскій Алатау; Малый Алай!!; Алайский хребеть, Бордаба!! въ Заалайскомъ хребтѣ; Тяньшань. — Видъ Туркестана типическая форма этого вида не встрѣчается.

35. *Corydalis capnoides* (L.) Pers., Synops. plant. v. enchy. II, 270. 1807.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, pp. 103 и 747, № 21.—*Fumaria capnoides* L., Sp. plant. ed. 1, p. 700 (1753).

var. *tenella* (Kar. Kir.) Fedtsch.—*C. tenella* Kar. et Kir., Enum. pl. Songar. № 60.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 4. № 11.

1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).

Геогр. распир. вида: а) Встрѣчается въ окрестностяхъ Омска, въ Тяньшанѣ, Джунгарскомъ Алатау и на Памиро-алаѣ.—б) Сибирь (окр. Тюменя, Иркутская губ., Алтай, Байкалъ, Даурія), ср. и ю. Европа, Китайскій Туркестанъ, средній Уралъ.

IV. Cruciferae.

36. *Arabis kokanica* Rgl. et Schmalh. in A. П. Федченко, Путеш. въ Турк., вып. 18, р. 6.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам. р. 4. № 17.

1892. Верховья Аличура, пл. (*Назаровъ!*).

Геогр. распир.: Алайский хребеть, Заравшань. Для Памира указаніе Назарова пока не подтверждилось.—Видъ Туркестана не указана.

37. *Parrya nudicaulis* (L.) Boiss., Fl. Or. I, p. 159.—*Parrya macrocarpa* R. Br. in Parry's 1. Voyage App. p. 270.—*P. macrocarpa* R. Br. *Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 131 et 751.—*P. macrocarpa* Br. *Hook.*, Fl. Br. Ind. I, p. 131.—*P. nudicaulis* L. var. *aspera* Rgl., *Комаровъ*, Мат. фл. Турк. нагорья р. 87.

Указ. для Памира: Федченко О., Раст. Памира, р. 9, № 12.

(30)

1901. Между урочищемъ Ходжа-Назаръ и переваломъ Кой-тезекъ, 14,000—15,000' (на щебниевыхъ розыняхъ), 20. VII въ цвету и съ молодыми плодами (Б. А. и О. А. Федченко!!).—Цветы розовые.

var. *turkestanica* Korsh., Fragmenta fl. Turkest. p. 408.

1897. Въ верх. р. Лянгаръ-су 18. VIII пл. (*Коржинскій!*).

Геогр. распир.: а) Горы верхняго Заравшана, Алайский хребеть, Шугнань, Памиръ, Джунгарскій Алатау.—б) Уралъ, Алтай, Тибетъ 14—15,000', с.-з. Гималаи, Афганистанъ, арктич. обл. европ. Россіи, Сибири и Америки.

38. *Parrya flabellata* Rgl. Regel et Herder, Enum. pl. Semen. („Bull. d. Soc. Nat. Moscou“ 1870, II, p. 261).—*Franchet*, Pl. Poncins p. 346 (*P. flabellata* Rgl.).

Указ. для Памира: *Franchet*, Pl. Poncins p. 343 et 346 (*P. ramosissima* Franch.). — Федченко О., Растенія Памира, р. 10, № 13.

1878. Перевалъ Кизыль-артъ, на вершинѣ, 22. VII цв. (*Кушакевичъ!*). — Алла-Байталъ (*Ашурбаевъ!*). — 1895. Кизыль-артъ, на перевалѣ, почва красная глинистая, 8. VII въ цв.; въ долинѣ р. Кохъ-сай, на луговинѣ, 9. VII въ цв. и пл. (*Коржинскій!*). — 1893. Кизыль-артъ (Poncins [non vidi] ex *Franchet* l. c., sub *P. flabellata* Rgl.); Караджильга (Poncins [non vidi] ex *Franchet* l. c. sub *P. ramosissima* *Franchet*). — 1901. II. Кизыль-артъ (*Тулиновъ!*). — 1901. На южной (памирской) сторонѣ перевала Кизыль-артъ, на глинисто-каменистыхъ склонахъ, 14,600—14,000', 3. VII въ цв. и между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизыль-артъ, 13,400—14,600', 10. VIII въ плодахъ (Б. и О. Федченко!!). — Цвѣты голубые.

Геогр. распир.: Встрѣчается на Памире, въ Алайскомъ хребтѣ (на пер. Джинтыкъ, 12,500', на пер. Караказукъ, 12,200'), въ Заалайскомъ хребтѣ и на Тяньшанѣ, однако довольно рѣдка и попадается исключительно въ алайской области. — Видъ Туркестана не найдена.

39. *Parrya eriocalyx* Rgl. et Schmalh. Regel, Descr. pl. nov. („Acta Horti Petrop.“ V. 1, p. 234).

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам. р. 4, № 12.

— Федченко О., Растенія Памира, р. 10, № 14.

1878. Перевалъ Кизыль-артъ, 23. VII и р. Чонъ-су 6. VIII (*Кушакевичъ!*). — 1892. Р. Акъ-Байталъ, въ цв. (*Назаровъ!*). — 1895. Кизыль-артъ, на перевалѣ, почва красная глинистая,

(31)

8. VII цв. и пл. и въ верховыи р. Уй-булакъ 9. VII въ цв. (*Коржинский!*).—1897. Кокъ-сай, на песчаныхъ и галечныхъ склонахъ горъ, 9. VII цв. и пл.; на вершинѣ перевала Кизыль-джикъ, 16,000', 12. VII цв.; около озера Рангъ-куль, на каменистой почвѣ холмовъ и долинъ 13. VII цв.; по р. Баянъ-кынъ 27. VIII отцвѣтніе! и въ плодахъ (*Коржинский!*).—1901. На южной сторонѣ перевала Кизыль-артъ, 14,600—14,000', на глинисто-каменистыхъ склонахъ и въ урочищѣ Маркансу, 13,100', 3. VII въ цв.; на щебневыхъ розсыпяхъ между уро-чищемъ Ходжа-Назарь и переваломъ Кой-тезекъ, 14,000—15,000', 20. VII въ цв.; между озеромъ Кара-куль и перева-ломъ Кизыль-артъ, 13,400—14,600', 10. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты розовые.

f. media (inter *P. exscapam* et *P. eriocalysem*) *Korshinsky* in sched. herb. Acad. Petrop.

1897. Кокъ-сай, на песчаныхъ и галечныхъ склонахъ горъ въ цв. 9. VII (*Коржинский!*).—1901. Наши растенія ближе къ *P. exscapa*, чѣмъ къ *P. eriocalyx*; собраны между Мар-кансу и Кара-кулемъ, 13,100—13,800', на Уй-булакъ среди гранита и на песчано-каменистыхъ склонахъ сѣв. берега озера Кара-куль, 4. VII въ цв.; у озера Кара-куль, 13,400', 5. VII въ цв.; на Акъ-байталъ и выше перевала Акъ-байталъ, до 16,400', 8. VIII въ пл. (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Теректы, Акъ-сай (Кауль-барсъ); Памиръ.—Внѣ Туркестана не найдена.

40. Parrya exscapa С. А. М., in *Ledb.*, fl. alt. III, p. 28.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, pp. 132 et 752.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. I, p. 151.

Указ. для Пам.: *Федченко* Б., Мат. фл. Пам., р. 4. — *Franchet*, Pl. Ponceins p. 346.—*Федченко* О., Растенія Памира, р. 10, № 15.

1878. Каръ-артъ 2. VIII (*Козловский!*) (оч. плох. экз.). Восточные предгорья Кара-куля 5. VIII (*Кушакевичъ!*).—1892. Акъ-байталъ, цв. (*Назаровъ!*).—1893. Кизыль-артъ, Караджильга (*Ponceins*; non vidi).—1897. Кокъ-сай, на песча-ныхъ и галечныхъ склонахъ горъ 9. VII цв. и пл. (*Коржин-ский!*).—1901. Уй-булакъ; Кара-куль, солончаки; сырье пески за Акъ-байталомъ (*Тулиновъ!*).—1901. Въ урочищѣ Маркансу, 13,100', на глинисто-солонцеватой равнинѣ, 3. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты розовые.

(32)

Геогр. распр.: а) Встрѣчается кромѣ Памира, также на Памиро-алаѣ (на перевалѣ Аучи-дагана 10,000'!!), на нер. Джингитыкъ 12,500'!!) и въ Тяньшанѣ.—б) Восточный Алтай, Тибетъ.

41. Meniocus linifolius (Steph.) D.C. Syst. II, p. 325.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 134.—*Alyssum linifolium* Steph. in *Willd.* III, p. 467.—*Alyssum linifolium* Steph. *Boiss.*, Fl. Or. I, p. 286.

1878. Карасу 31. VIII (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распр.: а) Памиръ, Памиро-алаї (окр. Самар-канда!!), Тяньшань, Джунгарія.—б) Ю. и В. Россія, Крымъ, Кавказъ, Арменія, Испанія, Сѣв. Африка, Anatolia, Сирія, Малая Азія, Палестина, вост. Персія, Белуджистанъ, Афга-нистанъ, Алтай, сѣв. Монголія.

42. Draba alpina L.—*Linne*, Spec. plant. I, p. 642.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 146.—*Boiss.*, Fl. Or. I, p. 297.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. I, p. 142.

Указ. для Памира: *Duthie*, *Alcock's* pl. p. 19, № 8 (*D. alpina* L.?). *Коржинский*, Оч. раст. Турк., р. 88 (*Pseudobraya Kisylarti* *Korsh.*).—*Федченко* О., Растенія Памира, р. 10, № 16 и р. 11, № 17.

1878. Каръ-артъ, VIII (*Козловский!*) (въ герб. Спб. Б. С.; въ герб. Ак. Наукъ подъ именемъ *D. Wahlenbergi* Hartm.).—1895. На высотѣ 13—14,000' (*Alcock*; non vidi).—1895. Въ долинѣ р. Кокъ-сай около Кизыль-арта 8. VII пл.! и 9. VII! съ послѣдними цвѣтами и почти зрѣлыми плодами (*Коржин-ский!*, подъ именемъ *Pseudobraya Kizil-arti*).

По характеру роста и листьевъ, у растенія, собранного Коржинскимъ, цвѣты должны быть желтые; и если онъ въ описаний своемъ называетъ ихъ бѣлыми, то потому, что видѣть ихъ уже отцвѣтающими и измѣнившими свой первоначальный цвѣтъ отъ засыханія. Самъ онъ впослѣдствіи измѣнилъ свое название (въ герб. Акад. Наукъ и Импер. Бот. Сада) на *Draba physocarpa* Kom., причемъ къ этому же виду отнести двѣ другія собранія имъ на Памире формы *D. alpina*, которая я называю var. *pamirica* и var. *Korshinskii*.—1898. Чатыръ-ташъ 3. VI цв. (*Ove Paulsen!*).

Геогр. распр.: а) Встрѣчается на Памиро-алаѣ и въ Тяньшанѣ.—б) Афганистанъ, Гималаи, вся сѣверная арктическая область, Тибетъ, сѣв. Монголія, Алтай, Уралъ, Альпы Европы, скалистыя горы Америки.

(33)

var. pamirica O. Fedtsch. (var nov.).—*Федченко О.*, Растения Памира № 16 („Материалы“ Общ. Исп. Пр. вып. 5, р. 10).

1897. Перевалъ Кизыль-Джинкъ, на вершинѣ (16.000') 12. VII цв. и мол. пл. (*Коржинский!* № 2075).—1901. На перевалъ Кой-тезекъ, 15.100', 20. VII въ цв. и пл. (*О. и Б. Федченко!!*).

Цвѣты золотисто-желтые, крупные для этого вида. Стручечекъ (незрѣлый) широко-яйцевидный; длина столбика въ $\frac{1}{5}$ часть стручечка. Цвѣты расположены укороченной кистью (щиткомъ). Листья зеленые, въ несплотныхъ розеткахъ, сверху голые, по краю усаженные довольно длинными простыми или вѣтвистыми волосками.

var. Korshinskii O. Fedtsch. var nova,—*О. Федченко*, Раст. Памира, № 17 („Мат.“ Общ. Исп. Прир. вып. 5, р. 11).

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам. р. 4. (*Draba physocarpa Komar.*), *О. Федченко* I. с. № 17.

1892. Акъ-байталъ, цв. (*Назаровъ!*).—1897. На перевалъ Кой-тезекъ, каменисто- песчаная почва, 22. VII, цв. желтые (*Коржинский!*, № 2449, въ герб. Ак. Н.; въ герб. Б. С. имъ же собранныя такія же растенія уже изъ предѣловъ Шугнана—Учъ-коль! за переваломъ Кой-тезекъ 22. VII, Кокъ-бай! 23. VII); по р. Лянгаръ-су, въ верховьяхъ, на каменистыхъ склонахъ горъ, 18. VIII (*Коржинский!*), цв. и мол. пл.—1901. На перевалъ Кой-тезекъ, 15.100', 20. VII и 1. VIII, въ цв. и пл., на щебниевыхъ розсыпяхъ!! (*Б. и О. Федченко*).

Это чрезвычайно характерная разновидность, которую, можетъ быть, правильно было бы выдѣлить въ особый видъ. Называю ее въ честь слишкомъ рано почившаго, многоуважаемаго С. И. Коржинскаго. Отъ *D. physocarpa* Ком., къ которой относится ее въ герб. самъ Коржинскій, она отличается формой стручечковъ, яйцевидно-эллиптическихъ, сверху суженныхъ (а не вздутыхъ и почти шарообразныхъ), короткимъ столбикомъ, большимъ количествомъ ¹⁾ цвѣтовъ, расположенныхъ удлиненной кистью, и опушениемъ листьевъ, покрытыхъ простыми и вѣтвистыми волосками, но не мохнатопушистыхъ.

Многолѣтнее; образуетъ густыя дерновинки; листья скуч-

¹⁾ Сомнительно, чтобы и у *D. physocarpa* Ком. (*Комаровъ*, Мат. по фл. Турк. нагорья, р. 102, № 178) было только два цвѣтка: у единственного экземпляра, по которому сделано описание В. Л. Комарова, верхушка стрѣлки отошла.

чены плотными розетками, сбро-зеленые, покрытые простыми и вѣтвистыми волосками, сухие съ замѣтнымъ килемъ; цвѣты въ живомъ состояніи желтые (сухие желтовато-блѣлые), расположены удлиненной (при плодахъ) кистью; стручечки яйцевидно-эллиптические, съ короткимъ столбикомъ.

43. *Draba Tranzschelii* Litw. *Litwinow*, Flora turkestanicae fragmenta, p. 3 (14), № 2 „Труд. Бот. Муз. Ак. Наукъ“, вып. 1, 1902 г. стр. 14).

1898. Оз. Яшиль-куль, 4000 м. цв. и пл. (*Paulsen!*).—Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: Въ Алайскомъ хребтѣ: при слѣяніи Кара-джильги съ Шартомъ; близъ Иркештама; на Тяньшанѣ; въ Александровскомъ хребтѣ на перевалѣ Кумбель 9—10,000'; въ горахъ Суссамыръ на щер. Сандыкъ 9—11,500'; въ Бухарѣ: Карагеинъ, на перевалахъ и у ледниковъ въ Гиссарскомъ хребтѣ.—Въ Туркестана не указана.

44. *Draba altaica* Bge., Delect. sem. hort. Dorpat. 1841, p. VIII.—*Ledb.*, Fl. ross. I, p. 754.—*Draba fladnitzensis* Wulf. var. *homotricha*, *Hooker*, Fl. br. Ind. I, p. 143, № 7.

Указ. для Памира: *О. Федченко*, Раст. Памира, р. 11, № 18.

1878. Каръ-артъ VIII, цв. (*Козловский!*).—1901. На южной сторонѣ перевала Кизыль-артъ, на глинисто-каменистыхъ склонахъ, 14.600—14.000', 3. VII въ цвѣту; на глине у самаго перевала Акъ-байталъ, 15.700', 8. VII въ цвѣту; между уро-чищемъ Ходжа-Назаръ и переваломъ Кой-тезекъ на алынѣ-скихъ лужайкахъ, до 15,000', 20. VII цв. и плоды (*Б. и О. Федченко!!*).—1901. На перевалѣ Кизыль-артъ, пл. (*Тулиновъ!*).—Цвѣты блѣлые.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Памиръ, Тянь-шань.—б) Шинцбергенъ, Новая Земля, Земля самоѣдовъ, Вайгачъ, Медвѣжій островъ, арктич. Сибирь, вост. Алтай.

45. *Draba incana* L., Spec. plant. I, p. 643.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 152, № 32.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I, p. 143.

Указ. для Памира: *Franchet*, Pl. Poncins p. 346 (*Draba incana* L.?).—*Федченко О.*, Растенія Памира, р. 11, № 19.

1895. Въ долинѣ р. Кокъ-сай, недалеко отъ Кизыль-арта, 8. VII мол. пл. (*Коржинский!*).—1893. Кизыль-артъ (*Poncins*, non vidi).—1897. По р. Лянгаръ-су, на каменистыхъ берегахъ, 17. VIII пл. (*Коржинский!* въ герб. А. Н.) (var. *contorta* Lindl.).

var. multicaulis Rgl. in sched. — *O. Федченко* „Списокъ“
„Пут. въ Турк. А. П. Федченко“ вып. 23, р. 14, № 102).

1901. Между Карасу и Чатырь-ташемъ, 13.100—14.300', 16. VII въ плодахъ. Между камнями у подошвы скаль (песчано-каменистыхъ склоновъ) (Б. и *O. Федченко*!). — 1901. На перевалъ Кизылъ-артъ, пл. (*Тулуновъ*). — Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: а) Встрѣчается на Памиро-алаѣ, въ Тяньшанѣ, въ горахъ Аркатъ, Тарбагатаи и Джунгарскомъ Алатау и на Памирѣ. — б) Европа, арктическая, сѣв. и среди Россіи, Ураль, Кавказъ, Монголія, Тибетъ, Китай, сѣв. Азіи (Алтай, Забайкалье, Даурія, Камчатка), алтайская и аркт. Америка, Огненная земля, альп. Гималаи, Амурскій край, Якутская обл., Гренландія.

46. *Draba lasiophylla* Royle, Ill. p. 71.—*Boiss.*, Fl. Or. I, p. 301.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. I, p. 143, № 6.

Указ. для Памира: Duthie, *Alcock's* pl. p. 19, № 9.

1895. На высотѣ 13—14.000' (*Alcock*; non *vidi*). — Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: а) Памиро-алаї (?), Памиръ. — б) Тибетъ 15.000—16.500', альп. Гималаи 12,000—18,000'.

47. *Draba media* Litw., Flora turkestanicae fragmenta l.c. 12.

Указ. для Памира: *Федченко* О., Растенія Памира, р. 11, № 20.

1897. По р. Лянгарь-су, въ верховьяхъ, на каменистыхъ склонахъ горъ, 18. VIII цв. и пл. (*Коржинский*! № 3597, въ герб. А. Н.). — 1901. Между уроцищемъ Ходжа-Назаръ и переваломъ Кой-тезекъ, 13,800—15,100', 20. VII въ цв. и пл. (Б. и *O. Федченко*!).

Одно изъ немногихъ однолѣтнихъ растеній Памира. Цвѣты желтые, у отцвѣтающихъ (сухихъ) бѣлые.

Геогр. распр.: Памиръ; Алайскій хребетъ: перевалъ Кенколь, Карап-джилъга, пер. Белеули, Гульша, Хатынъ-артъ, р. Талдыкъ. Верхній Заравшанъ; верхній Ягнобъ; Бухара (въ Дарвазѣ, у ледниковъ); Закаспійская область: Фирюза 9500'. Виѣ Туркестана пока не указана.

48. ?*Draba hyperborea* Desv. — (*D. grandis* DC.; *Delless.*, Ic. Sel. II, t. 47). — Duthie *Alcock's* pl. p. 19, № 10.

1895. На высотѣ 13—14.000'. Не очень обыкновенно и рѣдко попадалось въ цвѣту (*Alcock*; non *vidi*).

Судя по замѣткѣ Duthie, который говорить, что у этого растенія ярко красные цвѣты, и листья, похожіе на листья *Christolea crassifolia*, и по рисунку, на который онъ ссылается, его *Draba hyperborea* вѣроятно не что иное, какъ дѣйствительно *Christolea*; какой видъ — сказать нельзя, такъ какъ мы не знаемъ, мохнатые (какъ у болѣе обыкновенной *Chr. crassifolia Cambess.*) или голые (какъ у болѣе рѣдкой *Chr. pamirica Korsh.*) листья у растенія *Alcock'a*. Цвѣты же у обоихъ видовъ хотя и желтые, но съ пурпуровымъ пятномъ при основаніи лепестковъ, которые при высыханіи иногда совсѣмъ краснѣютъ (Duthie видѣлъ только сухіе экземпляры).

Ледебуръ (*Flora Rossica* I, p. 158, № 9) считаетъ *Draba grandis* за синонимъ *Cochlearia spathulata* Schlechtend., которая растетъ въ сѣверо-восточной Сибири близъ Охотска и на островахъ св. Георгія и св. Павла.

49. *Thlaspi alpinum* Jacq. var. *Poncinsii* Franchet, Note sur une coll. d. pl. rapp. par Poncins, pp. 343 et 346.

Указывается Франше для перевала Талдыкъ, т. е. для Алайскаго хребта, а не для Памира.

Геогр. распр.: Европа.

По всей вѣроятности, растеніе, собранное *Poncins* (non *vidi*) то же самое, которое другими авторами приводится для Туркестана подъ именемъ *Thlaspi cochleariforme* DC. (*Syst. II*, p. 381.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 164 № 10) и распространено въ Алайскомъ хребтѣ и Тяньшанѣ, а также на Алтай, Байкалѣ и въ Дауріи.

50. *Chorispora exscapa* Bge. — *Chorispora exscapa* Bge. *Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 169 et 758.—*Chorispora exscapa* Bge. *Hook.*, Fl. br. Ind. I, p. 167. — *Chorispora Bungeana* Fisch. et Mey., Enum. pl. nov. a cl. *Schrenk lectarum*, 1841 p. 96.

Указ. для Памира: *Федченко* Б., Мат. фл. Пам. р. 4 (*Ch. Bungeana* F. et M.). — *Franchet*, Pl. *Poncins* p. 346 (*Ch. Bungeana* F. et M.). — *Коржинский*, Fragm. fl. Turk. p. 424 (*Ch. exscapa* Bge.). — *Федченко* О., Растенія Памира, р. 11, № 22.

1878. На перевалѣ Кизылъ-артъ, на южной сторонѣ, въ верховьяхъ, на самомъ гребиѣ, 22. VII цв.! и 8. IX пл! (*Кушакеевъ*) (var. *pilosula*). — 1891. Перевалъ Юнова на Гиндукушѣ 26. VII (*Бржезицкій*!); (онъ же указывается на этикетѣ герб. для слѣдующихъ мѣстностей Памира: пер. Марджанай, пер.

Бендерского, пер. Тахта-гурумъ, до 18.000' (f. typica).—1892. Акъ-байталь, цв. (*Назаровъ!*).—1893. Кара-джильга (Roncins; non vidi).—1897. var. pilosula у перевала Кизыль-джинъ, 15.000', 12. VII и f. typica на вершинѣ того же перевала, 16.000', въ цвету 12. VII! (*Коржинский*).—1901. На южной сторонѣ перевала Кизыль-артъ, на глинисто-каменистыхъ склонахъ, 14.600—14.000', 3. VII въ цвету!! и 10. VIII въ цвете!! (Б. и О. Федченко).—1901. Перевалъ Кизыль-артъ (*Тулиновъ!*).

Геогр. распир.: а) Встрѣчается на Памиро-алаѣ (Караказукъ 12.200'!!), ледникъ Шуровскаго 10.730'!!; Малый Алай до 13.400' въ Джунгарскомъ Алатау и очень обыкновенно во всей высокогорной области Тяньшаня.—б) Алтай, Афганистанъ.

51. *Chorispora macropoda* Trautv., Enum. pl. songor. („Bull. Soc. Nat. Moscou“, 1869 I, p. 109).

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам. р. 4, № 28.—*Franchet*, pl. Poncins p. 346 (var. glabra Franchet).—Федченко О., Раст. Памира р. 11, № 21.

1878. Перевалъ Акъ-байталь, 14.500'! и 15.000'!, 7. VIII (*Кушакевичъ*).—1892. Акъ-байталь, цв. (*Назаровъ!*).—1897. У озера Кара-куль, на сухой, песчаной почвѣ долины озера 10. VII въ цвет. (№№ 2025 и 2026); на вершинѣ перевала Кизыль-джинъ 12. VII въ цвет. (№ 2074); на перевалѣ Кої-тезекъ, каменисто- песчаная почва, 22. VII; на каменистой вершинѣ перевала Тахта-горумъ! (№ 3862) (*Коржинский*).—1901. На южной сторонѣ перевала Кизыль-артъ, 14.600—14.000', на глинисто-каменистыхъ склонахъ, 3. VII въ цвету, на перевалѣ Кої-тезекъ, 15.000', сырая лужайка, 20. VII въ цвет. и пл., выше перевала Акъ-байталь, до 16.400', 8. VIII плоды (Б. и О. Федченко!).—Цвѣты мелкие, желтые.

var. *glabra* Franchet, Pl. Poncins, p. 346.

1893. Кизыль-артъ (Roncins; non vidi).

Геогр. распир.: Встрѣчается на Памиро-алаѣ (перевалъ Исфайрамъ 11.800'!!; Мал. Алай до 13.400'!!), въ Джунгарскомъ Алатау и въ Тяньшанѣ.—Внѣ Туркестана не найдена.

52. *Chorispora sibirica* DC. Syst. II, p. 437.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 169 et 758.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. I, p. 167, № 2.—var. *songorica* (Schrenk). (= *Chorispora songorica* Schrenk).

(38)

Указ. для Памира: Федченко О., Растенія Памира р. 11, № 23.

1901. Между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизыль-артъ, 13.400—14.600', 10. VIII въ цвет. и пл. (Б. и О. Федченко!).—Цвѣты мелкие, желтые.

Сюда же, можетъ быть, относится *Chorispora* sp. (*Franchet*, Pl. Poncins p. 346), собранная на Кизыль-артѣ Roncins (non vidi).

Геогр. распир.: а) var. *songorica* встрѣчается въ Джунгарскомъ Алатау и на Памире.—б) Типическая форма встрѣчается близъ Барнаула, въ западной Сибири и степяхъ Алтая, въ Монголіи и зап. Тибетѣ.

53. *Chorispora sabulosa* Camb. in *Jacquem.*, Voy. Bot. 15, tab. 15.—*Boiss.*, Fl. or. I p. 144.—*Hooker*, Fl. of Br. Ind. I p. 167, № 3.

Указ. для Памира: Duthie, *Alcock's* pl. p. 20 № 15. 1895. На высотѣ 13—14.000' (*Alcock*; non vidi). Цвѣты желтые.

Геогр. распир.: а) Памиръ, Памироалай: переваль Мура, 12.000';—б) Афганистанъ, зап. Гималаи и зап. Тибетъ.

54. *Sisymbrium glandulosum* (Kar. Kir.) Maxim. *Flora Tangutica*, p. 61 № 98.—*Arabis glandulosa* Kar. et Kir., Enum. pl. song. № 67.—*A. glandulosa* Kar. et Kir., *Ledb.*, Fl. Ross. I p. 750.

1897. Около озера Сассыкъ-куль, на каменистомъ берегу ручьевъ, 20. VII цвет. и пл. (*Коржинский*!, №№ 2332 и 2334).

Геогр. распир.: а) Р. Сарханъ въ субъ-альпийскомъ Джунгарскомъ Алатау;—б) Западный Тибетъ, Амдо.

55. *Sisymbrium brassicaeforme* C.A.Mey. in *Ledb.*, Fl. alt. III p. 129.—*Ledb.*, Fl. Ross. I p. 178 et 759.

Указ. для Памира: Федченко, Б., Мат. фл. Пам. р. 4, № 19.—Федченко О., Растенія Памира, р. 12, № 24.

1883. У р. Памиръ 4 VIII плод. (Д. Л. Ивановъ!).—1892. Мургабъ, цв. и мол. пл. (*Назаровъ!*).—1901. Отъ Памирского Поста до Карасу, 12.650—13.000', на крутыхъ каменистыхъ склонахъ, 15. VII въ цвет. и пл. (Б. и О. Федченко!).—Цвѣты желтоватые.

Геогр. распир.: а) Встрѣчается на Памиро-алаѣ (горы по Заравшану!!, Ферганы!! и Шугнана!!, Басмандинское

(39)

ущелье!!), въ Тяньшань, Джунгарскихъ степяхъ и Тарбагатаѣй и Закаспийской области; — б) Алтай.

56. *Sisymbrium Sophia* L. Sp. pl. ed. I p. 659.—*Ledb.* Fl. Ross. I. p. 180 № 13.—*Boiss.* Fl. Or. I p. 216.—*Hooker*, Fl. of Br. Ind. I p. 150 № 12.

f. *nana*.

1898. Озеро Яшиль-куль (*Паульсенъ*, № 968) цв. и пл. (опр. Лицкій!).

Геогр. расп р.: а) Заравшанская долина, Алайскій хребеть, Тяньшань, Сырь-даринская область, Джунгарія.— б) Распространено широко: Зап. Гималаи, Тибет, Монголія, Китай, Японія, Пенджабъ, сѣв. Африка, С. и Ю. Америка, Европа, вся европейская Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Алтай, Байкалъ, Даурія, Персія, Афганістанъ.

57. *Sisymbrium pumilum* Steph. in Willd. Spec. plant. III p. 507.—*Ledb.*, Fl. Ross. I p. 181. № 16.

Var. *alpinum* Korsh., Fragm. fl. Turkest. p. 410.

Указ. для Памира: *Korshinsky*, I. c.

1878. Яшиль-куль, 23. VII (*Кушакевичъ*).—1897. Въ верховьяхъ рѣки Лянгаръ-су, на бывшей стоянкѣ, сорное, 18. VII цв. и пл. (*Коржинскій*!).

Геогр. расп р.: а) Памиръ, Памиро-алай (Шугнанъ!!), Бухара!!, Самаркандъ!!), Саларъ близъ Таракента!!, Джунгарія.— б) Ю.-в. Россія, Закавказье, Персія, Сирія, Аравія, Афганістанъ, Белуджистанъ.

58. *Sisymbrium sulphureum* Korsh., Fragmenta fl. Turkest. p. 411 tab. III f. 12.

Указ. для Памира: *Korsh.* (I. c.) — *Федченко* Б., Мат. фл. Пам. р. 4, № 29. — *Федченко* О., Растенія Памира, р. 12, № 27.

1892. Акъ-байталь!, Карасу!, цв. и мол. пл. (*Назаровъ*).—1897. У оз. Кара-куль, на сухой песчаной почвѣ долины озера 10. VII. цв. и пл. (*Коржинскій*, № 2020); по долинѣ р. Акъ-байталь 14. VII. fl. (*Korshinsky*, I. c.); въ долинѣ Мургаба у Памирского Поста, на каменисто-песчаномъ сухомъ руслѣ, 16. VII. цв. и пл. (*Коржинскій*!). — 1899. Памиръ (*H. Вельманъ*). — 1901. На южномъ склонѣ перевала Кизыль-артъ 14.600—13.500' 3. VII въ цв.; на песчано-каменистыхъ склонахъ между Маркансу и Кара-кулемъ 13.100—13.400' 4. VII. въ цв.; у озера Кара-куль, на песчаной равнинѣ, 5. VII. въ цв.; въ щебневой пустынѣ между озеромъ Кара-

(40)

куль и Мусколомъ, 13.400—14.100' 6. VII. въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Карабу, 12.650—13.100', въ цв. и пл. 15. VII и 4. VIII; между Памирскимъ Постомъ и Гурумдами, 12.650—14.000' 7-го, отъ Гурумдовъ до Мускола, около 14.000', 8-го и отъ Мускола до озера Кара-куль 9. VIII. въ плодахъ; между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизыль-артъ 10. VIII. цв. и пл. (*Б. и О. Федченко*!!). — 1901. На Уй-булакѣ; у озера Кара-куль; на мокромъ пескѣ на Мусколѣ; на ледниковыхъ холмахъ передъ! и за Сассыкъ-кулемъ! (*Тулиновъ*!).

Обыкновенное на Памирѣ растеніе; встречается на глинистой, песчаной, солоноватой и каменистой почвѣ.

Цвѣты сѣрио-желтые.

59. *Sisymbrium Korolkowi* Rgl. et Schmalh.

Regel, Descr. pl. nov., fasc. V. p. 240 № 41. — *Sisymbrium mongolicum* Maxim., Fl. Mongol. p. 61 № 148.

1898. Озеро Кизыль-куль, 17. (= 5) VI. цв. (соб. *Паульсенъ*, опр. Лицкій!). — 1901. 5. VII, на скалахъ съ пескомъ возлѣ озера Кара-куль и 6. VII, въ щебневой пустынѣ между оз. Кара-куль и Мусколомъ, мы различали, среди экземпляровъ *S. sulphureum* съ сѣрио-желтыми цвѣтами, рѣже встречающиеся съ почти бѣлыми, которые считали за *S. Korolkowi*. Засушеннія растенія, однако, не представляютъ достаточныхъ отличий и вѣроятно все относятся къ одному и тому же виду (*Б. и О. Федченко*!!).

Геогр. расп р.: а) На перевалѣ Долонъ въ Терской Алатау, Памиръ (*S. Korolkowi*), пустыни Джунгаріи, долина Алая (*S. mongolicum*).— б) Сѣв. Монголія, Ю. Алтай (*S. mongolicum*).

60. *Sisymbrium nandum* DC. Syst. II p. 486.—*Ledb.*, Fl. Ross. I p. 181 № 17. — *Malcolmia nana* (DC.) Boiss. Fl. Or. I. p. 222.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 19. № 11 (*Malcolmia nana* Boiss.—*Sisymbrium binerve* C.A.M.; *Jaub.* et *Spach.*, Ill. Or. t. 298).

1895. Не часто; найдено только на безплодной почвѣ, на выс. 13—15.500' (*Alcock*; non *vidi*).

Геогр. расп р.: На морскомъ берегу въ Анатоліи, на Каспийскомъ морѣ близъ Баку и Ленкорани, Энзели въ сѣв. Персіи; восточная Сибирь.

(41)

61. *Sisymbrium humile* C.A.Mey. in *Ledb.*, *Flora altaica* III, 137. — *Ledb.*, *Fl. Ross.* I, p. 184.

Указ. для Пам.: *O. Федченко*, Растения Памира, р. 12, № 26.

1892. Акъ-Байталъ, цв. и мол. пл. (*Назаровъ!*; видѣла въ его герб.). — 1895. Кизыльтъ-артъ, немного ниже перевала, по утесамъ, 8. VII, цв. и пл. (*Коржинский!*). — 1897. Около Мускола 12. VII (*Коржинский!*); по р. Акъ-байталъ, каменистая пустыня (широкая долина), на берегу; 14. VII (*Коржинский!*); въ долинѣ Мургаба у Памирского Поста, на каменисто-песчаномъ сухомъ русль, 16. VII, пл. (*Коржинский!*, № 2199). — 1901. Чичикты, 12.750', 9. VII, въ цв. и мол. пл.; между Памирскимъ Постомъ и Ша-диканомъ, 12.650—12.450', 12. VII, въ цв. и пл.; оть Памирского Поста до урочища Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII, въ плодахъ (*Б. и О. Федченко!!*).

Геогр. распр.: а) Найденъ на Тяньшанѣ Красновымъ (въ герб.—Кюйлю, въ спискѣ—Бедель). — б) Сѣв. Монголія, Китайскій Туркестанъ, Тибетъ, Байкалъ, Алтай, сѣв. и арктическая Америка. На Алтай и въ Иркутской губ. растеть въ безводныхъ глинистыхъ и солончаковыхъ степяхъ (Крыловъ).

62. *Sisymbrium mollissimum* C.A.M. in *Ledb.*, *Fl. alt.* III, р. 140. — *Ledb.*, *Fl. Ross.* I, p. 185 et 760. — *Hook.*, *Fl. of Br. Ind.* I, p. 187.

Указ. для Памира: *Korshinsky*, *Fragm. fl. Turk.* p. 411. — *Федченко О.*, Растения Памира, р. 12, № 25.

1897. У озера Сассыкъ-куль, 20. VII, въ цв. и пл.; тамъ же, на каменистомъ берегу ручья, №№ 2335 и 2351, пл. (*Коржинский*). — 1901. Между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.540—13.100', 17-го и между Сассыкъ-кулемъ и Яшиль-кулемъ, 13.100—12.500', 18. VII, въ цв. и пл. (*Б. и О. Федченко!!*).

Геогр. распр.: а) Встрѣчается также на Аркатскихъ горахъ, въ Джунгарско-киргизской степи, на Алай; въ Шугнанъ!!; на Памирѣ рѣдко. — б) Алтай (на р. Чубъ), около Якутска, между Якутскомъ и Охотскомъ, Камчатка.

63. *Erysimum sisymbrioides* C.A.M. in *Ledb.*, *Fl. alt.* III, р. 150. — *Ledb.*, *Fl. Ross.* I, p. 136. — *Boiss.*, *Fl. Or.*, I p. 188.

1897. По р. Аличуру, 17. VII; тамъ же, въ урочищѣ Куйса, на сухой песчаной почвѣ долины 19. VII, цв. и пл. (№ 2317) (*Коржинский!*). — 1898. Чатыръ-ташъ, 3. VI, цв. и пл., 4000 м., оз. Булунъ-куль, 13. VIII, цв. и пл. (*Паульсенъ!*).

Геогр. распр.: а) Закаспійская область; солоноватая степь на р. Терсакканъ (Джунгарія), Тяньшань, Памиръ. — б) Сѣв. берегъ Каспійскаго моря, Армения, Персія, Малая Азія, Зап. Сибирь (Томск. г.), Монголія.

64. *Erysimum altaicum* C.A.M. in *Ledeb.*, *Fl. alt.* III p. 153. — *Ledb.*, *Fl. Ross.* I, p. 188. — *Boiss.*, *Fl. Or.* I, p. 206. — *Hooker*, *Fl. of Br. Ind.* I, p. 154. (= *E. Cheiranthus* Pers.).

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 4, № 20. — *Franchet Pl.* *Poncins*, p. 346. — *Федченко О.*, Растения Памира, р. 13, № 28.

1878. Каръ-артъ, VIII (*Козловскій!*). — 1883. Ad fl. *Pamir prope lacum magnum*, 24. VII, цв. (*Л. Л. Ивановъ!*). — 1891. Перевалъ Бенкъ, до 16.000' (*Брюсселлскій!*). — 1892. Карасу, цв. Акъ-Байталъ (*Назаровъ!*). — 1895. Зоръ-куль, 7. VII, цв.; Кокъ-белесь, 15. VII, цв. (*Вологоленскій!*). — 1895. Кизыльтъ-артъ, немного ниже перевала, по утесамъ, 8. VII! цв. и пл.; по р. Кокъ-саю около Кизыльтъ-арта, на холмахъ, 11. VII, цв. и мол. пл.! (*Коржинский*). — 1893. Кизыльтъ-артъ (*Poncins*; non *vidi*). — 1897. Урочище Сулу (т. е. мокрый) Тагаркакты, песчано-каменистые холмы и долины, 21. VII, цв. и пл. (*Коржинский!*, №№ 2375, 6, 7 и 9). — 1898. Кизыльтъ-куль, 3800 м., 15. VI (*Паульсенъ!*). — 1901. На глинисто-каменистыхъ склонахъ южной стороны перевала Кизыльтъ-артъ, 14.600—14.000', 3. VII, въ цв.; на щебьевыхъ розсыпяхъ между уро-чищемъ Ходжа-Назаръ и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII, въ цв.; между Ходжа-Назаромъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.800—13.100' 2. VII, въ плодахъ; оть озера Кара-куль до перевала Кизыльтъ-артъ, 13.400—14.600', 10. VIII, въ плодахъ (*Б. и О. Федченко!!*). — 1901. На перевалѣ Кизыльтъ-артъ; на ледниковыхъ холмахъ за Сассыкъ-кулемъ, пл. (*Тулиновъ!*).

Растеть на крутыхъ горныхъ склонахъ. Цвѣты крупные, золотисто-желтые. У нѣкоторыхъ экземпляровъ столбикъ длиннѣе, чѣмъ описываютъ. Ледебуръ и Буассе (у экз. Иванова въ 2 раза длиннѣе ширины молодаго стручка).

Геогр. распр.: а) Довольно обыкновенно въ высокогорной области Тяньшаня и встрѣчается на Памиро-Алай и въ Джунгарскомъ Алатау. — б) Сибирь, Кавказъ, зай. Гималаи и зап. Тибетъ, Монголія.

65. *Erysimum* sp.; близкій къ *E. lanceolatum* R. Br. (*E. pumilum* Gaud.).

Указ. для Памира: *Duthie, Alcock's pl. 20, № 14.*

1895. Довольно обыкновенно и растет массами въ сухихъ мѣстахъ открытаго Памира, на выс. 13—14.000' (Alcock; non vidi).

Собранные Олькоккомъ растеніе вѣроятно относится къ предыдущему виду — *E. altaicum* С.А.М.

66. *Erysimum* sp. *Franchet*, pl. Poncins, p. 346.

1893. *Bozai Gumbez* (Poncins; non vidi). По всей вѣроятности не что иное, какъ *Braya pamirica* m. (*Erysimum pamiricum* Korsh.), которая собрана въ той же мѣстности Богоявленскими въ 1895 г.

67. *Christolea crassifolia* Cambess. in *Jacquem.*, Voy. Bot. 17, t. 17. — *Hooker*, Fl. of Br. Ind. I, p. 154. — *Korshinsky*, Fragm. fl. Turk. p. 415 (*Ch. crassifolia* Camb. f. typica).

Указ. для Памира: *Korsh.* (l. c.). — *Федченко Б.*, Мат. фл. Памира р. 4 (№ 14. *Parrya microcarpa* et № 15. *Christolea crassifolia* Cambess. f. typica). — *Федченко О.*, Растенія Памира, р. 13, № 29.

1883. Притокъ съвер. Гези Ой-Балгынъ (Кацгар. Памирь) (Д. Л. Ивановъ!). — 1892. Яшиль-куль, пл.; Рангъ-куль; Мургабъ; (Назаровъ!). — 1897. Кокъ-сай, на песчаныхъ и галечныхъ склонахъ горъ 9. VII, цв.; у озера Рангъ-куль, на каменистой почвѣ холмовъ и долинъ, 13. VII, цв. и мол. пл.; переваль Акъ-байталъ, каменистая пустыня (широкая долина) 14. VII; переваль Балинъ-кіцкъ, къ югу отъ перевала Каинды, на каменистыхъ склонахъ, 27. VIII, пл.; *Коржинский!*). — 1899. Памирь (Н. Вельманъ!). — 1901. Въ урочищѣ Чичикты, 12.750', 9. VII, въ цв. (замѣчено въ тотъ же день на каменистыхъ склонахъ близъ урочища Гурумды 14.000'); на Памирскомъ Посту, 12.650', въ каменистой пустынѣ, 11—14. VII, въ цв. и пл.; между урочищемъ Ходжа-Назарь и озеромъ Сассыкъ-куль, въ щебневой пустынѣ, 13.800—13.100', 2. VIII, въ пл.; между Памирскимъ Постомъ и урочищемъ Гурумды, 7. VIII, въ цв. и пл.; на Акъ-байталъ, около 14.500', 8. VIII, въ пл.; между Мусколомъ и Каракулемъ, около 13.500', 9. VIII (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Рѣка Акъ-байталъ, сырой лугъ; на осипи передъ Найзаташемъ; на ледниковыхъ холмахъ за Сассыкъ-кулемъ; (Тулиновъ!).

Цвѣты желтые, часто съ пурпуровымъ пятномъ при основаніи лепестковъ.

Геогр. распир. а) На Памирѣ не рѣдко. Въ другихъ мѣстностяхъ Русского Туркестана не найдено; — б) Тибеть, Гималаи, Монголія.

68. *Christolea pamirica* Korsh.—*Коржинский*, Очерки раст. Турк., р. 89. — *Christolea crassifolia* Cambess. var. *pamirica* Korsh., Fragm. fl. Turk. p. 412 (17) № 28.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 4. № 16. — *Федченко О.*, раст. Памира, р. 13, № 30.

1878. Памирь-Харгоши: Кара-куль, 30. VII (*Ашурбаевъ!*); Кара-куль, 5. VIII (*Кушакевичъ* и *Скорняковъ!*); по долинѣ къ Суокъ-Чубыру, 5. VIII (*Скорняковъ!*). — 1892. Озеро Большой Кара-куль, бутоны (*Назаровъ!*). — 1895. Около озера Кара-куль на каменистыхъ склонахъ горъ 10. VII, цв. (*Коржинский!*). —

1897. Тамъ же, на сухой песчаной почвѣ долины озера, 10. VII, цв. (*Коржинский!*). — По р. Балынъ-кінкъ, къ югу отъ перевала Каинды, на каменистыхъ склонахъ, 27. VIII, пл. (*Корж.*!, № 3909, f. *media*, форма средняя между *Ch. pamirica* и *Ch. crassifolia*: коротко-пушистая). — 1901. Между Маркаису и Кара-кулемъ 13.100—13.400', на песчано-каменистыхъ склонахъ съвериаго берега озера Кара-куль, 4. VII; возлѣ озера Кара-куль, 13.400', на песчаной почвѣ, 5. VII, въ цвѣту и 10. VIII; между Мусколомъ и Кара-кулемъ 14.100—13.400', 9. VIII, въ плодахъ (Б. и О. Федченко!). — 1901. На пескѣ передъ Мусколомъ; на осипахъ по р. Мур-габъ; на ледниковыхъ холмахъ за Сассыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!*).

Цвѣты желтые, лепестки часто съ пурпуровымъ пятномъ при основаніи.

Геогр. распир.: Извѣстно только съ Памира, гдѣ встрѣчается гораздо рѣже предыдущаго вида.

Къ этому, или предыдущему виду рода *Christolea* относится, по всей вѣроятности, растеніе, собранное на Памирѣ Alcock'омъ и отнесенное Duthie (Alcock's plants, p. 19. № 10), подъ вопросомъ, къ *Draba hyperborea* Desv. (см. выше, подъ: *Draba hyperborea*).

69. *Didymophysa Fedtschenkoana* Regel. et Schmalh.
Regel, Descr. plant. nov. in A. П. Федченко, Путеш. въ Турк., III вып., 18, p. 8. 1881 г.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам. р. 4, № 25.

1892. Аличуръ, пл. (*Назаровъ!*).

Впервые собрано было мною въ 1871 г. въ Алайскомъ хребтѣ, затѣмъ найдено Комаровымъ въ бассейнѣ Заравшана и Б. Федченко въ 1897 г. въ Майдантальскомъ хребтѣ на Тяньшанѣ. Для Памира никакъ больше не указывается.

70. *Tetracme quadricornis* (Steph.) Bge, Ind. sem. h. Dorpat.
1836. — *Erysimum quadricorne* Steph. in Willd. Sp. pl. III, p. 514. — *T. quadricornis* Bge. Ledb., Fl. Ross. I, pp. 194 et 762. — *T. quadricornis* (Steph.). Boiss., Fl. Or I, p. 316.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Растенія Памира, р. 14, № 31.

1901. Между озеромъ Сассыкъ-куль и уроцищемъ Чатырь-ташъ, 13,100—13,540', 3. VIII, въ цв. и незр. пл. (*Б. и О. Федченко!!*).

Геогр. распр.: а) Собрano только разъ и въ плохихъ экземплярахъ. Встрѣчается на Памиро-алаѣ (Шугнанъ!!; Алай!!; по Заравшану), въ Тяньшанѣ и въ стенахъ Джунгари и Сырь-Дарьинской области; — б) южная Россія.

71. *Braya rosea* Bge, Index semin. horti Dorpat. a. 1839, p. VII. — *Ledb.*, Fl. Ross. I, pp. 195 et 763. — *Hooker*, Fl. of Br. Ind. I, p. 155. — *Maxim.*, Enum. Mong., p. 66, № 164. — *Maxim.*, Fl. Tangut., p. 69, № 116.

var. *albiflora* Maxim. Enum. Mong., p. 66, № 164. — *Braya aenea* Bunge, Delect. sem. h. Dorpat. a. 1841, p. VIII. — *Braya aenea* Bge, Korshinsky, Fragm. fl. Turkest. p. 416.

Указ. для Памира: *Korshinsky*, l. c., p. 416; (tab. III, fig. 13.—*B. aenea* Bge. var. *multicaulis* Korsh.). — *Федченко О.*, Растенія Памира, № 32.

1878. Уроч. Кокъ-сай, на солонцахъ, мол. пл.; р. Чонъсу и устье Узъ-били въ р. Чонъ-су. пл.; (*Кушакевичъ!*). — 1895. Въ долинѣ р. Кокъ-сай, около Кизыль-арта, на луговинахъ, 9. VII, цв. и пл.; у Кокъ-сая, 8. VII, цв. и мол. пл. (*v. simplicior* f. *grabra* и var. *simplicior* f. *pubescens* Korsh.); на полдорогъ между Карасу и Урустъ-булакомъ, уроцище Чуковой, на сырыхъ лужайкахъ, 18. VII, въ цв. (№ 2273, *v. simplicior* f. *pubescens* Korsh. — *Коржинскій!*).

1897. Около Мускола, 12. VII, цв. (№ 2078, *Коржинскій!*); по р. Балинъ-кикъ, къ югу отъ перевала Каинды, на каменистыхъ склонахъ, 27. VIII, пл. (*Коржинскій!*, №№ 3914 и 3915; var. *multicaulis* Korsh.). — 1901. На глинисто-ка-

менистыхъ склонахъ южной стороны перевала Кизыль-артъ, 14,600—14,000', 3. VII, въ цв.; между озеромъ Каракуль и Мусколомъ, на солоноватой луговинѣ на Мусколѣ, 6. VII, въ цв. и на глинисто-каменистыхъ склонахъ, 6. VII и 9. VIII, въ пл.; отъ Памирского Поста до урочища Гурумды, 12,650—14,000', 7. VIII, въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*). — 1901. Мокрый песокъ на Мусколѣ; у подошвы Акъ-Байтала; ледниковые холмы передъ Сассыкъ-кулемъ; на перевалѣ Кизыль-артъ, пл. (*Тулиновъ!*).

Цвѣты бѣлые, лепестки при основанії (у сухихъ) фиолетовые, цвѣточныхъ стрѣлокъ одна или иѣсколько (var. *simplior* Korsh. и var. *multicaulis* Korsh.), пушистыхъ. Стручечки пушистые, столбикъ удлиненный.

Встрѣчается на Памирѣ не часто, на сырыхъ лужайкахъ и на склонахъ горъ.

Геогр. распр.: а) Найдено также въ Алайскомъ хребтѣ на перевалѣ Кавукъ!! въ 1871 г. и на Тяньшанѣ: на пер. Теректы и въ долинѣ Аксая (Каульбарсъ), на Юлдусѣ (Пржевальский). — б) Алтай, тундры арктической Сибири около р. Оленека, сѣв.-вост. Россія (Новая Земля и земля Самоѣдовъ), алып. Гималаи, Тибетъ, Монголія.

var. *albiflora* Maxim. forma *gracilis* O. Fedtsch. — *Федченко О.*, Растенія Памира, р. 14, № 33.

Указ. для Памира: *О. Федченко* l. c.

1901. Акъ-байталь, на сѣверномъ склонѣ у рѣчки, 14,400', 7. VII въ цв.; на сыромъ лугу у Памирского Поста, 12,650', вмѣстѣ съ *Glaux maritima* L. и *Euphrasia Regelii* Wettst., въ половинѣ июля въ плодахъ; между Памирскимъ Постомъ и уроцищемъ Гурумды, 12,650—14,000', 7. VIII въ плодахъ (*Б. и О. Федченко!!*). — 1901. Мургабъ, сырые луга; ледниковые холмы передъ Сассыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!*). — Цв. бѣлые, съ фиолетовымъ пятномъ у основанія лепестковъ.

72. *Braya Scharnhorsti* Regel et Schmalh. Regel, Descr. pl. nov. fasc. V („Acta Horti Petrop.“ Vol. V, p. 241).

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 346. 1896. Кара-джилъга (Poncins; non vidi).

Я весьма сомнѣваюсь въ вѣрности опредѣленія Франше. По всей вѣроятности, Poncins собрать не *Braya Scharnhorsti*, извѣстную до сихъ поръ только изъ иѣкоторыхъ мѣстностей Тяньшана, а очень сходную съ ней по общему виду и обык-

новенную на Памирь *Braya pamirica* m. (= *Erysimum pamiricum* Korsh.). Главные отличия этих растений длина плода (у *Braya Scharnhorstii* — короткий стручечек, как у *Braya glabella* Rich.; у *Braya pamirica* более длинный, линейный, как у *Braya alpina* Stern. et Hoppe). Возможно, впрочем, что растения, описанная Регелем, имют недоразвитые плоды и что при получении более обильного материала съ Тяньшана оба вида придется соединить.

Геогр. распространение: настоящая *Braya Scharnhorstii* Rgl. et Schmalh. собрана на Тяньшанѣ въ Терской-Алатау (въ долинѣ Якъ-таша и на перевалахъ Суюкъ, Сартъ и Барскаунъ, 6000—12.000') Шаригорстомъ! и на Хань-тенгри (пер. Акъ-бель! и Бедель) Красивымъ. Другихъ мѣстонахождений пока не известно.

73. *Braya pamirica* (Korsh.) O. Fedtsch. — Федченко О., Растенія Памира, р. 14, № 34. — *Erysimum Pamiricum* Korsh. Коржинскій, Очерки раст. Турк., р. 88, № 3.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 4 (*Erysimum pamiricum*). — Коржинскій, I. с. р. 89 (*Erysimum pamiricum*). — Федченко О., Растенія Памира, р. 14, № 34 (*Braya pamirica*).

1878. Перевалъ Уй-булакъ къ Кара-кулю, 24. VII (*Күшакөвичъ!*, *forma glabra* O. F.). — 1883. Памирь (Кашгарскій) долина съвер. Гези, 24. VI, цв. (Д. Л. Ивановъ!). — 1892. Озеро Большой Кара-куль, цв. (*Назаровъ!*). — 1895. Бозай-Гумбезъ, 2. VII, цв. и мол. пл. (*Богоявленскій!*). — 1895. Кизылъ-артъ, на перевалѣ, почва красная глина, 14.000', цв. (*Коржинскій!*). Кокъ-сай, на песчаныхъ и каменистыхъ склонахъ горъ, 9. VII, цв. (*Коржъ!*); верховье р. Уй-булакъ, между глыбами гранита, на песчаной почвѣ, 9. VII (*Коржъ!* въ герб. Имп. Бот. Сада и Акад. Наукъ; въ А. Н. 1 экземпляр волосистый, 2 экз. — гладкие (*f. glabra* O. F.) и часть листьевъ съ рѣдкими зубцами. — 1897. У озера Кара-куль, на сухой песчаной почвѣ долины озера, 10. VII, цв.; около озера Рангъ-куль, на каменистой почвѣ холмовъ и долинъ, 13. VII; тамъ же, на солонцеватыхъ песчаныхъ отмеляхъ у берега, 13. VII, цв. и пл. (№ 2099); по р. Аличуру, въ уроцищѣ Куйса, на сырыхъ лужайкахъ у рѣки, 19. VII; по р. Балань-кінъ, 27. VIII, пл. (*Коржинскій!*). — 1898. Озеро Кизылъ-куль 4000 м., 5. VI, цв. и мол. пл. (*Паульсенъ!*). — 1901. На южномъ (памирскомъ)

(48)

склонѣ перевала Кизылъ-артъ, 14.600—14.000', на красной глиниѣ, и въ уроцищѣ Маркансу 13.100', 3. VII, въ цвѣту; между Маркансу и Кара-кулемъ — на Уй-булакѣ среди гранита, въ песчаной щебниевой пустынѣ и на песчано-каменистыхъ склонахъ съверного берега озера Кара-куль — 4. VII, въ цв.; возлѣ озера Кара-куль, 5. VII, въ цв.; отъ озера Кара-куль до Мускола, 6. VII, въ цв. и 9. VIII, въ пл.; возлѣ озера Сассыкъ-куль въ солоновато-глинистой пустынѣ, 13.100', 17. VIII, въ цв.; между уроцищемъ Ходжа-Назарь и переваломъ Кой-тезекъ 13.800—15.100', 20. VII, въ цв.; отъ Ходжа-Назара до озера Сассыкъ-куль, 13.800—13.100', въ щебниевой пустынѣ, 2. VIII, въ цв. и пл.; отъ Мускола до озера Кара-куль, 5. VIII, въ цв.; на перевалѣ Акъ-байталъ и выше перевала, до 16.400', 8. VIII, въ цв. и пл.; между Мусколомъ и озеромъ Кара-куль, 9. VIII, въ пл.; отъ озера Кара-куль до перевала Кизылъ-артъ, 13.400—14.600', 10. VIII, въ пл.; (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Кара-куль, солончики; песокъ передъ Мусколомъ и мокрый песокъ на Мусколѣ; р. Акъ-байталъ, сырой лугъ; на осинѣ передъ Найза-ташемъ; Сассыкъ-куль и ледниковые холмы передъ и за Сассыкъ-кулемъ (*Тулуновъ!*).

Цвѣты желтые; лепестки при основаніи шурпировые. Характеромъ опушения, формою и положеніемъ чашелистиковъ и своими плодами (линейные стручки съ перетяжками) рѣзко отличается отъ всѣхъ видовъ *Erysimum*, напоминая *Braya Scharnhorstii* Rgl. et Schmalh., за которую, очевидно, и была принята Франше (см. выше, подъ *Braya Scharnhorstii*).

Довольно обыкновенно на Памирѣ и встречается какъ на глинистой и солонцеватой, такъ и на песчаной и каменистой почвѣ. Кроме Памира нигдѣ не найдено.

74. *Eutrema Przewalskii Maxim.* — *Eutrema?* Przewalskii Maxim., Flora Tangutica, p. 68, № 115, tab. 28. — *Braya oxyacarpa*, Korshinsky in sched. (non Hook. et Thoms. Jour. Linn. Soc. V, p. 168).

Указ. для Памира: Федченко О., Растенія Памира, р. 15, № 35.

1897. Около перевала Кой-тезекъ, на влажныхъ луговинахъ, 22. VII цв. и мол. пл. (*Коржинскій!* въ герб. Имп. Бот. Сада и (№ 2458) Акад. Наукъ; по р. Ляпгаръ-су, въ верховьяхъ, на влажныхъ луговинахъ, 18. VIII въ цв. (*Коржин-*

(49)

скії!). — 1901. Къ югу отъ урочища Ходжа-Назаръ, на альпийскихъ лужайкахъ, въ травѣ, на высотѣ не менѣе 15.000', 20. VII въ цв. и съ незрѣлыми пл. (Б. и О. Федченко!!). — Цвѣты бѣлые, лепестки при основаніи лимовыя.

Геогр. распир.: Видъ этотъ для Россіи до сихъ поръ указаній не было. Впервые найденъ Пржевальскимъ, въ цв. и съ остатками пропилодниковыхъ плодовъ, въ сѣверо-восточномъ Тибетѣ, на высотѣ 14—14.500', 14. V(=5. VI) 1884 г., на пескѣ въ сырой мѣстности (№ 29!) и 16. V(=7. VI) 1884 г., въ болотахъ съ Kobresia, въ изобилии (№ 39!), очень мелкие экземпляры. Наша растеніца совершенно сходна съ образцами Пржевальского въ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада, только немножко крупнѣе.

75. *Capsella draboides* Korsh. *Fragmenta fl. Turk.* p. 417, № 31, tab. 2.

Указ. для Памира: *Korsh.* I. c. — *Федченко О.*, Раст. Памира, р. 15 № 36,
typica.

1897. У озера Сассыкъ-куль, на каменисто-песчаной почвѣ холмовъ, 20. VII пл. (*Коржинский!*). — 1901. У озера Сассыкъ-куль и въ его окрестностяхъ, 13,100' 17 и 18. VII и 2. VIII въ плодахъ, вмѣстѣ съ *Capsella procumbens* (L.) Fries. и *Festuca bellula* Rgl., въ безплодной глинистой солонцеватой пустынѣ (Б. и О. Федченко!!).

var. *sagittata* Korsh. I. c.

1897. Въ верховьяхъ р. Лянгаръ-су 18. VIII, пл. (*Коржинский!*). — 1898. Озеро Булунъ-куль, 3800 м., 12. VIII пл. (*Paulsen*, № 1157!).

Геогр. распир.: Однолѣтнее сорное растеніе, встрѣчающееся на Памире на мѣстахъ бывшихъ кочевокъ (юртъ) киргизъ.

76. *Capsella procumbens* (L.) Fries. — *Lepidium procumbens* L. *Spec. plant.* p. 643. — *Capsella procumbens* (L.) Fries. *Mant.* I p. 14. — *Boissier*, *Fl. Or.* I p. 340. — *Capsella elliptica* CAM. in *Ledb.*, *Fl. alt.* III p. 199. — *C. elliptica* CAM. — *Ledb.*, *Fl. Ross.* pp. 199, et 764. — *C. elliptica* CAM. *Hooker*, *Fl. Br. Ind.* I p. 159.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Растенія Памира, р. 16, № 37.

1878. Рангъ-куль 12. VIII (*Кушакевичъ!*). — 1897. По р. Аличуру, въ урочищѣ Куйса, на сухой песчаной почвѣ долины,

(50)

19. VII. пл.; по р. Лянгаръ-су, въ верховьяхъ, на бывшей стоянкѣ, сорное, 18. VIII. пл. (№ 3593); по р. Балинь-кінкѣ къ югу отъ перевала Каинды, на влажныхъ лужайкахъ у рѣки, 27. VIII. пл. (№ 3882)! (*Коржинский!*). — 1898. Рабатъ I, 22. V. пл. (*Паульсенъ!*). — 1901. Въ безплодной, солоновато-глинистой пустынѣ у озера Сассыкъ-куль и въ его окрестностяхъ, 13.100', вмѣстѣ съ *Capsella draboides* Korsh. и *Festuca bellula* Rgl. (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распир.: а) встрѣчается на Памироалѣ, въ Тяньшанѣ, Джунгаріи и Закаспійской области. — б) Монголія, Зап. Тибетъ, Кавказъ, Белуджистанъ, Южная Россія, Барбійская степь, Томская губ. (на солончаковыхъ степяхъ около с. Локтевскаго). Сирія, Персія, Египетъ, ю. Европа, Австралія, Чили.

77. *Capsella Thomsoni* Hook. fil. *Hooker*, *Fl. Br. Ind.* I p. 159. — *Hutchinsia tibetica* Thoms. in *Hook.*, *Ic. plant.* tab. 900.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, р. 16 № 38 1901. Собрano только разъ, 2. VIII. въ плодахъ и съ послѣдними цвѣтами, на пескѣ въ котловинѣ, между уроцищемъ Ходжа-Назаръ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13,800—13,100', гдѣ росло вмѣстѣ съ *Smelovskia annua* Rupr. Въ живомъ состояніи очень похоже на *Smelovskia* (*Hutchinsia*). Для Туркестана и вообще для Россіи до нашего путешествія не было указано. Наше растеніе совершенно тождественно съ тибетскими, имѣющимися въ герб. Имп. Спб. Бот. Сада.

Геогр. распир.: а) Памиръ. — б) Гималаи, Тибетъ, Монголія, Китай.

78. *Smelovskia calycina* (Steph.) CAM. in *Ledb.*, *Flora altaica* III p. 170. — *Lepidium calycinum* Steph. in *Willd. Spec. plant.* III. p. 433. — *Hutchinsia calycina* Desv. *Journ. bot.* III. p. 168. — *Hutchinsia calycina* Desv. — *Ledb.*, *Fl. Ross.* I p. 200. — *Hutchinsia pectinata* Bge. — *Ledb.*, *Fl. Ross.* I. 201. — *H. calycina* Desv. α. typica et γ. *pectinata* Regel et Herder., *Suppl. I ad plant. Semenov.* („*Bull. de Moscou*“ 1866, II p. 99).

Указ. для Памира: *Franchet*, *pl. Poncins*, p. 346. — *Duthie*, *Alcock's plants*, p. 19 № 13 (? *Smelovskia* sp.). — *Федченко О.*, Растенія Памира, р. 16, № 39.

1883. Р. Ваханъ-дарья. 20. VII цв. и пл. (*Д. Л. Ивановъ!*) — 1891. Р. Акъ-су 18. VII. цв.; устье р. Кара-Джильга; пер. Бейкъ (*Брэзезинъ!*) Имъ же указывается на этикеткѣ гер-

(51)

бария, для следующих мѣсть: р. Вахджиръ, р. Кара-чукуръ, р. Балындъ-кінкъ, М. Базай-Гумбезъ, Большой Памиръ). — 1895. Р. Памиръ, цв. и пл. (*Богоявленский!*). — 1895. На перевалъ Кизылъ-артъ, почва красная глина, 8. VII. (*Коржинский!*). — 1895. На выс. 13—14.000', довольно обыкновенно и встречается обыкновенно массами въ сухихъ мѣстахъ открытого Памира (*Alcock; non vidi*). — 1893. Кизылъ-артъ (*Ропсіns, non vidi*). — 1897. Перевалъ Кизылъ-джінкъ, на вершинѣ, 16.000', 12. VII. и немного ниже ея, 12. VII. въ цв.; урочище Сулу (т. е. мокрый) — Тагаркакты, песчано-каменистые холмы и долина, 21. VII. цв. (*Коржинский!*). — 1901. На альпийскихъ лужайкахъ и глинисто-каменистыхъ склонахъ (на красной глине) южной стороны перевала Кизылъ-артъ, 14.600—14.000', 3. VII. въ цв.; между озеромъ Яшиль-куль и урочищемъ Ходжа-Назарь, 12.500—13.800', 19. VII. въ цв. и пл.; на щебневыхъ разсыпяхъ между Ходжа-Назаромъ и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100' и на альпийскихъ лужайкахъ выше перевала, около 16.000', 20. VII. въ цв. (*Б. и О. Федченко!*). — 1901. Ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!*). — Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: а) довольно обыкновенно, какъ на Памирѣ и въ Шугнайѣ, такъ и въ высокогорной области Тяньшана; встречается также на Заравшанѣ и на Тастану, самый высокой вершинѣ Тарбагатая. — б) Алтай, Монголія, Сѣв. Америка.

79. Smelovskia annua Rupr., *Smelovskia* (*Hutchinsia*) *annua* Rupr., *Sertum tianschanicum*, p. 39.

Указ. для Памира: *Duthie, Alcock's plants* p. 19 № 13 (? *Smelovskia* sp.). — *Федченко О.* Растенія Памира, p. 16, № 40.

1891. Перевалъ Найза-ташъ у р. Шинда, до 14.000', 20. VII. цв. и пл. (*Брэсцицкий!*). — 1895. Кизылъ-артъ, немного ниже перевала, на утесахъ, цв. и пл. (*Коржинский!*). — 1895. Берега озера Зоръ-Куль (=Викторії) 13—14.000' (*Alcock; non vidi*). — 1897. Урочище Урусь-булаакъ, каменистая почва долины, 18. VII. цв.; урочище Тагаркакты, 23. VII; уроч. Сулу-Тагаркакты, на песчано-каменистой почвѣ холмовъ, 22. VII. цв. и пл., №№ 2466 и 2467 (*Коржинский!*). — 1901. На южномъ склонѣ перевала Кизылъ-артъ, 14.600—14.000', въ цв. 3. VII; у озера Кара-куль въ цв. и съ мол. пл. 5 VIII; между урочищемъ Ходжа-Назарь и переваломъ Кой-Тезекъ 20. VII. въ цв. и пл.; отъ озера Кара-куль до перевала Кизылъ-артъ,

13.400—14.500', 10. VIII. въ пл. и съ цветами (*Б. и О. Федченко!!*). Замѣчено также на пескѣ въ котловинѣ между урочищемъ Ходжа-Назарь и озеромъ Сассыкъ-куль, где росло вмѣстѣ съ *Capsella Thomsoni*, 13.700', 2. VIII (*Б. и О. Федченко!!*).

Геогр. распр.: встречается на Тяньшанѣ въ Терской-Алату (Красновъ) и на Чатыръ-куль (Остенть-Сакенъ).

80. Smelovskia flavissima Kar. et Kir., Enum pl. songor. № 117. — *Hutchinsia flavissima* Ledb., Fl. Ross. I, p. 764, № 6.

Указ. для Памира: *Franchet, Plantes Poncins*, p. 346.

Собрана Poncins на перевалѣ Талдыкѣ, на Алайскомъ хребтѣ, а не на Памирѣ, для котораго никакъ не указывается, и поэтому исключается изъ числа памирскихъ растений.

Геогр. распр.: Тарбагатай и Джунгарскій Алатау.

81. Lepidium ruderale L. Spec. plant. p. 645. — *Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 204. — *Boiss.*, Fl. Or. I, p. 361. — *Hook.*, Fl. Br. Ind. I, p. 160.

var. *micranthum* (Ledb.). — *Lepidium micranthum* Ledb. Fl. Ross. I, p. 205. — *L. incisum* Roth., *Boiss.*, Fl. Or. I, p. 362.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам. р. 4. № 24.

1892. Шоръ-куль, пл. (*Назаровъ!*).

Геогр. распр.: а) Закаспійская область, Джунгарія, Сыръ-даринская область (берегъ оз. Коарала!!); Памиръ. — б) Европа, вся Россія, Крымъ, Кавказъ, Арmenія, Ассирія, Месопотамія, Алтай, Байкалъ, Даурія, ю. Монголія, страна Тангутовъ, зап. Тибетъ, Афганістанъ, Китай, Ю. Африка, С. и Ю. Америка.

82. Lepidium latifolium L. Spec. plant. p. 644. — *Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 206 et 675. — *Boiss.*, Fl. Or. I, p. 359. — *Hooker.*, Fl. Br. Ind. I, p. 160.

1883. Р. Памиръ близъ р. Маса, 4. VIII. цв. (*Д. Л. Ивановъ!*). — 1892. На Яшиль-куль, въ бутонахъ (*Назаровъ!*; видѣла въ его гербаріи).

var. *pubescens* Ledb. l. c.

Указ. для Памира: *Федченко О.* Растенія Памира, p. 17 № 41.

1901. Между урочищемъ Ходжа-Назарь и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.000', 20. VII. въ цв. и съ молодыми плодами; собранъ только разъ и въ одномъ экземпляре. Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: Видъ, широко распространенный по всему Туркестану, Азии и Европѣ, и встречающийся даже въ сѣверной Африкѣ. Въ Рошацѣ и Шугнанѣ Коржинскимъ собрана var. *intermedium* Korsh.

83. *Lepidium cordatum* Willd., in D. C. Syst. II, p. 554.—*Ledb.* Fl. Ross. I, p. 207).—*Boiss.*, Fl. Or. I, 359.

1878. Близь Кара-куля 5. VIII. (*Кушакевичъ!*). — 1883. Ущелье Харгонъ въ Памирской цѣни (*Д. Л. Ивановъ!*). — 1897. На р. Акъ-байталь, каменистая пустыня (широкая долина), на берегу, 14. VII. въ бутонахъ (*Коржинскій*, № 2164!).

Геогр. распр.: а) Памиръ, Джунгарія, пески Каракумъ.—б) Монголія, пустыня Гоби, южный Алтай, на солончакахъ, въ Барабинской степи (Томск. губ.).

84. *Dilophia salsa* Thoms. in *Hook.*, Kew Journ. Bot. V. 20. and IV, t. 12.—*Dilophia salsa* Thoms. *Hooker.*, Fl. Br. Ind. I, p. 161.—*Dilophia kaschgarica* Rupr., *Osten-Sacken et Ruprecht*, Sertum tianschanicum p. 40.

Указ. для Памира: *Федченко Б.* Мат. фл. Пам. р. 4 № 22 (*Braya* sp.).—*Федченко О.*, Растенія Памира, р. 17 № 42. (*D. salsa* Thoms.).

1878. Памиръ Харгони 5. VIII; близь Кара-куля 5. VIII; (*Кушакевичъ!*). — 1892. Мусколъ; Мургабъ, цв. (*Назаровъ!*). — 1895. У озера Кара-куль, на влажныхъ луговинахъ, 10. VII. цв.; уроцище Мусколъ, на каменистомъ русль рѣки 11. VII (*Корж.*!). — 1897. Кокъ-сай, на песчаныхъ лужайкахъ у рѣки 9. VII. въ цв. (*Коржинскій!*). — 1901. Въ уроцищѣ Маркансу, 13.100', 3. VII. въ цв.; у озера Кара-куль, на песчаной равнинѣ, 13.400', 5. VII. въ цв.; у Памирского Поста, 12.650', 10. VII. въ цв.; между Мусколомъ и озеромъ Кара-куль, 14.100—13.400', 9. VIII. въ плодахъ (*Б. и О. Федченко!!*) — 1901. Мокрый песокъ на Мусколѣ (*Тулиновъ!*).

Одно изъ самыхъ оригинальныхъ растеній Памира: подземные корневища разрастаются въ разныя стороны, а на поверхности земли видны только плоскіе кружки прижатыхъ къ землѣ листьевъ и цветковъ. Цвѣты мелкие, блѣдые. Все растеніе мясистое, блѣдоватое, къ осени красноватое.

Геогр. распр.: а) встречается, кроме Памира: на Алайѣ (у Дараутъ-кургана, Коржинскій!) и въ Тяньшанѣ (*Остенть-Сакенъ*, *Бротерусъ*).—б) Гималаи, Тибетъ, Монголія, Китай.

85. *Tauscheria lasiocarpa* Fisch. in DC. Syst. II, p. 563.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 213.—*Boiss.*, Fl. Or., I, p. 371.—*Hooker.*, Fl. Br. Ind. I, p. 164.—*Tauscheria desertorum* *Ledb.*, Icon. II, p. 14.—*Maxim.*, Fl. Mong. p. 72 № 183.

1898. Озеро Яшиль-куль, 3800 м. (*Paulsen*, № 978!).

Геогр. распр.: а) Восточный берегъ Каспійского моря, Закаспійская область, Джунгарія, Сыръ-дарынскія области (Ташкентъ, Каракская степь, между г. Туркестаномъ и Казалами), Заравшанская долина, Шугнанъ, Тяньшань. Западная граница—Индерское озеро. — б) Алтай, Зап. Гималаи и зап. Тибетъ, Персія.

86. *Goldbachia laevigata* (MB.) DC.—*Raphanus laevigatus* MB. Taur. Cauc. II, p. 129.—*Goldbachia laevigata* DC., Syst. II, p. 577.—*Boiss.*, Fl. Or. I, p. 243.—*Hooker.*, Fl. Br. Ind. I, p. 166.—*G. laevigata* DC., *G. tetragona* *Ledb.* et *G. torulosa* DC., *Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 215.

1878. Акъ-байталь, цв. и мол. пл. (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распр.: а) Закаспійская область, Джунгарія, Киргизская степь, Бухара, долина Заравшана (Самаркандъ!!), Катты-курганъ !!), Сыръ-дарынскія области (Ташкентъ !!, Келесь !!), Тяньшань. — б) Ю. Россія, прикаспійскія степи, Талышъ, Малая Азія, Арменія, Персія, Афганістанъ, с.-з. Индія, ю. Алтай.

V. Violarieae.

87. *Viola tianschanica* Maxim., in Mél. biol. X, p. 576.—*Maxim.*, Fl. Mongol. p. 79, № 198.

Указ. для Памира: *Федченко Б.* Мат. фл. Пам. р. 4, № 31.

1892. Мургабъ; озеро Большой Кара-куль (*Назаровъ!*).

Геогр. распр.: а) Встрѣчается на Тяньшанѣ (на перевалѣ Цаукъ, 10.000', Семеновъ! у альп. оз. Чатыръ-куль—Остенть-Сакенъ!).—б) Китайскій Туркестанъ (Тяньшань), вост. Тибетъ.

88. *Viola uniflora* Linné, Sp. pl. ed. I p. 936.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 255, № 34.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 346.

Собрана Poncins на перевалѣ Талдыкъ въ Алайскомъ хребтѣ и слѣдовательно ошибочно приводится *Franchet* въ числѣ памирскихъ растеній.

Геогр. распир.: а) Алайский хребетъ!! Тяньшань,—б)
Алтай, Байкалъ, восточная Сибирь, Яблонный хребетъ, Даурія.

VI. Droseraceae.

89. *Parnassia Laxmanni* Pall. in Reliq. Willd. ex Schult. Syst. Veg., VI, p. 696.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 264.—*Parnassia ovata* Ledb. *Hook.*, Fl. Br. Ind. II, p. 403, № 6.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 6 № 78.—*Федченко О.*, Растенія Памира, р. 17 № 43.

1878. Р. Карасу 29. (var. *subacaulis* Kar. Kir.) и 31. VIII. (*Кушакевичъ!*).—1892. Акъ-байталь (*Назаровъ!*).—1897. пер. Каликъ 12. VIII. (*Громбечевскій!*).—1899. Памиръ (*H. Велманъ!*).—1901. Между Карасу и Чатыръ-ташемъ, около 13.300', 16. VII. въ цв.; отъ Памирского поста до Гурумдовъ, 12.650—14.000', 7. VIII. въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*).—Цвѣты бѣлые.

Геогр. распир.: а) Встрѣчается на Памироалаѣ, въ Джунгарскомъ Алатау и Тяньшанѣ. — б) Распространено также на Алтаѣ, въ Гималаяхъ и Тибетѣ.

VII. Sileneae.

90. *Gypsophila Gmelini* Bge. in *Ledb.*, Fl. alt. II, 128.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, pp. 293 et 775.

var. *caespitosa* Turcz., Flora Baicalensi-Dahurica („Bull. de Moscou“ XV, 1842. p. 571).

Указ. для Пам.: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам. р. 4, № 32.—*Федченко О.*, Раст. Пам. р. 18, № 45.

1878. Памиръ-Харгопи 7. VIII; Акъ-байталь 8 и 9. VIII; верховья Акъ-байтала 9. VIII (*Кушакевичъ!*).—1892. Шоръкуль; Акъ-байталь; (*Назаровъ!*).—1899. Памиръ (*H. Велманъ!*).—1901. Между Памирскимъ постомъ и урочищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII. въ цв.; на Акъ-Байталь 14.500—15.500', 8. VIII. въ цв.; между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизиль-артъ, 13.400—14.600', 14. VIII. въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*).—Растетъ по склонамъ, въ трещинахъ скалъ.

Геогр. распир. вида: а) Джунгарія.—б) Ю.-в. Россія, Байкалъ, Даурія, Зап. Сибирь, Якутская область, с. Монголія.

Геогр. распир. var. *caespitosa*: а) Тарбагатай, Памиръ.—б) In alpe Kawokta et in rupibus subalpinis vicinis (Байкалъ).

91. *Gypsophila fastigiata* L. *Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 299.—var. *cephalotes* Schrenk., Enum. plant. nov. p. 92.—*Ledb.* l. c. *Gypsophila planifolia* H. Winkl., Caryophyllaceae p. 48.

Указ. для Пам.: *Winkler* (l. c.)—*Федченко О.*, Растенія Памира, р. 18, № 46.

1878. Акъ-байталь 8. VIII. (*Кушакевичъ!*).—1897. По р. Аличуру, въ урочищѣ Куйса, на каменистыхъ склонахъ горъ 19. VII. цв. (№ 2299); по р. Лянгаръ-су, на каменистыхъ берегахъ, 17. VIII. въ цв. (№ 3507); урочище Кокъджаръ, на каменистыхъ склонахъ горъ, 25. VIII. въ цв. (№№ 3838, 3839 и 3840 *Коржинскій!*).—1898. Р. Карабу 30. VI; Яшиль-куль VII. 17 и 30. (Ove Paulsen, sub *G. planifolia* H. Winkl.; non vidi): я не видела экземпляровъ Паульсена, но, судя по описанію Винклера, они тождественны съ нашими.—1901. Между Карабу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.000', 16. VII. цв. (*Б. и О. Федченко!!*).—Цвѣты бѣлые.

Геогр. распир. вида: Средняя и южная Россія.

Геогр. распир. var. *cephalotes*: а) Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Памироалай (ледникъ Щуровскаго!! ущ. Макиеватъ!! Куль-и-Каланъ!!, Караказукъ!!, Шугнанъ!!), Памиръ.

92. *Gypsophila pseudoverticillata* Komar. *Комаровъ*, Мат. по фл. Турк. нагорья, р. 123.

Указ. для Пам.: *Федченко О.*, Растенія Памира, р. 18, № 47.

1878. 6. VIII. Ущелье... (названія ущелья нѣть на этикетѣ гербарія; но экскавировала Кушакевичъ въ этотъ день въ предгорьяхъ Кара-куля, на устьѣ Узъ-биля въ Чонъ-су и на р. Чонъ-су); Карабу 29. VIII. (*Кушакевичъ!*).—1897. Уроч. Карабу, каменистая почва, въ долинѣ, 18. VII. въ цв. (№ 2292); на перевалѣ Малый Марджанай, между рѣкой Киргизъ-су и Бартангомъ, на каменистой вершинѣ перевала 20. VIII. (№ 3699); на р. Балынъ-кіикъ къ югу отъ перевала Каниды, на каменистыхъ склонахъ горъ 27. VIII. (№ 3904); (*Коржинскій!*).—1901. На Акъ-байталь, 14.500—15.500', 8. VIII. въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*).

Чрезвычайно оригинальное растеніе, напоминающее своимъ общимъ видомъ *Glaux maritima* L. Лежачіе, тонкіе стебли стелятся между камнями на берегу ручья. Цвѣты розовые.

Геогр. распир.: Алтайская область Заравшана, Хребетъ Петра Великаго, Памиръ.

93. *Saponaria Griffithiana* Boiss., Diagn. Ser. II, I, p. 70.—
Boiss., Fl. Or. I, p. 524.—*Saponaria silenoides* Winkler H.,
Caryophyllaceae, p. 50.

Указ. для Памира: Winkler H., l. c.

1898. Джангарлыкъ на р. Памирь-даръѣ 3700 м. 25. VIII.
(Паульсенъ; non vidi).

Геогр. распир.: а) Памиро-алай (ущелье Саратагъ,
7000—12.000'!!), Искандеръ-куль и др., восточная Бухара,
Шугнанъ), Памиръ.—б) Афганистанъ.

94. *Saponaria dichotoma* Komar. Комаровъ, Мат. по фл.
Турк. нагорья I, p. 120.

1897. Переваль Марджанай, между р. Кизылъ-су и Бар-
тангомъ, на каменистыхъ осыпяхъ изъ сланца, 20. VIII. пл.
(№ 3693, Коржинский!).

Геогр. распир.: Памиръ, Памиро-алай (Косатаранъ,
Оббурданъ, Искандеръ-куль, Шугнанъ).

95. *Saponaria Vaccaria* L. Spec. plant. p. 409.—
Boiss., Fl. Or. I, p. 525.—*Vaccaria vulgaris* Host. Fl. austr. I,
p. 518.—*V. vulgaris* Host. Ledb., Fl. Ross. I, p. 302.

Указ. для Памира: Winkler H., Caryophyllaceae in Asia
Centrali a cl. Ove Paulsen lectae, p. 49. (*Vaccaria segetalis*
(Neck.) Garcke ex Ascherson).

1891. Переваль Найза-ташъ, 20.VII, до 14.000' (Бржезицкий!).

Показание это болѣе, чѣмъ сомнительно: ни мы, ни другіе
путешественники не находили этого растенія на Памирѣ: оно
попадается въ Туркестанѣ, какъ сорное, на поляхъ. Мы со-
бирали его въ 1901 г. въ Шугнанѣ, въ посѣвахъ близъ
Хорога. Экземпляры Паульсена собраны также въ Шугнанѣ,
въ Ишкашимѣ, на выс. 2700 м., въ культурной полосѣ.

Изъ числа памирскихъ растеній я этотъ видъ исключаю.

Что касается до названія мѣстности, приводимой Брже-
зицкимъ, то надо замѣтить, что это не тотъ Найза-ташъ,
которымъ мы шли въ 1901 г. съ Мургаба на Памирь-Али-
чуръ (въ Чатыръ-ташъ), а другой переваль того же имени,
лежащий въ юго-восточномъ углу Памира, на Маломъ Памирѣ.—
Цвѣты розовые.

Геогр. распир.: а) Горы и измѣнности Заравнианской
долины, Шугнанъ, Тяньшань, Джунгарско-киргизской степи.—
б) Почти вся Европа и Россія, Крымъ, Кавказъ, Сибирь, Забай-

калье и Амурская область, Алтай, Монголія, Тибетъ, сорная
трава въ поляхъ по всей Индіи, Персія, Ассирія, Месопотамія.

96. *Silene caucasica* Boiss., Fl. Or. I, p. 622, Suppl. p. 99.—
var. pamirensis, H. Winkl. Caryophyllaceae in Asia centrali a cl.
Ove Paulsen lectae, p. 47.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 4
№ 34 (*S. depressa* B. Fedtsch. non Boiss.).—Федченко О., Раст.
Пам. р. 17 № 44 (*S. caucasica* var. pamirensis). Winkler, H., (l. c.).

1878. Яшиль-куль (*Кушакевичъ!*).—1892. Мургабъ (*Наза-
ровъ!*).—1897. Урочище Карасу, каменистая почва, въ долинѣ,
18. VII. цв. (№№ 2290 и 2291); около озера Сассыкъ-куль,
на каменисто-песчаной почвѣ холмовъ, 20. VII. цв. (№ 2346);
урочище Сулу-Тагаркакты, песчано-каменистые холмы и
долины, 21. VII. цв. (№ 2398); (*Коржинский!*).—1898. Р. Карасу
30. VI (f. floribus flavidopurpurascensibus, foliis paullo lati-
oribus; Paulsen, non vidi); Яшиль-куль 9. VII. (f. floribus
flavidis и f. floribus purpurascensibus; Paulsen; non vidi).—
1901. Между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.540—
13.100', на каменистыхъ склонахъ, 17. VII. въ цв. и 3. VIII.
въ пл.; между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—
12.500', 18. VII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты розовые
или тѣлесного цвета.

Геогр. распир.: а) Памиръ (var. pamirensis).—б) Вос-
точный Кавказъ и горы Арmenіи (тип. форма).

97. *Silene venosa* (Gilib.) Aschers., Fl. d. Prov. Bran-
denburg, p. 86. var. commutata (Guss.) Rohrb., Monogr.
Gatt. Silene p. 86. S. commutata Guss., Prodr. Fl. sic. I, p. 499.—
S. commutata Guss. Boiss., Fl. Or. I, 629.

Указ. для Памира: H. Winkler, Caryophyllaceae p. 47.

Собрана Паульсеномъ уже въ Шугнанѣ, въ культур-
ной полосѣ (prov. Goran, ad Misjus (Нишусъ), 2400 м., in
cultis.), следовательно, изъ Памирской флоры исключается.

Геогр. распир.: а) Памироалай.—б) Горы южной
Европы.

98. *Melandryum longicarpophorum* Komar. Комаровъ, Мат.
по фл. Турк. нагорья I, p. 132.

1878. Акъ-байталъ, 7. VIII. (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распир. У ледниковъ и переваловъ на Зарав-
шанѣ и верхнемъ Янобѣ (Памироалай) и на Памирѣ.

99. *Melandryum apetalum* Fenzl. in Ledb., Fl. Ross. I, p. 326

et 778.—*Lychnis apetala* L., *Hooker*, Fl. Br. Ind. I, p. 222.—*Lychnis himalayensis* Edgew. = *L. apetala* var. *himalayensis* *Rohrb.* in „Linnaea“ XXXVI. 22.—Probably only a slender form of *L. apetala*—*Hooker*, Fl. Br. Ind. I, p. 223.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 4, № 35, (v. typicum).—*Duthie*, Alcock's plants p. 20 № 16 (*Lychnis himalayensis* Edgew.).—*Федченко О.*, Растения Памира р. 18, № 48.

1878. Памиръ Харгоши, 7. VIII; изъ перваго перевала отъ Чонъ-су къ Акъ-байталу, у рѣчки; Акъ-байталъ 9. VIII; предгорья Раңгъ-куля, 14. VIII. (*Кушакевичъ!*).—1892. Аличуръ (*Назаровъ!*; v. typicum).—1895. По р. Аксу (Alcock, non vidi, *Lychnis himalayensis* Edgew.).—1897. Между Карасу и Урусь-булакомъ (на 1/2 дороги), уроч. Чуковай, на осини у подножия горъ 18. VIII. (№ 2269); по р. Лянгаръ-су, на каменистыхъ берегахъ, 17. VIII. пл. (№ 3503); въ верховьяхъ р. Лянгаръ-су, у ручейковъ, 18. VIII. (№ 3621); (*Коржинекъ!*).—1901. Отъ Кара-куля до Мускола, на луговинахъ вдоль ручья, 13.400—14.100', 6. VII. въ цв.; Акъ-байталъ, на съверномъ склонѣ, по рѣчкѣ, 14.400', 7. VII. въ цв.; между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.540—13.100', 17. VII. незрѣлые плоды; между урочищемъ Ходжа-Назаръ и переваломъ Койтезекъ, 13.800—15.100', 20. VII. въ пл. (Б. и О. Федченко!!). Кизыль-артъ (*Тулиновъ!*).

Растетъ на травянистыхъ склонахъ.

Геогр. распр.: а) Альпійская область Памироалая (леди Щуровскаго!!), Караказукъ!!, горы Заравшана), Тяньшань, Джунгарский Алатау, Тарбагатай, Памиръ.—б) Шпицбергенъ, Новая Земля, арктическая область и горы Европы, Азіи и Америки, алы. обл. Урала, Алтай, Монголія, Тибетъ, Гималаи.

100. *Melandryum triste* (Bunge) Fenzl. *Ledb.* Fl. Ross. I, p. 326.—*Lychnis tristis* Bunge in *Ledb.* Fl. alt. II, p. 184.

Указ. для Памира: *Winkler H.*, Caryophyllaceae, p. 48. 1898. Яшиль-куль, 17. VII; Харгошъ, 29. VIII; (Паульсенъ, non vidi).

Геогр. распр.: а) Памиръ.—б) Алтай, Саяны, Нарымский хребетъ, сѣв. Монголія.

VIII. Alsineae.

101. *Lepyrodiclis holosteoides* (C. A. Mey.) Fenzl. in *Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 359, № 1.—*Gouffea holosteoides* C. A.

Meyer, Ind. cauc. p. 217.—*Lepyrodiclis holosteoides* Fenzl. *Boiss.*, Fl. Or. I, p. 668.—*Arenaria holosteoides* Edgew. *Hook.*, Fl. Br. Ind. I, p. 241, № 21.

Указ. для Памира: *Winkler H.*, Caryophyllaceae, p. 52.

Собрano Паульсеномъ въ Ваханѣ и на поляхъ въ Лянгаркинѣ, и изъ числа памирскихъ растений исключается. Мы тоже собирали его, какъ сорное, на поляхъ въ Шугнанѣ, въ 1901 году.

Геогр. распр.: а) Встрѣчается на Памиро-алаѣ (въ горахъ и низменности Заравшанской долины 1869 г.!! горной!! и равнинной Бухарѣ) и въ бассейнѣ Сыръ-Дары!! (1870 и 1871 г.). Для Джунгаріи указывается Траутфеттеромъ (pl. Schr.) близкий видъ, *L. stellarioides* Schrenk, а Максимовичемъ (Fl. Mong.) и Гукеромъ (l. c.) этотъ же.—б) Армения, Талышъ, Персія, Малая Азія, Афганистанъ, Тибетъ, Зап. Гималаи, Китайский Туркестанъ, Китай, Белуджистанъ, С.-З. Индія.

102. *Arenaria Meyeri* Fenzl. in *Endlicher*, Gen. p. 966.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 368.—*Arenaria Griffithii* Boiss. *Boiss.*, Fl. Or. I, p. 697.—*Arenaria Griffithii* Boiss., *Hook.*, Fl. Br. Ind. I, p. 237.—*A. glaucescens* H. Winkl., Caryophyllaceae in Asia Centrali a cl. Ove Paulsen lectae, p. 53.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам. р. 4, № 37.—*Winkler H.* l. c. (*A. glaucescens*).—*Федченко О.*, Раст. Памира р. 18, № 49.

1878. Яшиль-куль, 23. VIII. (*Кушакевичъ!*); Булунъ-куль 26. VIII. (*Ашурабаевъ!*).—1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*).—1897. По р. Аличуру въ урочищѣ Куйса на каменистыхъ склонахъ горъ 19. VII. зацвѣтающіе (№№ 2299 и 2308); въ урошищѣ Тагаркакты, песчано-каменистые холмы и долины, 21. VII. цв. и пл. (№№ 2382, 3 и 4; у этихъ экземпляровъ цветы крупнѣе, листья гуще, ярко-зеленые, и влагалища старыхъ листьевъ гуще, вообще все растеніе имѣть болѣе роскошный видъ); (*Коржинекъ!*).—1898. Чатыръ-ташъ 5. VII; Яшиль-куль 6 и 20. VII. (Paulsen; non vidi).—1901. На песчано-щебеневыхъ осиняхъ, между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.540—13.100', 17. VII. въ цв. (f. *glabra* m.); между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, 12.500—13.800', 19. VII. въ цв. (f. *glandulosa* m.).—Цвѣты блѣдные.

Геогр. распр.: а) Встрѣчается на Памиро-алаѣ (въ горахъ по Заравшану, въ Шугнанѣ), въ Джунгаріи (г. Кар-

каралы) и на Тянь-шанѣ.—б) Афганистанъ, Западный Тибетъ, Монголія.

103. *Stellaria humifusa* Rottb. in Acta hafn. X, p. 447.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 384, № 11.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 4, № 39, 1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).

var. *caespitosa* Rgl. lus. *oxysepala* Regel, Descr. plant. nov. fasc. V, p. 251 № 65.

Указ. для Памира: Федченко О., Растенія Памира, р. 19, № 50.

1897. Озеро Рангъ, въ луговомъ болотѣ, 13. VII. въ цв. (№ 2091); по Аличуру, въ урочищѣ Урусь-булакъ, на болотистыхъ лужайкахъ, 19. VII. въ цв. (№ 2323); около озера Сассыкъ-куль, на каменисто-песчаной почвѣ холмовъ, 20. VII. въ цв. (№ 2353); урочище Сулу-Тагаркакты, сырья лужайки у рѣчки, 21. VII. въ цв. (№ 2369); (*Коржинскій!*).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. Въ солончаково-глинистой пустынѣ возлѣ озера Сассыкъ-куль, 13,100', 17. VII. въ цв. и близъ озера Яшиль-куль, 12.500', 18. VII. въ цв. (Б. и О. Федченко !!). Въ сравненіи съ оригиналными экземплярами, описанными Регелемъ, наши отличаются очень маленькимъ ростомъ, укороченными междуузліями и сизымъ оттенкомъ болѣе мясистыхъ листьевъ.—1901. Чатырь-ташъ (*Тулиновъ!*).—Цвѣты блѣдые.

Геогр. распр.: а) Видъ этотъ встрѣчается на Памирѣ, Памиро-алаѣ (въ горахъ по Заравшану и на перев. Кавукъ 13.300'!! въ Алайскомъ хребтѣ) и въ Тяньшанѣ.—б) Исландія, Арктическая Россія, Новая Земля, Вайгачъ, с.-в. Финляндія, Земля Чукчей, Камчатка, с.-з. Америка.

104. *Stellaria glauca* With., Arrang. I, p. 420.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 389.—*Boiss.*, Fl. Or. I, p. 708.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. I, p. 233.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's plants, p. 20, № 19.

1895. На сырому лугу по р. Аксу, 13—14.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.: а) Памироалай (горы верхняго Заравшана, оз. Искандеръ-куль, пер. Мура).—б) Гренландія, сѣв. и ср. Европа, Франція, Германия, сѣв., ср. и ю. Россія, Ураль, Кавказъ, Арmenія, зап. Азія, Сибирь (Алтай, Байкалъ, Даурія),

(62)

Амурскій и Уссурійскій край, зап. Гималаи, зап. Тибетъ, Афганистанъ, Персія, с. Китай, Монголія, долина Инда, Австралія.

105. *Stellaria brachypetala* Bge. in *Ledb.*, Fl. alt. II, p. 161.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 390, 391.—*Stellaria graminea* L. var. *brachypetala* Bge.—*Regel*, Aufzähnung der von Radde etc. („Bull. Mosc.“ 1862, p. 287).—*St. brachypetala* Bge. *a.* *procumbens* Bge., Enum. alt. p. 26 (35).—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 391.—*St. graminea* L. var. *brachypetala* Bge. *lusus procumbens* Fenzl.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 4, № 41 (*Stellaria* sp.).—*Winkler H.*, Caryophyll. p. 51 (*St. brachypetala* Bge.).

1878. Пампръ-Аличуръ, близъ Башть-Гумбеза (*Кушакевичъ!*).—1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*).—1897. По р. Аличуру, на болотистыхъ лужайкахъ, 20. VII. въ цв. (№№ 2358 и 9); по р. Киргизъ-су, въ урочищѣ Ирхъ, въ ручейкахъ во мху, 19. VIII. цв. (№№ 3668 и 9), (*Коржинскій!*).—1898. ущ. Харгашъ 22. VIII; р. Аличуръ 4. VII; (Paulsen; non vidi).

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау.—б) Алтай—на р. Чуй, въ степныхъ и солончаковыхъ мѣстахъ.

106. *Stellaria rigida* Bge. („Acta H. Petrop.“ V. 1877. p. 251).
1878. Кара-куль, 27. VII. (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распр.: а) Памироалай, Верхній Заравшанъ и пер. Мура, пер. Караказукъ, 12.200', въ Алайскомъ хребтѣ!! и пер. Джиптыкъ, 12.500!!—б) Верховье р. Чуи (восточный Алтай).

107. *Cerastium trigynum* Vill. Dauph. II, p. 645, t. 46.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 396, № 1.—*Boiss.*, Fl. Or. I, p. 715.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. I, p. 227.—*Cerastium schizopetalum* H. Winkler, Caryophyll. p. 51.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's plants, p. 20, № 17.—Федченко О., Раст. Памира, р. 19, № 51.—H. Winkler, l. c.

1883. 24. VII. Зоръ-куль, или оз. Викторії. (Д. Л. Ивановъ!).—1901. Бенкъ-аузы; Кара-Джильга; до 11,000' (*Бржезинскій!*). Указывается имъ же, на этикеткѣ гербарія для р. Кара-чукуръ и р. Вахджиръ на Памирѣ).—1895. Обыкновенно на лужайкахъ открытаго Памира на выс. 13—14.000' (Alcock; non vidi).—1897. На каменистой вершинѣ перевала Тахта-горумъ, 26. VII. въ цв. (*Коржинскій!* № 3862).—1898. Оз. Булунъ-куль 18. VIII. (Paulsen; non vidi).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. Между Чатырь-ташемъ

(63)

и Сассыкъ-кулемъ, 13.540—13.100', на кочкахъ солоноватой сухой лужайки и на песчано-щебневыхъ осыпяхъ, 17. VII. въ цв.; на перевалъ Кой-тезекъ, на щебневыхъ розсыпяхъ, 15.100', 20. VII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!)

var. *glandulosum* *Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 397.—*Cerastium argaeum* *H. Winkler*, Caryoph. p. 51.

1878. Аксу; р. Аличуръ, близъ Башъ-Гумбеза, 27. VIII. (*Кушакевичъ!*).—1897. По р. Аличуру, на песчано-каменистыхъ холмахъ, 20. VII. въ цв. (№ 2363); около перевала Кой-тезекъ, на влажныхъ лужайкахъ, 22. VII. въ цв. (№№ 2457 и 8); по р. Лянгаръ-су, на каменистыхъ склонахъ горъ, 18. VIII. (№ 3604); тамъ же, на каменистыхъ берегахъ, 18. VIII. въ цв. (№ 3488—эти экземпляры вдвое выше, до 5 вершковъ) и 17. VIII. въ цв. (№ 3547), (*Коржинский!*).—1898. Яшиль-куль 30. VII., въ ущельи Харгошъ 22. VIII. (Паульсенъ, non vidi).

Геогр. распр.: а) Альпийская область Памироалая, Тяньшань, Джунгарский Алатау, Тарбагатай.—б) Лабрадоръ, Гренландія, арктическая область Европы, альпийская область средней и южной Европы и сѣв. Индіи, сѣв. Ураль, Кавказъ, Алтай, Саяны, сѣв. Монголія, горы сѣв. Персіи, Афганістанъ, зап. Тибетъ и Гималаи.

108. *Cerastium alpinum* L. Spec. plant., p. 438.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 411.—*Boiss.*, Fl. Or. I, p. 728.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Растенія Памира, р. 19, № 52.

1895. Въ долинѣ р. Кокъ-сай, около Кизыль-арта, 8. VII. въ цв. (*Коржинский!*).—1901. На глинисто-каменистыхъ склонахъ южной стороны перевала Кизыль-арта, 14.600—14.000', 3. VII. въ цв., и на обратномъ пути отъ озера Карапуль къ перевалу Кизыль-арта, 10. VIII. все еще въ цвету. Кроме того собрано на перевалъ Кой-тезекъ, 15.000', на каменистыхъ склонахъ, 20. VII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!). Цвѣты блѣдые.

Геогр. распр.: а) Памиръ, Памироалай (ущ. Саратай и пер. Мура), Тяньшань, Джунгарский Алатау.—б) Аркт. и сѣв. Россія; Ураль, Закавказье (г. Аракатъ), Турецк. Армения, Македонія, горы арктической Европы, Альпы, Пиренеи, аркт. Америка.

109. *Cerastium* sp. *Duthie*, Alcock's plants, p. 20, № 18. 1895. На высотѣ 13—14.000' (Alcock; non vidi—можетъ быть относится къ предыдущему виду).

110. *Cerastium arvense* L. Sp. pl. ed. I, p. 438.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 412, № 27.—*Boiss.*, Fl. Or. I, p. 728.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 346.

Собрano Poncins на перевалъ Талдыкъ въ Алайскомъ хребтѣ и изъ числа памирскихъ растеній исключается.

Геогр. распр.: а) Джунгарія, Тяньшань.—б) Македонія, большая часть Европы и европейской Россіи, Ураль, Кавказъ, Сибирь, Якутская и Амурская области, сѣв. Китай, Монголія, Сѣв. и Ю. Америка, зап. Гренландія.

III. *Cerastium vulgatum* L. *Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 408.—*Boiss.*, Fl. Or. I, p. 726.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. I, p. 228.

Указ.: *Franchet*, pl. Poncins, p. 346.

1893. Кизыль-арта (Poncins; non vidi).

Poncins, какъ и для всѣхъ растеній, собранныхъ имъ на Кизыль-арта, не указываетъ и въ данномъ случаѣ,—на сѣверномъ (алайскомъ) или южномъ (памирскомъ) склонѣ они взяты. Между тѣмъ сѣверный склонъ гораздо богаче растительностью и весьмаѣ вѣроятно, что *C. vulgatum* собранъ имъ именно тамъ. Для южнаго склона его никто не указываетъ, а на сѣверномъ собирались его въ 1895 г. Коржинскій! (по р. Кизыль-арта на альпийскихъ луговинахъ, 18. VII. въ цвету).

Геогр. распр.: а) Заравшанская долина, Заалайский хребтъ, Тяньшань.—б) Вся Европа, вся Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Сибирь, Камчатка, сѣв. Персія, зап. Тибетъ, Монголія, Китай, Корея, Индія, Цейлонъ, Сѣв. Америка.

IX. Lineae.

112. *Linum perenne* L. Spec. plant. I, p. 277.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 426.—*Boiss.*, Fl. Or. I, p. 865.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. I, p. 411.

1878. Перевалъ Кизыль-арта (*А. Кушакевичъ!*).

Вѣроятно, собрались Кушакевичемъ на сѣверномъ склонѣ перевала; мы, по крайней мѣрѣ, находили его тамъ (въ Бордабѣ) въ 1901 году; на южномъ же склонѣ, какъ и на всемъ Памире, его не видали.

Въ гербаріи Имп. Бот. Сада есть также это растеніе съ этикеткой: „1878. VI. Ак-су, Кушакевичъ“, но почеркъ не самого Кушакевича, а такъ какъ въ герб. Имп. Бот. Сада часто встречается надпись „Памиръ, Кушакевичъ“ на расте-

ніяхъ, собранныхъ не имъ, и не на Памирѣ, а другимъ участникомъ Ферганской экспедиціи 1878 года, И. И. Скорняковымъ, въ Ферганѣ и на Алайскомъ и Заалайскомъ хребтахъ, то вѣроятно и въ даниомъ случаѣ здѣсь та же ошибка; Кушакевичъ на памирскомъ Аксу быть не въ іюнѣ, а въ августѣ. Самое название Аксу (=бѣлая вода) такъ же употребительно въ Туркестанѣ, какъ и Карасу (=черная вода).—Цвѣты синіе.

Геогр. распр.: а) Памироалай (горы Заравшана, Ягиоба (пер. Аизобъ) и Искандеръ-куль—пер. Мура, Заалайский хребетъ), Тяньшань, Джунгарскій Алатау, Тарбагатай, Арало-каспійскій край.—б) Ю. Европа, ср. и ю. Россія, Ураль, Кавказъ, Байкалъ, вост. Сибирь, Якутская и Амурская область, Камчатка, Даурія, Алтай, зап. Тибетъ, Канарскіе острова, Монголія и Китайскій Туркестанъ, Китай, Персія, Белуджистанъ, Афганистанъ, Сѣв. Америка.

X. Malvaceae.

II3. Althaea nudiflora Lindl., Trans. Hort. Soc. VII. (1830) 251.—*Trautv.*, Enumer. pl. songor. („Bull. de Moscou“, 1860, II, p. 452).—*Althaea ficifolia forma foliis vix palmatis*, *Козаровъ*, Мат. по фл. Турк. нагорья, р. 114, № 320.—*Althaea ficifolia* (ex parte) *Крыловъ*, Флора Алтая, р. 185, № 298.

1891. Озеро Яшиль-куль, до 14,000' 12. VIII. (*Бржезинцій!*)¹⁾.—Цвѣты бѣлые, лепестки при основаніи желтые.

Геогр. распр.: а) Джунгарія (гора Хантау), Памироалай (горы Заравшанской долины, Шугиантъ), Тяньшань.—б) Алтай, Китайскій Туркестанъ.

II4. Malva mauritiana L. Spec. plant. ed. I, p. 689.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 434.—*Malva sylvestris* L. var. *Mauritiana*. *Boiss.*, Fl. Or. I, p. 819.—*M. silvestris* L. var. 1. *mauritiana*. *Hooker*, Fl. Br. Ind. I, p. 320, № 2.

1878. Акъ-байталъ, 9. VIII. (*Кушакевичъ!*). Цвѣты розовые.

Геогр. распр.: а) Заравшанская долина; близъ Акмолинска.—б) Умѣренный поясъ Европы и Азіи, Крымъ, Кавказъ, Китайскій Туркестанъ, Бенгалія.

¹⁾ Указывается имъ же (на этикеткѣ гербарія) для р. Мургабъ и р. Бейкъ на Памирѣ.

XI. Geraniaceae¹⁾.

II5. Geranium collinum Steph. in Willd. Sp. III, p. 705.—*Ledb.*, Fl. Ross. I, pp. 146 и 785.—*Boiss.*, Fl. Or. I, p. 874.—*Geranium collinum* M.B. *Hooker*, Fl. Br. Ind. I, p. 429.

Var. *eglandulosum* *Ledb.* l. c.

Указ. для Пам.: *Федченко О.*, Раст. Памира, р. 19, № 53.

1878. Аксу 16. VIII (*Кушакевичъ!*). Очень высокіе экземпляры, съ обращенными внизъ короткими волосками на черешкахъ листьевъ, цвѣтоносками и стеблѣ.—1883. Fl. Aksu ad fauces Murgab 12. VII fl. (*Д. Л. Ивановъ!*).—1891. Верховье Мургаба (*Бржезинцій!*)²⁾. Очень высокая крупнолистная форма, съ цвѣтами на длинныхъ черешкахъ. — 1897. Памирский Постъ, сырья солонцеватыя лужайки 17. VII въ цв. (№ 2243, *Коржинский!*).—1899. Безъ обозначеній мѣстности, но вѣроятно тамъ же (*Н. Вельманъ!*).—1901. На глинистыхъ крутыхъ склонахъ и на солонцеватомъ лугу между Памирскимъ Постомъ и уроцищемъ Ша-джанъ, 12.650—12.450', 12. VII и 5. VIII въ цв. (*Б. и О. Федченко!*).—Цвѣты фиолетовые.

var. *alpinum* Rgl.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 5, № 47.

1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).

Геогр. распр.: а) Памироалай (Шугиантъ, Заравшанская долина, Искандеръ-куль, Алайский хребетъ, Малый Алай), Тяньшань, Джунгарскій Алатау и степи Джунгаріи близъ горъ Каркаралы, Памиръ. — б) Трансильвания, ю. Россія, Кавказъ, Персія, Афганистанъ, Тибетъ, Гималаи, Монголія, ю. часть Томской губ.

II6. Geranium tuberaria Camb. in *Jacquem.*, Voy. bot. 33, t. 37.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. I, p. 481, № 12.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's plants p. 20, № 21.

1895. Памиръ 13—14.000' (*Alcock*; non vidi).

Геогр. распр.: Западные Гималаи.

¹⁾ Представителей семейства *Hypericaceae* не собрано на Памире; экземпляр *Hypericum regforatum* L. въ гербаріи Бржезинского! взятъ имъ 27. VII 1891 г. въ цв. на р. Суксуреватъ, т. е. на Гиндукушъ, уже въ предѣлахъ Памира, на высотѣ до 13.000'.

²⁾ Указывается имъ же (на этикеткѣ гербарія) для р. Каракчукуръ и р. Бейкъ на Памирѣ, до 13.000'.

II7. *Erodium tibetanum* Edgew. *Fl. Br. Ind.* I, p. 434.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Памира, р. 5, № 48 (*E. oxyrhynchum*).—*Федченко О.*, Растения Памира, р. 19, № 54. (Var. *pamiricum* O. Fedtsch.).

1892. Мургабъ, цв. и мол. пл.; Карабу, цв. и пл. (*Назаровъ!*).—1901. Въ каменистой пустынѣ около Памирского Поста, 12.650', въ цв. и съ изрѣльными плодами 14. VII (Б. и О. Федченко!).—Цвѣты (на сухихъ) бѣловатые. Лепестки вдвое длиннее чашелистиковъ.

У собранныхъ нами экземпляровъ волоски на внутренней сторонѣ носика бѣлые, но можетъ быть, это отличие только возрастное, и зависитъ отъ изрѣльности плодовъ. У экземпляровъ Назарова съ Карабу плоды зрѣлые и волоски рыжіе, какъ должно быть у типической формы *E. tibetanum*.

Геогр. распр.: а) Памиръ.—б) Монголія, западный Тибетъ.

XII. Zygophyllaceae.**II8. *Zygophyllum Rosowii* Bunge, Rel. Lehm. p. 536 (370).**

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 5, № 46.—*Федченко О.*, Раст. Пам., р. 20, № 55.

1892. Раинъ-куль, Мургабъ (*Назаровъ!*).—1897. Около Раинъ-куля, въ каменистой пустынѣ 14. VII въ цв. и мол. пл. (№№ 2168, 69, 70 и 71; *Коржинский!*).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. Собрано возлѣ озера Карабу, 13.400', 5. VII въ цв., на песчанистой почвѣ, и около Памирского Поста, въ каменистой пустынѣ, 11, 12, 13 и 14. VII въ цв. и съ мол. пл. (Б. и О. Федченко!).—1901. Р. Мургабъ, осыпи (*Тулиновъ*). Стебли очень ломкие въ междуузліяхъ. Цвѣты оранжевые.

Геогр. распр.: а) Памиръ, Джунгарія.—б) Монголія и Китайский Туркестанъ.

II9. *Zygophyllum brachypterum* Kar. et Kir., Enum. pl. Fl. alt. № 198. — *Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 485, № 5. — *Boiss.*, Fl. Or. I, p. 913.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 5, № 45.

1878. Аличуръ, VIII; Акъ-байталъ 15. VIII; Яшиль-куль, близъ китайского памятника, 23. VIII (*Кушакевичъ!*).—1883. Р. Аличуръ, 30. VII пл. (*Д. Л. Ивановъ!*).—1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).—1897. Около Раинъ-куля, въ каменистыхъ пустыняхъ 14. VII цв. и мол. пл. (№№ 2172, 3, 4, 5 и 6, *Коржинский!*).

Геогр. распр.: а) Сѣв. Туркестанъ, Джунгарія, Норь-Заїсанъ.—б) С.-в. Персія, Монголія и китайскій Туркестанъ.

XIII. Rhamneae.**II0. *Nitraria Schoberi* L., Syst. ed. X. 1044. — *Ledb.*, Fl. Ross. I, p. 505.—*Boiss.*, Fl. Or. I, p. 919.**

1878. Карабу 31. VIII (*Кушакевичъ!*).—Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: а) Джунгарія, Памиръ.—б) Ю. Россія, Крымъ, Кавказъ, Сирія, Месопотамія, Сибирь (Байкалъ, Даурія), Монголія, Китай, Тибетъ, Персія, Белуджистанъ, Австралія.

XIV. Papilionaceae¹⁾.**II1. *Thermopsis alpina* (Pall.) *Ledb.*, Flora altaica II, 112.—1830. — *Ledb.*, Fl. Ross. I, 510.—*Sophora alpina* Pallas Astragal. p. 121, t. 90, f. 1.—1800.**

1878 Карабъ-артъ, VIII, зрѣл. пл. (*Козловскій!*).

Экземпляры, собранные Козловскимъ на Карабъ-артѣ (?), являются единственнымъ указаниемъ для Памира, до сихъ поръ не подтвержденнымъ. Можно думать, что растеніе это собрано уже въ предѣловъ собственнаго Памира, гдѣ инѣдругъ въ низовьяхъ р. Маркану.

Геогр. распр.: Въ Туркестанѣ видъ этотъ встрѣчается въ высокогорной полосѣ Тянъ-шаня и Джунгарскаго Алатау.—Извѣстенъ также на Алтаѣ и указывается для восточной Сибири.

II2. *Medicago lupulina* L. Species plantarum ed. 1-а p. 779.—1753. — *Ledb.*, Fl. Ross. I, 527.—*Boiss.*, Flor. Or. II, 105.

1891. По р. Акъ-су 17. VII, въ цв. и пл. (*Бржезицкій!*)²⁾. Показаніе Бржезицкаго до сихъ поръ не подтверждилось и въ силу этого кажется нѣсколько сомнительнымъ.

Геогр. распр.: Въ Туркестанѣ M. lupulina распространена преимущественно въ предгорьяхъ и нижней зонѣ горъ; на сѣверѣ Туркестана растетъ и на равнинѣ.—Въ горы, на сѣверѣ Туркестана встречается во всей Европѣ, въ Сибири, Сѣверо-Туркестана встречается во всей Европѣ, въ Сибири, Сѣвер-

¹⁾ Сем. Papilionaceae обработано здесь Б. А. Федченко.

²⁾ На этикеткѣ гербарія указывается имъ также для р. Вахдже-дже, устья р. Истыкъ и Найзаташа.

номъ Китаѣ, на Азорскихъ и Канарскихъ островахъ, въ Сѣверной Африкѣ и Абиссиніи.

123. *Trigonella cachemiriana* Cambess. in *Jacquemont*, *Voyage Vol. IV*. p. 36, t. 41.—**1844.**—*Boiss.*, *Fl. Or. II*. 88.—*Trigonella Emodi* Benth., *Hook.*, *Fl. Br. Ind. II*. 88 (ex parte?).

Указ. для Памира: *Franchet*, *Plantes Poncins*, p. 346 (T. Emodi).—*Федченко Б.* Раст. Назарова р. 5 № 50.—*Федченко О.*, Растенія Памира, р. 20, № 56.

1878. Р. Карасу 31. VIII (A. Кушакевичъ!); р. Аличурь, 22. VIII. (A. Кушакевичъ!); Булунъ-куль, въ цв. 26—27. VIII (A. Кушакевичъ!) Яшиль-куль 23—25. VIII, въ цв. и пл. (A. Кушакевичъ!).—1892. Яшиль-куль и Карасу (Назаровъ!).—1893. Бозай Гумбезъ (Поинцизъ — non vidi).—1901. На сланцевыхъ скалахъ по лѣвому берегу р. Мургабъ между Памирскимъ Постомъ и р. Карасу, въ цв. и съ незр. пл. 15. VII (O. и B. Федченко!!); на каменистыхъ склонахъ между р. Карасу и переваломъ Найзаташъ, въ цв. 16. VII (O. A. и B. A. Федченко!!); на каменистыхъ склонахъ между оз. Сасыкъ и Яшиль-куль, 18. VII въ цв. (O. и B. Федченко!!).

Геогр. распир. Въ Туркестанѣ встрѣчается нерѣдко въ горахъ: Тянъ-шань и Памироалай. — Извѣстно также изъ Афганистана и Кашмира.

124. *Trifolium repens* L. Species plantarum ed. I p. 667. 1753.—*Ledb.*, *Fl. Ross. I*. 553.—*Boiss.*, *Fl. or. II*. 145.—*Hook.*, *Fl. Br. Ind. II*. 86.

1891. Ур. Каинды, въ цв., 21. VIII., до 12000' (Бржезинскій!).—Собрано, вѣроятно, въ нижнемъ теченіи р. Каинды, уже виѣ предѣловъ собственнаго Памира.

Геогр. распир. Въ Туркестанѣ не рѣдко встрѣчается на лугахъ въ предгорьяхъ и нижней зонѣ горъ: Памироалай, Тянъ-шань, Джунгарскій Алатау, Тарбагатай.—Въ Туркестана: вся Европа, Азиатская Турція, Персія, Афганистанъ, Белуджистанъ, Сибирь, Сѣверная Америка, Гималаи до 20000' (?), Нильгири, Цейлонъ.

125. *Caragana jubata* (Pall.) Poir., *Encycl. méth.* Suppl. II. 89.—*Ledb.*, *Fl. Ross. I*. 572.—*Robinia jubata* *Pallas* („Nova Acta Acad. Petropol.“ X. 370. t. 6.)

Указ. для Памира: *Б. Федченко*, Растенія Назарова, р. 5 № 52.

Мѣстное название: „Алты-хана“ (въ Бордабѣ, киргизское название).

Указывалось для окрестностей Бордабы, гдѣ найдено не только *H. C. Назаровыи* (!) въ 1892 г., но и *Кушакевичъ* (!) въ 1878 г., *C. Коржинскии* (!) въ 1895 г. и нами (!!?) въ 1901 г. Однако, Бордаба лежитъ уже на сѣверномъ склонѣ Заалайскаго хребта, виѣ предѣловъ собственнаго Памира, и потому растеніе это подлежитъ исключению изъ памирской флоры.

Геогр. распир.: Въ Туркестанѣ извѣстно также изъ альпийской области центральнаго Тянъ-шаня.—Въ Туркестана встрѣчается въ Прибайкальи и Монголіи.

126. *Oxytropis bella* B. Fedtsch.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, р. 21, № 58.

(Sectio Ianthina Bge.) Caudices subelongati ramosi, parte superiore stipularum petiolumque reliquiis tecti. Stipulae albo-hyalinae, villosae, petiolo breviter (usque tertiam partem) adnatae, lanceolato acuminatae. Foliola 2—4 juga, cum impari, complicata, linearis-oblonga, obtusa; rhachis brevissima. Scapi folia superantes, adpresso pubescentes, pilis patulis paucis intermixtis. Capitulum 8—15 florum, compactum, oblongum. Bracteae lanceolatae villosulae, pedicellos superantes. Calyx campanulatus, dentes calycinis linearis lanceolati, tubum superantes vel subaequantes. Vexillum alas paulo, carinam multo superans; carinae mucro elongatus, porrectus. Ovarium brevissime stipitatum. Legumen uniloculare, immaturum oblongolanceolatum, calysem paulo superans, albido-pubescentes.

Новый видъ этотъ не подходитъ съ точностью ии къ одному изъ извѣстныхъ. Всего ближе онъ къ экземплярамъ, собраннымъ О. А. Федченко 22 июля 1871 г. въ Алайской долинѣ. Эти экземпляры отнесены Бунге къ *O. tatarica* Cambess., но они весьма мало похожи на Гималайскіе образцы этого вида. Растеніе, собранное Каю въ Западномъ Тянъ-шанѣ по р. Андаульганъ и опредѣленное Франши, какъ *O. tatarica*, отличается и отъ того, и отъ другаго.

Вообще, весьма трудно установить съ точностью систематическое положеніе нашего растенія и нельзя не указать на то, что предложенная Бунге классификація видовъ *Oxytropis* далеко не можетъ считаться окончательно установленной.

ной: многие виды были описаны Бунге по жалким обломкамъ, у большинства не извѣстны плоды и т. д.

1878. Прибрежье озера Каракуль, 5. VIII. въ цв. и пл. (*A. Кушакевичъ!*) Каракуль 30. VII. (*Ашурбаевъ!*). — Ущелье на Памирь-Харгоши, 6. VIII. въ цв. и пл. (*A. Кушакевичъ!*). — Чонъ-су 6. VIII (*A. Кушакевичъ!*). — Памирь-Аличуръ, 20—22. VIII въ цв. и пл. (*A. Кушакевичъ!*). — 1901. На глинистыхъ и каменистыхъ склонахъ выше перевала Акъ-байталь, до 16000', 8. VIII. въ цв. и съ пл. (Б. и О. Федченко!!).

Примѣчаніе. Не къ этому ли виду относятся и слѣдующія указания:

1) *Oxytropis* sp. (*tataricae affinis*) *Franchet*, Plantes Poncins. p. 346. (Кара-джильга).

2) *Oxytropis* sp. (near *O. tatarica*), *Duthie Alcock's* pl. p. 21 № 24 (Pamir, 13—14.000').

127. *Oxytropis leucosocarpa* Bge. *Bunge Species generis Oxytropis*. № 18 („Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg“, XXII. № 1) 1874.

1878. Памирь Харгоши 6. VIII въ цв. (*A. Кушакевичъ!*).

Единственный экземпляръ, имѣющійся гербаріи Импер. Бот. Сада, похожъ по всѣмъ признакамъ на собранные въ Тяньшанѣ Кушакевичемъ же образцы *O. leucosocarpa*, хотя нельзя не сознаться, что за полное тожество ручаться невозможно; къ тому же, и оригиналы Бунге, и наше растеніе едва лишь зацвѣтаютъ и точно опредѣлить положеніе этого вида въ системѣ невозможно.

128. *Oxytropis pagobia* Bunge, Species generis *Oxytropis* № 28 („Mémoires de l'Académie Impériale de St. Pétersbourg“ v. XXII № 1). 1874.—*А. Бунге* in A. П. Федченко, Путешествие въ Туркестанъ ч. III. В. 15, стр. 168, № 10.

Указ. для Памира: *Федченко, О.*, Растенія Памира, р. 22, № 59.

1901. На лужайкахъ у ручьевъ въ долинѣ р. Акъ-байталь, отъ Памирского поста до ур. Гурумды, 7. VIII, въ пл. (О. и Б. Федченко!!).

Очень неполные экземпляры, почему определеніе не можетъ считаться вполнѣ достовѣрнымъ. Въ Туркестанскомъ Гербаріи Императорскаго Ботан. Сада хранятся образцы съ Памироалая, Тянь-шаня и Джунгарскаго Алатау, по Бунге относящіеся къ этому виду.

129. *Oxytropis humifusa* Kar. et Kir., Enumer. plant. song. Addenda („Bulletin de la Societé Impériale des Naturalistes de Moscou“, 1842, III. p. 535). — *Бунге* in A. П. Федченко. Путешествие въ Туркестанъ, ч. III. в. 15, № 12, стр. 169. — *O. lapponica* Gaud. v. *humifusa*, *Hook.*, Fl. Br. Ind. II. 137.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, р. 22, № 60.

1878. Акъ-байталь, 8. VIII, въ цв. (*A. Кушакевичъ!*). — Каръ-артъ, 2. VIII, въ цв. (*Козловский!*). — 1892. Акъ-байталь (*Назаровъ!*). — 1895. Бозай гумбезъ, 30. VII въ цв. (*Богородицкий!*). — 1901. На южномъ склонѣ перевала Кизыль-артъ, на красной глине, въ цв. з. VII, 14.600—14.000', на песчаныхъ склонахъ между ур. Мусколъ и долиной оз. Каракуль въ пл. 9. VIII, 14.100—13.400', (плоды преимущественно съ прижатыми черными волосками), тамъ же, на каменистыхъ мѣстахъ, въ цв. 6. VII, 13.500—14.300', на сѣверномъ склонѣ перевала Акъ-байталь, въ цв. 7. VII, 14.400', (завязь почти голая); на каменистыхъ склонахъ выше перевала Акъ-байталь, въ цв. и съ пл. 8. VIII, до 16.400', на луговинахъ у рѣчки Акъ-байталь, на югъ отъ перевала, 8. VIII, въ цв. и пл., 15.000—14.500', на склонахъ между ур. Ходжа-назарь и переваломъ Кой-тезекъ 20. VII въ цв., 13.800—15.100', бл. перевала Кой-тезекъ, 1. VIII, въ цв. 15.000—16.000', на луговинахъ по рѣчкѣ въ долинѣ Аличура отъ ур. Чатыръ-ташъ до озера Сассыкъ (О. и Б. Федченко!!). — 1901. Переваль Кизыль-артъ, въ цв. з. VII, Уй-булакъ, пески передъ Мусколомъ, р. Акъ-байталь, сырой лугъ (*Тулинковъ!*).

Одно изъ самыхъ обыкновенныхъ растеній Памира, преимущественно травяныхъ склоновъ и сырыхъ луговинъ. Сильно варьируетъ и, можетъ быть, некоторыя изъ собранныхъ на Памире растеній заслуживали бы выдѣленія въ особыя формы, если не виды. Нельзя однако не прибавить, что и здѣсь, какъ мы видѣли и выше, въ своей монографіи Бунге различается иногда виды на основаніи ничтожныхъ признаковъ.

Геогр. распир.: въ горахъ Памироалая, Тянь-шаня и Джунгарскаго Алатау. — Въ Туркестанѣ встречается въ Гималаяхъ; по крайней мѣрѣ, я отношу сюда некоторые гималайскіе образцы.

Примѣчаніе 1-ое. Сюда же повидимому относится и обрывокъ растенія, находящійся въ гербаріи Импе-

раторского Сиб. Ботанического Сада и собранный К. А. Брюзевицкимъ на перевалѣ Бенкъ 20. VII, 1901¹⁾.

Примѣчаніе 2-ое. Сюда же, вѣроятно, относятся и слѣдующія литературовыя указанія:

1) *Oxytropis* sp. (*glacialis affinis*), *Franchet*, *Plantes Poncins* p. 346 (Кара-джилъга, Кизылъ-артъ).

2) *Oxytropis* sp. (*near glacialis* Benth.) *Duthie*, *Alcock's plants* № 28, p. 21. (На песчаной почвѣ по р. Аксу 13—14.000'). Это впрочемъ можетъ быть и другой видъ.

130. *Oxytropis glabra* (Lam.) DC., *Astragalos*. p. 76, № 31, t. 8.—**1802.**—*A. Бунге* in A. П. Федченко *Путешествіе въ Туркестанъ* т. III, в. 15, стр. 173, № 18.—*Oxytropis diffusa* *Ledb.*, Fl. alt. III: 281.—**1831.**—*Ledb.*, Fl. Ross. I. 585.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. II. 140.—*Astragalus glaber* Lam., Encycl. méth. I. 525.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, p. 22, № 61. var. *humilis* Rgl.

Omnibus partibus minor, inflorescentia etiam fructifera subcompacta.

1899. Памиръ (*H. Вельшанъ!*).—1901. Въ долинѣ р. Мургаба, между Памирскимъ Постомъ и р. Карасу 15. VII, посл. цв. и пл. (*О. и Б. Федченко!!*).

Var. *pamirica* B. Fedtsch. (var. n.) *Omnibus partibus minor, tota planta villosa- et adpresso pubescens; foliola 10—15 juga; pedunculi interdum breviusculi, carinae mucro brevis.*

1901. На лугахъ по р. Мургабъ бл. Памирскаго Поста, 11. и 14. VII. въ цв., на луговинахъ по Мургабу отъ Памирскаго Поста до ур. Ша-джанъ, въ цв. 15. VII. 12.650—12.400', по р. Акъ-байталъ, 8. VIII., 14.500—15.000' (*О. и Б. Федченко!!*).

Эта форма сильно отличается отъ типичныхъ *O. glabra* (Lam.) DC., однако, принимая во вниманіе сильную измѣнчивость этого вида, полагаемъ наиболѣе удобнымъ пока отличать наше растеніе только какъ особую разновидность.

O. glabra широко распространена по Туркестану и встречается не только въ предгорьяхъ и горныхъ зонахъ всѣхъ хребтовъ, но и на равнинѣ — въ особенности въ кир-

¹⁾ Имя же указывается, на этикеткѣ гербарія, для Вахджаира, Каанды и переваловъ Кизылъ-артъ и Кизылъ-джинъ.

гизской степи. — Въ южн. Туркестана — въ Сибири до Дауріи, также въ Западномъ Тибетѣ.

131. *Oxytropis platonychia* Bge., Species generis *Oxytropis* № 50 („Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg“, XXII, № 1.) 1874.—*A. Бунге* in A. П. Федченко, *Путешествіе въ Туркестанъ* т. III в. 15 стр. 175 № 22.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Растенія Памира, p. 23, № 62.

1878. Восточные предгорья Кара-куля 5. VIII. въ пл. (*A. Кушакевичъ!*).—1901. По склону горы на восточномъ берегу озера Каракуль, на смычущемъ пескѣ, 5. VII. въ цв.; по каменистымъ склонамъ выше перевала Акъ-байталъ, до 16.000', въ цв. и съ незр. пл. 8. VIII (*О. и Б. Федченко!!*).

Геогр. распр.: Въ Туркестанѣ было открыто въ 1871 г. въ Алайскомъ хребтѣ (Джинтыкъ, Малый Алай) О. А. Федченко и больше ни откуда не известно.

132. *Oxytropis cachemiriana* Cambess. *Jacquemont*, Voyage t. IV, bot. p. 38, t. 44.—*Бунге* in A. П. Федченко, *Путешествіе въ Туркестанъ* т. III в. 15 стр. 176 № 23.—*O. cachemiriana*, *Hook.*, Fl. Br. Ind. II. 139.—*Федченко Б.* Растен. Назарова № 55 р. 5 (*O. acuta*).—*Федченко О.* Растенія Памира, p. 23, № 63.

1878. Памиръ Харгоши, 7. VIII. въ цв. (*A. Кушакевичъ!*). Переходъ отъ Каракуля къ рѣчкѣ, 5. VIII. (*A. Кушакевичъ!*). устье Узбилия въ Чонъ-су 6. VIII (*A. Кушакевичъ!*), Башъ Гумбезъ 28. VIII. (*A. Кушакевичъ!*), Акъ байталъ 8. VIII, (*A. Кушакевичъ!*), долина р. Чонъ-су 6. VIII (*A. Кушакевичъ!*).—

1892. Акъ-байталъ, Карасу (*Назаровъ!*).—1901. На каменистыхъ мѣстахъ между оз. Каракуль и переваломъ Кизылъ-артъ, 10. VIII., 13.400—14.500', отъ Памирскаго Поста до р. Кара-су въ цв. 15. VII., 12.650—13.100, отъ озера Сассыкъ до озера Яшиль, 17. VII въ цв., 13.100—12.500', отъ уроцища Ходжа-Назаръ до перевала Кой-тезекъ, въ цв. и пл. 20. VII. 13.800—15.100', отъ озера Сассыкъ до ур. Чатыръ-тапъ въ долинѣ р. Аличуру, 3. VIII. въ цв. и пл. 13.100—13.540', отъ р. Маркансу до озера Каракуль, 4. VII. въ цв. 13.100—13.400', въ ур. Мусколъ, 9. VIII. въ цв. и пл. 14.000', отъ Памирскаго поста до уроцища Гурумды, на щебниѣ въ долинѣ р. Акъ-байталъ, 7. VIII. въ цв. и пл. 12.650—14.000', ниже перевала Акъ-байталъ 8. VIII. въ цв.

и пл. 15,000—14,500', выше перевала Акъ-байталъ, на каменистыхъ склонахъ, 8. VIII въ цв. и пл. (О. и Б. Федченко!). 1901. Уй-булакъ, пески передъ Мусколомъ и сырьи пески по р. Акъ-байталъ (*Tulinoev!*).

Весьма характерное растение, бросающееся въ глаза своим яркомалиновыми вѣничками, въ то же время прижатое къ поверхности почвы. Наше растеніе очень похоже на экземпляры, собранные П. П. Семеновымъ въ Тянъ-шанѣ (въ Заилийскомъ Алатау), но замѣтно отличается отъ растенія, встрѣчающагося въ Кашмирѣ, Тибетѣ и Западномъ Тибетѣ менѣе развитымъ стеблемъ.

Примѣчаніе. При устьи р. Истыкъ 18 июля 1891 г. собрано К. А. Бржезинскимъ растеніе, которое, быть можетъ, также относится сюда. На этикеткѣ гербарія имъ же указывается для Карапура, Вахджира, Кизыльджинка, Аличура и Каниды, до 15.000'.

133. *Oxytropis Poncinsii* Franchet, Note sur une collection de plantes rapportées du Pamir en 1894 par M. E. de Poncins („Bulletin du Muséum d'histoire naturelle“ 1896 № 7 p. 343—346).

Указ. для Памира: Федченко Б., Растен. Назарова р. 5. № 53.—Федченко О., Растенія Памира, р. 24, № 64.

1878. Каракуль 30. VII, съверный берегъ Каракуля 27. VII., Карасу, прибрежье Каракуля 30. VII, р. Чонъ-су. 6. VIII, пер. Кизыль-артъ 22. VII (А. Кушакевичъ!). Каръ-артъ 2. VIII. (Козловскій!).—1892. р. Акъ-байталъ, р. Карасу (*Назаровъ!*).—1893. Карапильга (*Понцинзъ!*)—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. На пескѣ между гранитными глыбами, близъ ручья Уй-булакъ, на переходѣ отъ р. Маркану до озера Карапуль, въполномъ цвѣту 4. VII., 13.100—13.400', между озеромъ Карапуль и уроцищемъ Мусколъ 6. VII. въ цв., 13.400—14.100', у перевала Акъ-байталъ, на съверномъ склонѣ, 7. VII. незрѣлые плоды, 14.400', около перевала Акъ-байталъ, 8. VII въ цв.; 14.500—15.000', тамъ же 8. VIII. съ пл., отъ Памирского Поста до ур. Гурумды, по р. Акъ-байталъ 7. VIII. въ цв. и пл. 12.650—14.000', въ верховьяхъ Аличура отъ ур. Чатыръ-ташъ до пер. Найза-ташъ, 16. VII и 4. VIII съ цв. и пл. 13.540—14.300', на песчаной и каменистой почвѣ; на каменистыхъ склонахъ отъ ур. Чатыръ-ташъ до озера Сасыкъ, 17. VII. съ цв. и пл. 13.540—13.100' (О. и Б. Фед-

ченко!).—1901. Уй-булакъ, 4. VII въ цв., р. Акъ-байталъ, передъ Найзаташемъ на осипи 16. VII, ледниковые холмы передъ и за оз. Сассыкъ-кулемъ 17—18. VII. въ пл. (*Tulinoev!*).

Растеніе весьма характерное для Памирской пустыни: все оно совершенно почти не поднимается надъ поверхностью почвы и только ярко-фиолетовые вѣнички и затѣмъ тѣлесного цвѣта вздутые плоды немногого выставляются надъ плотной дерновиной этого растенія.

Извѣстно оно только на Памирѣ.

Прикильчаніе. Къ этому виду близко подходитъ также растеніе, собранное А. Кушакевичемъ (Каракуль 5. VIII, отъ Каракуля до рѣчки 5. VIII., р. Чонъ-су 5. VIII въ цв. и незр. пл.) отличающееся развитой стрѣлкой, превышающей листья. Для меня остается не выясненнымъ, есть ли это особый видъ, или же только особая форма?

134. *Oxytropis chiliophylla* Royle, Illustr. himal. p. 198.—Bunge, Species generis Oxytropis № 173 („Mémoires de l'Académie des Sciences de St. Pétersbourg“ XXII № 1).—O. microphylla, Hook. Fl. Br. Ind. II. 139.

Указ. для Пам.: Franchet, Plantes Poncins, p. 346 (O. tibetica).—Duthie, Alcock's Plants p. 21, № 25 (O. microphylla).—Федченко Б., Растенія Назарова р. 5, № 54.—Федченко О., Растенія Памира, р. 24, № 65.

1878. Прибрежье оз. Карапуль, 25. VII въ цв. (А. Кушакевичъ!), оз. Карапуль, 27. VII въ цв. (А. Кушакевичъ и Ю. Ашурбаевъ!), Памиръ Харгоши 4. VIII. въ цв. (А. Кушакевичъ!), р. Чонъ-су 6. VIII. въ цв. (А. Кушакевичъ!).—1892. Рангъ-куль, Большой Карапуль (*Назаровъ!*).—1893. Карапильга (*Понцинзъ!*).—1895. Памиръ, по сухимъ русламъ рѣчекъ около 13.000' (Алосек).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. Въ долинѣ озера Карапуль, на южномъ, восточномъ и съверномъ берегахъ, на щебниѣ и лессовидной глиниѣ, во множествѣ; 4. и 5. VII. съ цв., 9. VIII. отцв., 10. VIII. со зрѣлыми плодами, 13.400—13.600', въ ур. Чичкты, 9. VII. съ цв., 12.750', въ долинѣ р. Акъ-байталъ 8. VIII. съ пл. 14.500—15.000' (О. и Б. Федченко!).—1901. Близъ озера Карапуль 5. VII., ледниковые холмы передъ оз. Сассыкъ-куль 16. VII. и пески передъ Мусколомъ 6. VII въ цв. (*Tulinoev!*).

B. albida B. Fedtsch. var. n. *Corollae albidae*.

1878. Берега оз. Кара-куль 5. VIII. въ цв. (*A. Kuschakewiczi!*). — 1901. Въ уроч. Чичикты, 9. VII., 12.750', въ цв. (*O. и B. Fedtsch.!!*).

O. chiliophylla — одно изъ интереснейшихъ и характернейшихъ Памирскихъ растений. До настоящаго времени плоды этого вида не были известны. Они продолговатоланцетной формы, изогнутые, покрыты въ изобилии железками. Опушение замѣтно, но его гораздо меньше, чѣмъ на молодыхъ завязяхъ. — Три вида, *O. microphylla* DC., *O. chiliophylla* Royle и *O. tibetica* Bge. являются чрезвычайно близкими другъ къ другу и относятся, можетъ быть, къ одному и тому же циклу.

Геогр. распр.: Кашмиръ, Тибетъ.

Примѣчаніе. Невыясненными остаются слѣдующія литературные указания:

1) *Oxytropis* sp. (*Duthie, Alcock's plants* p. 21 № 27). Памиръ 13—14.000' (*Alcock's herb.* № 17.696). „Flowers purple, on elongated peduncles“, такъ что это можетъ быть и *Hedysarum cephalotes* Franch. subsp. *pamiricum* B. Fedtsch.?

2) *Oxytropis* sp. (*Duthie, Alcock's plants* p. 21 № 26) Большой и Малый Памиръ, 13—14.000', одно изъ самыхъ обыкновенныхъ растений, растеть въ видѣ подушекъ на сухой почвѣ (*Alcock's herb.* № 17,695 и № 17,698) „A very showy plant with reddish-purple flowers, and silvery pubescent foliage; rootstock woody and much branched“.

Не есть ли это *O. Poncinsii* Fr.?

135. *Astragalus ophiocarpus* Benth. in hb. Kew. — *Bunge, Astragal. gerontog.* № 28. („Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg“ vol. XI № 16. 1868, vol. XV. № 1. 1869.—*Hook., Fl. Br. Ind. II*, 122, — *Boiss., Fl. Or. II*, 224.

1878. Яшиль-куль 23. и 24. VIII въ пл. (*A. Kuschakewiczi!*). — Геогр. распр.: изрѣдка въ предгорьяхъ, напр. бл. Ходжента (!) и степяхъ (Чиназъ, Голодная степь — *Руссовъ*), а также въ Шугнанъ (*O. и B. Fedtsch.!!*). — Въ ю. Туркестана известно въ ю.-з. Персии (Багсиранъ, Керманъ, Іездъ), Афганистанъ и западномъ Тибете.

136. *Astragalus Kuschakewiczi* B. Fedtsch. (sp. n.).

(§ *Hemiphaca*). Rhizoma induratum, lignescens. Caules e collo numerosissimi, adscendentes vel prostrati, 10—20 см. longi. Stipulae foliorum inferiorum basi saltem coalitae, albidae, foliorum mediorum et superiorum viridiuseculae, liberae, lanceolatae. Foliola 5—8 juga, cum impari, oblongo-ovata vel oblongo-lanceolata, apice emarginata, ut tota planta adpresso sericeopubescentia. Racemus pedunculo folium superante suffultus. Flores 10—20 breviter pedicellati in capitulum subovatum coarctati. Bracteae lanceolato-lineares, pedicellum brevem superantes. Calyx campanulatus albo nigroque pilosus. Dentes calycini tubum subaequantes. Corolla (e sicco) pallida, carina apice subattenuata, macula intensa violacea notata. Vexillum carinam subaequans, alae breviores. Legumen oblongo lanceolatum, paulo curvatum, calycem circiter duplo superans, dense albovillosum.

Приналежитъ несомнѣнно къ секціи *Hemiphaca* и въ неї стоить повидимому ближе всего къ *A. multicaulis* Ledb., отъ которого отличается однако уже волосистыми бобами.

1878. Прибрежье Кара-куля, 28. VII. въ цв. и съ пл. (*A. Kuschakewiczi!*).

137. *Astragalus densiflorus* Kar. et Kir., Enum. plant. songor. № 245. („Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“ XV. II. p. 329). 1842.—*Бунге* in A. П. Федченко Путешествие въ Туркестанъ т. III. в. 15 стр. 214, № 17. — *Hook., Fl. Br. Ind. II* 125.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, p. 25, № 66.

1878. Ур. Ала-байталъ 4. VIII; Памиръ Харгоши 4. VIII; сѣверная сторона озера Каракуль, прибрежье, 27—31. VII. (*A. Kuschakewiczi!*). — Озеро Каракуль 31. VII. (*И. Скорняковъ!*). — Озеро Каракуль 30. VII. въ цв. и пл. (*Ю. Ашурбаевъ* и *A. Kuschakewiczi!*). — 1901. На пескѣ близъ р. Маркану 3. VII. въ цв., отдѣльными кустиками, которые замѣтно задерживаютъ и скопляютъ движущійся песокъ, на выс. 13.100', въ цв.; отъ р. Маркану до озера Каракуль, 4. VII., 13.100—13.400', зацвѣтасть; близъ озера Каракуль, на пескахъ, 13.400', 13.400', зацвѣтасть; между озеромъ Каракуль и уро. 5. VII. въ цв.; на пескахъ между озеромъ Каракуль и уро. чищемъ Мусколъ, 13.400—14.000', 6. VII., зацвѣтасть; тамъ же 9. VIII. въ цв. и пл.; отъ Памирского Поста до ур. Гуже 9. VIII. въ цв. и пл.; въ долинѣ р. Акъ-байтала, 7. VIII., на выс. 12.650—13.000', въ долинѣ р. Акъ-байтала, 7. VIII., на выс. 12.650—13.000', въ долинѣ р. Акъ-байтала, 7. VIII., на выс. 12.650—13.000'.

14.000', въ цв.; на пескѣ въ заливной долинѣ р. Мургабъ, въ урочищѣ Шаджанъ, 12.450', 12. VII, въ цв. и пл. (О. и Б. Федченко!). — 1901. Каракуль 5. VII. въ цв. и пески передъ Мусколомъ 6. VII. въ цв. (Тулиновъ!).

Чрезвычайно характерное растеніе для песчаныхъ мѣстъ. Было бы весьма интересно сдѣлать съ этимъ растеніемъ опыты культуры, какъ кормовой травы.

Геогр. распр.: Въ Джунгарскомъ Алатау, а также въ Гималаихъ и Афганистанѣ.

138. *Astragalus brachytropis* (Stev.) C. A. Mey., Verzeichniss der Pflanzen gesam. in 1829—1830 im Caucasus p. 140. — 1831. — Boiss., Fl. Or. II. 266. — A. Бунге in А. П. Федченко, Путешествіе въ Туркестанъ т. III. в. 15, стр. 216, № 24. — Phaca brachytropis Stev. (Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou" IV. p. 93. 1812). — Astragalus oroboides Ledb., Fl. Ross. I. 602.

Указ. для Памира: Franchet, Plantes Poncins p. 346 (A. Zacharensi aff.). — Федченко О., Растенія Памира, р. 25, № 67.

1893. Кара-джилыга (По иции изъ). — 1901. На луговинахъ у ручья между озеромъ Яшиль-куль и ур. Ходжа-Назарь, 12.500—13.800', 19. VII. въ цв.; на лужайкахъ въ долинѣ р. Аличуръ между ур. Чатырь-ташъ и озеромъ Сассыкъ, 17. VII. въ цв. 13.540—13.100' (О. и Б. Федченко!).

Геогр. распр.: Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ Тянь-шанѣ—напр. Заилийскій Алатау (Семеновъ!, А. Регель!), а также по р. Барекоуи, Суекъ и др. (Шаригорсть!) и въ Джунгарскомъ Алатау (Сайрамъ — Фетисовъ!). — Въ Туркестана встрѣчается на Кавказѣ и указанъ для горъ южной Сибири.

139. *Astragalus tianschanicus* Bge., in Ruprecht et Osten-Sacken, Sertum tianschanicum p. 48 („Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg“ t. XIV. № 4) 1869. — Бунге in А. П. Федченко Путешествіе въ Туркестанъ т. III. в. 15, стр. 237, № 57.

var. *pamiricus* B. Fedtsch. (var. n.).

Omnino exscapus, humilis. Ovarium in stipitem brevem attenuatum.

Указ. для Памира: Duthie Alcock's plants p. 20, № 23 (A. near purpurascens). — Федченко Б., Растенія Назарова, р. 5, № 57. — Федченко О., Растенія Памира, р. 25, № 68.

1892. Памиръ (Назаровъ!). — 1895. 13—14.000' (Оль-кокъ). — 1901. На каменистыхъ мѣстахъ близъ перевала Кої-тезекъ, 1. VIII. въ цв., тамъ же 20. VII. въ цв., на выс. 14.500—15.000'; на каменистыхъ склонахъ между р. Карасу и ур. Чатырь-ташъ, 13.100—14.000', 16. VII, въ цв. и на такихъ же мѣстахъ между ур. Чатырь-ташъ и озеромъ Сассыкъ, 13.540—13.100', 17. VII. въ цв. (О. и Б. Федченко!). — 1901. Ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ 17. VII. въ пл. (Тулиновъ!).

Довольно часто встречается въ южной части Памира.

Определить это растеніе съ достовѣрностью довольно трудно. Всего ближе оно подходитъ къ описанію A. tianschanicus, описанного Бунге съ Центральнаго Тянь-шаня, но ни въ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада, ни въ гербаріи Императорской Академіи Наукъ мнѣ не удалось отыскать оригиналъ экземпляра Бунге.

140. *Astragalus taldigensis* Franchet, Note sur une collection de plantes rapportées du Pamir en 1894 par M. E. de Poncins („Bulletin du Muséum d'histoire naturelle“ 1896. № 7, p. 346).

Растеніе это хотя и показано Франше для Памира (Plantes du Pamir...), на самомъ дѣлѣ найдено на Алайскомъ хребтѣ (перевалъ Талдыкъ) и къ Памирской флорѣ не относится. Судя по описанію, растеніе это очень близко къ предыдущему виду.

141. *Astragalus alatavicus* Kar. et Kir. Karelín et Kirilow, Enumer. plant. songor. № 280. („Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“, XV. II. p. 344). 1842. — А. Бунге in А. П. Федченко Путешествіе въ Туркестанъ т. III. в. 15, стр. 232, № 47.

var. *pamirensis* (Franchet) B. Fedtsch. — A. pamirensis Franchet, Note sur une collection de plantes rapportées du Pamir en 1894 par M. E. de Poncins („Bulletin du Muséum d'histoire naturelle“, 1896. № 7, p. 344).

Указ. для Памира: Franchet, Plantes Poncins p. 344, 346 (A. pamirensis). — Федченко Б., Растенія Назарова р. 5, № 60 (A. alatavicus). — Федченко О., Растенія Памира, № 69.

1878. Каракуль, 25. VII. въ цв., Кизыль-артъ 24. VII. въ цв., Чонъ-су 6. VIII. въ цв. (А. Кушакевичъ!). — 1891. Р.

Аксу 18. VII. въ цв. (*Бржезицкий!*)¹). — 1892. Акъ-байталь (*Назаровъ!*). — 1893. Кара-джильга (*Понцинь*). — 1901. На песчаныхъ и каменистыхъ равнинахъ бл. оз. Кара-куль, 5. VII., 13.400' въ цв.; между р. Маркансу и озеромъ Каракуль, въ цв. 4. VII. 13.100 — 13.400', тамъ же 10. VIII. въ пл. и цв., между урочищемъ Мусколъ и озеромъ Каракуль 9. VIII., 14.100 — 13.400', въ цв.; близъ перевала Акъ-байталь, 8. VII. въ цв. 15.000 — 15.700' (*О. и Б. Федченко!!*). — 1901. Уй-булакъ и пески передъ Мусколомъ, въ цв. и пл. (*Тудиновъ*).

Въ горныхъ странахъ средней Азии широко распространены, отъ Джунгарского Алатау и до Афганистана, различные формы, которая всего удобнее относить къ одному и тому же виду — *A. alataicus Kar. et Kir.*

Формы эти были описаны разными авторами, какъ самостоятельные виды. Первымъ былъ описанъ:

A. alataicus Kar. et Kir. — въ 1842 г. (l. c.).

Затѣмъ:

A. kurrimensis Bge., Suppl. Astrag. turkest. („Acta Horti Petrop.“ VII. 370). 1880.

A. verticillaris Aitch., On the flora of Kuram valley („Journ. of Linn. Soc.“ XVIII. 45). 1880.

A. myriophyllum Bge. in А. П. Федченко, Путешествие въ Туркестанъ т. III. в. 15, стр. 232, № 48. 1880.

A. pamirensis Franchet (l. c.) — 1896.

Какъ было замѣчено уже В. И. Липскимъ (Материалы для флоры Средней Азии I. „Acta Horti Petrop.“ XVIII. № 27), первыя три формы, (*A. alataicus Kar. et Kir.*, *A. kurrimensis Bge.*, *A. verticillaris Aitch.*) относятся несомнѣнно къ одному и тому же виду. Не знаю, почему В. И. Липский не упоминаетъ о двухъ послѣднихъ формахъ — *A. myriophyllum Bge.* и *A. pamirensis Franchet*; на мой взглядъ, эти формы не болѣе отличаются отъ типичныхъ *A. alataicus*, чѣмъ напр. *A. verticillaris Aitch.*

Прибавлю еще, что Франшие, описывая свой *A. pamirensis*, относить его къ несуществующей секціи Baikalia (такая секція имѣется въ р. *Oxytropis*, а не въ р. *Astragalus*) и сравнивать этотъ видъ съ несуществующимъ *A. monop-*

¹⁾ Это же растеніе указывается имъ, на этикеткѣ гербарія, для оз. Кара-куль и р. Кизыль-джинъ.

phyllus, вмѣсто того, чтобы сравнить его съ *A. myriophyllum Bge.*, отъ котораго Памирское растеніе едва отличимо. Приводимые Франшие отличительные признаки (*tiges presques nulles, feuilles velues sur les deux faces, grappes pauciflores*) на самомъ дѣлѣ не существуютъ.

Геогр. распир.: Различныя формы *A. alataicus* встрѣчаются въ Туркестанѣ и въ Джунгарскомъ Алатау, Тянъ-шанѣ, Памироалай — Алайскомъ хребтѣ, въ Заравшанѣ, въ Шахрисебзѣ, Гиссарѣ. Въ Туркестана — лишь въ горахъ Афганистана.

142. *Astragalus lasiosemius* Boiss., Diagnoses pl. nov. or. Ser. I. 9. p. 96. — 1849. — *Boiss.*, Fl. Or. II, 304. — *A. Бунге* in А. П. Федченко, Путешествіе въ Туркестанъ, т. III. в. 15, стр. 239, № 62.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, р. 27, № 70. 1878. Аличуръ, 23. VIII. (*A. Кушакевичъ!*). — Яншиль-куль 24. VIII. (*A. Кушакевичъ!*). — 1901. На каменистыхъ склонахъ въ долинѣ р. Аличуръ близъ впаденія ея въ озеро Яншиль, въ цв. 18. VII., 12.500'; близъ озера Булунъ-куль, на песчаныхъ склонахъ, 19. VII. въ цв., 12.500 — 12.700' (*О. и Б. Федченко!!*).

Геогр. распир.: Встрѣчается въ горахъ Туркестана: Тянъ-шань, Памироалай, а также въ Афганистанѣ.

Видъ этотъ сильно варьируетъ, но варьациіи эти пока остаются неизученными.

143. *Astragalus Tulinovii* B. Fedtsch.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, р. 27, № 71.

(Sect. *Hypoglossi*?). Caudices tenuissimi, ramosi, subterranei. Caules breviusculi, pedunculis breviores, adscendentes. Stipulae ad medium coalitae, lanceolato oblongae, ciliatae. Folia petiolata, glabriuscula, carnosula. Foliola 3—5 juga, cum impari, ovatooblonga vel oblongo-lanceolata, obtusa. Pedunculi elongati, erectiusculi, inflorescentia — capitulum densum, multiflorum oblongoovatum. Bracteae scariosae, lanceolato-lineares, calycis tubum subaequantes. Calyx campanulatus, nigrovillosus; dentes calycini inaequales, inferior tubum subaequans, superiores breviores. Corolla albida, calycem multo superans. Vexillum late ovatum, apice subemarginatum. Alae carinam superantes. Carina apice subacuta. Ovarium lanceolato-

lineare, in stipitem longum abrupte attenuatum. Legumen ignotum.

Называемъ это растеніе въ честь Михаила Ивановича Тулинова, участника нашей Памирской экспедиції.

1901. На альпийскихъ луговинахъ оть урошища Ходжа-Назаръ до перевала Кой-тезекъ 20. VII. въ цв., 14—15.000'; на лужайкахъ у ручья между озерами Сассыкъ и Яшиль, 12—13.000' 17. VII. въ цв. (О. и Б. Федченко!!).

144. *Astragalus tibetanus* Benth. *Benth* in herb. — *Bunge*, Astrag. geront. I. p. 52. II. № 345 („Mémoires de l'Academie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg“ I. vol. XI. № 16, 1868. II. vol. XV. № 1, 1869.—*A. Бунге* in А. П. Федченко Путешествіе въ Туркестанъ т. III. в. 15, стр. 242, № 66.

Указ. для Памира: *Franchet*, Plantes de Poncins p. 344, 346 (A. chadjanensis n. sp.).—*Duthie*, Alcock's Plants p. 20.—*Федченко О.*, Растенія Памира, р. 28, № 72.

1878. Памиръ-Харгоши, Каракуль 30. VII. въ цв. (*Ашурбаевъ!*); Каракуль 28. VII. въ цв., прибрежье оз. Каракуль 28. VII. въ цв., по р. Чонъ-су 6. VIII. въ цв., предгорья Каракуля, 5. VIII. въ цв., пер. Кизыльтъ-артъ (верхъ) 22. VII. въ цв. (*A. Кушакевичъ!*); Памиръ Харгоши 6. VIII. въ цв. (*A. Кушакевичъ и Ю. Ашурбаевъ!*).—1893. Ша-джанъ (*Пончикъ*).—1895. Памиръ 13—14.000' (*Олыкъ*).—1901. На сырыхъ мѣстахъ въ долинѣ р. Мургабъ, оть Памирского поста до ур. Ша-джанъ, 12.650—12.500' 12. VII. въ цв., и близъ Памирского поста, на луговинахъ, 14. VII. зацвѣтаєть, 12.600'; въ долинѣ р. Акъ-байталъ, въ урошищѣ Чичикты, 12.750' 9. VII. въ цв.; на переходѣ оть Каракуля до перевала Кизыльтъ-артъ, 13.500—14.000' 10. VIII. въ цв. (О. и Б. Федченко!!).

Геогр. распр.: Въ Туркестанѣ видъ этотъ встрѣчается еще въ Тяньшанѣ, гдѣ встрѣчаются и близкіе къ нему *A. laxmanni* и *A. adsurgens*. Извѣстенъ еще въ Шуганѣ, въ Гималаяхъ и Афганистанѣ.

145. *Astragalus* n. sp.

1895. Рѣка Вахджиръ, з. VII. въ цв. (*Вогоявленскій!*). Новидимому, новый видъ изъ секціи *Hypoglottis*, но по имѣющемуся крайне недостаточному экземпляру невозможно составить диагнозъ.

146. *Astragalus physodes* L. Species plantarum ed. I p. 760, 1753.—*Ledb.* Fl. Ross. I, 659.—*Boiss.* Fl. Or. II, 453.—*Бунге* in А. П. Федченко, Путешествіе въ Туркестанъ, т. III, в. 15, стр. 278, № 121.

1891. Перевалъ Бенкъ 20. VII плоды (*Брэзезицкий!*).

Въ гербаріи хранится листъ вѣтка съ плодами, новидимому принадлежащими къ этому виду, широко распространенному въ Туркестанѣ въ степяхъ оть Урала и до Алтая, а также въ предгорьяхъ и горахъ: Джуигарскій Алатау, Тянь-шань.

Внѣ Туркестана—въ Крыму и южной Россіи; указано было и для Кавказа, но ни у *Буассье* (Fl. orient. l. c.), ни у *Линскаго* (Флора Кавказа) не значится.

147. *Astragalus Chomutowi* B. Fedtsch. Novitiae florae turkestanicae II. („Bulletin de l'herbier Boissier“ 1899. № 11) — *Федченко Б.*, Матеріаль для флоры Памира и Алайскаго хребта р. 5, № 61.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, р. 28, № 73.

1878. Памиръ-Харгоши 6, VIII. (*A. Кушакевичъ и Ашурбаевъ!*).—1892. Раңгъ-куль (*Назаровъ!*).—1901. На песчаныхъ склонахъ на восточномъ берегу оз. Каракуль, 5. VII. 13.600', въ цв.; между оз. Каракуль и ур. Мусколъ, 13.500—14.000', 6. VII. въ цв.; въ долинѣ р. Акъ-байталъ, между переваломъ того же имени и ур. Гурумды, 14—15.000' 8. VII. въ цв., въ ур. Чичикты 9. VII. 12.800', въ цв. и съ незрѣл. пл. (О. и Б. Федченко!!).

Нѣкоторые изъ собранныхъ нами образцовъ имѣютъ незрѣлые плоды, которые даютъ возможность, до известной степени, судить о томъ, каковы будутъ и взрослые плоды. Незрѣлые плоды продолговато ланцетные, суженные въ короткую плодоножку, бѣловойлочинные, съ продольной бороздой. На спинномъ швѣ внутри замѣтна неглубокій выростъ (*sutura dorsalis anguste septifera*). Листочки бываетъ иногда не 3, а 5, наконецъ, лодочка бываетъ заостренная.

148. *Astragalus Alitschuri* B. Fedtsch.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Растенія Назарова (A. macropus).—*Федченко О.*, Растенія Памира, р. 28, № 74.

Caudices crassiusculi, suffrutescentes. Caules hornotini breviusculi, adscendententes. Stipulae parvae, triangulares. Folia petiolata, ut tota planta pilis bicuspidiatis conspersa,

foliola 3—5 juga cum impari, ovatooblonga vel lanceolata, parva. Pedunculi numerosi, arcuato-ascendentes. Capitulum subumbellatum, 3—12 florum. Bracteae triangularilanceolatae, pedicellum vix aequantes. Calyx longe tubulosus, albonigroque pubescens. Dentes calycini tubo multoties breviores. Corolla flava; vexillum alaeque lanceolatae, carinam multo superantes. Legumen basi attenuatum, longe albo villosum, sutura dorsalis pilis nigris dense vestita.

Растение это очень близко къ некоторымъ формамъ *A. macropus* Bge., но ии у одной изъ формъ того вида я не видѣлъ столь характерного плода.

1878. Яшиль-куль 24. VIII. въ пл. (*A. Kuschakewiczii*!). — 1892. Яшиль-куль (*Назаровъ*!). — 1901. Въ долинѣ р. Аличуръ, на каменистыхъ склонахъ отъ ур. Чатырь-ташъ до озера Сассыкъ, 17. VII. въ цв. и съ незр. пл., на выс. 13—13,500' (*O. и Б. Федченко*!).

149. *Astragalus Muschketowi* B. Fedtsch., Novitiae florae turkestanicae I. (Bulletin de l'herbier Boissier, 1899. № 11) — Федченко Б., Материалъ для флоры Памира и Алайского хребта р. 5, № 62.

Указ. для Памира: Федченко О., Раст. Памира, р. 29, № 75.

1878. Долина р. Чонъ-су, 6. VIII. въ цв.; р. Карасу 30. VIII. въ цв.; Каракуль 31. VII. въ цв. (*A. Kuschakewiczii*!). — 1892. Большой Каракуль (*Назаровъ*!). — 1899. Памиръ (*H. Beilmannii*!). — 1901. На каменистыхъ мѣстахъ къ сѣверу отъ озера Каракуль, 13,500', зацвѣтаетъ 4. VII., тамъ же отцвѣтшія растенія 10. VIII; отъ Каракуля до Мускола, 13,500 — 14,000', въ цв. 16. VII; на восточномъ берегу озера Каракуль, на песчаныхъ склонахъ, 13,500—14,000' въ цв. 5. VII; на каменистыхъ мѣстахъ близъ Памирскаго Поста, въ цв. 14. VII., 12,500', и между Памирскимъ постомъ и р. Карасу 5. VIII. отцв., 12,500—13,000'; въ долинѣ р. Акъ-байталъ, въ уроцищѣ Чичикты, 12,750', 9. VII. въ цв. (*O. и Б. Федченко*!). — 1901. Озеро Каракуль (*Тулиновъ*!).

Извѣстно пока лишь съ Памира.

150. *Astragalus nivalis* Kar. et Kir., Enumeratio plantarum songoricarum № 272 („Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“ XV. 1842. p. 341. — Буне in A. П. Федченко, Путешествие въ Туркестанъ т. III. в. 15, стр. 301,

№ 163. — *Hook.*, Fl. of B.. Ind. II. p. 136.— *A. Thomsonianus* Benth. in herb.

Указ. для Памира: Федченко Б., Растенія Назарова р. 5, № 59.— Федченко О., Растенія Памира, р. 29, № 76.

1878. Р. Аличуръ 20—21. VIII. въ цв.; р. Джаманталь, верховья, 17. VIII. въ цв.; предгорья Каракуля 5. VIII. въ цв.; по р. Чонъ-су 5. и 6. VIII. въ цв.; сѣверные предгорья озера Каракуль 25. VII.; Каракуль 25. VII. въ цв. (*A. Kuschakewiczii*!). — 1892. Карасу (*Назаровъ*!). — 1901. На каменистыхъ мѣстахъ къ сѣверу и востоку отъ озера Каракуль, на выс. 13,500—14,000' 4—5. VII. зацвѣтаетъ, 10. VIII. со зрѣлыми плодами; у перевала Акъ-байталъ, 8. VIII., 14—15,000'; отъ Памирскаго Поста до р. Карасу, на каменистыхъ мѣстахъ, 12,500—13,000', 15. VII. въ цв. (*O. и Б. Федченко*!).

Геогр. распир.: Въ Туркестанѣ это растеніе извѣстно еще въ альпийской области Памироалая, Тянъ-шаня и Джунгарскаго Алатау. — Въ Туркестана — во внутреннемъ Тибетѣ и въ западномъ Тибете.

151. *Astragalus djilensis* Franchet, Note sur une collection de plantes rapportées du Pamir en 1894 par Mr. E. de Poncins („Bulletin du Muséum d'histoire naturelle“ 1896. № 7, p. 344, 346).

1893. Кара-джильга (Поинцизъ). — Мнѣ совершенно неизвѣстно, что это за растеніе. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ описываетъ его Франше: „*A. djilensis* n. sp. — *A proximo A. onobrychide var. alpina* Sieb. optime differt: calyce elongato, albo, piloso, dentibus lanceolatis, obtusis, apice pilis nigris penicellatis hirtellis; foliolis minutis ovatis obtusis; ovario subsessili, longe alboviloso; carina apice macula atrovioletacea, notata“.

152. *Astragalus* sp. Franchet, Plantes Poncins p. 346.

1893. Кизыль-артъ (Поинцизъ).

Мнѣ совершенно неизвѣстно, что это за растеніе. Къ тому же, быть можетъ, оно и собрано на Алайскомъ склонѣ Кизыль-арта и тогда вовсе не относится къ Памирской флорѣ.

153. *Cicer songoricum* Steph. in DC., Mémoires sur Légumineuses, VIII. 349, t. 54. — 1825. — Ledb., Fl. Ross. I. 660. — Hook., Fl. of Br. Ind. II. p. 176.

Указ. для Памира: Федченко Б., Растенія Назарова (*C. tragacanthoides*). — Федченко О., Растенія Памира, р. 21 № 57.

1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*). — 1901. На каменистыхъ мѣстахъ у ручья Сулу-тагаркакты, между озер. Булунь-куль и ур. Ходжа-Назарь, съ цв. и незр. пл. 19. VII., 12.500—13.800' (*O. и Б. Федченко!!*).

Нѣкоторые изъ образцовъ, собранныхъ нами, замѣтно уклоняются по величинѣ прилистниковъ отъ оригиналъныхъ экземпляровъ Стефана изъ Зонгори и приближаются къ *C. atlanticum* Alef.; другіе образцы, именно растеніе собранное Назаровыемъ, подходятъ довольно близко къ *C. tragacanthoides* Jaub. et Sp., имѣющему колючія оси листьевъ. Обращаемъ на это вниманіе будущихъ изслѣдователей Памирской флоры, а пока относимъ всѣ эти формы къ одному и тому же виду, подобно тому, какъ поступаетъ и Baker въ Hooker's Flora of British India (l. c.).

Геогр. распир.: Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Памироалай. — Въ Туркестанѣ — въ Гималаихъ.

154. *Pisum sativum* L. Species plantarum ed. 1а р. 754. 1753. — *Ledb.*, Fl. Ross. I. 660. — *Boiss.*, Fl. Or. II. 622.

1891. Устье р. Карапулакъ 17. VII., посѣвы (*Бржезицкій!*). Собрano въ полосѣ посѣвовъ, а слѣдовательно уже въ предѣловъ Памирской флоры.

155. *Vicia peregrina* L. Species plantarum ed. 1а р. 737. 1753.—*Ledb.*, Fl. Ross. I. 667.—*Boiss.*, Fl. Or. II. 576.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. II. p. 178.

1891. Озеро Каракуль, съ цв. и зрыл. пл. 12. VII., до 14.000' (*Бржезицкій!*)¹⁾.

Показаніе о нахожденіи на Памирѣ *Vicia peregrina* L. является очень сомнительнымъ, тѣмъ болѣе, что оно никѣмъ не подтверждено, хотя на озерѣ Каракуль перебывало уже не мало ботаниковъ.

Въ Туркестанѣ найдена лишь въ зонѣ предгорій: Аксабадъ, Ташкентъ, Самаркандъ, Джизманское ущелье.

Въ Туркестанѣ — въ южной Европѣ, съверной Африкѣ и передней Азіи (Кавказъ, Азіатская Турція, Персія), а также въ Индіи на равнинахъ Пенджаба.

156. *Vicia Cracca* L. Species plantarum ed. 1а р. 735—1753. — *Ledb.*, Fl. Ross. I. 674. — *Boiss.*, Fl. Or. II. 585.

¹⁾ На этикетѣ гербарія указывается имъ также для р. Марданай.

Для нашей области является единственнымъ указаниемъ замѣтка на этикетѣ гербарія Бржезицкаго, будто онъ видѣлъ *V. cracca* L. также на озерѣ Каракуль. Въ гербаріи Бржезицкаго хранится *Vicia Cracca* L. лишь съ Алайскаго хребта (ущ. Агачъ-артъ 5. VII. 91, до 14.000') и показаніе для Памира представляется голословнымъ и маловѣроятнымъ.

Геогр. распир.: Въ горахъ Памироалая, Тяньшаня, Джунгарскаго Алатау и Тарбагатая; на съверѣ Туркестана встрѣчается также на равнинѣ. — Въ Туркестанѣ встрѣчается во всей Европѣ, Малой Азіи, на Кавказѣ и въ Сибири до Дауріи, въ съверномъ Китаѣ, Гань-су, Сычуанѣ, Гупехъ и Корейскомъ архипелагѣ.

157. *Lathyrus tuberosus* L. Species plantarum ed. 1а р. 732, 1753.—*Ledb.*, Fl. Ross. I. 682.—*Boiss.*, Fl. Or. II. 611.

1891. Р. Каинды, 24. VIII. 91 въ цв. до 13.000' (*Бржезицкій!*).

Можно думать, что это растеніе собрано Бржезицкимъ уже въ предѣловъ собственно Памирской флоры, такъ какъ это обычное луговое растеніе болѣе низкой горной полосы.

Геогр. распир.: Въ Туркестанѣ встрѣчается въ предгорьяхъ и нижней полосѣ горъ: Памироалай, Тяньшань, Джунгарскій Алатау, Тарбагатай, а въ съверной части Туркестана — и на равнинѣ.

Въ Туркестанѣ — средняя и южная Европа, Сибирь до Алтая и Енисея, съверная Африка, Азіатская Турція, Кавказъ.

158. *Hedysarum pumilum* (Led.) B. Fedtsch. *Федченко Б.*, Обзоръ видовъ рода *Hedysarum* № 63 („Acta Horti Petropolitani“ XIX. p. 309). 1902.—*H. polymorphum* Ledb. v. *pumilum* Ledb., Fl. alt. III. 338. — 1831. — *Ledb.*, Fl. Ross. I. p. 701.

Указ. для Памира: *Franchet*, Plantes Poncins (H. Poncini). — *Федченко Б.*, Растенія Назарова (*H. polymorphum*). — *Федченко О.*, Растенія Памира, р. 29, № 77.

1878. Харгоши 6. VIII. (А. Кушакевичъ!); Каръ-артъ 2. VIII. (Козловскій!). — 1892. Кизылъ-артъ (*Назаровъ!*). — 1893. Кизылъ-артъ (*Понцинъ!*). — 1899. Памиръ (*H. Beilmannъ!*). — 1898. Кизылъ-куль 4000 м. 17. VI. въ цв. № 629. (*Ove Paulsen!*). — 1901. На каменистыхъ и глинистыхъ склонахъ южной стороны перевала Кизылъ-артъ, въ цв. 10. VIII. 14.500—14.000' (*O. и Б. Федченко!!*).

На Памирѣ встрѣчается почти исключительно та не-высокая форма, съ малымъ числомъ листочковъ, которую Франци выдѣлилъ въ особый видъ (H. Poncinsii). Я сомнѣваюсь однако, чтобы эту форму можно было удержать даже и какъ разновидность.

Геогр. распир.: H. pumilum широко распространено въ горахъ Туркестана: Заалайскій и Алайскій хребты, весь Тяньшань, Джунгарскій Алатау, Тарбагатай, а также на Алтаѣ, въ Дауріи и Монголіи.

159. *Hedysarum cephalotes* Franchet, Plantes du Turkestan, Mission Capus, p. 264. („Annales d. Scienc. Naturelles“ XV). 1883.

Subsp. *pamiricum* B. Fedtsch.—Федченко Б., Обзоръ видовъ рода *Hedysarum* № 66 („Acta Horti Petropolitani“ XIX. p. 313). 1902.

Указ. для Памира: Franchet, Plantes Poncins (H. microphyllum). — Федченко Б., Растенія Назарова (H. cephalotes v. elatius). — Федченко О., Растенія Памира, p. 30, № 78.

1878. Карасу 31. VIII., Акъ-байталь 8. VIII., р. Аличуръ 22—25. VIII. (*A. Кушакевичъ!*). — 1892. р. Акъ-байталь (*Назаровъ!*). — 1893. Бозай-гумбезъ (*Понцинъ!*). — 1895. Яшилькуль и Ваҳджиръ, 2. VII. въ цв. (*Богоявленскій!*). — 1897. Р. Акъ-байталь, каменистая пустыня, 14. VII., ур. Карасу 18. VII., ур. Сулутагаркакты, песчано-каменистые холмы и долина, 21. VII. (*C. Коржинскій!*). — 1898. Сары-мулла, недалеко оть Памирского Поста 4000 м., № 677, 23. VI. (*Ove Paulsen!*). — 1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*). — 1901. На каменистыхъ склонахъ у перевала Акъ-Байталь и по р. Акъ-Байталь, 15.700—14.500' 8. VII и 8. VIII въ цв.; въ долинѣ р. Аличуръ, оть озера Сассыкъ-куль до ур. Чатыръ-ташъ, на каменистыхъ склонахъ, 13.100—13.540', 17. VII. въ цв., оть озера Сассыкъ до озера Яшиль, 13.100—12.500', въ цв. 18. VII., оть Памирского Поста до р. Карасу, 15. VII. въ цв., оть урошища Чатыръ-ташъ до р. Карасу, 16. VII. и 4. VIII. въ цв., 13.540—13.100' (*O. и B. Федченко!*). — 1901. Ледниковые холмы близъ озера Сассыкъ 16. и 17. VII. въ цв. (*Тулиновъ!*).

Subsp. *Schugnanicum* B. Fedtsch.—Федченко Б., Обзоръ видовъ рода *Hedysarum* № 66, („Acta Horti Petropolitani“ XIX. 314). 1902.

1898. На сухихъ мѣстахъ по Марджанаю бл. Яшилькуля, 3800 м. 16. VII.—(*Ove Paulsen!*); экземпляръ весьма не-

достаточный, такъ что опредѣленіе (въ отношеніи подвида) является сомнительнымъ, къ тому же съ достовѣрностью неизвѣстно, не собранъ ли этотъ экземпляръ виѣ предѣловъ собственнаго Памира.

Геогр. распир.: Изъ трехъ формъ этого вида одна (subsp. *sericeum*) встрѣчается на Заравшанѣ, въ Дарвазѣ и Карагеминѣ, другая (subsp. *pamiricum*) на Памирѣ и въ Заалайскомъ хребтѣ, третья (subsp. *schugnanicum*) въ Шугнанѣ.

160. *Onobrychis pulchella* Schrenk. in Fischer et Meyer, Enumeratio (1a) plantarum a Schrenk lectarum p. 87. 1842. — Ledb., Flora rossica I, 713.

1891. Перевалъ Терсъ-агаръ, 24. VIII. до 11,000' въ пл. (Бржезинскій!).

Это растеніе не относится къ флорѣ собственнаго Памира.

Геогр. распир.: Семирѣченская область — предгорья Тяньшаня и Лабассы, Фергана (!!) — Сыръ-дарынскія обл., Самаркандинская обл., Закаспійская обл., Гиссаръ, Яккабагъ, Шахрисіябъ. — Въ Туркестана лишь въ пограничномъ Афганістанѣ (Бадхызъ).

XV. Rosaceae.

161. *Alchemilla vulgaris* L.¹⁾, Linne, Sp. pl. ed. 1, p. 123. — Ledb., Fl. Ross. II, p. 28, № 1. — Boiss., Fl. Or. II, p. 729, № 1. — Hook., Fl. Br. Ind. II, p. 360, № 1.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 346.

Собрана Poncins на перевалѣ Талдыкъ въ Алайскомъ хребтѣ и изъ числа Памирскихъ растеній исключается.

Геогр. распир.: а) Въ горахъ Заравшана рѣдко; Тяньшань; Тарбагатай, Алайскій хребтъ. — б) Вся Европа, вся Россія оть арктической до южной, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Ураль, вся Сибирь, Гренландія, Лабрадоръ, Персія и на западъ до Атлантическаго океана, Кашмиръ.

162. *Sibbaldia tetrandra* Bge.—Sibbaldia tetrandra Bunge, Enum. pl. Alt. p. 17. — Dryadanthe Bungeana Ledb., Fl. Ross.

¹⁾ Poterium Sanguisorba L. собрана Бржезинскимъ! на перевалѣ Терсъ-Агаръ въ Заалайскомъ хребтѣ, на высотѣ 11,000', 24. VIII въ цв. и пл.

II, р. 33. — *Potentilla tetrandra* (Bge.) Hook., Fl. Br. Ind. II, р. 346.

Указ. для Памира: Федченко О., Раст. Памира, р. 30, № 79.

1878. Каръ-артъ (*Козловский!*). На этикеткѣ, писанной уже въ Петербургѣ, стоитъ „20. VII“, но это, очевидно, ошибка: въ этотъ день никто еще не былъ на Памирѣ, а на Каръ-артѣ, судя по другимъ растеніямъ, Козловский собирали 2. VIII. — 1901. На скалахъ, выше перевала Акъ-байталь, до 16,400' (Б. Федченко!).

Геогр. распр.: а) Альпийская область Алайского хребта (близъ ледниковъ Щуровского!! и Караказукъ!!); Тяньшань; Джунгарскій Алатау, Памиръ.—б) Западный Тибет; Алтай.

163. *Chamaerhodos sabulosa* Bge. in Ledb., Fl. alt. I, р. 431.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, р. 35, № 5.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. II, р. 360, № 1.

Указ. для Памира: Федченко О., Раст. Памира, р. 30, № 80.

1901. Собрана въ бесплодной каменистой пустынѣ близъ Памирского Поста, 12,650', 11. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—1901. Мургабъ, песчаный лугъ (*Тулиновъ!*).—Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Тяньшань.—б) Алтай, Китай, Тибет, Гималаи.

164. *Potentilla*¹⁾ *sericea* L., Sp. plant. ed. I, р. 495.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, р. 41.—*Boiss.*, Fl. Or. II, р. 709, № 20.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. II, р. 354, № 25.

Указ. для Памира: Fedtschenko, O. et B., Potentillae nonnullae, e regionibus Turkestanicis allatae, № 3, „Bull. de l' Herbier Boissier“ VII, mars 1899, p. 182.—Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 6, № 69.—Franchet, pl. Ponceins, p. 346.—Duthie, Alcock's pl., р. 21, № 31 (P. sericea L. var., близкая къ P. multisida L.).—Федченко О., Растенія Памира, р. 30, № 81.

1878. Каръ-артъ, 2. VIII цв. (*Козловский!*):—1878. Памиръ-Харгошъ, Кара-куль, на горахъ, 6. VIII; Кара-куль, на горахъ по Кчи-акъ-байтalu, 5. VIII цв.; по р. Чоинъ-су, 5. VIII цв. и 6. VIII цв. (*Кушакевичъ!*).—Кушакевичемъ собрано также довольно значительное количество экземпляровъ этого вида, изуродованныхъ наростами, произведенными насекомыми, на Карасу 17. VIII и въ уроцищѣ Найза-ташъ 20. VIII (*Кушакевичъ!*).

¹⁾ Образцы *Potentilla*, собранныхъ Б. и О. Федченко, посланы для проверки определений г. Зигфриду.

вичъ!).—1891. Акъ-ташъ, 19. VII цв. (*Бражесицкий!*)! Имя же указывается, на этикеткѣ гербарія, для р. Шиндъ, р. Бенкъ и р. Балундъ-Кіикъ, до 16,000', — 1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).—1893. Кара-джильга; Бозай-гумбезъ (Poncins: non vidi).—1895. Бозай-гумбезъ, з. VII цв. (*Богоявленский!*).—1895. Большой и Малый Памиръ, 13—14,000' (Alcock, non vidi; *Potentilla sericea* L. var. близкая къ P. multisida L.).—1899. Памиръ (*Н. Вельманъ!*).—1901. На южной сторонѣ перевала Кизылъ-артъ, на глинисто-каменистыхъ склонахъ, 14—14,600' з. VII въ цв.; на сланицевыхъ скалахъ у озера Кара-куль, 13,600', 5. VII въ цвѣту; между Карасу и Чатыръ-ташемъ, около большихъ камней (розсыпи) у подошвы горъ, 13,300—13,500', 16. VII въ цв. и 4. VIII въ цв. и плодахъ; тамъ же, на альпийскихъ лужайкахъ ниже перевала Найза-ташъ, 13,800', 16. VII въ цв.; отъ Чатыръ-таша до Сассыкъ-куля, по склонамъ горъ, 13,540—13,200', 17. VII въ цв.; на перевалѣ Койтезекъ, 15,100', 1. VIII въ цв.; на перевалѣ Акъ-байталь, 14,500—15,700', 8. VIII въ плодахъ; между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизылъ-артъ, 13,400—14,600', 10. VIII въ цвѣту; между Памирскимъ Постомъ и озеромъ Яшиль-куль въ половинѣ юля въ цвѣту (Б. и О. Федченко!!).

Замѣчена также на щебневыхъ розсыпяхъ и на альпийскихъ лужайкахъ къ ю.-в. отъ Ходжа-Назара, до 16,000', 20. VII и на глиниѣ у самого перевала Акъ-байталь 8. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).

vár. (nova) *akbaitalensis* O. Fedtsch.

Указ. для Памира: Федченко О., л. с.

1901. Выше перевала Акъ-байталь, до 16,400', на скалахъ, 8. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Альпийская область Заравшана и Алайского хребта, Шугнантъ, Тяньшань, Джунгарскій Алатау, Тарбагатай, Памиръ.—б) Кавказъ, Ураль, Байкалъ и Забайкалье, Даурія, Китай, Тибетъ, Монголія, отъ Афганистана до Армении, умбрейная и арктическая С. Америка.

165. *Potentilla polyschista* Boiss., Diagn. Ser. I, 10, р. 6.—*Boiss.*, Fl. Or. II, р. 710, № 22.—*Potentilla sericea* L. var. *polyschista* Lehm.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. II, р. 354, № 25.

Указ. для Памира: Fedtschenko O. et B., Potentillae nonnullae, №№ 4 et 5.—Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 6, № 70.

1892. Акъ-байталь (*Назаровъ!*).—Цвѣты желтые.

Геогр. распир.: а) Памиръ. Западный Тяньшань.—
б) Альпийская область съверной Персии, Тибетъ.

166. *Potentilla multifida* L. Sp. pl. ed. I, p. 496.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 42.—*Boissier*, Fl. Or. II, p. 710.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. II, p. 353, № 24.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 346.—Федченко О., Растения Памира, p. 31, № 82.

1878. Съверные предгорья озера Кара-куль 30. VII (*Кушакевичъ!*, *Ашурбаевъ!*). Памиръ—Харгошъ, Кара-куль 30. VII (*Ашурбаевъ!*). Вдоль долины Алла-байтала 6. VIII, на р. Чонъсу 6. VIII цв., Акъ-байталь 8. VIII цв., Памиръ—Аличуръ 20 и 21. VIII (*Кушакевичъ!*).—1891. Устье р. Истыкъ, 18. VII цв. (*Брэсцицкий!*), до 16.000'. Имъ же указывается, на этикеткѣ гербарія, для р. Аксу, р. Бенкъ и р. Кара-чукуръ на Памиръ. — 1893. Шаджанъ (*Poncins*; non vidi).—1901. На южномъ склонѣ перевала Кизылъ-артъ, 14600—14.000', 3. VII въ цв.; между уроцищемъ Маркану и озеромъ Кара-куль, 13.100—13.400', 4. VII въ цв.; (замѣчена также на скалахъ съ пескомъ возлѣ оз. Кара-куль, 5. VII); между озеромъ Кара-куль и Мусколомъ, 13.400—14.300', 6. VII въ цв.; на Памирскомъ Посту, 10. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 15. VII въ цв.; между Чатыръ-ташемъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540—13.100', 17. VII въ цв.; между озеромъ Яшиль-куль и Ходжа Назаромъ, 12.500—13.800', 19. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и уроцищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII въ цв.; на перевалѣ Акъ-байталь и на скалахъ выше перевала, до 16.400', 8. VIII въ цвѣту (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Перевалъ Кизылъ-артъ; р. Акъ-байталь, сырой лугъ; Сассыкъ-куль; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!*).

Самый распространенный на Памиръ видъ лапчатки. Растетъ на каменистыхъ склонахъ. Цвѣты желтые.

Геогр. распир.: а) Горы Заравшана, Алайский хребетъ, Тяньшань, Джунгарский Алатау, Каркараны, Памиръ, Шугнанъ.—б) Альпы, Лапландія, Пиренеи, Кавказъ, Сибирь (Красноярскъ, Даурія, Байкалъ), Кашмиръ, Тибетъ, Монголія, Китай, Афганистанъ, съверная Персія, умѣренная и арктическая Съверная Америка.

167. *Potentilla bifurca* L. Sp. plant. ed. I, p. 497.—*Ledb.*,

Fl. Ross. II, p. 43.—*Boiss.*, Fl. Or. II, p. 707, № 15.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. II, p. 353, № 22.

Указ. для Памира: *Fedtschenko*, O. et B., Potentillae non-nullae № 2.—Федченко Б., Мат. фл. Пам., p. 6, № 68.—*Franchet*, pl. Poncins, p. 346.—*Duthie*, Alcock's pl. p. 21, № 30.—Федченко О., Растенія Памира, p. 32, № 83.

1878. Памиръ—Харгошъ, Кара-куль, 30. VII (*Ашурбаевъ!*). — 1878. Канышъ-хатынъ, 4. VIII (*Колловей!*). — 1878. Акъ-байталь, 8. VIII цв. (*Кушакевичъ!*). — 1892. Карасу; Мургабъ; Акъ-байталь (*Назаровъ!*). — 1893. Бозай-гумбезъ; Кара-джильга (*Poncins*; non vidi). — 1895. Большой и Малый Памиръ, 13—14.000' (*Alcock*; non vidi). — 1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*). — 1901. Между Кара-кулемъ и Мусколомъ, въ щебневой пустынѣ и на луговинахъ вдоль ручья, 13.400—14.100', 6. VII въ цв. и 9. VIII; въ уроцищѣ Чичикты, 12.750', 9. VII въ цв.; по дорогѣ изъ Карасу къ Чатыръ-ташу, 13.100—14.000', 16. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). — Замѣчена также между уроцищемъ Маркану и озеромъ Кара-куль, 13.100—13.400', на склонахъ; и между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', въ щебневой пустынѣ (Б. и О. Федченко !!). — 1901. Кара-куль (*Тулиновъ!*).

Довольно обыкновенна на Памиръ, въ каменистыхъ мѣстахъ. Цвѣты желтые.

Геогр. распир.: а) Горы Заравшанской долины, Тяньшань, Алайский хребетъ, стени Джунгарин и Джунгарскій Алатау, Памиръ, Шугнанъ.—б) Средняя и южная Россія, Кавказъ и Закавказье, Алтай, Красноярскъ, Байкалъ, Даурія, Монголія, Тибетъ, Китай, съверная Индія, Персія.

168. *Potentilla anserina* L. Sp. plant. ed. I, p. 495.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 44.—*Boissier*, Fl. Or. II, p. 707, № 14.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. II, p. 350, № 14.

Указ. для Памира: Федченко О., Раст. Памира, p. 32, № 84.

1878. Акъ-байталь, 4. VIII въ цв. (*Кушакевичъ!*). — 1878. Южная часть прибрежья малаго Кара-куля, 5. VIII въ цв. (*Скорняковъ!*). — 1890. Памиръ (*H. Вельманъ!*). — 1901. На кочкарныхъ солоноватыхъ лугахъ по берегу р. Мургабъ: у Памирского Поста, 12.650', 11 VII, и между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII въ цвѣту (Б. и О. Федченко!!). На Памиръ встречается рѣдко. Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Алайский хребетъ, Тяньшань, Памир.—б) Западная Европа и европейская Россія отъ арктической до южной, Кавказъ, Закавказье, Ураль, Сибирь; Алтай, Байкалъ, Даурія, Камчатка, Тибетъ, Монголія, Китай, Кашгаръ, сѣв. Персія, Ливанъ, С. и Ю. Америка, Австралія.

169. *Potentilla recta* L. Sp. pl. ed. 1, p. 497.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 45—46, № 21.—*Boiss.*, Fl. Or. II, p. 713, № 32.

1891. Р. Аксу, 18. VII въ цв. и пл. (*Бржезицкій!*). Указанія Бржезицкаго, на той же этикеткѣ гербарія, для р. Бейкъ, р. Вахдикъ, р. Памиръ и р. Аличуръ — можетъ быть относятся къ обычнымъ на Памирѣ *P. multifida* или *P. sericea*. Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Тяньшань, степи Джунгаріи, Тарбагатай и Джунгарскій Алатау.—б) Средняя и южная Россія, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Ураль, Македонія, средняя Европа, сѣверная Персія.

170. *Potentilla dealbata* Bge. in *Ledb.*, Fl. alt. II, p. 250.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 48, № 27.

Указ. для Памира: *Fedtschenko, O. et B.*, Potentillae nonnullae № 6. — *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 6, № 71.

1878. При устьѣ Узбилия въ Чонъ-су 6. VIII въ цв.; Акъбайталъ, 9. VIII въ цв. (*Кушакевичъ!*). — 1892. Карасу (*Назаровъ!*). — 1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*). Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Алайский хребетъ, Тяньшань, степи Джунгаріи и г. Каркаралы; Памиръ.—б) Бараба.

171. *Potentilla reptans* L. Sp. plant. ed. I, p. 499.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 52, № 36.—*Boiss.*, Fl. Or. II, p. 723.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. II, p. 356, № 30.

1891. Р. Акъ-су, 18. VII въ цв., до 16.000'; р. Марджанай, до 12.000', 12. VIII въ цв. (*Бржезицкій!*). Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Заравшанская долина, Алайский хребетъ, Тяньшань, степи Джунгаріи и прикаспійскія. Памиръ.—б) Европа, сѣверная, средняя и южная Россія, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Ураль, Сибирь, сѣв. Китай, Японія, сѣв. Индія, Афганистанъ, Персія, сѣв. Африка, Абиссинія.

172. *Potentilla nivea* L. Sp. plant. ed. I, p. 499. — *Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 57, № 48.—*Boiss.*, Fl. Or. II, p. 725, № 66.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. II, p. 358, № 37.

Указ. для Памира: *Fedtschenko, O. et B.*, Potentillae nonnullae № 16, и *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 6, № 72 (*P. nivea* L. v. *incisa* Lehm.). — *Franchet*, pl. Poncins, p. 346.

1895. Яшиль-куль, цв. (*Богоявленскій!*). Цвѣты желтые. Листья у экземпляра Богоявленского сверху и снизу съроватые отъ густыхъ шелковистыхъ волосковъ.

Другая форма, съ листьями сверху зелеными, а снизу бѣловато-желтыми, собрана Кушакевичемъ!, 22 и 23. VII 1878 г. въ цвѣту, на сѣверномъ склонѣ перевала Кизыль-артъ, на р. Кизыль-артъ въ Бордабѣ, следовательно къ числу памирскихъ растеній не относится.

P. nivea L., собранная Poncins на пер. Талдыкъ въ Алайскомъ хребтѣ въ 1893 г., къ числу памирскихъ растеній также не относится.

P. nivea L. var. *incisa* Lehm. собрана Назаровымъ въ 1892 г. въ Бордабѣ (въ Заалайскомъ хребтѣ), следовательно тоже не на Памирѣ. Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Въ альпійской области горъ Заравшана, Тяньшань, г. Джилькарагай, г. Тастан въ Тарбагатай. Памиръ.—б) Умбрепная и арктическая Европа, Азія и Сѣв. Америка, Альпы, Пиренеи, альпійские луга Кавказа, Алтай, Даурія, Китай; альпійская область Гималаевъ, Западный Тибетъ.

173. *Potentilla floribunda* Pursh. Fl. bor.-am. I, p. 255.—*Potentilla fruticosa* L. var. *pumila* Hook., Fl. Br. Ind. II, p. 348.

Указ. для Памира: *Fedtschenko, O. et B.*, Potentillae nonnullae № 1.—*Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 6, № 67 (*P. floribunda*). — *Duthie*, Alcock's pl. p. 21, № 29 (*Potentilla fruticosa* L. var.). — *Федченко О.*, Раст. Памира, р. 32, № 85 (*P. floribunda*).

1878. Верховье Акъ-байтала, 7. VIII цв.; вдоль верховья р. Карасу, 30 VIII (*Кушакевичъ!*). — 1892. Аличуръ (*Назаровъ!*). — 1895. Памиръ, 13—14.000' (Alcock; non vidi). — 1901. Между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—13.800', 16. VII; тамъ же, въ плодоахъ, 4. VIII (*B. и O. Федченко!*). — 1901. Передъ Найзаташемъ, осинъ (*Тулиновъ!*). Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Памиръ.—б) Тибетъ, Каракорумъ, Сѣв. Америка.

174. *Comarum Salessovii* Bge. Ind. sem. h. dorpat. 1839.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 63, № 2. — *Potentilla Salessovii*.

Steph. Hook., Fl. Br. Ind. II, p. 348, № 9.—*Potentilla Salessoviana*, J. D. Hooker in „Bot. Mag.“, tab. 7258.

Указ. для Памира: О. Федченко, Раст. Памира, р. 32, № 86. 1878. Акъ-байталь, 9. VIII пл., 15 и 16. VIII пл.; Каасу, 29 и 31. VIII пл. (*Кушакевичъ!*).—1901. На р. Каасу, въ уро-чищѣ Джаманталь, въ заросляхъ ивняка (*Salix oxycarpa* And.), 15. VII въ цвѣту, на выс. 12.800' (О. и Б. Федченко!). Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: а) Алайский хребетъ, Тяньшань, Памиръ.—б) Алтай, Кашмиръ, западный Тибетъ.

XVI. Halorageae.

175. *Myriophyllum spicatum* L. Sp. plant. ed. I, p. 992.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 118, № 2.—*Boiss.*, Fl. Or. II, p. 755.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. II, p. 433, № 4.

1878. Рангъ-куль, 14. VIII плоды; протокъ изъ 1-го во 2-е озеро Рангъ-куль, 12. VIII, листья (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распр.: а) Долина Заравшиана. Памиръ.—б) Холмистый и умѣренный поясъ всего сѣверного полушарія, въ Россія отъ арктической до южной; Кавказъ, Ураль, Алтай, Байкалъ и Забайкалье, Греція, Критъ, Палестина, Вавилонъ, ю. Персія, Белуджистанъ, Афганистанъ, Кашмиръ, Китай, сѣверная Африка, Мысъ Доброй Надежды.

176. *Myriophyllum* sp.

Указ. для Памира: Федченко О., Раст. Памира, р. 32, № 87.

1878. Кушакевичемъ собраны въ Яшиль-куль 24. VIII очень крупные экземпляры, но безъ цв. и пл., такъ что опре-дѣление вида невозможно; онъ приводить туземное название этого растенія: кульбака.—1901. Мы также собирали это растеніе только 19. VII въ озерѣ Яшиль-куль, 12.500', гдѣ оно, вмѣстѣ съ *Ranunculus aquatilis* L. и *Myrio-phyllum* (О. и Б. Федченко).

XVII. Hippurideae.

177. *Hippuris vulgaris* L. Sp. pl. ed. 1, p. 4.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 119, № 1.—*Boiss.*, Fl. Or. II, p. 754, № 1.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. II, p. 432, № 1.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 6, № 80 (*H. vulgaris*) и № 81 (*f. minima* B. Fedtsch.).—*Duthie*, Alcock's pl. p. 22, № 38.—Федченко О., Раст. Памира, р. 33, № 88 (*f. minima*).

1878. Яшиль-куль, устье р. Аличура, 23. VII пл. (*Кушакевичъ!*).—1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*).

f. minima B. Fedtsch. l. c.

1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).—1899. Памиръ (*H. Veltmanii*!).

— 1901. На болотистомъ солоноватомъ лугу близъ Памирского Поста, въ водѣ, 12.650', 10 и 14. VII; между Сассыкъ-кулемъ и Яшиль-кулемъ, 13.100—12.500', въ озерахъ, 18. VII (О. и Б. Федченко).

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Памиръ.—б) Всѣ сѣверное полушаріе, вся Европа,—въ южной рѣже,—всѣ Россія отъ арктической до южной, Кавказъ, вся Сибирь, Камчатка, арктическая Америка, Магеллановъ проливъ, Тибетъ, Афганистанъ, Персія, Монголія, Китай.

XVIII. Ceratophylleae.

178. *Ceratophyllum demersum* L. Sp. pl. ed. 1, p. 992.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 123, № 2.—*Boiss.*, Fl. Or. IV, p. 1202 (Addenda).

Указ. для Памира: Федченко О., Раст. Памира, р. 33, № 89.

1901. Въ озерѣ Яшиль-куль, 12.500', у берега; 19. VII; образуетъ заросли, вмѣстѣ съ *Ranunculus aquatilis* L. и *Myriophyllum* (О. и Б. Федченко).

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Памиръ.—б) Всѣ Европа, средняя и южная Россія, Кавказъ, Ураль, Алтай, Байкалъ, сѣверная Африка, Египетъ, Афганистанъ, Китай.

XIX. Tamariiscineae.

179. *Myricaria germanica* (L.) Desv. in Annal. sc. natur. IV, p. 349.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 131, № 3.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. I, p. 250, № 1. — *Tamarix germanica* L. Sp. pl. ed. I, p. 271.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 20, № 20.

1895. На р. Аксу, 13—14.000' (Alcock; non vidi). Цвѣты розовые.

Геогр. распр.: а) Маргантъ.—б) Отъ западной Европы до Гималаевъ и Сибири на востокъ; южная Россія, Крымъ, Кавказъ.

var. *alopecuroides* (Schrenk). — *Myricaria alopecuroides* Schrenk, Enum. pl. nov. p. 65.—*Myricaria alopecuroides* Schrenk Ledb., Fl. Ross. II, p. 131, № 2.—Федченко Б., Мат. фл. Пам., p. 5, № 42.

1878. Р. Аксу, 17. VIII пл.; Памирь-Сересь: р. Джаманталь, 17. VIII пл. (*Кушакевичъ!*).—1892. Карасу; Яшиль-куль (*Назаровъ!*).—1899. Памирь (*Н. Вельманъ!*). Цвѣты розовые.

Геогр. распр.: долина Заравшана, Шугнантъ, Тяньшань, по берегу р. Коксу въ Джунгарской степи, на Алай и въ Алайскомъ хребтѣ и на Памирѣ.

var. *squamosa* Maxim.—*Myricaria germanica* Desv. var. *squamosa* Maximiowicz, Fl. Tangutica, № 172.—Maxim., Fl. Mongol., № 272.—*Myricaria davurica* Ehrenberg in „Linnaea“ II, p. 252.—*Myricaria davurica* Ehrenb. Ledb., Fl. Ross. II, p. 132, № 5.

Указ. для Памира: Федченко О., Раст. Памира, № 90.

1901. На Памирскомъ Посту, 11. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12. VII плоды; на берегу р. Карасу, 12.800', 15. VII; между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—13.600', по рѣчкѣ Карасу, 16. VII плоды (Б. и О. Федченко!).—1901. Мургабъ, песчаный лугъ (*Тулиновъ!*).

Растетъ по берегамъ и сухимъ русламъ рѣкъ и на островахъ. Цвѣты розовые.

Геогр. распр.: а) Искандеръ-куль, Ягиобъ, Тяньшань, Памирь.—б) Алтай, Даурія, Байкалъ и Забайкалье, Монголія, Персія, Афганістанъ.

XX. Crassulaceae.

180. *Umbilicus leucanthus* Ledb.—*Cotyledon leucantha* Ledb. Fl. alt. II p. 198 et Ic. pl. Fl. Ross. IV t. 395. *Umbilicus leucanthus* Ledb., Fl. Ross. II p. 173 № 4.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам. р. 6 № 76. 1892. Яшиль-Куль (*Назаровъ!*).

Геогр. распр.: а) Джунгарская степь, Тарбагатай, между Майдибаевъ и Орскомъ, Тяньшань, Памирь.—б) Алтай, Тибетъ, Китай, Сѣв. Индія.

181. *Umbilicus Semenovii* Rgl. et Herd., Enumeratio plantarum in regionibus cis et transiliensibus a cl. Semenovio anno 1857 lectarum, p. 109 № 406.

1878. Каръ-артъ, 2. VIII плоды (*Козловскій!*).—1891. Озеро Чакмантынъ-куль, 2. VIII въ цв. (*Бржезицкій!*). Цвѣты желтоватые.

Геогр. распр. а) Алайский хребеть. Памирь.—б) Гиндукушъ.

182. *Umbilicus alpestris* Kar. et Kir., Enum. pl. Songor. 1841. („Bull. Soc. Nat. Mosc.“ XV (1842), 354).

1878. Алла Баїталъ, 4. VIII цв. (*Кушакевичъ!*).—1891. Р. Аксу, 18. VII цв. (*Бржезицкій!*). Цвѣты розовые.

Геогр. распр.: Джунгарский Алатау, Тяньшань. Памирь.

183. *Umbilicus platyphyllus* Schrenk. Fisch. et Mey., Enum. pl. novar. p. 71.—Ledb., Fl. Ross. II p. 175 № 11.—Boiss., Fl. Or. II p. 773 № 16.

1878. Близъ Карапуля, 5. VIII пл. (*Кушакевичъ!*). Геогр. распр. а) Предгорья Джунгарского Алатау; Тяньшань. Памирь.—б) Сѣверо-восточная Персія.

184. *Sedum gelidum* (Schrenk) Ledb.
Rhodiola gelida Schrenk, in Fisch. et Mey. Enum. pl. nov. p. 67.—*Sedum gelidum* Ledb., Fl. Ross. II p. 177 № 4.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам. р. 6 № 77.—Федченко О., Раст. Памира, р. 33, № 91.

1878. Каръ-артъ, 2. VIII пл.; Кашиль-хатынь 4. VIII цв. (*Козловскій!*).—1888. На перевалѣ Мингъ-теке, въ плодахъ (*Громбечевскій!*).—1891.—Указывается Бржезицкимъ (1891 г.), на этикеткѣ гербарія, для перевала Найза-ташъ (Шинда) и пер. Бенкъ на Памирѣ, но собранъ имъ на Гиндукушъ (пер. Іонова).—1892. Верховья Аличура (*Назаровъ!*).—1901. Между Ходжа-Назаромъ и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII. въ цвѣту и молодыхъ плодахъ и на перевалѣ Кой-тезекъ, 15.100', 1. VIII. въ цвѣту, на каменистыхъ склонахъ горъ; къ юго-востоку отъ Ходжа-Назара, на альпийскихъ лужайкахъ до 16.000', 20. VII (Б. и О. Федченко!).

¹⁾ Имъ же указывается, на этикеткѣ гербарія, для р. Бенкъ, р. Карапукуръ, р. Вахджеиръ, р. Памиръ, р. Аличуръ, р. Балыидъ-кінкъ и р. Кокуй-бель, до 16.000'.

Геогр. распир. а) Алайский хребетъ, Тянь-шань (Терскай-Алатау, Кунгей-Алатау) горы Джилькарагай въ Джунгарии, Памиръ.—б) Гиндукушъ (перевалъ Іонова).

185. *Sedum Rhodiola DC.*, Prodrom. III р. 401.—*Ledb.*, Fl. Ross. II р. 179 № 7.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. II р. 417 № 1.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. р. 22 № 36 (*Sedum Rhodiola DC.*?).

1895. Бозай Гумбезъ, з. VII цв. (*Богоявленскій!*).—1895. Памиръ, 13—14.000' (Alcock, non vidi).

var. *heterodontum* (H. f. et Th.).—*Sedum heterodontum* H. f. et Th. in „Journ. of Linn. Soc. II. 95.—*S. heterodontum* H. f. et Th., *Hooker*, Fl. Br. Ind. II р. 417 № 2.

Указ. для Памира: *Franchet*, Pl. Ponceins p. 346 (*S. heterodonton* H. et T.).—Федченко О. Раст. Памира, р. 33, № 92.

1878. Аличуръ, 20—21. VII, пл.; Карасу, отцвѣтающій, 30. VIII (*Кушакевичъ!*).—1888. На перевалъ Мингъ-Теке (*Громбовскій!*).—1901. Между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.300', 16. VII въ плодахъ (Б. и О. Федченко!).—1901. На осыпяхъ передъ Найза-ташемъ (*Тулиновъ!*).

Ponceins (*Franchet*, l. c.) собралъ его на перевалъ Тайдыкъ, то есть въ Алайскомъ хребтѣ, а не на Памиръ.—Цвѣты желтые.

Геогр. распир. а) Алайский хребетъ, Тянь-шань. Заравшанъ.—б) Арктическая Россія (Кола, Лапландія, земля Самоѣдовъ), Ураль (Пермская и Оренбургская губ.) зап. Гималаи, Кашмиръ, Арктическая и альпійская области Америки, Европы и Азіи.

186. *Sedum crenulatum* Hook. f. et Th. in „Journ. of Linn. Soc.“ II. 96.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. II р. 417 № 3.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. р. 22 № 37.

1895. Памиръ до 14.000' (Alcock, non vidi).

Геогр. распир. Алайской область Гималаевъ.

XXI. Saxifragaceae.

187. *Saxifraga flagellaris* Willd.—*Sternb.*, Revis. Sax. p. 25, t. 6.—*Ledb.*, Fl. Ross. II 209 № 14.—*Boiss.*, Fl. or. II р. 809 № 26.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. р. 22 № 35.

1895. Памиръ около 15.000' (Alcock, non vidi).

Геогр. распир. а) Джунгарскій Алатау, Алайский хребетъ (Караказукъ, морены, 12,200'); Тянь-шань, Памиръ.—б) Шпицбергенъ, Арктическая Россія (Новая Земля), альпійская область Кавказа и Сибири, земля Чукчей, Тибетъ, Гималаи, арктическая Америка и Скалистая горы.

188. *Saxifraga Hirculus* L. Sp. plant. ed. I р. 402.—*Ledb.*, Fl. Ross. II р. 210.—*Boissier*, Fl. Or. II р. 808 № 25.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. II р. 392 № 11.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам. р. 6 № 74.—*Duthie*, Alcock's pl., р. 21 № 34.—Федченко О., Растения Памира, № 93.

1878. Въ урошищѣ Кокъ-сай, на сазахъ (болотахъ), 22. VII въ цв.; перевалъ Кизыль-артъ 24. VII въ цв.; въ урошищѣ Уй-булакъ, 24. VII цв.; верховье Акъ-байтала, на сазахъ, 9. VIII въ цв.; Яниль-куль 24. VIII. цв.; Сассыкъ-куль 26. VIII цв.; Карабу 29. VIII цв. (*Кушакевичъ!*).—1878. Озеро Булунъ-куль, 26. VIII цв. (*Кушакевичъ и Ашурбаевъ!*).—1878. Канышъ-хатынъ, 4. VIII цв. (*Козловскій!*).—1891. На перевалъ Бенкъ 20 (въ мочежинахъ) и 21. VII въ цвѣту (*Бржезицкий!*).—1892. Акъ-Байтала (*Назаровъ!*).—1895. Акъ-Байтала, 24. VII цв.; Кокъ-белесь, въ цв. (*Богоявленскій!*).—1895. Очень обыкновенно на р. Аксу и ее притокахъ, почти до 15.000' (Alcock; non vidi).—1901. Перевалъ Кизыль-артъ; Чатыръ-ташъ (*Тулиновъ!*)—1901. Между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.540—13.100', 17. VII въ цв.; у озера Сассыкъ-куль, 13.100', на кочкихъ солоноватаго болота, 17. VII цв.; между Яниль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, 12.500—13.800', 19. VII въ цв.; въ Ходжа-Назарѣ, у рѣчки, 13.800', 19. VII въ цв.; между Ходжа-Назаромъ и Кой-тезекомъ, 13.800—15.100', 20. VII въ цв.; на Акъ-байтала, 8. V III въ цв. и между озеромъ Карапуль и переваломъ Кизыль-артъ, 13.400—14.600', 10. VIII въ цв. (О. и Б. Федченко).

Растетъ у самой воды по берегамъ рѣчекъ и на болотистыхъ, солоноватыхъ лужайкахъ. Цвѣты золотисто-желтые.

Геогр. распир.: а) Алайский хребетъ, Тяньшань, Джунгарскій Алатау.—б) Арктическая и альпійская область Европы, Азіи и Сѣверной Америки, вся Россія, альпійская область

⁴⁾ Имя же указывается, на этикетѣ гербарія, для р. Аксу, р. Аличуръ и р. Ваханъ-дары.

Кавказа, вся Сибирь, Германия, Скандинавия, Британия, Гималаи, Тибет, Китай, Монголия.

189. *Saxifraga cernua* L. Sp. plant. ed. I, p. 403.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 219. — *Hook.*, Fl. Br. Ind. II, p. 390, № 3.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 21, № 33. — *Федченко О.*, Растения Памира, № 94.

1895. Памиръ, 13—14,000' (Alcock; non vidi). — 1901. Къ юго-востоку отъ Ходжа-Назара, на альпийскихъ лужайкахъ, до 16,000', 20. VII въ цв. (Б. Федченко!!).

Геогр. расп.: а) Джунгарский Алатау, Памиръ.—б) Широко распространена въ умѣренной, альпийской и арктической областяхъ Европы, Азии и Сѣв. Америки; аркт. и сѣв. Россія, аркт. и вост. Сибирь, Байкалъ, Даурія, Камчатка, Китай, зап. Гималаи и зап. Тибетъ.

XXII. Umbelliferae.

190. *Eryngium macrocalyx* Schrenk Fisch. et Mey., Enum. pl. nov. p. 60.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 238, № 5.

1891. Р. Мургабъ, 12. VIII (Бржезинчикъ); имъ же указывается, на этикеткѣ гербарія, для р. Марджанай).

Геогр. расп.: Горы Заравшана (Искандеръ-куль), Тяньшань, степи Джунгаріи, Памиръ.

191. *Carum* sp.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 346.

Ни одного вида *Carum* не известно для Памира, *Carum* sp., приводимый Франше (l. c.), собранъ Poncins на перевалъ Талдыкъ, т. е. въ Алайскомъ хребтѣ, а не на Памирѣ.

192. *Chamaesciadium albiflorum* Kar. et Kir., Enum. pl. Songor. № 363.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 253, № 2.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 346.

1893. Кизылъ-артъ (Poncins; non vidi).

Геогр. расп.: Тяньшань, Джунгарский Алатау.

193. *Bupleurum kokanicum* Rgl. et Schmalh. Путешествие въ Туркестанъ А. П. Федченко, вып. 18, р. 29, № 72.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Растения Памира, № 95.

1901. Найденъ только одинъ экземпляръ, между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13,100—14,300', 16. VII въ цвету (Б. и О. Федченко!!). Цвѣты желтые.

Геогр. расп.: Алайский хребетъ (переваль Джинитъкъ), Памиръ.

194. *Libanotis condensata* Fisch. in Turcz. Cat. Baikal. № 521.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 280, № 5.

f. *gymnocarpa* B. Fedtschenko, fructibus glabris. — *Федченко Б.*, Мат. для флоры Шугиана, р. 26, № 120.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 6, № 83 (*L. condensata*).

1878. По рѣкѣ Аличуръ, недалеко отъ впаденія въ Яшиль-куль, 22. VIII пл.; у озера Яшиль-куль, 24. VIII пл. (Кушакевичъ!). — 1892. Яшиль-куль (Назаровъ!).

Мѣстные названія: созъ-кокоты; иркекъ-сабза (Кушакевичъ; на ярлыкѣ).

Геогр. расп.: а) Алайский хребетъ (переваль Каувъкъ), Тяньшань, горы Джиль-карагай и Джабыкъ въ Джунгаріи, Памиръ.—б) Алтай, Байкалъ, Даурія.

195. *Neogaya simplex* (L.) Meisn. Gen. p. 144. — Comment. p. 104.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 287. — *Ligusticum simplex* All. Fl. Pedem. II, 15, t. 71 f. 2. — *Laserpitium simplex* L. Mantiss. I. 56.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 346 (*Gaya* sp.). — *Федченко О.*, Растения Памира, № 96 (*Neogaya simplex*).

1893. Бозай-гумбезъ (Poncins; non vidi). — 1901. Между Ходжа-Назаромъ и Сассыкъ-кулемъ, 13,800—13,400', 2. VIII въ пл., на глинистыхъ склонахъ, вмѣстѣ съ *Delphinium dasyanthum* Kar. et Kir.; на глинисто-каменистыхъ склонахъ, на южной сторонѣ перевала Кизылъ-артъ, 14,000—14,600', 10. VIII въ плодахъ и 3. VII (Б. и О. Федченко!!). Цвѣты блѣдные.

Геогр. расп.: а) Алайский хребетъ, Тяньшань, гора Джабыкъ въ Джунгаріи, Памиръ.—б) Альпіи Европы и Арктическая Россія.

196. *Selinum papyraceum* C. B. Clarke¹⁾ in Hooker, Fl. Br. Ind. II, p. 701, № 5.

13. VIII Памиръ, озеро Булунъ-куль, 3800 м., пл. (Paulsen!; опр. Липскій).

Геогр. расп.: а) Памиръ.—б) Отъ Балтистана до Кашмира и Сиккима, часто.

¹⁾ Въ укрѣплениі Серезъ, вигъ предѣловъ Памира, но близъ самой границы его (западной), на выс. до 12,000', собрана Бржезинчикъ!!

14. VIII 1891 г. *Pastinaca sativa* L.

197. *Zozimia tragoides* Boiss. in „Ann. Sc. Natur.“ 1844, p. 340.—*Boiss.*, Fl. or. II, p. 1037, № 3.

var. *bipinnata* Lipsky.—= *Heracleum Thomsoni* C. B. Clarke. *Hook.*, Fl. Br. Ind. II, p. 711.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Растения Памира, № 97. 1898. Въ бесплодныхъ горахъ у озера Яшиль-куль, 20 VII, на выс. 3800 м. (*Paulsen!*). — 1901. Между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, 12.500—13.800', 19. VII въ цв. и мол. плодахъ *B.* и *O. Федченко!!*). Растетъ на скалахъ. Цвѣты бѣлые.

Геогр. распир.: а) Памиръ, Шугнанъ.—б) Персія, Кашмиръ.

198. *Daucus Carota* L. Sp. pl. ed. 1 p. 242. — *Ledb.*, Fl. Ross. II p. 338.—*Boiss.*, Fl. Or. II p. 1076.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. II p. 718.

Видъ этотъ, широко распространенный и ветрѣчающійся, между прочимъ, въ сосѣднемъ Шугнанѣ, указывается Бржезицкимъ, на этикеткѣ гербарія, для озера Яшиль-куль, р. Марджанай и р. Мургабъ, но собранъ имъ линіи вѣроятно собственнаго Памира (на р. Борогиль, 29. VII. 1891 въ цв.); интересно провѣрить, подтверждается ли это указание, или Бржезицкій смѣшиваетъ этотъ видъ съ *Libanotis condensata* или *Zozimia tragoides*, образцы которыхъ мы имѣемъ съ Памира.

Геогр. распир.: а) Весь Туркестанъ.—б) Вся западная Европа, средняя и южная евр. Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Сибирь, Камчатка, Китай, Кашмиръ и западные Гималаи, Афганистанъ, євр. Африка, Абиссинія, Мадера и Канарскіе острова.

199. *Hymenolaena Lindleyana* Klotzsch. Reis. Pr. Waldem. Bot. 150, t. 49. — *Pleurospermum stellatum* Benth. var. *Lindleyana*, *Hooker*, Fl. Br. Ind. II, p. 705, № 10.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 6, № 82 (*P. stellatum* Benth. v. *Lindleyanum*).—*Федченко О.*, Растенія Памира, № 98.

1892. Акъ-байталъ (*Назаровъ!*). — 1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*). — 1901. Между Памирскимъ Постомъ и урочищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII пл.; на Акъ-байталъ и выше перевала Акъ-байталъ, до 16.400', 8. VIII въ цв. (*B.* и *O. Федченко!!*). Цвѣты бѣлые.

Геогр. распир.: а) Тяньшань, Памиръ, Шугнанъ.—б) Западные Гималаи, Каракорумъ, Кашмиръ.

200. *Trachydium Roylei* Lindl.¹⁾ in *Royle*, III. 232.—*Hook.*, Fl. br. Ind. II, p. 672, № 2.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 22, № 39.

1895. По болотистымъ берегамъ рѣкъ, 14,000—15,000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распир.: а) Памиръ.—б) Западный Тибетъ, с.-з. Гималаи, Кашмиръ.

201. *Trachydium*.

1898. На сырыхъ горныхъ склонахъ близъ озера Яшиль-куль, 4000 м., 8. VIII цв. и мол. пл. (*Paulsen!* № 1074; опр. Липский).

XXIII. Rubiaceae.

202. *Galium verum* L. Sp. pl. ed. 1, p. 107. — *Ledb.*, Fl. Ross. II p. 414, № 26.—*Boiss.*, Fl. or. III, p. 62.—*Hook.*, Fl. br. Ind. III, p. 208, № 15.

1891. Р. Найза-тапъ, 20. VII, до 13,000' (Бржезицкий!).—Въ Памирскомъ гербаріи И. Вельманъ также есть это растение, но мнѣ кажется болѣе вѣроятнымъ, что оно взято на сѣверномъ склонѣ Кизыль-арта, въ Заалайскомъ хребтѣ, гдѣ и мы его находили въ 1901 г.

Геогр. распир.: а) Горы Заравиана, Алайский и Заалайский хребты, Тяньшань, Джунгарскій Алатау.—б) Вся Россія, Крымъ, Кавказъ, Сибирь, Европа, с. Африка, с. и з. Азія, Китай, Японія, зап. Гималаи, Кашмиръ.

XXIV. Dipsaceae.

203. *Cephalaria syriaca* Schrad. Ind. sem. h. götting. a. 1814. — *Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 448, № 4. — *Boiss.*, Fl. Or. III, p. 120, № 7.

1891. Р. Вахджиръ, до 16.000' (Бржезицкий!).

Геогр. распир.: а) Между Орскомъ и Ташкентомъ, въ

¹⁾ *Coriandrum sativum* L. собранъ Громчевскимъ въ Караконѣ (вост. Туркестанъ), 25. VI 1890 г. въ цв. и мол. пл. Мы собирали это растеніе въ Шугнанѣ, гдѣ оно разводится; но на Памире оно не найдено.

долинъ Заравшана.—б) Южная Россія, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Кипръ, Сирія, Персія, Белуджистанъ, Афганистанъ, южная Франція, южная Испанія, сѣв. Африка.

204. Scabiosa caucasica M. B., Fl. taur.-cauc. I, p. 98; III, p. 192.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 452, № 1.—*Boiss.*, Fl. or. III, p. 136, № 13.

var. *songorica* (Schrenk).—*Scabiosa songorica* Schrenk, *Fisch. et Mey.*, Enum. pl. nov. I, p. 55.—*Scabiosa songorica* Schrenk, *Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 453, № 2.

Указ. для Памира: *Б. Федченко*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 89.

1878. Памирь-Харгоши: близъ Кара-куля, 6. VIII цв.; Акъ-байталъ, 7. VIII цв. (*Кушакевичъ!*).

Есть еще въ герб. Импер. Слѣб. Бот. Сада экземплярь этого растенія, съ надписью: Аксу, 1878, VII. Кушакевичъ; но почеркъ не его, и на Памирскомъ Аксу Кушакевичъ въ іюль 1878 г. не былъ.

Назаровыи этотъ видъ собрали въ 1892 г. въ Бордабѣ, съдовательно въ Заалайскомъ хребтѣ, а не на Памирѣ. Въ Бордабѣ и мы его собирали въ 1901 г.; оттуда же, вѣроятно, и экземплярь въ гербаріи 1899 г. И. Вельманъ. Цвѣты липловые.

Геогр. расп. вида: а) Джунгарскій Алатау.—б) Весь Кавказъ.

Геогр. расп. var. *songorica*: Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Заалайскій хребетъ, Памирь.

XXV. Compositae.

205. Aster alpinus L. Sp. plant. ed. I, p. 872.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 472, № 2.—*Boiss.*, Fl. Or. III, p. 157, № 1.

1878. Акъ-байталъ, 7. VIII, въ цв. (*Кушакевичъ!*). Цвѣты синие.

Геогр. расп.: а) Тяньшань, Джунгарскій Алатау, Памирь.—б) Средняя и восточная Россія, Кавказъ и Закавказье, Арmenія, Уралъ, Сибирь—Байкаль, Забайкалье, вост. Сибирь, Камчатка; Македонія, Сербія, Дунай, Италия, Франція, горы Испаніи, Персія, Китай, Маньчжурия, арктическая Америка и Скалистыя горы. Въ Гималаяхъ, сколько известно, не встрѣчается.

206. Aster flaccidus Bge.¹⁾ Enum. alt. p. 77 (1835).—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 473 № 3.—*Aster heterochaeta* Benth. in Gen. Plant. II, p. 272.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. III, p. 250, № 5.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 92.—*Franchet*, pl. Poncins p. 347.—*Федченко О.*, Раств. Памира, № 99.—*Duthie*, Alcock's pl. p. 22, № 40. (*A. heterochaeta*).

1878. Каръ-артъ, 2. VIII. цв. (*Козловскій!*).—1892. Акъ-байталъ (*Назаровъ!*).—1893. Карап-джильга, Кизиль-артъ (Poncins, non vidi).—1895. Р. Акъ-байталъ, въ цвѣту; Вахджири, 1. VII. цв. (*Богоявленскій!*).—1895. Во множествѣ у тающаго снѣга, на высотѣ около 15.000' (Alcock; non vidi).—1901. Между уроцищемъ Ходжа-Назарь и переваломъ Кой-тезекъ, на сырыхъ лужайкахъ и на берегу рѣчки, у самой воды, 14—14.500', 20. VII. въ цв.; выше перевала Кой-тезекъ, на алыпийскихъ лужайкахъ, до 16.000', 20. VII. въ цв.; между Мусколомъ и Акъ-байталомъ, 14.100—14.400', 7. VII. въ цв.; на перевалѣ Акъ-байталъ, 14—15.700', 8. VIII. въ цв.; близъ вершины перевала Кизыль-артъ, 14.600', на южномъ (памирскомъ) склонѣ, 10. VIII. въ цв., на песчаной почвѣ, близъ дороги. (Замѣчено также на перевалѣ Кизыль-артъ, на глиннисто-каменистыхъ склонахъ, 3. VII.). (*Б. и О. Федченко!!*). Цвѣты синие.

Геогр. расп. а) Алайскій хребетъ: ледникъ Кара-казукъ, 12.200', перевалъ Кавукъ, 13.300' (*О. Федченко!!*, 1871 г.); Тяньшань, Джунгарскій Алатау, Памирь.—б) Алтай, Байкаль, Даурія, Алпы Гималаевъ, Тибетъ, Алтай.

207. Erigeron turkestanicus (Rgl. et Schmalh.) O. Fedtsch. nom. nov. —*Diplopappus turkestanicus* Rgl. et Schmalh., Descr. plant. nov. fasc. VI („Acta Horti Petrop.“ V, p. 615, № 54).

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 22, № 41 (*Aster* sp., near *A. turkestanicus* Franchet = *Diplopappus turkestanicus* Rgl. et Schmalh.).—Винклеръ въ *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 94, (*Diplopappus turkestanicus*, ex parte).

¹⁾ *Aster flaccidus* Bge. собранъ Бржезицкимъ на перевалѣ Іонова (Гиндукушъ) 26. VII. 1891 г. въ цв., но указывается имъ же, что этикеткѣ гербарія, для пер. Вахджири, пер. Марджанай, пер. Тахта-гурумъ и пер. Каинды на Памирѣ.

Calimeris Altaica Nees. указывается Бржезицкимъ, на этикеткѣ герб., для р. Ваханъ-дарын (часть ея относится къ Памиру) и р. Сукеураватъ (не Памирь), но экземплярь, имъ собранный, взять на перевалѣ Талыкъ, въ Алайскомъ хребтѣ.

1878. Аксу VII (*Кушакевичъ!*, въ герб. Имп. Бот. Сада; но это, вѣроятно, ошибка и слѣдуетъ VIII).—1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).—1895. Памиръ, 13.000—14.000' (Alcock; non vidi; Aster sp., near *A. turkestanicus* Franchet).

Геогр. распр.: Горы Заравшана, Алайский хребетъ, Тяньшань.

208. *Erigeron andryaloides* (DC.) Benth. *Conyza andryaloides* DC., Prodr. V. 377.—*Erigeron andryaloides* Benth. in herb. Kew.—*E. andryaloides* Hooker, Fl. of Br. Ind. III, p. 255, № 3.—*Erigeron Olgae* Rgl et Schmalh. var. *pamirica* C. Winkler in sched.—*Aster (Diplopappus) Poncinsii* Franchet, Note sur une coll. d. pl. rapp. du Pamir en 1894 par Poncins, p. 345. („Bull. du Mus. d'hist. Nat.“ 1896, № 7).

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl., p. 22, № 43.—Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 7, № 94 (*D. turkestanicus*, ex parte).—Федченко О., Растенія Памира, № 100.

1878. По рѣчкѣ, 5. VIII. ¹⁾ (*Кушакевичъ!*).

1891. Устье р. Кара-джилыца, 20. VII. цв. (*Бржезицкій!*). Растеніе, собранное Бржезицкимъ, очень похоже на *Erigeron andryaloides* C. B. Clarke (экз. Aitchison'a изъ Афганистана, въ герб. Сиб. Бот. Сада), но хохолокъ съмяинки двойной (щетинки наружного ряда короткія, внутренняго — длинины), что встречается и у Гималайскихъ экземпляровъ, собранныхъ Шлагинтвейтомъ, хотя у *E. andryaloides*, по Гукеру, этихъ щетинокъ должны быть только одинъ рядъ. Язычковые цветы свѣтлые, повидимому блѣдно-желтые.—1891. Памиръ Тагдумбашъ (Young husband; non vidi).—1892. Аличуръ; Акъ-байталъ (*Назаровъ!*).—1893. Бозай-Гумбезъ (Poncins; non vidi). По описанію Франши (л. с.) язычковые цветы у растенія Poncins блѣдно-желтые.—1895. На сѣверномъ склонѣ горы близъ перевала Урта-бель (Alcock; non vidi).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. Между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 15. VII. въ цв.; между Чатыръташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.540—13.100', 17. VII. въ цв.; въ щебневой пустынѣ между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, 12.500—13.800', и въ ущельи, близъ рѣчки, между камнями, въ Ходжа-Назарѣ, 13.800', 19. VII. въ цвѣту; близъ

¹⁾ 5. VIII. Кушакевичъ собиралъ въ окрестностяхъ озера Каракуль.

перевала Кой-тезекъ, 14.500—15.000', 1. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!).

Замѣчено также на щебневыхъ розсыпяхъ близъ перевала Кой-тезекъ, 20. VII. (Б. и О. Федченко!!).

Довольно обыкновенно на Памирѣ. Отъ *E. turkestanicus* m. (*D. turkestanicus* Rgl. et Schmalh.) отличается главнымъ образомъ болѣе сильнымъ опушениемъ. Наше растеніе совершенно подходитъ къ описанію Franchet; только цветы у нашего золотисто-желтые (что сохранилось даже при сушки), а не блѣдно-желтые, какъ пишетъ Franchet ¹⁾.

Растетъ въ сухихъ каменистыхъ кѣстахъ.

Геогр. распр.: а) Памиръ, Щугнай.—б) Западные Гималаи, западный Тибетъ, Гилгитъ, Афганистанъ, Читраль.

209. *Erigeron pulchellus* (Willd.) DC. Prodr. V. p. 287.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 486.—*Aster pulchellus* Willd., Sp. III, p. 2019.—*Erigeron pulchellus* (Willd.) Boiss., Fl. Or. III, p. 164.—*Erigeron alpinus* L. var. *pulchellus* (DC.) Trautv.

Указ. для Памира: C. Winkler in Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 7, № 92 (*Aster alpinus*).—Duthie, Alcock's pl., p. 22, № 42 (*Erigeron alpinus* L. var. *pulchellus* Trautv.).

1891. Памиръ Тагдумбашъ (Young husband; non vidi).—1892. Верховья Аличура (*Назаровъ!*).—1895. Памиръ, 13—14.000' (Alcock; non vidi).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Памиръ.—б) Кавказъ, Армения, Персія, земля Чукчей, островъ Уналашка.

210. *Erigeron uniflorus* L. ²⁾. Sp. pl. ed. 1, p. 864.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 490, № 11.—*Boiss.*, Fl. Or. III, p. 165, № 5.

Указ. для Памира: Федченко О., Растенія Памира, № 101. 1901. На перевалѣ Кой-тезекъ, 15.100', 1. VIII. въ цвѣту (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Памироалай 10.730—12.500': перевалъ Джиптыкъ; ледникъ Щуровскаго; ледникъ Караказукъ въ Алайскомъ хребтѣ (О. Федченко!! 1870 и 1871 гг.). Памиръ; Тяньшань; Джунгарскій Алатау, Тарбагатай, горы Карагату.—

¹⁾ О. А. Федченко сравнивалъ въ Парижѣ наше растеніе съ типическимъ экземпляромъ, описаннымъ Франши, и не нашелъ между ними разницы.

²⁾ *Erigeron* *aceg* L. var. *elongata* (Led.) собранный Бржезицкимъ въ ущельи Агачъ-артъ въ Алайскомъ хребтѣ, 5. VII. 1891 г., указывается имъ также, на этикеткѣ гербарія, для р. Каницы.

б) Альпийская область Скандинавии, Пиренеи, Альпы, горы Венгрии и Трансильвании, арктическая Россия, Кавказ и Закавказье (г. Арарат), Ливан, Персия, Тибет, Исландия, Байкал, земля Чукчей и сев. Америка.

211. *Inula rhizocephala* Schrenk. *Fisch. et Mey.*, Enum. pl. nov. I, p. 51.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 507, № 17.—*Boiss.*, Fl. Or. III, p. 196, № 28.

1878. Алла-байталъ, 4. VIII. въ цв. (*Анурбасовъ!*).

Геогр. распир.: а) Тарбагатай, горы Заравшиана, Алайский хребет, Шугнань, Тяньшань, Памир.—б) Персия, горы Афганистана.

212. *Achillea trichophylla* Schrenk. *Fisch. et Mey.*, Enum. pl. nov. I, p. 48.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 538, № 14.

1891. Р. Каинды (*Бржезицкий!*; указывается имъ на этикеткѣ гербарія и для р. Балындъ-кінкъ). Цвѣты желтые.

Геогр. распир.: Джунгарія и Джунгарскій Алатау, Алай, Шугнань, Тяньшань, сѣверо-западная окраина Памира.

213. *Pyrethrum transiliense* Rgl., Descr. pl. nov. fasc. VI, № 57 („Acta Horti Petr.“ V, p. 618).—*Richteria pyrethroides* Kar. et Kir. in „Bull. Soc. Mosc.“ 1842, p. 126.—*Richteria pyrethroides* Kar. et Kir. *Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 519.—*Chrysanthemum Richteria* Benth., in Gen. Plant. II, 426.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. III, p. 315, № 3.

var. *tomentosa* Rgl. l. c.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 104 (*Richteria pyrethroides* Kar. et Kir.)—*Duthie*, Alcock's pl. p. 23, № 46 (*Chrysanthemum Richteria* Benth.—*Федченко О.*, Растения Памира, № 102.

1878. Верховья р. Карасу, 31. VIII. въ цв. (*Кушакевичъ!*).—1891. Перевалъ Бенкъ, въ цв., 20. VII. (*Бржезицкий!*; указывается имъ же, на этикеткѣ гербарія, для ущ. Марджанай и ущ. Мургабъ¹⁾).—1892. Акъ-байталъ (*Назаровъ!*).—1895. Довольно обыкновенно на выс. 13.000—14.000' (Alcock; non vidi).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. У озера Каракуль, 13.400', 5. VII. цв.; на глинисто-каменистыхъ склонахъ на южной сторонѣ перевала Кизыль-артъ, 14.600—14.000', 10. VIII. въ цв. (замѣчено тамъ же 3. VII); Акъ-байталъ, 8.

¹⁾ Этотъ видъ собранъ также Бржезицкимъ (!) на перевалѣ Йонова въ Гиндукушѣ, 26. VII. 1891 г. въ цвѣту, на выс. до 17,000'.

VII. цв. и 8. VIII. цв. и выше перевала Акъ-байталъ, до 16.400', 8. VIII. въ цв.; на сѣверномъ склонѣ Акъ-байтала, по рѣчкѣ, 14.400', 7. VII. въ цв.; между Карасу и Чатыръ-ташемъ 13.100—14.300' 16. VII. въ цв. и 4. VIII. въ цв. (*О. и Б. Федченко*).

var. *subvillosa* Rgl. l. c.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins p. 347 (*Chrysanthemum transiliense* Herd.).

1878. Каръ-артъ, 2. VIII. цв. (*Козловскій!*).—1878. По рѣчкѣ, 5. VIII. ¹⁾, въ цв.; Акъ-байталъ, 9. VIII. въ цв.; р. Аличури, 20—21. VIII. въ цв. (*Кушакевичъ!*).—1893. Кизыль-артъ (Poncins; non vidi).

Объ разновидности представляютъ постепенные переходы между собою, и промежуточные формы можно отнести одинаково къ той или другой. Цвѣты бѣлые.

Геогр. распир.: а) Джунгарскій Алатау; Тяньшань; альпийская область Алайского хребта, 10—13.400' (О. Федченко!! 1871 г.), Шугнань, Памир.—б) Западный Тибет.

214. *Pyrethrum pulchrum* Ledb., Fl. alt. IV, p. 118.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, pl. 548, № 5.

Указ. для Памира: *Б. Федченко*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 103.

1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*). Цвѣты розовые.

Геогр. распир.: а) Джунгарскій Алатау.—б) Алтай.

215. *Chrysanthemum (Pyrethrum) djilgense* Franchet, Note sur une coll. de pl. rapp. par Poncins, p. 345.

Указ. для Памира: *Franchet* l. c.—*Федченко О.*, Растения Памира, № 103.

1893. Кара-джильга (Poncins; non vidi).—1901. Отъ Маркансу до озера Каракуль, 13.100—13.400', 4. VII. въ цв.; отъ Карасу до Чатыръ-таша, 13.100—14.000', 16. VII. въ цв.; отъ Каракуль до Кизыль-арта, въ каменистомъ ущельи въ сѣверныхъ предгорьяхъ Каракулья, 10. VIII. пл. (О. и Б. Федченко).—1901. Уй-булакъ (*Тулиновъ!*). Цвѣты розовые.

Геогр. распир.: Найдено только на Памирѣ.

216. *Pyrethrum pamiricum* O. Fedtsch. nova spec. *O. Федченко*, Растения Памира („Мат. для познанія флоры и фауны Россіи“, вып. 5; печатается).

¹⁾ 5. VIII. 1878. Кушакевичъ экскавировалъ близъ озера Каракуль.

1901. Акъ-байталъ, 14.400—15.000', 8. VIII. цв. и пл. (Б. и О. Федченко).

Однолѣтнее, маленькое растеніе, съ простымъ или мало-вѣтвистымъ прямостоящимъ стеблемъ, шелковисто-серебристыми разрѣзными листьями и крупными головками; листочки обвертки съ бурымъ перепончатымъ краемъ.

Геогр. распр.: Найдено только на Памире.

217. *Artemisia Dracunculus* L. Sp. pl. ed. 1. p. 849.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 563, № 9.—*Hooker*, Fl. of Br. Ind. III, p. 321, № 2.—О. Федченко, Растенія Памира, № 105.

1878. Предгорья озера Кара-куль, 30. VII. цв. (*Кушакевичъ!*).—1901. Отъ Чатырь-тана до Карасу, 13.000—14.000', 4. VIII. въ цв. (О. и Б. Федченко).—1901. Кара-куль (*Тулинъ!*). Цвѣты краснобурье.

Геогр. распр.: а) Заравшанская долина, Искандеръ-куль, Алайский хребеть, Тянъ-шань, г. Каркаралы, Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Памиръ.—б) Средняя и южная Россія, Ураль, Киргизская степь, Прикаспійскія степи, Алтай, восточная Сибирь, западный Тибетъ 14—16.000', Афганистанъ.

218. *Artemisia Pamirica* C. Winkl., Decas nona Compositarum novarum № 1 („Acta H. Petrop.“ XI, p. 329).

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 7, № 113 (*Artemisia* sp.).—Franchet, Pl. Poncins, p. 347.—Федченко О., Растенія Памира, № 106.

1878. Кара-куль, 27. VII; сѣверные предгорья озера Кара-куль, 30. VII; (*Кушакевичъ!*).—1892. Акъ-байталъ; Рань-куль (*Назаровъ!*).—1893. Бозай-Гумбезъ; Кара-джилыга (Poncins; non vidi).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. Собрана у озера Кара-куль, на сланцевыхъ скалахъ, 13.600', 5. VII. въ бутонахъ; между Кара-кулемъ и Мусколомъ, 13.400—14.000', 6. VII. въ бутонахъ и 9. VIII. въ цвѣту; между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.650—12.450', 12. VII. въ цв.; между Карасу и Чатырь-танемъ, 13.100—14.000', 16. VII. въ цвѣту; между Ходжа-Назаромъ и Кой-тезекомъ, 13.800—15.100', 20. VII. въ цвѣту (Б. и О. Федченко!!). Замѣчена также въ щебневой пустынѣ и на пескѣ въ котловинѣ, 2. VIII. 1901, между Ходжа-Назаромъ и озеромъ Сасыкъ-куль (Б. и О. Федченко!!).—1901. Кара-куль; ледниковые холмы за Сасыкъ-кулемъ (*Тулинъ!*).

Очень сходна съ *A. Dracunculus*, отъ которой отличается пушистыми вверху стеблемъ и вѣточками.

Бржезинскій собралъ этотъ видъ на Ольгиномъ лугу, то есть въ Алайскомъ хребтѣ, но указываетъ его и для Памира (р. Аксу, р. Бенкъ, р. Мургабъ и р. Каинды).

var. *Aschurbajewi* C. Winkler, l. c. 330.

1878. Памиръ-Харгоши: Кара-куль, 30. VII. (собралъ Юлдашъ¹⁾ Ашурбаевъ!).

Геогр. распр.: Видъ этотъ собранъ въ Алайскомъ хребтѣ, на Памиръ и въ Шугнанъ.

219. *Artemisia desertorum* Spreng., Syst. veg. III, p. 490.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 564, № 12.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. III, p. 322, № 4.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 20, № 50.

1895. Памиръ, 13—14.000' (Alcock; non vidi).

Весьмаѣвѣроятно, что растеніе, собранное Alcock'омъ, относится къ предыдущему виду (*A. pamirica* C. Winkl.). По крайней мѣрѣ, *Duthie* пишетъ (l. c.), что не видитъ разницы между *A. desertorum* Spreng. и растеніями, собранными на Памиръ и въ Туркестанѣ русскими ботаниками и опредѣленными въ гербаріи *Saharanpur*'а какъ *A. pamirica* C. Winkler. Въ дѣйствительности же, оба названные вида совершенно различны. *A. desertorum* Spreng. сходна съ *A. campestris* L., тогда какъ *A. pamirica* C. Winkl. болѣе похожа на *A. Dracunculus* L., отъ которой отличается сразу опущеніемъ и болѣе широкими по отношению къ своей длины и менѣе стѣженными книзу листьями.

Геогр. распр.: Южная Россія, Сибирь — близъ Тобольска, Байкалъ, западный Тибетъ, Восточный Туркестанъ.

220. *Artemisia maritima* L. Sp. pl. ed. 1 p. 846.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 570.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. III, p. 323, № 9.—*Artemisia maritima* L. (№ 12) et *Artemisia fragrans* W. (№ 13). Boissier, Fl. Or. III, p. 366.

var.

1878. Бани-Гумбезъ 28. VIII. (*Кушакевичъ!*).

Туземное название: швакъ.

¹⁾ Винклеръ пишетъ „prope Jul-Dasch Pamiri non procul a lacu Karacul“, принимая „Юлдашъ“ за название мѣстности, тогда какъ это имя Ашурбаева.

Геогр. распр.: а) Заравшанская долина, Маргандъ, Семиреченская область, Алай, пески Кизылъ-кумъ, Тяньшань, Джунгаро-Киргизская степи, Индерские горы, Туркмения, Памиръ.—б) Средняя и южная Россия, Крымъ, Кавказъ, Закавказье, Ураль, Алтай, Даурія, восточная Сибирь, Байкалъ, Афганистанъ, Скандинавія, Англія, Франція, съверная Германія, Испанія, Италія, Дунай.

221. Artemisia sacrorum Ledb. *Ledb.*, Fl. alt. IV, p. 72.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 572, № 32.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. III, p. 326, № 18.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. *Poncins*, p. 347.

1893. Бозай-Гумбезъ (*Poncins*; non vidi).

var. *minor* *Ledb.* l. c.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Растенія Памира, p. № 107.

1901. Между Карасу и Памирскимъ Постомъ, на каменистомъ берегу р. Карасу въ урочищѣ Джаманъ-таль, 12.800', 5. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Степи Джунгаріи и Джунгарскій Алатау, Каркары, Тарбагатай, Джилькарагай, Тяньшань, Памиръ.—б) Средняя и южная Россия, Ураль, Алтай, Байкалъ и Забайкалье, восточная Сибирь, Даурія, Манджурія, Китай, западный Тибетъ, с.-з. Индія.

222. Artemisia chamaemelifolia Vill., Fl. delph. III, p. 250, t. 35.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 580, № 35.—*Boiss.*, Fl. Or. III, p. 370, № 23.

1878. Р. Аличуръ, 21. VIII (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распр.: а) Памиръ.—б) Южная Россия, Кавказъ, Закавказье, Персія, Альпы Дофине.

223. Artemisia Skorniakowi C. Winkl., Decas nona, № 3 („Acta Horti Petr.“ XI, p. 331).

1878. Кара-куль 5. VIII. (*Кушакевичъ!*, *Скорняковъ!*, *Ашурбаевъ!*).

Вмѣстѣ съ типической формой, тамъ же собраны одновременно var. *ramosa* C. Winkler (l. c. p. 331) и var. *pleiocephala* C. Winkler (l. c. p. 332).

Геогр. распр.: Извѣстна только съ Памира.

224. Artemisia Kuschakewiczhii C. Winkl., Decas nona № 2 („Acta Horti Petr.“ XI, p. 330).

1878. Близъ Кара-куля 5. VIII; р. Чонъ-су 6. VIII. (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распр.: Найдена только на Памирѣ.

225. Artemisia Aschurbajewi C. Winkl., Decas nona № 4 („Acta Horti Petr.“ XI, p. 332).

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. *Poncins*, p. 347.

1893. Кара-джилыга (*Poncins*; non vidi).

var. *ramosa* C. Winkl. l. c. p. 333.

Указ. для Памира: *C. Winkl.*, l. c.

1878. Акъ-байталъ, 7. VIII. цв. (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распр.: Типическая форма собрана на Алай, у устья Хатынъ-арта, въ 1878 г. (Ашурбаевъ). Разновидность var. *ramosa* извѣстна только съ Памира.

226. Artemisia rupestris L. Sp. pl. ed. 1. p. 847.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, 597, № 79.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, № 108.

1901. Между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.540—13.100', 17. VII. въ цв. и 3. VIII. въ цв.; между Ходжа-Назаромъ и Кой-тезекомъ, 13.800—15.100', 20. VII. въ цвѣту (Б. и О. Федченко!!).—1901. Ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (*Туліновъ!*).

var. *viridifolia* DC.

1878. Памиръ-Аличуръ, 20. VIII; верховье Карабу, 29. VIII; Акъ-байталъ, 3. IX; (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распр.: а) Каракалы, Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Памиръ, Шуганъ, Омскъ.—б) Ураль, Байкалъ, Забайкалье, Восточная Сибирь у Охотска.

227. Artemisia macrocephala Jacquem.—*Artemisia macrocephala* Jacquem., Bess. in „Bull. Soc. Nat. Mosc.“ IX (1836) 28.—*Artemisia macrocephala* Jacquem. *Hook.*, Fl. Br. Ind. III, p. 329, № 29.—A. *Griffithiana* *Boiss.*, Fl. Or. III, 376, № 37.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, № 109.

1878. Карабу 29. VIII. (*Кушакевичъ!*). (Въ Туркестанскомъ гербарии Спб. Бот. Сада опредѣлена Винклеромъ какъ *Artemisia Sieversiana* W.). Памиръ-Харгоши, 7. VIII. пл.; Аличуръ 27—29. VIII. пл. (*Кушакевичъ!*).—1901. Между Памирскимъ Постомъ и Карабу, на каменистомъ берегу рѣчки Карабу, 12.800', 15. VII. въ цв.; на песчано-щебниевыхъ осыпяхъ между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.540—13.100', 17. VII. въ цв.; въ щебневой пустынѣ между Сассыкъ-кулемъ и Яшиль-кулемъ, 13.100—12.500', 18. VII. въ

цв.; на щебниевыхъ розсыпяхъ между Ходжа-Назаромъ и Койтезекомъ, 13.800—15.100', 20. VII въ цвету (Б. и О. Федченко!!).

Замѣчена также на пескѣ въ котловинѣ между урочищемъ Ходжа-Назарь и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.800—13.100', 2. VIII. (Б. и О. Федченко!!).—1901. Карапуль; Сассыкъ-куль; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (Тулиновъ!).

Головки очень крупныя; у экземпляровъ съ р. Карапуль, какъ нашихъ, такъ и Кушакевича—менѣе крупныя, чѣмъ у растеній изъ другихъ перечисленныхъ мѣстностей.

Геогр. расп.: а) Памиръ.—б) Афганистанъ, Тибетъ, Гималаи, Монголія.

Для Памира указаны еще иѣкоторыя *Artemisiae* (неопределенные):

228. *Artemisia* sp. *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 110.

1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).

229. *Artemisia* sp. *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 111.

1892. Карапуль, Шоръ-куль, Яшиль-куль, Мургабъ (*Назаровъ!*).

230. *Artemisia* sp. *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 112.

1892. Акъ-байталъ (*Назаровъ!*).

231. *Artemisia* sp. *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.

1893. Шаджанъ (*Poncins*; non vidi).

232. *Artemisia* sp., близкая къ *A. minor* Jacqum. *Duthie*, Alcock's pl., p. 23, № 49.

1895. Одно изъ обычновенныхъ растеній Большаго и Малаго Памировъ, растетъ всюду на сухой почвѣ, на выс. 13—14.000' (Alcock; non vidi).

233. *Artemisia* sp. *Федченко О.*, Раст. Пам., № 110. Цвѣтоложе голое; корень толстый, деревянистый; многоглѣтнее.

1901. Чатыръ-ташъ, 13.540', 16. VII, безъ цветовъ и плодовъ; собрана мѣстными киргизами, какъ образецъ тоилива. Возлѣ озера Карапуль, 13.400', съ остатками прошлогоднихъ цветовъ, 5. VII; между Сассыкъ-кулемъ и Чатыръ-ташемъ, 13.540—14.000', 3. VIII въ цвету. (Б. и О. Федченко!!).

Туземное название: шуакъ.

234. *Artemisia* sp. *Федченко О.*, Раст. Пам., № 111. Похожа на *A. argyrophylla* Ledb.; цветоложе голое.

1901. Между Карапуль и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII въ цвету (Б. и О. Федченко!!).

235. *Artemisia* sp. *Федченко О.*, Раст. Пам., № 112. Похожа на *A. sericea* Web. var. *parviflora* DC. и на *A. Turczaninowiana* Bess. var. *dasyantha*. Цвѣтоложе голое. Стебель много, тонкихъ, прямыхъ. Соцветіе узкое.

1901. Между Карапуль и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII въ цвету. (Б. и О. Федченко!!).

236. *Artemisia* sp. *Федченко О.*, Раст. Пам., № 113. Шелковисто-серебристая; головки продолговатыя; листья большою частью скучены у корня; корень деревянистый, исклоняющій, красноватый.

1901. Чичикты, 12.750', 9. VII въ цвету; между Мусколомъ и Карапульемъ, 13.400—14.000', 6. VII въ цвету и 9. VIII въ цвету. (Б. и О. Федченко!!).

237. *Artemisia* sp.¹⁾, *Федченко О.*, Растенія Памира, № 114. Листья мохнатые; цветоложе голое.

1901. Акъ-байталъ, два плохихъ экземпляра, 8. VIII въ цвету (Б. и О. Федченко!!).

238. *Tanacetum fruticosum* Ledb., Fl. alt. IV, p. 58.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 603, № 6.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. III, p. 318, № 1.—*Pyrethrum Athanasia* (Bess.) Boiss., Fl. Or. III, p. 353, № 40.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, № 115.

1878. Карапуль, 5. VIII; Акъ-байталъ, 9. VIII (*Кушакевичъ!*).—1901. Въ окрестностяхъ Памирского Поста, въ каменистой пустынѣ, 12.650, 15. VII въ цвету. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты желтые, листья блѣдо-войлочные.

Геогр. расп.: а) Памиро-алай, Тянъшань, Тарбагатай и Джунгарскій Алатау, Памиръ.—б) Алтай, западный Тибетъ, Афганистанъ.

239. *Tanacetum gracile* Hook. f. et Thoms. *Hooker*, Fl. of Br. Ind. III, p. 318, № 3.

Указ. для Памира: *Федченко О.*, Раст. Памира, № 116.

1901. Въ урочищѣ Чичикты, 12.750', 10. VII съ сухими, пропилогодними головками; между Памирскимъ Постомъ и урочищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII въ цвету. (Б. и О. Федченко!!).

¹⁾ *Crossostephium turkestanicum* Rgl. et Schmalh. со-
брали Бражевицкимъ на р. Бал-каръ, уже въ предѣлахъ Памира,
25. VII 1891 г. въ цвету.

Отличается от предыдущего более тонкими стеблями, сильнее олиственными; листья менее густо опущенные, поэтому зеленоватые, доли листьевъ длиннѣе; листочки обвертъ голые. Растеніе сильно пахучее. Можетъ быть, не болѣе, какъ разновидность предыдущаго вида. Цвѣты желтые.

Геогр. распир.: а) Памиръ.—б) Тибетъ.

240. *Tanacetum tenuifolium* Jacq. in DC. Prodr. VI, p. 129.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. III, p. 319, № 6.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 106.—*Федченко О.*, Растенія Памира, № 117.

1878. Сѣверные предгорья озера Кара-куль, 30. VII (*Кушакевичъ!* и *Ашурбаевъ!*); Суокъ-чубыръ, 6. VIII; Харгоши, 7. VIII (*Кушакевичъ!*).—1892. Раигъ-куль; Аличуръ (*Назаровъ!*).—1895. Яшиль-куль, по долинѣ Аличура (*Богоявленскій!*).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. На южной сторонѣ перевала Кизыль-артъ, на глинисто-каменистыхъ склонахъ, 14.600—14.000', 3. VII въ цв. и 10. VIII въ цв.; на сухой, песчаной равнинѣ въ урочищѣ Маркансу, 13.100', 3. VII въ цв.; на песчаномъ берегу озера Кара-куль, 13.400', 5. VII въ цв.; между озеромъ Кара-куль и урочищемъ Мусколъ, 13.400—14.000', 6. VII въ цв. и 9. VIII въ пл.; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.000', 5. VII въ цв.; между Карасу и урочищемъ Чатыръ-ташъ, 13.100—14.000', 16. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и урочищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII въ цв.; на перевалѣ Акъ-байталъ и выше перевала, до 16.400', 8. VIII въ цв. (*О. и Б. Федченко!!*). Замѣчено также на пескѣ между гранитными глыбами у рѣки Уй-булакъ, 4. VII (*Б. и О. Федченко!!*).—1901. Уй-булакъ; Каракуль; песокъ передъ Мусколомъ; Акъ-байталъ, сырой лугъ (*Тулиновъ!*).

Очень обыкновенное на Памирѣ растеніе; сильно варьируетъ по росту и habitus'у; на перевалѣ Акъ-байталъ и выше — карликовая форма, напоминающая *T. Scharnhorsti* Rgl. et Schmalh.

Цвѣты оранжевые; листья шелковисто-серебристые.
Геогр. распир.: а) Памиръ. — б) Западный Тибетъ, 14,000'.

241. *Tanacetum tibeticum* Hook. f. et Thoms. *Hooker*, Fl. of Br. Ind. III, p. 319, № 5.—*Clarke*, Comp. Ind. 154. Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 23, № 47.

(120)

1895. Довольно обыкновенно на сухихъ открытыхъ мѣстахъ, 13—14.000' (*Alcock*; non vidi).

Геогр. распир.: Тибетъ, 15—17.000'.

242. *Tanacetum panum* C. B. Clarke, Comp. Ind. 155.—*Hooker*, Fl. of Br. Ind. III, p. 320, № 11.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 23, № 48.

1895. Памиръ, 13—14.000' (*Alcock*; non vidi).

Геогр. распир.: Западный Тибетъ, 16.000'.

243. *Tanacetum Kuschakewiczi* O. Fedtsch. nova spec.—*Федченко О.*, Растенія Памира, собранныя въ 1901 г. Б. А. и О. А. Федченко („Мат. для познанія флоры и фауны Россіи“, бот. вып. 5, р. 40, № 118) (печатается¹).

Указ. для Памира: *Федченко, О.*, l. c.

Fruticulus fragrans humilis (10—12 см. altum). Radix elongata indurata. Caules ramosissimi; divaricati, infra dense foliati, pubescentes; florentes folia decrescentia rariora gerentes. Folia pubescentia, carnosula, glandulis numerosis obsessa, pinnatipartita, pinnulae lineares, marginibus revolutis, obtusiuscula, laterales indivisae, terminalis trifida. Folia suprema interdum indivisa. Caules florigeri elongati folia cm. 2—3 superantia; capitula solitaria, majuscula (usque 1 см. lata), late campanulata. Involucri phylla imbricata, 4-serialia, pubescentia, obtusiuscula, dorso viride-carinata, margine fuscescens, anguste pallide marginata, nonnulla sub apice nigromaculata, pleraque apice barbellata. Discus glaber, floredi tempore planus. Flores omnes tubulosi, extus glanduloso-puberuli, aurantiaci, sub anthesi involucri phylla subaequantes, demum superantes. Achene (juniora) compressa, corona maxima, paleata, albida, lacerato-denticulata.

Многолѣтний, низкорослый полукустарникъ (въ 10—12 см. высоты), пушистый, съ длиннымъ деревянистымъ корнемъ и растопыренными вѣтвями, внизу густо олиственны; на цветущихъ стебляхъ листья мельче и рѣдкіе, верхний иногда линейный (нераздѣльный). Листья пушистые, мясистые, съ многочисленными точечными ямочками (железками), перистораздѣльные; доли линейныя, съ завороченными краями, туповатыя, боковая простая, верхняя трехраздѣльная. Цвѣтуватыя, боковая простая, верхняя трехраздѣльная.

¹) Описание сдѣлано 21 марта 1902 года и сдано въ печать въ Имп. Общ. Испытателей Природы въ Москвѣ въ томъ же году.

(121)

точные стебли удлиненные и возвышаются над листьями на 2—3 см., головки одиночные, крупные (до 1 см. ширины), широко-колокольчатые; листочки обвертки черепичатые, расположенные въ 4 ряда, пушистые, туповатые, на спинкѣ съ зеленымъ килемъ, по бокамъ буроватые, съ узкимъ блѣднымъ перепончатымъ краемъ, иѣкоторые передъ вершиной съ темнымъ пятномъ, многіе на вершинѣ почти бородатые отъ болѣе длинныхъ волосковъ. Цвѣтолове голое, во время цвѣтения плоское. Цвѣты всѣ трубчатые, снаружи железисто-пушистые, оранжевые, во время цвѣтения не длиннѣе листочковъ обвертки, при отцвѣтании превышающіе длиною обвертку. Сѣмянки (молодыя) сжатыя, коронка очень большая, пленчатая, бѣлая, разрѣзана зубцами. Растеніе сильно паучутое.

Изъ растеній, имѣющихся въ богатомъ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада, наше всего ближе къ *Rutherfordia kermanense* Bornt., собранному Борнимюллеромъ въ альпийской области юго-восточной Персии (описаніе будетъ въ скоромъ времени опубликовано авторомъ) и къ *Tanacetum Fischerae* Aitch. изъ Афганистана. Но оба отличаются отъ нашего своими еще болѣе незначительными размѣрами; кроме того, у *R. kermanense* Борн. листья и опушение ихъ мягче, доли листьевъ короче, листочки обвертки острые и съ болѣе рѣзкимъ темнымъ краемъ, а у *T. Fischerae* Aitch. все растеніе голое, доли листьевъ островатыя, иногда съ маленькимъ остриемъ, цвѣточные головки узко-колокольчатыя, листочки обвертокъ шире и съ широкимъ волнистымъ перепончатымъ краемъ.

Въ живомъ состояніи наше растеніе очень характерно и рѣзко отличается отъ обыкновенного на Памирѣ *Tanacetum tenuifolium* Jacq., имѣющаго мягкіе серебристо-шелковистые листья и многочисленныя головки съ темными обвертками. Оно растетъ отдѣльными кустиками на значительномъ разстояніи другъ отъ друга, выдѣляясь на каменисто-песчаныхъ осыпяхъ своими оранжевыми цвѣтами.

Собралъ Б. А. Федченко и мною на Памирѣ, въ 1901 году: между Карасу и Чатырь-ташемъ, 13.100—14.000', 16. VII въ цвѣту; на песчано-щебневыхъ осыпяхъ между уроцищемъ Чатырь-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540—13.100', 17. VII въ цвѣту и 3. VIII въ цвѣту; между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', 18. VII въ цвѣту.

Названіе въ честь первого русскаго изслѣдователя флоры Памира (въ 1878 г.), покойного Аполлона Александровича Кулакевича, въ теченіи своей долголѣтней службы въ Туркестанѣ обогатившаго туркестанскій гербарій Императорскаго Ботаническаго Сада въ С.-Петербургѣ обширными и цѣнными коллекціями, особенно съ Тяньшаня, къ сожалѣнію до сихъ поръ почти не опубликованными.

244. *Leontopodium alpinum* Cass. in Dict. sc. nat. XXV, p. 474.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 613—614, № 1.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. III, p. 279.

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 98.—*Duthie*, Alcock's pl., р. 23, № 44.—*Федченко О.*, Раст. Памира, № 119 (var. *subalpina* *Ledb.*).—*Franchet*, pl. Poncins p. 347 (*Gnaphalium Leontopodium* Scop. et var. *sibiricum*).

1891. Перевалъ Бендерского, з. VIII, до 15.000' (*Бржесницкий!*).—1892. Акъ-байталъ; Карасу; (*Назаровъ!*).—1893. Караджилыга (Poncins; non vidi).—1895. Очень обыкновенъ на склонахъ до высоты около 15.000', (Alcock; non vidi).

var. *subalpinum* *Ledb.* I. c. *Федченко О.*, Раст. Пам., № 119.

1901. На глинисто-каменистыхъ склонахъ на южной сторонѣ перевала Кизылъ-артъ, 14.600—14.000', з. VII въ цв. и 10. VIII; на берегу рѣчки у подошвы Акъ-байтала, на сѣверномъ склонѣ его, 14.400', 7. VII въ цв.; между Карасу и Чатырь-ташемъ, на альпийскихъ лужайкахъ ниже перевала Найза-ташъ, 13.800', 16. VII въ цв.; между уроцищемъ Ходжа-Назаръ и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII въ цв.; на перевалѣ Акъ-байталъ и выше перевала, до 16.400', 8. VIII въ пл. (*Б. и О. Федченко!!*).—1901. Кизылъ-артъ; мокрый лугъ на Мусколѣ (*Тулиновъ!*).—Цвѣты бѣлы; листочки обвертки съ черными концами.

var. *sibiricum* (*Ledb.*). *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.

1893. Бозай-гумбезъ (Poncins; non vidi).

Геогр. распир.: а) Алайскій хребеть, Тяньшань, Джунгарскій Алатау, Памиръ.—б) Альпы Европы, Гималаи и Тибетъ отъ 10.000—18.000', Китай, Монголія, Алтай и Даурія.

245. *Ligularia altaica* DC. Prodr. VI, 315. — *Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 621, № 2. — *Senecio altaicus* Schultz Bip., Flora (1845), p. 50. — *Senecio altaicus* Schultz Bip. *Franchet*, Les genres *Ligularia*, *Senecillis*, *Cremanthodium* et leurs espèces

dans l'Asie centrale et orientale („Bull. Soc. Bot. de France XXXIX 1892, p. 292, № 22).

Указ. для Памира: *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 114. — *Федченко О.*, Растения Памира, № 120. — *Duthie, Alcock's pl.*, p. 23, № 52 (*Senecio sp.*, section *Ligularia*). — *Franchet, pl. Poncins*, p. 347 (*Senecio altaicus Franchet*¹⁾).

1878. Въ окрестностяхъ Кара-куля, 27. VII въ цв.; въ съверныхъ предгорьяхъ озера Кара-куль, 30. VII въ цв.; Акесу, 16. VIII пл. (*Кушакевичъ!*). — 1891. Р. Истыкъ (*Бржезинский!*; указывается имъ также, на этикеткѣ гербарія, для р. Ваханъ-дары). — 1891. Памиръ-Тагдумбашъ (*Youghusband ex Duthie, Senecio sp., non vidi*). — 1892. Карасу (*Назаровъ!*). — 1895. Р. Вахджиръ, 1. VII зацвѣтающая (*Боголюбенский!*). (Имъ же собрана въ Бордабѣ, въ Заалайскомъ хребтѣ). — 1895. Вдолъ ручьевъ, на выс. 14—15.000', не часто (*Alcock ex Duthie, Senecio sp., non vidi*). — 1901. Между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 15. VII въ цв. и между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.000', 16. VII въ цв., на берегу рѣки и въ сырыхъ тѣнистыхъ мѣстахъ у скалъ (*Б. и О. Федченко!!*). — 1901. Чатыръ-ташъ (*Тулиновъ!*). — Цвѣты золотисто-желтые.

Геогр. распир.: а) Джунгарія (Тарбагатай и Акчавлы), Арасанъ, Памиръ, Заалайский хребетъ. — б) Алтай, Байкалъ, съверная Монголія, Китай.

246. Waldheimia tridactylites Kar. et Kir., in Bull. d. l. Soc. des Natur. de Moscou, 1842, p. 125. — *Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 627. — *Allardia glabra Dene.* in *Jacquemont*, Voy. Bot. 88, t. 96 (1844). — *Allardia glabra Dene.* *Hook.*, Fl. of Br. Ind. III, p. 313.

Указ. для Памира: *Duthie, Alcock's pl.*, p. 23, № 45 (*Allardia glabra Dene.*).

1891. По р. Съв. Бекъ, въ цв. 20. VII, до 15.000' (*Бржезинский!*). — 1895. На каменистой почвѣ, у рѣчекъ, до высоты около 14.000' (*Alcock; non vidi*).

¹⁾ Poncins (Franchet, l. c.) собирая это растеніе на перевалѣ Талдыкъ, т. е. въ Алайскомъ хребтѣ, а не на Памирѣ. Если, перечисливъ его растенія, Франше называетъ этотъ видъ *Senecio altaicus Franchet*, то это, очевидно, ошибка. Въ монографіи рода *Ligularia* Франше (l. c.) такого вида нѣть, а есть только *Senecio altaicus Schultz Bip.* (= *Ligularia altaica DC.*).

Геогр. распир.: а) Джунгарій Алатау, Алайский хребетъ, Тяньшань, Памиръ. — б) Восточный и западный Тибетъ.

247. Senecio coronopifolius Desf. Atl. II, p. 273. — *Boiss.*, Pl. Or. III, p. 390, № 13. — *Hooker, Fl. Br. Ind. III*, p. 341, № 12.

Указ. для Памира: Винклерь въ *Федченко Б.*, Мат. фл. Пам., р. 7, № 116 (*S. alabugensis C. Winkl.*). — *Duthie, Alcock's pl.*, p. 23, № 51. — *Федченко О.*, Растенія Памира, № 121.

1878. Карасу, 29. VIII пл.; Акесу, 31. VIII пл. (*Кушакевичъ!*). — 1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*). — 1895. Памиръ, 13—14.000' (*Alcock; non vidi*). — 1901. Въ бесплодной пустынѣ между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', 18. VII въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*). — Цвѣты сърно-желтые.

Геогр. распир.: а) Долина Сыръ-дары, пески Каракумъ, пески Кизыль-кумъ, Заравшанская долина, Алайский хребетъ, Шугнанъ, Тяньшань, Памиръ. — б) Египетъ, Аравія, Палестина, Афганистанъ, Белуджистанъ, зап. Гималаи, съв. Африка, Испанія, Тибетъ, Персія, Канарские острова.

248. Senecio Renardi C. Winkl. *Traubellet, Regel, Maximowicz et Winkler*, Decas plantarum novarum, Petrop. 1882, p. 6, № 3.

1893. Бозай-гумбезъ (*Poncins; non vidi*).

Геогр. распир.: Типическая форма въ Дарвазѣ, var. *Korolkowi* — въ Хивѣ.

249. Senecio songoricus Fisch. et Mey., Enum. I, p. 52. — *Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 637, № 25.

var. *arachnoidea C. Winkl.*

1891. Р. Акесу, 17. VII въ цв., до 12.000' (*Бржезинский!*).

Геогр. распир.: Степи Джунгаріи у р. Тентекъ, Тарбагатай и оз. Алакуль, Памиръ.

250. Saussurea rugosa Spreng. Syst. III, 381. — *Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 660, № 1.

Указ. для Памира: *Franchet, pl. Poncins*, p. 347. — *Федченко О.*, Растенія Памира, № 122.

1893. Кизыль-артъ (*Poncins; non vidi*). — 1901. Глинисто-каменистые склоны на южной сторонѣ перевала Кизыль-артъ, 14.600—14.000', 3. VII и 10. VIII въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*). Цвѣты лиловые.

Геогр. распир.: а) Малый Алай, Тяньшань, Джунгар-

ской Алатау, Памирь.—б) Альпы Европы, Алтай, Байкалъ, Даурія, Тибетъ, Монголія.

251. *Saussurea salsa* (M. B.) Spreng. Syst. III, 381.—*Boisier*, Fl. Or. III, p. 566, № 2.—*Saussurea crassifolia* DC. Ledb., Fl. Ross. II, p. 665, № 15.

Указ. для Памира: Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 7, № 123.—*Duthie*, Alcock's pl., p. 23, № 53.—Федченко О., Растения Памира, № 123.

1878. Близъ Кара-куля, 4. VIII и Кара-куль, 5. VIII цв. (*Кушакевичъ!* и *Скорняковъ!*); Памирь-Харгоши, 5. VIII (*Кушакевичъ!* и *Скорняковъ!*); Акъ-байталъ, 9. VIII (*Кушакевичъ!* и *Ашурбаевъ!*); Раңгъ-куль, 14. VIII цв.; Аксу, 16. VIII цв., верховье р. Джаманъ-таль, 20. VIII (*Кушакевичъ!*). Pamir, Karasu, 78 (*Kuschakewicz!*—не его почеркомъ и безъ числа).—1892. Мургасъ (*Назаровъ!*).—1895. На сухой почвѣ, не часто (Alcock; non vidi).—1899. Памирь (*H. Вельманъ!*).—1901. Между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.650—12.800', на болотныхъ кочкахъ, 12. VII зацвѣтающія; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.680—12.500', 15. VII въ цв. и 5. VIII въ цв.; между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', 18. VII въ бутонахъ (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты лиловые.

Геогр. распр.: а) Въ долинѣ Фергана, Алай, Шуганъ, Памирь, съверный Туркестанъ, Джунгарія.—б) Южная Россія, Кавказъ, Уралъ, Алтай, Байкалъ, Забайкалье, Даурія, Арmenія, Персія, Китай, Манджурия.

252. *Saussurea alpina* (L.) DC. in Annal. du Mus. d'hist. nat. XVI, p. 200.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 669, № 24.—*Serratula alpina* L. Sp. plant. ed. 1 p. 816.

var. *Kuschakewiczi* C. Winkler in sched.

Указ. для Памира: Федченко О., Раст. Пам., № 124.

1878. Р. Чонъ-су, 7. VIII (*Кушакевичъ!*).—1901. У подошвы перевала Кизылъ-артъ, на южномъ склонѣ, не выше 14,000', 10. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). Цвѣты лиловые.

Наше растеніе съ Кизылъ-артъ совершиенно тождественно съ тѣмъ, которое собрано на Чонъ-су Кушакевичемъ и определено Винклеромъ въ туркестанскомъ гербаріи Имп. Бот. Сада какъ *P. alpina* L. var. *Kuschakewiczi* C. Winkl. Разновидность эта, сколько миѣ известно, нигдѣ не описана Винклеромъ; по *habitus*'у она сходна съ Винклеровскимъ видомъ, *Saussurea Kuschakewiczi*, но отличается отъ него пленчатымъ

цвѣтоложемъ и зелеными листочками обвертки (*receptaculo paleato et involucro foliaceo*), тогда какъ у *S. Kuschakewiczi* цвѣтоложе голое и листочки обвертки жесткіе, соломообразные (*receptaculo nudo, involuci phyllis stramineis*).

Геогр. распр. вида: а) Алайскій и Заалайскій хребеть, Тяньшанъ, Юлдузъ.—б) Арктическая и съверная Россія, Уралъ, Алтай, Даурія, Байкалъ, земля Чукчей, Камчатка.

253. *Saussurea colorata* C. Winkl. Decas sexta Comp. nov. Turkest. № 5 („Acta Horti Petrop.“ XI, p. 167).

Указ. для Памира: Winkler, l. c. — Федченко О., Раст. Пам., № 125.

1878. Прибрежье Кара-куля, р. Чонъ-су, 30. VII, 5. VIII и 6. VIII; Кара-куль, 5. VIII цв.; переходъ отъ Кара-куля къ рѣчкѣ 5. VIII цв.; Акъ-байталъ, 9. VIII цв. (*Кушакевичъ!*).—1901. На песчаныхъ кочкахъ у озера Кара-куль, 5. VII только листья, 10. VIII въ цвѣту; близъ рѣчки на съверномъ склонѣ у подошвы Акъ-байтала, 14.400', съ остатками прошлогоднихъ цвѣтовъ, 7. VII; между Мусколомъ и озеромъ Кара-куль, 14.100—13.400', 9. VIII въ цвѣту (О. и Б. Федченко).

Геогр. распр.: Памиръ.

254. *Saussurea pamirica* C. Winkl. Decas sexta Comp. nov. Turkest. № 9 („Acta H. Petrop.“ XI, p. 171).

Указ. для Памира: Winkler, l. c. — Федченко Б., Мат. фл. Пам., р. 7, № 125. — Федченко О., Раст. Памира, № 126.

1878. Р. Чонъ-су, 6. VIII въ цв.; при устьѣ р. Узбиль въ Чонъ-су, 6. VIII въ цв.; верховья Акъ-байтала, 8. VIII цв. (*Кушакевичъ!*). Памирь 7—8. VIII въ цв. (*Кушакевичъ!* и *Скорняковъ!*).—1892. Акъ-байталъ (*Назаровъ!*).—1901. Въ урочищѣ Маркану, 3. VII въ цв.; на Мусколѣ, въ сухомъ руслѣ между камнями и на солонцеватой луговинѣ, 14.000', 6. VII въ цв. и 9. VIII въ цв.; на перевалѣ Акъ-байталъ и выше перевала, до 16.400', 8. VIII въ цвѣту (Б. и О. Федченко!!).—1901. Мокрый песокъ на Мусколѣ (*Тулиновъ!*).—Цвѣты лиловые.

f. *albiflora* (flore albo) O. Fedtsch.

1901. На Мусколѣ, между камнями въ сухомъ руслѣ рѣки, среди экземпляровъ съ лиловыми цвѣтами, собрано несколько съ бѣлыми, 6. VII въ цв., 14.000' (Б. и О. Федченко!!).

Кромъ перечисленныхъ мѣстностей, Винклерь (l. c.) указываетъ этотъ видъ для ущелья Кизылъ-артъ, гдѣ онъ действительно собранъ 8. IX. 1878 г. Кушакевичемъ (но это

уже не Памиръ, а съверный склонъ Заалайскаго хребта),— и для озера Кушлань-куль (въ Алайскомъ хребтѣ), гдѣ онъ вовсе не встрѣчается; этикетка, писанная уже въ герб. Имп. Бот. Сада: „Кушлань-куль 9. VII. 78“, ошибочно отнесена къ растеніямъ съ подлинной этикеткой Кушакевича: „при устьѣ Узбилия въ Чонъ-су 6. VIII. 78.“

Геогр. расpr.: Памиръ, Заалайскій хребетъ.

255. *Saussurea sorocephala* (Schrenk) Hook. f. et Th. *Saussurea sorocephala* Hook. f. et Th. in *Clarke, Comp. Ind.* 226.— *Saussurea sorocephala* Hook., *Fl. of Br. Ind.* III, p. 377, № 39.— *Haplotaxis sorocephala* Schrenk, *Fisch. et Mey.*, *Enum. pl. nov.* I, 43.— *Haplotaxis sorocephala* Schrenk, *Ledb.*, *Fl. Ross.* II, p. 673.— *Aplotaxis sorocephala* Kar. et Kir., *Enum. pl. Soong.* № 482.— *Aplotaxis gnaphalodes* Royle, *Ill. him.* p. 251, tab. 59, f. 1.— *DC. Prodr.* VI, p. 542 № 22.

Указ. для Пам.: *Duthie, Alcock's pl.*, p. 24, № 54.

1878. Каръ-артъ, 2. VIII (*Козловскій!*; подъ названиемъ *Saussurea gnaphalodes* Sch. Bip. въ герб. Имп. Бот. Сада).— 1895. На вершинѣ перевала Бендерскаго, 15.000' (*Alcock, non vidi*). — Цвѣты лиловые.

Геогр. расpr.: а) Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Алайскій хребетъ (Караказукъ, морены).— б) Тибеть, Монголія, Алтай.

256. *Saussurea* sp. Указ.: *Franchet, pl. Poncins*, p. 347.
1893. Кизылъ-артъ (*Poncins; non vidi*).

257. *Cousinia submutica* Franchet, Pl. du Turk. („Ann. Sc. nat. VI sér.“ Bot. XVI p. 314.).

Указ. для Памира: *Winkler C., Synopsis specierum generis Cousinia* № 21, in *Acta H. Petr.* XII, № 7, 1892, p. 195.

1891. На р. Марджанай, до 12,000', 12. VIII. (*Брэсезицкій!*)¹⁾.

Геогр. расpr.: Заравшанская долина, Маргандъ, Алайскій хребетъ, Памиръ.

261²⁾. *Cousinia rava* C. Winkl., *Mantissa Synopsis specierum generis Cousiniae* № 159 („Acta H. Petrop.“ XIV, № 9, 1897).

¹⁾ Другія двѣ мѣстности, которыя приводить Виклеръ (I. c.): ущ. Арчаты въ Алайскомъ хребтѣ, гдѣ собирали этотъ видъ 13 VII. 78 г. въ цв. Кушакевичъ! и р. Ничка-су на Алай, гдѣ собирали его 7. IX. 1878 г. Невѣскій! — къ Памиру не относятся.

²⁾ Въ монографіи этого рода: *Winkler C., Synopsis specierum gen. Cousiniae* („Acta H. P.“ XII, 1893, стр. 180—283) для Памира по

Указ. для Памира: *C. Winkler*, I. c. — *B. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 7, № 118.

1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*),

Геогр. расpr.: Найдена пока только въ указанной мѣстности на Памирѣ.

265. *Cousinia auriculata* Boiss., Diagn. Pl. nov. or. Ser. II. № 3, p. 58. — *Boiss., Fl. Or.* III, p. 502, № 108. — *Hook., Fl. Br. Ind.* III, p. 360, № 4.

Указ. для Памира: *Winkler C., Synopsis* № 179. — *B. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 7, № 119. — *O. Федченко*, Раст. Памира № 127.

1892. Перевалъ Найза-ташъ (*Назаровъ!*). — 1901. Между Карасу и Чатыръ-ташемъ 13.100—14.300', 16. VII. въ цв.; между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ 17. VII. въ цв.; въ щебневой пустынѣ между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, 12.500—13.800', 19. VII. въ цв.; между Ходжа-Назаромъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.800—13.100', на каменистыхъ склонахъ, 2. VIII. въ цв. (*O. и B. Федченко!!*). Въ послѣдней мѣстности растеніе это встрѣчалось довольно часто и на каждомъ почти экземпляре сидѣли бабочки одного и того же вида, изъ семейства *Zygaenidae*¹⁾.

Типическаго растенія, описанаго Буассье, я не видала; но съ экземпляромъ, собраннымъ Назаровымъ! на перевалѣ Найза-ташъ и опредѣленнымъ монографомъ рода *Cousinia*, К. Винклеромъ, какъ *C. auriculata* Boiss., наши растенія изъ той же мѣстности (между Карасу и Чатыръ-ташемъ) совершили тожественны: у нихъ замѣчается такой же лиловатый оттѣнокъ цвѣточныхъ головокъ, сравнительно мягкие и мало отогнутые листочки обвертки, отороченные довольно широкимъ травянистымъ зеленымъ краемъ и оканчивающіеся

казашъ ошибочно цѣлый рядъ видовъ; приводимъ ихъ подъ тѣми №№, которые они занимаютъ въ систематическомъ порядкѣ во „Флорѣ Памира“: 258. *Cousinia hastifolia* C. Winkl. найдена Невѣскімъ возлѣ Пумбачи (Каратегинъ!); 259. *C. aigrea* C. Winkl. на перев. Чакмакъ-Куды (Яккабагъ, Гискар. хр.!), 260. *C. decurrens* Rgl. сел. Моды (предг. Алайск. хр.!), 262. *C. microcarpa* Boiss. возлѣ Малин-сай (Намаиган. у. Ферган. обл.!), 263. *C. arachnoidea* F. et M. возлѣ Гульчи (!); 264. *C. speciosa* C. Winkl.—Арчаты и Агачъ-артъ (Алайск. хребетъ!).

¹⁾ По любезному сообщенію Г. Е. Грумъ-Гржимайло, опредѣлявшаго памирскихъ бабочекъ Б. А. Федченко, это — *Zygaena turanica*.

остриемъ; у растеній изъ другихъ указанныхъ мѣстностей листочки обвертки крѣпче и сильное отогнуты. Опушение всего растенія также сильно варьируетъ, доходя до блѣдоваточного. Цвѣты розовые; головки крупные.

Геогр. распир.: а) Памиръ.—б) Афганистанъ, Кашмиръ.

266. *Cousinia semidecurrens* C. Winkl., Decas V, № 4 („Acta H. Petr.“ X. p. 574).

Указ. для Памира: C. Winkler., Synopsis № 181.

Въ гербаріи Имп. Бот. Сада находится три экземпляра этого растенія, такъ сходные между собою, что вѣроятно они и собраны вмѣстѣ, но при нихъ двѣ разныхъ этикетки: одна, писанная рукой Кушакевича: „Кизылъ-джаръ, 12. VII. 78“, другая, не его почеркомъ: „Pamir, Kara-su, Kuschakevicz 78“. Послѣднее мѣстонахожденіе (приводимое и Винклеромъ, I. с.) въ виду многихъ, уже раньше указанныхъ ошибокъ въ томъ же родѣ, мнѣ кажется сомнительнымъ, и достовѣрнѣмъ я считаю только Кизылъ-джаръ (т. е. Алайскій хребетъ).—Собрано нами также въ Шугнанѣ.

267. *Cousinia* sp.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 347.

Собрана въ 1893 г. на Талдыкѣ, т. е. въ Алайскомъ хребтѣ (Poncins; non vidi), и къ числу памирскихъ растеній не относится.

268. *Centaurea squarrosa* W., Sp. pl. III, p. 2319.—*Ledb.* Fl. Ross. II. p. 705, № 45.—*Centaurea virgata* Lam. var. *squarrosa*, Boiss., Fl. or. III. p. 651, № 80.

1891. Р. Марджанай, 12. VIII. въ цв., до 10.000 (Бржезицкій!).

Геогр. распир.: а) Джунгарія (у озера Балхашъ) и Тарбагатай, Самаркандъ, Алайский хребетъ, Тяньшань.—б) Кавказъ и Закавказье, Ураль, Анатолія, Армения, Сирія, Месопотамія, Персія, Афганистанъ.

269. *Kentrophyllum lanatum* DC., Prodrom. VI, 610.—*Ledb.*, Fl. Ross. II. p. 714, № 1.—*Carthamus lanatus* L.—Boiss., Fl. or. III. p. 706.—*Carthamus lanatus* L.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. III. p. 386, № 3.

1891. Кара-чукуръ 22. VII. цв. (Бржезицкій!).

Геогр. распир.: а) Заравшанская долина.—б) Вся южная Европа отъ средней Франции и южной Германіи до южной Россіи, отъ Греціи до Фессаліи, Крымъ, Кавказъ,

Закавказье, Персія, Кашмиръ и на западъ до Атлантическаго океана, Месопотамія, Египетъ, Абиссинія, сѣверная Африка, Канарские острова, Мадера.

270. *Cirsium arvense* (L.) Scop. *Serratula arvensis* L., Sp. pl. ed. 1 p. 820 (1753).—*Cirsium arvense* Scopol., Fl. Carniol. II. p. 126.—*Cirsium arvense* Scop. Ledb., Fl. Ross. II. p. 734, № 28.—*Cirsium arvense* (L.) Scop. Boiss., Fl. or. III. p. 552, № 74.—*Cnicus arvensis* Hoffm. Hook., Fl. of Br. Ind. III. p. 362, № 1.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 128. 1901. На берегу р. Карасу въ уроцищѣ Джаманъ-талъ, въ кустахъ *Salix oxycarpa* And., 5. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!).

var. *incana* Led. I. c. p. 735.

1891. Р. Марджанай, 12. VIII. въ цв., до 12,000' (Бржезицкій!). Цвѣты розовые.

Геогр. распир. вида: а) Заравшанская долина, Шугнанъ, Джунгарскій Алатау и Тарбагатай, Тяньшань, Памиръ.—б) Отъ западной Европы до восточной Азіи, средняя и южная Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Алтай, Бенгалія, Пенджабъ, западные Гималаи и западный Тибетъ, Китай.

var. *incana*: а) Джунгарскій Алатау, Заравшанская долина, Куванъ-дарья.—б) Средняя и южная Россія, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Сибирь, Македонія, Anatolія, Армения, Ассирія, Персія, Афганистанъ, Белуджистанъ.

271. *Serratula procumbens* Rgl. Regel et Herder, Enum. plant. in regionibus cis- et transiliensibus à cl. Semenovio anno 1857 lectarum (стр. 63 отд. отт.) („Bull. de Moscou 1867, III, p. 165“).

Указ. для Памира: О. Федченко, Раст. Памира, № 129.

1878. Карасу, 17. VIII. цв. (Кушакевичъ!).—1888. Яшилькуль, 23. VIII. въ цв.; сухие листья употребляются туземцами какъ чай (Громчевскій!¹).—1901. Между Памирскимъ постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 15. VII. въ цв. и 5. VIII. въ цв.; между Чатыръ-ташемъ и Карасу, 13.540—14.000', 4. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!). Цвѣты розовые; головки крупные.

Геогр. распир.: Восточный Тяньшань, долина Иссыкъкуля (Семеновъ и Красновъ), Памиръ.

¹) *Dracosperma heterophyllum* тоже, по Громчевскому (зам. на языке), употребляется на Памирѣ, какъ чай.

272. *Jurinea depressa* (Stev.) CAM., Ind. cauc. p. 67. — *Ledb.*, Fl. Ross. II. p. 767, № 20. — *Jurinea depressa* (Stev.) CAM. — *Boiss.*, Fl. or. III. p. 583, № 41. — *Serratula depressa* Stev. Mém. Soc. Mosc. IV. p. 61.

1878. Канышъ-хатынь, 4. VIII. въ цв. (*Козловский!*).

Геогр. распр.: а) Въ герб. var. *Kuschakewiczi* C.W., пер. Караголь 23. VII. (*Скорняковъ!*). — б) Кавказъ, Армения, Тавръ Киликійскій.

273. *Tragopogon major* Jacq., Fl. austr. p. 19, tab. 29. — *Ledb.*, Fl. Ross. II. p. 784, № 1. — *Tragopogon majus* Jacq. *Boiss.*, Fl. or. III. p. 747, № 6.

Экземпляръ, собранный Бржезицкимъ 26. VII. 1891 г. въ пл., взять на перевалъ Іонова, т. е. уже въ Гиндукушъ, на выс. до 12,000', но указывается имъ этотъ видъ, на этикеткѣ гербарія, и для Памира (р. Кара-чукуръ).

Геогр. распр.: а) Долина и горы Заравшана; Алай-скій хребеть. — б) Средняя и южная Европа отъ Бельгіи и Германіи до средней Россіи, южная Россія, Крымъ, Кавказъ, Македонія.

274. *Tragopogon pratensis* L., Sp. pl. ed. 1 p. 789. — *Ledb.*, Fl. Ross. II. p. 785, № 7. — *Boiss.*, Fl. or. III. p. 747, № 7. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. III. p. 418, № 2.

Указ. для Памира: О. Федченко, Раст. Памира, № 130.

1901. Между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, на высотѣ около 13,000', собранъ одинъ экземпляръ въ цвету и плодахъ 18. VII. (*Б. и О. Федченко!!*). Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Тяньшань. — б) Сѣверная и средняя Европа, сѣв., средняя и южная Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Македонія, Фракія, Арменія, западные Гималаи и западный Тибетъ и на западъ до Атлантическаго океана.

275. *Tragopogon brevirostris* DC., Prodr. VII. p. 114. — *Ledb.*, Fl. Ross. II. p. 788, № 12. — *Boiss.*, Fl. Or. III. p. 749, № 12.

1878. Прибрежныя стени озера Кара-куль 30. VII. въ цв. (*Кушакевичъ!*). Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Джунгарія, Тарбагатай, Шугнанъ, Памиръ, Иргизъ. — б) Южная и средняя Россія, Крымъ, Кавказъ, Болгарія.

276. *Tragopogon gracile* Don., in „Mém. Wern. Soc.“ III. (1820), 414. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. III. p. 417.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl., p. 24, № 56.

1895. Собрано только два экземпляра; одинъ выше 15.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.: Центральные и западные Гималаи, Кашмиръ, Тибетъ.

277. *Scorzonera stricta* Horn., Hort. Hafn. II. p. 750. — *Boiss.*, Fl. or. III. p. 768, № 26. — *Scorzonera Marschalliana* CAM. Suppl. Fl. alt. № 168. — *Scorzonera Marschalliana* CAM. *Ledb.*, Fl. Ross. II. p. 795, № 13.

var. *villosa* (M. B.) C. Winkler.

Указ. для Памира: О. Федченко, Раст. Памира, № 131.

1878. Аличуръ, 22. VIII. пл. (*Кушакевичъ!*). — 1901. Между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, на высотѣ отъ 12.500—12.800', на каменистыхъ склонахъ, 19. VII. въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*). Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Шугнанъ, Памиръ, Семипалатинская область и степи Джунгаріи, — р. Ишимъ, Терсакканъ и Улутау. — б) Южная Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль и Алтай — Бараба.

278. *Taraxacum officinale* Wiggers, Prim. fl. hols. p. 56. — *Ledb.*, Fl. Ross. II. p. 812, № 3. — *Boiss.*, Fl. Or. III. p. 787, № 3. — *Hooker*, Fl. of Br. India III. p. 401, № 1.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 347. — Федченко Б., Мат. фл. Пам. р. 8, № 131 (*Taraxacum* sp., ex parte).

1893. Кара-джильга (Poncins; non vidi).

var. *corniculatum* (DC.) Rgl. — *Taraxacum corniculatum* DC. *Ledb.*, Fl. Ross. II. p. 813, № 5. — *T. officinale* Wigg. var. *glaucescens* Koch. *Boiss.*, Fl. Or. III. p. 787, № 3. — *T. officinale* Wigg. var. *glaucescens* Koch. *Hook.*, Fl. Br. Ind. III. p. 401, № 1.

Указ. для Памира: О. Федченко, Раст. Памира, № 132.

Указывается Бржезицкимъ, на этикеткѣ гербарія, для Памира (р. Аксу и р. Ваханъ-дарья), экземпляръ же, собранный имъ 5. VII. 1891 г. (*T. officinale* var. *corniculatum* f. *glaucanthum*), взять въ ущельи Агачъ-артъ, т. е. въ Алайскомъ хребтѣ. — 1892. Карасу (*Назаровъ!*). — 1901. На сырьемъ лугу у Памирского Поста, 12.650', 14. VII. въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Ша-диканомъ, 12.650—12.400', 12. VII. въ пл.; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 5. VIII. въ пл.; на болотныхъ кочкиахъ между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.500—13.100', 17. VII. въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и

урочищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VII. пл.; между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизыль-артъ 10. VIII. цв. (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Сассыкъ-куль (*Tulinoevo*!).

var. *dissectum* (Ledb.) — *Taraxacum dissectum* Ledb. Fl. Ross. II. p. 814, № 7.

Указ. для Памира: О. Федченко, Раст. Памира, № 132.

1901. Собраний одинъ экземпляръ, между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.000', 16. VII. съ незрѣлыми плодами (Б. и О. Федченко!!).

Э. Регель относить *T. dissectum* Ledb. къ *T. officinale* Wigg. var. *palustre* Rgl., но наше растеніе очень отличается отъ var. *palustre* по своимъ сильно разрѣзнымъ и мохнатымъ листьямъ; правда, носикъ у него короче сѣмянки, чѣмъ оно отличается отъ *T. dissectum* Ledb. и ближе подходитъ къ *T. lyratum* DC., но это зависить, вѣроятно, отъ незрѣлого состоянія плодовъ на нашемъ экземпляре.

var. *palustre* (DC.) Rgl. — *Taraxacum palustre* DC., *Ledb.* Fl. Ross. II. p. 815, № 10. — *T. officinale* Wigg. var. *lividum* Koch, *Boiss.* Fl. or. III. p. 788, № 3. — *T. officinale* var. *parvula* Hook. Fl. of Br. Ind. III. p. 401, № 1.

Указ. для Памира: *Duthie Alcock's* pl., p. 24, № 55 (*T. officinale* var.). — О. Федченко, Растенія Памира, № 132.

1878. Перевалъ Кизыль-артъ, 22. VII. цв. (*Kushakovichъ*!). — 1892. Рангъ-куль, (*Nazarovo*!). — 1895. На сырой песчаной почвѣ, 13—14.000'. Памирское растеніе карликовое, съ очень узкими листьями (Alcock; non vidi). — 1901. Между озеромъ Кара-куль и Мусколомъ, на луговинахъ вдоль ручьевъ, 13.400—14.000', 6. VII. цв.; на берегу рѣчки въ урочищѣ Чичикты, 12.750', 9. VII. цв.; на сырыхъ лугахъ по берегу Мургаба, между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 15. VII. въ цв. и пл.; между озеромъ Сассыкъ-куль и урочищемъ Чатыръ-ташъ, 13.540—13.100', 3. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!). Цвѣты желтые.

Геогр. распр. вида: а) г. Актау и Каркараны въ Джунгаріи, Ташкентъ, Самаркандъ, Бухара, Фарангъ, Алайский хребетъ. — б) Умѣренный и холодный поясъ обоихъ полушарій, вся Европа, евр. Россія отъ арктической до южной, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Алтай, Байкалъ, Камчатка, островъ Уналашка, арктическая Америка, сѣв. Африка, Сирія, Персія, Белуджистанъ, Ливанъ, Афганистанъ, Китай, Корея, Монголія, Тибетъ.

var. *corniculatum*: а) Джунгарскія степи, Ташкентъ, горы и долина Заравшана, Алайскій хребетъ, Памиръ. — б) Кавказъ, Алтай, Монголія.

var. *dissectum*: а) Памиръ. — б) Восточная Сибирь.

var. *palustre*: а) Заравшанская долина, Алайскій хребетъ, Памиръ, Семипалатинская область. — б) Сѣверная, средняя и южная Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Красноярскъ, Камчатка, Гималаи 10—18.000', Тибетъ.

279. *Taraxacum leucanthum* Ledb. Fl. Ross. II. p. 815, № 9. — *Taraxacum bicolor* DC. Prodr. VII. p. 148.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8, № 131 ex parte (*Taraxacum* sp.). — О. Федченко, Растенія Памира, № 133.

1878. Перевалъ Кизыль-артъ, 14.017', 23. VII. пл.; берега озера Каракуль, 5. VIII. цвѣты (блѣлые) и молодые плоды; устье Узбилия въ Чонъ-су 6. VIII. цв. и пл. (*Kushakovichъ*!). — 1892. Акъ-байталъ (*Nazarovo*!). — 1899. Памиръ (*H. Вельманъ*!). — 1901. На южномъ склонѣ Кизыль-арта, 14.500', 3. VII. въ цв.; тамъ же на красной глини, 14.500', 10. VIII. въ цв.; на сырой луговинѣ и на склонахъ между Маркану и озеромъ Кара-куль, 13.100—13.400', 4. VII. въ цв. и пл.; на песчаныхъ холмахъ у озера Кара-куль, 5. VII. въ цв.; на бесплодной равнинѣ у рѣчки въ урочищѣ Чичикты, 9. VII. въ цв.; на болотистомъ лугу у Памирского Поста, 12.650', 10. VII. въ цв.; между Чатыръ-ташемъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540—13.100', по кочкиамъ солоноватыхъ болотъ, 17. VII. въ цв. и 3. VIII. въ пл.; на Акъ-Байталъ, на луговинѣ, 8. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!). Замѣчено также на лугахъ у озера Яшиль-куль, 12.500', 19. VII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Кизыль-артъ; р. Акъ-Байталъ, сырой лугъ; Чатыръ-ташъ (*Tulinoevo*!). — Цвѣты блѣлые, снаружи лиловые, мелкие.

Довольно обыкновенно на Памирѣ, на сырыхъ, солоноватыхъ лужайкахъ, гдѣ встрѣчается вмѣстѣ съ *Gentiana leucocelaena* Maxim. и *Gentiana prostrata* Haenke и производить впечатлѣніе маргаритокъ. Регель относить это растеніе къ *T. officinale* Wigg. var. *palustre*, съ которымъ, однако, въ живомъ состояніи оно не можетъ быть смѣшано.

Геогр. распр.: а) Джунгарія, Памиръ. — б) Алтай, Забайкалье, Даурія, Монголія, Тибетъ, Гималаи.

280. *Pterotheca bifida* (Vis.) Fisch. et Mey., Ind. IV. sem. h. petropol. p. 43.—*Ledb.*, Fl. Ross. II, p. 831, № 1.—*Lagoseris bifida* (Vis., Stirp. Dalim. p. 19, tab. 7, sub Trichocrepide) Boissier, Fl. Or. III, p. 881, № 1.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.

Указывается Франшие для перевала Талдыкъ въ Алайскомъ хребтѣ, и изъ числа памирскихъ растеній исключается.

Геогр. распр.: а) Тяньшань, степи Джунгаріи.—б) Ю. Россія, Крымъ, Кавказъ, Закавказье, Ураль, Греція, Єракія, Анатолія, Сирія, Аравія, Алеппо.

281. *Youngia diversifolia* Ledb., Fl. Ross. II, p. 837, № 7.—*Crepis tenuifolia* Willd. Sp. plant. III, p. 1605.—*Crepis tenuifolia* Willd. Hook. Fl. Br. Ind. III, 395, № 5.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 8, № 130 (*Crepis tenuifolia* W.).—О. Федченко, Растенія Памира, № 134.

1878. Карасу, у скаль, 29. VIII. пл. (*Кушакевичъ!*).—1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).—1901. Между Карасу и Чатыръташемъ, 13.100—14.300', 16. VII. зацвѣтающая и 4. VIII. въ цв. и пл. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Тарбагатай и Джунгарскій Алатау, Памиръ.—б) Ураль, Алтай, Байкалъ, вост. Сибирь, Даурія, Монголія, сѣв. Кашмиръ и зап. Тибетъ.

282. *Youngia flexuosa* Ledb., Fl. Ross. II, p. 838, № 4.

Указ. для Памира: Винклеръ въ Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 8, № 133 (*Chondrilla* sp.).—О. Федченко, Мат. фл. Пам., № 135.

1878. Сѣверные предгорья озера Карапуль, 30. VII; р. Аксу 31. VIII. цв. (*Кушакевичъ!*); Сукъ-чубыръ 7. VIII. (*Кушакевичъ!* и *Скорняковъ!*).—1888. Переваль Каликъ (*Громбескій!*).—1892. Яшиль-куль, Мургабъ (*Назаровъ!*).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. Собрана зацвѣтающая 11 и 14. VII. около Памирскаго Поста и 12. VII. между Памирскимъ Постомъ и Шаджаномъ; между Памирскимъ Постомъ и Карасу 15. VII. зацвѣтающая и 5. VIII. въ цв., и плодахъ; отъ Чатыръ-таша до Карасу, 13.540—14.000', 4. VIII. въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и уроцищемъ Гурумды, въ горномъ ущельи, около 13.400', 7. VIII. въ цв.; отъ озера Карапуль до перевала Кизиль-артъ, 13.400—14.500', 10. VIII. въ

цв. (Б. и О. Федченко!!).—Растеть на каменистыхъ склонахъ горъ и въ оврагахъ. Цвѣты желтые.

var. *gigantea* C. Winkl.

1901. Между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 5. VIII. въ цв. и пл., вмѣстѣ съ типической формой (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Горы Заравшана, Шугнанъ, Тяньшань, оз. Балхашъ, Памиръ.—б) Гималаи, Тибетъ, Монголія.

283. *Youngia rupestris* Ledb., Fl. Ross. II, p. 838, № 5.

Указ. для Памира: О. Федченко, Раст. Памира, № 136.

1901. На сланцевыхъ розсыпяхъ на южномъ склонѣ перевала Акъ-байталъ, 15.000', 8. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты желтые.

var. *purpurea* C. Winkler.

1878. Кокъ-сай, 31. VII. въ цв. (*Скорняковъ!*); Касть-артъ, 2. VIII. въ цв. (*Козловскій!*); Памиръ-Харгоши, 31. VII. въ цв. (*Кушакевичъ!* и *Скорняковъ!*).—1901. На сланцевыхъ розсыпяхъ на южномъ склонѣ перевала Акъ-байталъ, 15.000', 8. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты пурпуровые.

Геогр. распр.: а) Памиръ, Тяньшань.—б) Алтай, Байкалъ, восточная Сибирь, озеро Косоголь въ Монголіи.

284. *Mulgedium tataricum* (L.) DC.—*Sonchus tataricus* Linne, Mant. p. 572.—*Mulgedium tataricum* DC., Prodr. VII, p. 248.—*M. tataricum* DC. Ledb., Fl. Ross. II, p. 842, № 6.—*M. tataricum* DC. Boiss., Fl. Or. III, p. 799, № 1.—*Lactuca tatarica* C.A. Mey., Encycl. Pl. Cauc. 56.—*L. tatarica* CAM., Hook. Fl. of Br. Ind. III, p. 406, № 10.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 8, № 129 (f. *pumilum* B. Fedtsch.).—О. Федченко, Растенія Памира, № 137.

1878. Аксу, 16. VIII. цв.; Аличуръ, 22. VIII. цв.; Яшиль-куль, у озера, 24. VIII. цв. (*Кушакевичъ!*).—1901. Между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!). Цвѣты голубые.

f. *pumilum* B. Fedtsch.

1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*).

Геогр. распр.: а) Долина и горы Заравшана, Бухара, Шугнанъ, Фергана, Тяньшань, Джунгарскій Алатау, Балхашъ, Памиръ.—б) Средняя и южная Европа, Босфоръ, средняя и южная Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Сибирь, Майджурія, Китай, западный Тибетъ, сѣв. Индія.

Семейство *Campanulaceae* не имѣетъ представителей на Памирѣ: *Campanula glomerata* L., въ гербаріи Бржезинскаго собрана имъ 26. VII. 1891 въ цв. на р. Суксуратъ, т. е. уже въ предѣловъ Памира. *Glossocomia clematidea* Schrenk (= *Wahlenbergia clematidea* Schrenk—*Codonopsis ovata* Benth.) въ гербаріи Н. Вельманъ! 1899 г. взята ею, вѣроятно, по пути на Памирь, въ Алайскомъ хребтѣ, гдѣ и мы собирали это растеніе въ 1901 г. (на Чигирчикѣ).

Caprifoliaceae и *Pyrolaceae* на Памирѣ также не встрѣчаются; только у истоковъ р. Кизыль-су, т. е. уже на сѣверномъ склонѣ Заалайскаго хребта, собраны Скорняковымъ 26. VII. 1878 г. *Lonicera hispida* Pall. и рѣдкая въ Туркестанѣ *Pyrola rotundifolia* L., которую я собирала въ 1871 г. въ Алайскомъ хребтѣ; а Б. А. Федченко и мною въ 1901 г. при самомъ подъемѣ на перевалъ Кизыль-артъ, но также еще на сѣверномъ склонѣ его, собрана карликовая *Lonicera Olgae* Rgl. et Schmalh.

XXVI. Lentibularieae.

285. *Utricularia vulgaris* L. ?—*Linne*, Sp. pl. ed. I p. 18.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 1 № 1.—*Boiss.*, Fl. Or. IV. p. 4 № 3.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 138.

1901. Въ ямахъ съ водой на болотистомъ лугу близъ Памирского Поста, 12.650', 10. VII (Б. и О. Федченко!!). Безъ цветовъ, поэтому видъ не можетъ быть опредѣленъ съ достовѣрностью.

Геогр. распр.: а) Долина Заравшана, Джунгарія, Памирь.—б) Вся Европа и Европейская Россія, Ураль, Киргизская степь, Кавказъ, Сибирь, сѣв. Африка и Сѣв. Америка.

XXVII. Primulaceae¹⁾.

286. *Primula farinosa* L.—*Linne*, Sp. plant. ed. I p. 143.—*Ledebour*, Fl. Ross. III p. 13, № 10.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. III p. 486, № 15.

Указ. для Памира: О. Федченко, растенія Памира, № 140. var. *algida* (Adam) Trautv.

¹⁾ *Primula* и *Androsace*, собранныя Б. и О. Федченко, обработаны Leo Derganc.

1878. Перевалъ Кизыль-артъ, на южной сторонѣ у вершины, 22. VII въ цв. (*Кушакевичъ!*).

Среди этихъ растеній есть экземпляры съ совершенно зелеными, со слабо окрашенными, и съ темно-лиловыми зубцами чашечки.

Кромѣ того, есть въ гербаріи Спб. Бот. Сада одинъ экземпляръ съ этикеткой, писанной Винклеромъ „Pamir 2—5 VIII. 1878, Kuschakewicz“!; зубцы (и кили) чашечки у него очень темные, совершенно такие, какъ у растеній, собранныхъ Кушакевичемъ 15. VII 1878 г. на перевалъ Арчата въ Алайскомъ хребтѣ.

1901. На южномъ склонѣ перевала Кизыль-артъ 14.610—14.000', 3. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). Листья съ нижней стороны мало мучнистые.

var. *armena* C. Koch forma *albo-farinosa* Kusnez.

1878. По дорогѣ къ рѣкѣ Карасу 28. VIII и у рѣки Карасу, въ среднемъ ея течениі, 29. VIII (*Кушакевичъ!*).—1901. Между Карасу и Чатыръ-ташемъ, на альпійскихъ лужайкахъ ниже перевала Найзаташъ, 13.800', 16. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). (Форма съ сильнымъ мучнистымъ налетомъ на чашечкахъ и на нижней сторонѣ листьевъ).

var. *armena* C. Koch, forma *Nazarensis* Derganc.

„Отличается отъ предыдущей формы совершенномъ отсутствіемъ мучнистаго налета и вѣнчикомъ, напоминающимъ нѣсколько *Primula algida*. Прицвѣтки узко-линейные, короткие, нѣсколько превышающіе очень короткія цветоножки соцвѣтія, скученіаго въ головку. Трубка вѣнчика не выдается изъ чашечки; верхняя часть и зубцы чашечки фиолетовые или чернофиолетовые. Повидимому, новая, конечная форма *Primula farinosa* var. *armena*“ (Leo Derganc, ms.).

1901. Въ уроцищѣ Маркансу, 13.100', 3. VII въ цв.; между Ходжа-Назаромъ и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).

Этотъ же видъ замѣченъ нами на солонцеватомъ кочкарномъ лугу между уроцищемъ Чатыръ-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540—13.100', вмѣстѣ съ *Primula sibirica* Jacq., 17. VII. 1901 г. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты розовые.

Геогр. распр.: а) Тянь-шань, Памиро-алай (Туркестанскій и Алайскій хребты, Памирь).—б) Ев-

ропа и Европейская Россия, Кавказъ, Алтай, Байкалъ, Даурія, Зап. Тибетъ, Арктическая Америка.

287. *Primula auriculata* Lamk.—*Lam.* It. I p. 429 № 1931.—*Lebedour*, Fl. Ross. III p. 11. № 8.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins p. 347.

Указывается Франше (l. c.) для перевала Таңдыкъ, т. е. для Алайского хребта, а не Памира.

Геогр. распр.: а) Джунгарский Алатау.—б) Кавказъ, Малая Азія, Алтай, Китай.

288. *Primula sibirica* Jacquin.—*Jacquin*, Miscell. Austr. I, (1778) p. 161.—*Lebedour*, Fl. Ross. III p. 14 № 12.—*Hooker*, Fl. Br. Ind. III p. 487 № 19.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.—Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8 № 141.—*Duthie*, Alcock's pl. p. 24 № 58.—О. Федченко, Растенія Памира, № 141.

1878. Каракуль 27. VII (*Кушакевичъ!*); Каракуль, по берегамъ озерковъ, по сазамъ, 5. VIII (*Кушакевичъ и Скорняковъ!*); устье Узъ-бия въ Чонъ-су 6. VIII, Суокъ-Чубыръ (Памиръ-Харгоши) 7. VIII, верховья Акъ-Байтала 9. VIII, Раңгъ-куль 14. VIII, Карасу 29. VIII (*Кушакевичъ!*). Южная часть озера Малаго Каракуля, 5. VIII (*Скорняковъ!*). Акъ-Байталь 15. VII (*Ашурбаевъ!*)—1891. Р. Аксу 18. VII; р. Мургабъ, 17. VII (*Бржезицкий!*¹⁾).—1892. Карасу, Мургабъ, Раңгъ-куль, Акъ-Байталь (*Назаровъ!*).—1893. Ша-джанъ (Poncins; non vidi).—1895. Яшиль-куль, Чакмактынъ-куль, 26 и 27. VI (*Богоявленский!*).—1895. Очень обыкновенна по р. Аксу и ее притокамъ (Alcock, non vidi).—1899. Памиръ (*H. Велманъ!*)—1901. Въ уроцищѣ Маркансу, 13.100', 3. VII въ цв.; на болотистыхъ мѣстахъ на берегу озера Карап-куль, 13.400', вмѣстѣ съ *Pedicularis uliginosa* Bge., 5. VII въ цв.; на болотистомъ лугу по р. Мургабъ близъ Памирского Поста, 12.650', 10, 11 и 14. VII въ цвѣту; на солонцеватомъ кочкарномъ лугу между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.540—13.100', и на кочкарномъ болотѣ на самомъ берегу озера Сассыкъ-куль, 13.100', 17. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!).—Замѣчена также въ солонцеватой долинѣ на Мусколѣ, 14.100', 6. VII; на луговинѣ у рѣки Акъ-Байталь у уроцища Гу-

¹⁾ На этикеткѣ, очевидно по ошибкѣ, стоитъ: „р. Нургабъ, 17. VI“. (Указывается также Бржезицкимъ, на этикеткѣ гербарія, для р. Ка-ра-чукуръ).

румды, 14.000', 9. VII; на лугахъ по берегу озера Яшиль-куль, 12.500', 9. VII (Б. и О. Федченко!).—1901. Карап-куль, солончаки; Мургабъ, сырьи луга (*Тулиновъ!*).—Цвѣты розовые.

Самый обыкновенный на Памирѣ видъ этого рода; встречается иногда сплошными группами, образуя во время цветенія красивыя розовые пятна на сырьихъ лужайкахъ.

Геогр. распр.: а) Горы Заравшана, Алай и Алайский хребеть, Тянь-шань, Памиръ.—б) Арктическая Норвегія и арктическая и сѣверная Европейская Россія (Кола, Лапландія, Земля Самоѣдовъ, Архангельская губ.), Алтай, Байкалъ, Восточная Сибирь, Даурія и Камчатка, Западный Тибетъ, Гиндукушъ, сѣверная и арктическая Америка.

289. *Primula nivalis* Pall.—*Pallas*, Reise durch versch. Prov. d. Russ. Reichs, III Theil, Anhang p. 723.—*Lebedour*, Fl. Ross. III p. 10 № 5.—*Boiss*, Fl. Or. IV p. 27 № 13.—*Primula Stuartii* Wall., *Hooker*, Fl. of Br. Ind. III p. 490.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 24 № 59 (P. Stuartii Wall. var. *purpurea*).—О. Федченко, Растенія Памира № 139 (var *turkestanica*).

var. *purpurea* (Royle) *Rgl.* in Acta H. Petrop. III p. 137.

1895. На высотѣ около 15.000', у тающаго снѣга (Alcock; non vidi).

var. *turkestanica* *Regel* in „Путешествіе въ Туркестанъ“ А. П. Федченко“ вып. 12 p. 8 tab. V.

forma *glabrata* O. Fedtsch.—foliorum laminâ subtus pedicellisque farinâ destitutis.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 141.

1901. Близъ перевала Кой-тезекъ и на самомъ перевалѣ, на альпийскихъ лужайкахъ, 14.500—15.100', 20. VII въ цвету и 1. VIII въ цвету и плодахъ (Б. и О. Федченко!).

forma *farinosa* Schrenk—foliorum laminâ subtus pedicellisque farinâ parce adspersis.

1901. Вмѣстѣ съ предыдущей формой (Б. и О. Федченко!).

Цвѣты малиновые.

Геогр. распр.: а) Джунгарский Алатау, Тяньшань, Памиръ.—б) Кавказъ, Сибирь, арктическая Америка, Гималаи, Тибетъ, Китай.

290. *Androsace villosa* L. Sp. pl. ed. I p. 142.—*Lebedour*, Fl. Ross. III p. 17 № 6.—*Boiss*, Fl. Or. IV p. 13 № 1.—*Hooker*, Fl. of Br. Ind. III p. 499 № 10.

Указ. для Памира: *B. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 8 №№ 139 и 140 (*Androsace villosa* и *A. chamaejasme*). — *O. Федченко*, Растения Памира № 142 (var. *dasyphylla* (Bge.) Kar. Kir.

var. *typica* Trautv.

1878. Памиръ-Харгопи, 6. VIII (*Ашурбаевъ!*). — 1891. Озеро Рангъ-куль, 15. VII (*Бржезицкий!*; имъ же указывается, на этикеткѣ гербарія, для р. Акъ-Байталъ, р. Бенкъ, р. Вахдиръ, р. Памиръ, р. Аличуръ; р. Балундъ-кінкъ и р. Ваханъ-дары, до 17.000'). — 1892. Озеро Большой Каракуль; Карасу (*Назаровъ!*).

var. *dasyphylla* (Bge.) Kar. Kir. — *Karelin et Kirilow* in Bull. Soc. Moscou XV (1842) p. 249. — *A. dasyphylla* Bunge in Ledb. Fl. alt. I p. 218. — *A. dasyphylla* Bge., Ledb. Fl. Ross. III p. 16 № 3. — *A. villosa* var. *dasyphylla* Duby in DC. Prodr. VIII (1844) p. 50.

1892. Акъ-Байталъ, въ цв. (*Назаровъ!*). — 1895. Зоркуль, 11. VII въ цв. (*Богоявленскій!*). У экземпляра Богоявленского но два цвѣтка на стрѣлкѣ. — 1901. На южномъ склонѣ перевала Кизыль-артъ, 14.700—14.500', 10. VIII цв. и пл. (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Переваль Кизыль-артъ; Акъ-Байталъ, у подошвы (*Тулиновъ!*).

Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: а) Джунгарский Алатау, Тяньшань, альпійская область Заравшана и Алайскаго хребта. — б) Горы Европы, Крымъ (г. Чатырдагъ), Кавказъ, Малая Азія, Сибирь, Сѣверная Америка, Китай; Монголія, Тибетъ, западные Гималаи, Афганистанъ, сѣверная Индія.

291. *Androsace chamaejasme* Host, Syn. 95. — Boiss. Fl. Or. IV p. 14 № 2. — Hook., Fl. of Br. Ind. III p. 499 № 12. — *A. chamaejasme* Koch, Syn. p. 584. — Ledb., Fl. Ross. III p. 18 № 7.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347. (*A. chamaejasme* Koch).

1893. Кизыль-артъ (*Poncins*; non vidi).

Геогр. распр.: а) Алайскій хребетъ (альпійская область: ледникъ Караказукъ, морены, переваль Кавукъ), Тяньшань, Джунгарский Алатау. — б) Альпы Европы и арктическая Европейская Россія (Земля Самоѣдовъ), альпійская область Кавказа и всей Сибири, сѣверная Америка, Тибетъ, Китай.

292. *Androsace akbaitalensis* Leo Dergane n. sp. in O. Федченко, Растенія Памира № 143 („Мат. къ позн. фл. и фауны Россіи“, бот. вып. 5, печатается).

Указ. для Памира: *O. Федченко*, l. c.

Folia parva, juniora rosulas globosas, adulta erecto-patulas formantia, ovato-oblonga vel subspathulata, rigida, laete-viridia, margine et lamina utrinque pilis brevissimis albicantibus obtecta; involucri phylla linearia vel oblonga, etiam in planta fructifera pedunculos superantia vel eis aquilonga; umbella multiflora; calycis non profunde partiti laciniis obtusis; corollae albae lobis obovatis obtusis; scapi, involucri phylla, calyces extus et pedunculi villosi.

1901. На сѣверномъ склонѣ у перевала Акъ-Байталъ, на берегу рѣчки, 14.400', 7. VII въ цв.; между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.300', 16. VII въ цв.; выше перевала Акъ-Байталъ до 16.400', 8. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). — Замѣчена также на щебниевыхъ розсыпяхъ выше перевала Кої-тезекъ, до 16.000', 20. VII въ цвѣту (Б. и О. Федченко!!). — Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: Памиръ.

293. *Cortusa Matthioli* L. — Linne, Sp. pl. ed. I p. 144. — Ledb. Fl. Ross. III p. 22 № 1. — Hooker, Fl. of Br. Ind. III p. 501.

var. *glabrata* Borb as in „Oesterr. Botan. Zeitschr.“ XXXIX. 1889. p. 144.

1891. Р. Аксу, 18. VII въ цв. (*Бржезицкий!*); на этикеткѣ гербарія указывается имъ также для р. Кара-чукуръ, р. Вахдиръ, р. Памиръ, р. Аличуръ, р. Марджанай и р. Ваханъ-дары.

Геогр. распр.: а) Памиро-алай (Басмандинское ущелье, Аучи-дагана, горы Заравшана, Алайскій хребеть), Тяньшань. — б) Кашмиръ, Афганистанъ, альпы Европы, сѣв. Азія, Сахалинъ, Закавказье, Китай.

294. *Glaux maritima* L. — Linne, Sp. pl. ed. I p. 207. — Ledb. Fl. Ross. III p. 23 № 1. — Boiss., Fl. Or. IV p. 7 № 1. — Hooker, Fl. of Br. Ind. III p. 505.

Указ. для Памира: *B. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. № 8; *O. Федченко*, растенія Памира № 144.

1878. Алла-Байталъ 4. VIII (*Кушакевичъ!*). — 1892. Яшилькуль (*Назаровъ!*). — 1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*). — 1901. На болотистомъ лугу у Памирского Поста, 11 и 14. VII въ цв.,

12.650', между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—1901. Мургабъ, сырьи луга; ледниковые холмы передъ Сассыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!*).—Цвѣты розовые.

Геогр. распр.: а) Джунгарія, Тяньшань, Алай и Алайский хребетъ, Заравшанская долина.—б) Сѣв. и средняя Европа и Европейская Россія, вся Сибирь, прибрежье Чернаго и Каспійскаго морей, сѣверная Персія, Тибетъ, Монголія, сѣв. Китай и Японія, Сѣв. Америка.

295. *Lysimachia dubia* Ait., h. kew. I p. 199. — *Ledb.*, Fl. Ross. III p. 26 № 1.—*Boiss.*, Fl. Or. IV p. 8 № 2.

1878. Каръ-артъ 2. VIII (*Козловскій!*).

Геогр. распр.: а) Заравшанская долина.—б) Сирія, Месопотамія, Закавказье, сѣв. Персія. Въ Европѣ рѣдко (Евбей, Фракія).

XXVIII. Gentianaceae.

296. *Gentiana falcata* Turcz.—*Turcz.*, Cat. Baikal. № 783.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 55 № 10.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8 № 142.—О. Федченко, Растенія Памира № 145.

1892. Кизыль-артъ (*Назаровъ!*).—1895. Андеманынъ, 25. VI въ цв. (*Богоявленскій!*).—1901. Между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, 12.500—13.800', 19. VII въ цв.; между уроцищемъ Ходжа. Назаръ и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII въ цв. и на самомъ перевалѣ, 15.100', 1. VIII въ цв.; на перевалѣ Акъ-Байталъ, 14.500—15.500', 8. VIII въ цв., и у подошвы перевала Кизыль-артъ, на сырой лужайкѣ, вмѣстѣ съ *Swertia marginata* Schrenk, 10. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Замѣчена также на глинисто-каменистыхъ склонахъ на южной сторонѣ перевала Кизыль-артъ, 14.000—14.500', и на алпійскихъ лужайкахъ выше перевала Кой-тезекъ до 16.000', 20. VII (Б. и О. Федченко!!).—1901. Перевалъ Кизыль-артъ; р. Акъ-Байталъ (*Тулиновъ!*).—Цвѣты синіе.

Одно изъ красивѣйшихъ растеній Памира и наиболѣе распространенный тамъ изъ видовъ рода *Gentiana*.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Тяньшань, алпійская область Алайскаго хребта.—б) Байкалъ, Тибетъ.

297. *Gentiana rugosa* Rgl. et Schmalh. (non Clarke). Регель, описание новыхъ видовъ собр. О. А. Федченко (Путешествіе въ Туркест. А. И. Федченко, вып. 18 р. 54).

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира № 146.

1901. Между уроцищемъ Чичикты и уроцищемъ Гурумды, 12.750—14.000', на луговинахъ вдоль ручья, 7. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты мелкие, бѣлые.

Геогр. распр.: Альпійская область Алайскаго хребта (Малый Алай), Памиръ, Тяньшань.

298. *Gentiana umbellata* M.B. Fl. taur.-cauc. III p. 188.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 58 № 16.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8 № 145. О. Федченко, Раст. Пам. № 147.

1878. Карасу, у поворота, гдѣ скалы, 29. VIII (*Кушакевичъ!*).—1892. Карасу (*Назаровъ!*).—1901. Между Карасу и Памирскимъ Постомъ 13.100—12.650', 5. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты лиловые.

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Джунгарскій Алатау, горы Заравшана (Анзобъ на р. Ягиобъ) и Алайский хребетъ, Памиръ.—б) Алтай, Кавказъ.

299. *Gentiana barbata* Fröl., Gentian. p. 114.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 59 № 19.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8 № 144. О. Федченко, Раст. Пам. № 148.

1892. Карасу, Аличуръ (*Назаровъ!*).—1901. Въ уроцищѣ Джаманталь на р. Карасу 15. VII и 5. VIII въ цв.; въ уроцищѣ Ходжа-Назаръ, на берегу ручья, 13.800', 19. VII въ цв.; между Памирскимъ постомъ и уроцищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты синіе.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Тарбагатай, Тяньшань, Шугнанъ, Алай и Алайский хребетъ.—б) Ураль, Алтай, Байкалъ, Вост. Сибирь, Даурія.

Гукерь не отличается этого вида отъ слѣдующаго.

300. *Gentiana detonsa* Rottb. in Act. hafn. 10 p. 435, t. 1, f. 3. — *Ledebour*, Fl. Ross. III p. 59 № 20. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV p. 118 № 35.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 24 № 61.

1895. Въ травѣ, на открытыхъ местахъ Памира 13.000—14.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.: Арктическая Россия, Алтай, Маньчжурія, Китай, съв. Кашмиръ, зап. Тибеть, съв. Америка.

301. *Gentiana leucomelaena* Maxim. in Diagn. pl. nov. Asiat. VIII p. 33.—*Kusnez.*, in „Mél. Biol.“ XIII p. 175.—*Кузнецовъ*, Подродъ *Eugentiana* p. 234 № 109 („Труды Сиб. Общ. Ест.“ XXIV, 1894).

Указ. для Памира: *O. Федченко*, Раст. Пам. № 149.

1901. На кочкахъ болотистаго луга у Памирскаго Поста, 12.650', 11, 13 и 14. VII въ цв.; въ урошищѣ Ша-джанъ, на болотныхъ кочкахъ у р. Мургабъ, 12.450', 13. VII въ цв.; между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VII въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*).—1901. Мургабъ, сырье луга и песчаный лугъ (*Тулиновъ!*).—Цвѣты бѣлые, снаружи съ темными полосами.

Геогр. распр.: а) горы Заравшана, Памиръ, Тянь-шань.—б) Монголія, Нань-шань, съверный Китай, Куэнь-луинъ, Тибеть, западный Тибеть.

302. *Gentiana prostrata* Haenke in Jacq. Collect. II p. 66 t. 17 f. 2. — *Ledb.*, Fl. Ross. III p. 62 № 25. — *Boiss.*, Fl. Or. IV p. 72 № 8.—*Кузнецовъ*, Подродъ *Eugentiana*, p. 221 № 106 („Тр. Спб. Общ. Ест.“ XXIV, 1894).

Указ. для Памира: *Кузнецовъ*. I. с. р. 225. — *Duthie*, Alcock's pl. 24 № 60.—*Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 8 № 143.—*О. Федченко*, Раст. Памира № 150.

1878. Акъ-Байталъ¹⁾ 9. VIII пл. (*Кушакевичъ!*).—1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).—1895. На сырой почвѣ, въ травѣ, въ открытыхъ мѣстахъ Памира, 13.000—14.000' (Alcock; non vidi).—1899. Памиръ (*Н. Вельманъ!*; var. *genuina*).—1901. Въ урошищѣ Чичикты, 12.750', на каменистой пустынной равнинѣ 9. VII въ цв.; между Чатыръ-ташемъ и озеромъ Сассыкъ-куль, на лугахъ по Аличуру, 13.540—13.100', 17. VII и 3.VIII въ цв.; между озеромъ Яшиль-куль и урошищемъ Ходжа-Назарь, 12.500—13.800', 19. VII въ цв.; между Ходжа-Назаромъ и переваломъ Кої-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и урошищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*)—Цвѣты синіе.

¹⁾ Другая мѣстность, гдѣ собирались въ 1878 г. Кушакевичъ! и которую приводитъ Кузнецовъ (I. с.): „устье Кизыль-арта у Алай“, лежитъ въ предѣловъ Памира.

Встрѣчается на болотистыхъ кочкахъ, въ такихъ же мѣстахъ, какъ *G. leucomelaena* Maxim., и часто вмѣстѣ съ нею. var. *Karelini* (Griseb.) Kusnez.

Указ. для Памира: *Кузнецовъ*, I. с. р. 227.

1878. Предгорья озера Карапуль, 30. VII цв. (*А. Кушакевичъ и Ю. Ашурбаевъ!*)!

Геогр. распр.: а) Тянь-шань, Джунгарскій Алатау, горы Заравшана, алтайская область Алайскаго хребта.—б) Альпы Европы, Алтай, Байкалъ, Монголія, Китай, Тибеть, Афганистанъ, Кашгарія, съверная и южная Америка.

303. *Gentiana aquatica* L.—*Linné*, Sp. plant. ed. I p. 229.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 62 № 27.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV p. 110 № 7.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.

Указывается Франции для перевала Талдыкъ, т. е. Алайскаго хребта, а не Памира.

Геогр. распр.: а) Джунгарія.—б) Ураль, Алтай, Байкалъ, Даурія, Монголія, Китай, Кашмиръ, Тибеть и западный Тибеть.

304. *Gentiana tianschanica* Rupr.—*Osten-Sacken* et *Ruprecht*, Sertum tianschanicum, p. 61.

var. *glomerata* Kusnez. forma integricalyx.—*Kusnez.*, Subg. Eugent. Kusn. („Acta Horti Petrop.“ XV, 2 p. 305—308).—*Gentiana Regeli* Kusnez. var. *glomerata* Kusnez.—*Кузнецовъ* „Подродъ *Eugentiana* Kusn. рода *Gentiana* Tournef.“, р. 161.

Указывается Кузнецовымъ въ герб. Имп. Бот. Сада для „перевала“ Кизыль-артъ, но на подлинной этикеткѣ Кушакевича: „ущелье Кизыль-артъ“! (слѣдовательно не Памиръ). Здѣсь же вѣроятно собранъ экземпляръ, находящійся въ гербаріи Н. Вельманъ! 1899 года.

var. *intermedia* (подродъ *Eugentiana* p. 160) указывается Кузнецовымъ для „перевала“ Кизыль-артъ „у Бордабы“, слѣдовательно тоже на съверномъ (алайскомъ) склонѣ.

Геогр. распр.: а) Тянь-шань.—б) Тибеть, Гималаи.

305. *Gentiana Kaufmanniana* Rgl.—*Regel*, Descr. pl. nov. fasc. VII № 50 (in „Acta Horti Petrop.“ VI p. 331).

Указ. для Памира: *Кузнецовъ*, подродъ *Eugentiana*, p. 173.—*Kusnezow*, Subg. Eugentiana, p. 318.—*Franchet*, pl. Poncins, p. 347 (*G. Kaufmanniana* Rgl.?).

1878. Каръ-артъ¹⁾ (Козловскій; non vidi). 1893. Караджилыг (Poncins; non vidi).

Геогр. распир.: а) Алайский хребетъ (Малый Алай), Заалайский хребетъ (ущелье Кизылъ-артъ), Юлдузъ, Тяньшань, Джунгарский Алатау.—б) Афганистанъ (var. *afghanica* Kusnez.).

306. *Gentiana Olgae Rgl. et Schmalh.* in „Путешествие въ Туркестанъ А. П. Федченко,” вып. 18, р. 55 № 126.

Указ. для Памира: Кузнецова, подродъ *Eugentiana*, р. 166 № 80.

1891. Маз. Базай-и-Гумбезъ 24, VII (*Бржезинскій!*; имъ же указывается, на этикеткѣ гербарія, для р. Каинды и р. Аксу, до 14.000').

Указание Кузнецова (l. c.) не вполнѣ точно.

Геогр. распир.: Алай, Заалайский и Алайский хребты, Ферганы (Наманганскій уѣздъ).

307. *Pleurogyne carinthiaca* (Wulf.) Griseb. — *Griseb. Gentian.* p. 310. — *Ledb. Fl. Ross.* III p. 71 № 2. — *Boiss., Fl. Or.* IV p. 77 № 1. — *Hooker, Fl. of Br. Ind.* IV p. 120 № 1.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl., p. 24 № 62 (*Pleurogyne* sp.). — О. Федченко, Растенія Памира, № 151.

1878. Памиръ-Харгоши 30. VII; среднее теченіе Акъ-Байтала 10. VIII; Карасу, у поворота, гдѣ скалы, 29. VIII цв. и пл. (*Кушакевичъ!*).—1888. На перевалѣ Каликъ 12. VIII въ цв. (*Громбечевскій!*).—1895. Обыкновенно на сырыхъ мѣстахъ, въ травѣ, до 15.000' (Alcock; non vidi).—1901. Въ уроцищѣ Ходжа-Назаръ, на берегу ручья, 13.800', 19. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и уроцищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).

Цвѣты у крупныхъ экземпляровъ синевато-блѣлые, съ темными полосами снаружи, у болѣе мелкихъ — синіе. Вѣничекъ 5-ти-раздѣльный.

Геогр. распир.: а) Тарбагатай, Тяньшань, Шугнанъ, горы Заравшана, Алайский хребетъ, Памиръ.—б) Альпы

¹⁾ Изъ двухъ другихъ мѣстностей, которыхъ приводитъ Кузнецова, Караколь — къ Памиру уже не относится и собирались на немъ (23. VII. 1878 г.) Скориковы!, а не Кушакевичъ; къ „перевалу“ Кизылъ-артъ онъ, вѣроятно, пріурочиваетъ растенія, собранныя Кушакевичемъ „въ средней части ущелья Кизылъ-артъ“, гдѣ оно „растетъ въ изобилии“, 22. VIII. 1878 г. въ цв.

Европы, Кавказъ, Уралъ, Алтай, Байкалъ, вост. Сибирь, Даурія, Камчатка, Западные Гималаи, Западный Тибетъ, Афганистанъ.

308. *Pleurogyne Thomsoni* C. B. Clarke. — *C. B. Clarke in Hook. Fl. of Br. Ind.* IV p. 120 № 2.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl. p. 24 № 63.

1895. Во множествѣ, въ травѣ на сырватой песчаной почвѣ, 13.000—14.000', (Alcock; non vidi).

Геогр. распир.: Западный Тибетъ 15.000—18.000'.

309. *Pleurogyne brachyantha* Clarke in Hook. Fl. of Br. Ind. IV p. 120 № 3.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 152.

1901. Между Карасу и Памирскимъ постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).

Цвѣты синевато-блѣлые, снаружи съ широкими темными полосами; вѣничекъ 4-раздѣльный.

Геогр. распир.: а) Памиръ.—б) Внутренний и западный Тибетъ, Каракорумъ.

310. *Swertia marginata* Schrenk in Bull. d. l'Acad. d. sc. d. St. Pétersb. X, p. 353. — *Ledb., Fl. Ross.* III, p. 75, № 4.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl., p. 25, № 64 (*Swertia* sp.) — Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8, № 146. — О. Федченко, Раст. Памира, № 153.

1878. Вершина перевала къ Карапулью, Уй-булакъ, 24. VII цв. (низкорослая форма, но цвѣты крупные) (*Кушакевичъ!*); предгорья Каракульскихъ горъ, 27. VII; Памиръ-Харгоши: Карапуль, 30. VII (*Ашурабаевъ!*); съверная предгорья озера Карапуль 30. VII; Акъ-Байталь и верховья Акъ-Байтала 8. VIII; р. Чонъ-су 6. VIII; Раңгъ-куль 14. VIII. (*Кушакевичъ!*). — 1891. На перевалѣ Вахджиръ (Wakhjirui) на Маломъ Памирѣ (Young husband; non vidi — ex Duthie, *Swertia* sp.). — 1892. Аличуръ (*Назаровъ!*). — 1895. Зоркуль, 11. VII цв.; Коқъ-белесъ, цв.; Куртексе, цв. (*Боголюбенскій!*). — 1895. Обыкновенно на влажныхъ мѣстахъ до выс. не менѣе 15.000' (Alcock; non vidi, *Swertia* sp.) — 1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*). — 1901. У озера Карапуль, 13.400', 5. VII въ цв.; на сырыхъ лужайкахъ между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—13.800', на берегу рѣки и въ сырыхъ мѣстахъ 16. VII; между Памирскимъ Постомъ и уроцищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII въ цв.; на перевалѣ Акъ-Байталь, на лугови-

нахъ, и выше перевала, до 16.400', 8. VIII въ цв.; у подошвы перевала Кизыль-артъ, 14.000', на сырой луговинѣ, вмѣстѣ съ *Gentiana falcata* Turcz., 10. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Собрано также *Tulipanovыи*!, вѣроятно у перевала Кизыль-артъ. — Цвѣты блѣдно-синіе.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Памиро-алай (Заалайскій и Алайскій хребты), Алай, Иркенштамъ, Караколь, Моголь-тау.

XXIX. Cuscuteae.

311. *Cuscuta pedicellata* Ledb. Fl. alt. I, p. 293 т. 234.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8, № 154. 1892. Карасу (*Назаровъ!*).

Геогр. распр.: а) Горы Заравшана, Памиръ. — б) Сибирь, Китай.

312. *Cuscuta planiflora* Ten.? Syll. p. 128. — Engelm. Cusc. p. 14. — Boiss. Fl. Or. IV, p. 116 № 2.

var. *approximata* Eng.?

1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*; въ „Мат. фл. Пам.“ Б. Федченко пропущено).

Геогр. распр.: а) Джунгарія, горы Заравшанской долины, Ферганская область, долина Сыръ-Дары (Каракекская степь, Старый Ташкентъ), Шугнанъ, Памиръ. — б) Южная Европа и южная европейская Россія, Кавказъ, Сирія, Персія, Афганистанъ, Белуджистанъ, Западные Гималаи, Сирія, Египетъ, Канарскіе острова.

XXX. Boraginaceae.

313. *Macrotomia perennis* (DC.) Boiss. Fl. Or. IV, p. 212 in nota. — *Arnebia perennis* Alph. DC. Prodr. X, p. 95. — *A. perennis* DC. Ledb., Fl. Ross. III, p. 139, № 2. — *Macrotomia perennis*, Boiss. Hook., Fl. of Br. Ind. IV, p. 177, № 2. — *Macrotomia perennis* Boiss., Б. Федченко, Мат. для флоры Шугнана, p. 44, № 206. — *Macrotomia onosmoides* Rgl. et Smirnow, Regel, Descr. pl. nov. (Acta H. Petrop. V, 2, p. 624).

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins p. 347 (*Arnebia perennis*). — О. Федченко, Раст. Памира, № 154.

1878. Предгорья Кара-куля, 30. VII цв.; Акъ-Байталъ, 9. VIII цв.; р. Аличуръ — Сассыкъ-куль, 26. VIII послѣдніе

цв.; отъ Булунь-куля до Сассыкъ-куля 27. VIII цв. (*Кушакевичъ!*). (Есть также этикетка „Pamir, Kara-su, Kuschakewicz“, но почеркъ не его, и время сбора не указано). — Памиръ Харгоши: Кара-куль 30. VII цв. (*Ашурубаевъ!*). — 1895. Караджильга (Poncins; non vidi). — 1901. У озера Кара-куль, на сланицевыхъ скалахъ, 12.400—13.700', 5. VII въ цв.; на перевалѣ Акъ-Байталъ и между Акъ-Байталомъ и урочищемъ Гурумды 8. VII въ цв.; въ щебниевой пустынѣ между урочищемъ Ходжа-Назаръ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.800—13.100', 2. VIII въ цв.; между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII отцвѣтшія растенія (Б. и О. Федченко!!) — Цвѣты синіе.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Тяньшань. Шугнанъ. — б) Западные Гималаи и Западный Тибеть; Кабуль, Кашгаръ, Яркендъ.

314. *Arnebia guttata* Bunge, Ind. sem. h. Dorpat. 1840, p. VII. — Ledb., Fl. Ross. III, p. 139, № 3.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8, № 147. — О. Федченко, Растенія Памира, № 155.

1878. Предгорья озера Каракуль, съверная сторона 30. VII цв. (*Кушакевичъ!* и *Ашурубаевъ!*); Акъ-Байталъ 9. VIII въ цв. и 16. VIII въ цв.; Памиръ-Аличуръ 27. VIII цв.; Карасу 29 и 31. VIII, въ цв. и отцвѣти; Акъ-су 31. VIII (*Кушакевичъ!*). Туземное название: икликъ. — 1892. Мургабъ, Карасу (*Назаровъ!*). — 1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*). — 1901. Между озеромъ Кара-куль и Мусколомъ, 14.300', на сланицевомъ щебнѣ въ ущельи, 6. VII зацвѣтающій и 9. VIII въ цвѣту; между урочищемъ Чичикты и Памирскимъ Постомъ 12.750—12.650', 10. VII въ цв.; въ каменистой пустынѣ близъ Памирского Поста 11 и 14. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Шаджаномъ, 12.650—12.450', въ каменистыхъ оврагахъ, 12. VII въ цв.; между Карасу и Памирскимъ Постомъ 5. VIII въ цв. (нѣкоторые экземпляры съ болѣе узкими листьями — *soliis angustioribus*) (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Р. Мургабъ, осипы (*Tulipanovъ!*).

Цвѣты желтые, съ черными пятнами.

Геогр. распр.: а) Шугнанъ, Тяньшань, Памиръ. — б) Алтай:

315. *Stenosolenium saxatile* Turcz. in Bull. d. l. Soc. d. Nat. d. Moscou, 1840, p. 253. — Ledb. Fl. Ross. III p. 142, № 1. — *Arnebia saxatilis* Benth. et Hook. Gen. pl. II, p. 862.

Указ. для Памира: *Poncins*, Chasses et explorations dans la région des Pamirs, Paris, 1897, p. 257.

1893. Ша-Джанъ (*Poncins*, l. c.; non vidi). Вънчики липовые.

Вѣроятно, это указание относится къ предыдущему виду (*Arnebia guttata*), который Кушакевичъ, Назаровъ и мы собирали въ этой мѣстности, посѣщенной нами одними шесть разъ. Весьма мало правдоподобно, чтобы *Poncins* нашелъ тамъ дѣйствительно *Stenosolenium saxatile* Turcz., известный только изъ окрестностей Селенгинска въ Байкальской Сибири и Китая. Къ тому же, въ „Note sur une coll. de plantes, rapportées par Poncins“ Франция не указываетъ ни одного растенія изъ семейства Boraginaceae, которое было бы собрано *Poncins* въ Ша-Джанъ.

Геогр. распр.: Сибирь (окрестности Селенгинска) и Китай (близъ Пекина).

316. *Myosotis sylvatica* Hoffm. Deutschl. Fl. ed. 2 p. 85.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 145, № 6.—*Boiss.*, Fl. Or. IV, p. 237, № 7 (*M. sylvatica* Hoffm.) и p. 238, № 9 (*M. alpestris* Schm.).—*Hook.* Fl. of Br. Ind. IV, p. 173, № 2.

Указ. для Памира: *Duthie*. Alcock's pl., p. 25, № 67.

1895. Бозай-Гумбезъ, 1—7. VII въ цв. (*Богоявленскій!*).—1895. Не часто, на выс. 14—15.000', въ защищенныхъ мѣстахъ (Alcock; non vidi).

Въ памирскомъ гербаріи Н. Вельманъ есть *Myosotis sylvatica* Hoffm., но собранная, я думаю, не на Памирѣ, а въ Алайскомъ хребтѣ, гдѣ она обыкновенна. Миѣ самой не приходилось видѣть на Памирѣ незабудокъ. Растеніе же, собранное 29. VIII 1878 г., въ цв. и съ мол. плодами, на Ка-расу Кушакевичемъ! и опредѣленное Винклеромъ, какъ *Myosotis*, вовсе къ этому роду не относится, хотя очень сходно съ нимъ по habitus'у. Растеніе, собранное на озёрѣ Яшилькуль 23. VI 1889 г. въ цв., Громчевскимъ!, которое находится въ гербаріи Импер. Бот. Сада, взято не на Памирѣ, а на озёрѣ того же имени въ Каратегинѣ, т. е. Горной Бухарѣ.—Цвѣты голубые.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Шугнанъ, Памиръ, Алайскій хребетъ, горы Заравшана, Туркестанскій хребетъ, Тяньшань.—б) Вся Европа съ Европейской Россіей и Ураломъ, Крымъ (г. Чатырдагъ), Кавказъ, Сибирь, Запад-

ные Гималаи, Персія, Абиссинія, Капарские острова, Сѣверная Америка.

317. *Eritrichium pamiricum* B. Fedtsch. n. sp. — *B. Fedtschenko* in *O. Федченко*, Раст. Пам., № 156.

Указ. для Памира: *O. Федченко*, Растенія Пам., № 156.

Multicaule. Caudiculi tenues petiolorum vestigiis fuscis obtecti. Caules adscendentibus vel suberecti, usque pedales, tenuis, debiles, ut tota planta patentim striguloso pilosi. Folia basilaria longe (1—2") petiolata, lamina eorum oblongo lanceolata, uncialis. Folia caulina inferiora sessilia, basi angustata, oblongo-lanceolata. Folia caulina superiora sessilia, basi subamplexicaulia. Inflorescentia angustior, laxa. Pedicelli inferiores bracteati, fructificantes subcurvato-patentes. Calycis laciniae angustae linear-lanceolatae. Corolla albida, tubus calycis lacinias subaequans. Caryopsides immaturiae.

1901. Собрano между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ 12.500—13.800', 19. VII въ цв. и съ мол. пл. (Б. и *O. Федченко*!).

Изъ всѣхъ описанныхъ видовъ *Eritrichium*, наше растеніе всего ближе подходитъ къ *E. latifolium* Kar. Kir. (съ Джунгарскаго Алатау). Нѣкоторые отличительные признаки кажутся мнѣ; однако, довольно существенными, именно: болѣе узкие и длинные листья, болѣе узкое и рѣдкое соцѣвье, характеръ орѣшковъ, особенно же узкія доли чашечки, которыя у *E. latifolium* вдвое шире и короче.

318. *Eritrichium rupestre* Bge. Enum. alt. p. 8.—*Ledb.*, Fl. Ross., III, p. 151, № 8.

Указ. для Памира: *B. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 8, № 149.—*O. Федченко*, Раст. Памира, № 157.

1892. Акъ-Байташъ (*Назаровъ!*)—1901. Отъ уроцища Чичкты до Памирского Поста 12.750—12.650', 10. VII, въ цв. и съ мол. пл.; между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.000', въ цв. и съ мол. пл.

Геогр. распр.: а) Джунгарія (Карагайлы).—б) Алтай, Байкаль, Даурія.

319. *Eritrichium dubium* O. Fedtsch. (sp. n.).

Multicaule, vestigiis foliorum vetustorum ad radicem residuis; caulis rectis foliisque pilis non longi, nec densis adpressis tectis. Folia radicalia oblonga obtusa in petiolum attenuata, caulina sessilia sensim diminuta in bracteas transcurrentia.

*Racemus longus tenuis; pedicelli calyce 2—3-plo longiores, flores majusculi (ut in *Myosotide silvatica*) azurei; caryopsis (nondum matura) tenuiter verrucosa margine serie aculearum armata.*

Valde affinis *E. pamirico*, a quo differt pubescentia adpressa (nec patentia), foliis obtusis spathulato-oblongis, floribus azureis (nec albis) et caryopside glabra tenuiter verrucosa (nec breviter pilosa).

Многолѣтнее, съ остатками старыхъ листьевъ у корня; стеблей не сколько, прямые, вмѣстѣ съ листьями покрытые недлинными и не густыми прижатыми волосками; прикорневые листья продолговатые, тупые, съуженные въ черешокъ, стеблевые сидячіе и, постепенно уменьшаясь, переходящіе въ прицѣпники. Кисть узкая, длинная; цвѣтоноски гораздо длиннѣе (въ 2—3 раза) чашечки, цвѣты крупные (какъ у *Myosotis silvatica*), голубые; сѣмянки (изрѣльныя) мелко-буторчатыя, съ однимъ рядомъ колючекъ по краюмъ.

Походитъ на *Myosotis* и на *Echinospermum deflexum* Lehm. Отъ первого отличается характеромъ сѣмянокъ, а отъ втораго болѣе длинными и не отогнутыми внизъ (по крайней мѣрѣ при молодыхъ плодахъ) цвѣтоносками.

Очень близокъ къ *Eritrichium pamiricum*; отъ котораго отличается характеромъ опушения (у *E. dubium* волоски прижатые, у *E. pamiricum* отстоящіе), тупыми, лопатчато-продолговатыми листьями (у *E. pamiricum* они ланцетовидные, островатые), синими цвѣтами (у *E. pamiricum* — бѣлые) и голыми мелко-буторчатыми сѣмянками (у *E. pamiricum* сѣмянки коротко-волосистыя, съ тупымъ килемъ).

1878. Карасу, 29. VIII, цв. и молодые плоды (*Кушакевичъ!*).

320. *Eritrichium* sp., очень близкій къ *E. turkestanicum* Franchet и *E. pamiricum* B. Fedtsch.

Указаний для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8 № 152 ex parte (?).

1892. Мургабъ (*Назаровъ!*). Очень плохой экземпляръ въ цвѣту.

321. *Echinospermum barbatum* (M. B.) Lehm., Asperifol., p. 128. — *Ledb. Fl. Ross. III*, p. 156, № 4. — *Boiss. Fl. Or. IV*, p. 250, № 7. — *Hook. Fl. of Br. Ind. IV*, p. 163. — *Myosotis barbatum* M. B., Taur. cauc. I, p. 421.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 25, № 66. 1895. Памиръ, 13—14.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. расп.: а) Долина и горы Заравшана, Алайский хребетъ, долина Сыръ-Дары (Ташкентъ). — б) Ю. Россия, Крымъ, Кавказъ, Болгарія, Персія, Западные Гималаи, Белуджистанъ, Кабулъ.

322. *Echinospermum omphaloides* Schrenk in Bull. phys.-mathém. de l'Acad. de St. Petersb., III, p. 214. — *Ledb. Fl. Ross. III*, p. 159, № 12.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347. — О. Федченко, Раст. Памира, № 158.

1893. Кара-Джильга (Poncins; non vidi). 1901. Между уроцищемъ Маркансу и озеромъ Каракуль, 13.100—13.400', 4. VII въ цв.; у озера Каракуль, на пескѣ, 5. VII въ цв. и 10. VIII въ цв. и пл. (Б. и О. Федченко!!). Цвѣты бѣлые. *forma coeruleum* O. Fedtsch. floribus coeruleis.

1901. У озера Каракуль, вмѣстѣ съ бѣлыми, собранъ 5. VII въ цвѣту одинъ экземпляръ съ синими цвѣтами (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. расп.: Въ Джунгарской степи на берегу р. Атасу.

223. *Echinospermum strictum* Ledebour, Fl. alt. I, p. 200. — *Ledb. Fl. Ross. III*, p. 160, № 15.

Указ. для Памира: О. Федченко, Раст. Памира, № 159.

1901. Между уроцищемъ Ходжа-Назаръ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.800—13.100', 2. VIII въ цв.; между Чатыръташемъ и озеромъ Сассыкъ-куль 3. VIII цв. и пл.; сюда же, вѣроятно, относятся растенія, собранныя между Карасу и Чатыръташемъ, 13.100—14.000', 16. VII и между Чатыръташемъ и озеромъ Сассыкъ-куль 17. VII Б. и О. Федченко!!). — Ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!*).

Геогр. расп.: У Индерского озера, въ стенахъ Джунгаріи, близъ Семипалатинска и на Памирѣ.

324. *Echinospermum* sp.

Указ: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8, № 148, ex parte.

1892. Мургабъ (*Назаровъ!*), цв. и изрѣльные плоды.

325. *Echinospermum microcarpum* Led. Fl. alt. I, p. 202. — *Ledb. Fl. Ross. III*, p. 160, № 18. — *Boiss. Fl. Or. IV*, p. 251, № 9.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 160.

1901. Между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.000', съ незрѣлыми плодами 16. VII. Сюда же, вѣроятно, относятся экземпляры, собранные у озера Кара-куль, на скалахъ съ пескомъ, 13.500—13.700', 5. VII въ цвету (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Степи Джунгаріи и Джунгарский Алатау, Тяньшань, долина и горы Зеравшана, долина Сырь-Дары, Лепсийскъ. — б) Кавказъ; Персія, Алтай.

326. *Echinospermum* sp. — Цвѣты и плоды почти сидячие (цвѣтоночка очень короткая).

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 8, № 148, ex parte.

1802. Шоръ-куль (*Назаровъ!*), цв. и мол. плоды.

327. *Echinospermum?*

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8, № 162 ex parte. — (?)

1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*).

Молодые плоды, съ колючками на диске.

328. *Solenanthus nigricans* Schrenk in F. et M., Enum. pl. nov. II, p. 29. — *Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 171, № 6.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 347. — Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8, № 151. — О. Федченко, Растенія Памира, № 161.

1878. Сѣверные предгорья на озерѣ Кара-куль 30. VII цв. (*Кушакевичъ!*, *Ашурабаевъ!*); близъ Кара-куля 5. VIII цв. (*Кушакевичъ!*, *Скорняковъ!*); отъ р. Чонъ-су къ Акъ-Байталу 6. VIII цв. (*Кушакевичъ!*). — 1891. Р. Истыкъ, 18. VII въ цвет. (*Бржезицкий!*; имъ же указывается на этикеткѣ гербарія, для Бенкъ, р. Кара-чукуръ и р. Марджанай). — 1892. Акъ-Байталь (*Назаровъ!*). — 1893. Кара-Джильга (Poncins; non vidi). — 1901. У озера Кара-куль, на скалахъ съ пескомъ, 13.500—13.700', 5. VII въ цвету; на песчаномъ берегу озера Кара-куль на пути къ Мусколу, 13.400', 6. VII въ цвет.; отъ Акъ-Байтала до урочища Гурумды, 14.000—14.500', 8. VII въ цвет.; между переваломъ Кой-тезекъ и урочищемъ Ходжа-Назарь, 13.800—15.100', 1. VIII въ цвет.; между Чатыръ-ташемъ и Карасу, 13.100—14.000', 4. VIII въ плодахъ; между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизыль-артъ, 13.400—14.000', 10. VIII. въ пл. (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!*).

var. *hispidus* Rgl.

1901. Между Памирскимъ Постомъ и Ша-Джаномъ, въ каменистыхъ оврагахъ, 12.650', 12. VII въ цвет. (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: Тарбагатай и Джунгарский Алатау, Тяньшань.

329. *Paracaryum heliocarpum* A. Kerner, Nov. Pl. Spec. II, 9. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 161, № 4.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl. p. 25, № 65.

1895. Въ оврагахъ на открытомъ Памире, не часто (Alcock; non vidi).

По всей вѣроятности, собранное Олькоккомъ растеніе относится къ предыдущему виду (*Solenanthus nigricans* Schrenk), очень съ нимъ сходному и собранному нами въ такихъ же мѣстахъ.

Геогр. распр.: *Paracaryum heliocarpum* указывается Гукеромъ (I. c.) для западныхъ Гималаевъ и для Кашгара.

Очень сходный и можетъ быть тожественный съ нимъ *Cynoglossum macrostylum* Bge. (Bunge, Pl. Lchm. p. 412. — Boiss., Fl. Or., IV, p. 266, № 8) собранъ въ Заравшанской долинѣ и Басмандинскомъ ущельи (О. Федченко 1869 и 1870!!) въ Тяньшань (*Красновъ!* и др.) и въ Шугнанъ (Б. и О. Федченко!!).

330. *Rochelia stellulata* Reichenbach, in Flora 1824, p. 243. — *Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 175, № 1. — Boiss. Fl. Or. IV, p. 244, № 2. — *Lithospermum dispermum* Linne Sp. pl. ed. II p. 191.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8, № 150 (*Heterocaryum minimum*).

1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*).

Геогр. распр.: а) Тарбагатай, Джунгарія, Иnderская горы, Тяньшань, Заравшанская долина.—б) Испания, по Дунаю, Южная Россія, Крымъ, Кавказъ, Закавказье, Персія, Сирія, Алжиръ, Афганистанъ, Белуджистанъ.

XXXI. Solanaceae.

331. *Hyoscyamus pusillus* Linne, Sp. pl. ed. I p. 180. — *Ledb.*, Fl. Ross. III p. 184, № 4. — Boiss., Fl. Or. IV, p. 294, № 2. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 245.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 8, № 155.

1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*).

Геогр. распр.: а) Степи Джунгарии, пески Кизиль-кумъ (гора Каракъ), долина и горы Заравшана, Шугнантъ, Тяньшань, Семипалатинская область. — б) Ю. Россия, Кавказъ, Персия, Аравія, Египетъ, Западный Тибетъ, Белуджистанъ.

XXXII. Scrophulariaceae.

332. *Linaria odora* (M. B.) Chav., Monogr. p. 136. — *Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 207, № 6. — *Boiss.*, Fl. Or. IV, p. 373, № 24. — *Antirrhinum odoratum* M. a Bieb. Fl. taur.-cauc. II p. 76.

Указ. для Памира: *Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 8, № 157 (*L. macroura* MB.). — *О. Федченко*, Растения Памира, № 162 (*L. odora* (MB) Chav.).

1878. Р. Аличуръ 20 и 21. VIII пл.; Аличуръ 22. VIII пл.; Яшиль-куль 24. VIII; цв.; Карасу 29. VIII цв. и 31. VIII пл.; Суокъ-чубыръ з. IX пл. (*Кушакевичъ!*). Памирь-Аличуръ 27. VIII (*Ашурбасовъ!*). — 1892. Мургабъ (*Назаровъ!*). — 1901. Между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII въ цвету (*Б. и О. Федченко!!*). — Цвѣты грязнобурые.

Геогр. распр.: а) Семипалатинская область, Тарбагатай, степи Джунгарии, пески Каракумъ, Тяньшань, горы Заравшана и Туркестанский и Алайский хребты, долина Сырь-Дары. — б) Европейская Россия, Крымъ, Кавказъ, Персия, Афганистанъ, Алтай, Турция, восточная Пруссия.

333. *Scrophularia aquatica* Linne Spec. pl. ed. I, p. 619. — *Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 218, № 10.

1891. Р. Вахджиръ 23. VII въ цвет. (*Бржезицкий!*; указывается имя также, на этикеткѣ гербарія, для р. Ваханъ-Дары).

Геогр. распр.: а) Джунгарский Алатау, Тяньшань, Шугнантъ, Алайский хребетъ, долина Заравшана. — б) Ср. и ю. Россия, Крымъ, Кавказъ.

334. *Scrophularia incisa* Weinm. Ind. pl. Hort. Dorpat. p. a. 1810, p. 136. — *Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 219, № 13.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 25, № 68 (*Scrophularia* sp., близкая къ *S. scabiosaeifolia* Benth.). — *Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 8, № 156 (sub nom. *S. canescens* Bong. f. *glabrata* Trautv.). — *О. Федченко*, Растения Памира, № 163.

1878. Карасу 29. VIII пл. (*Кушакевичъ!*)¹⁾. — 1892. Карасу (*Назаровъ!*). — 1895. Въ каменистыхъ, высохшихъ ложахъ ручьевъ, не часто, 13—14.000' (Alcock; non vidi).

var. *pamirica* *O. Fedtsch.* (var. n.).

Листья мелко-зубчатые, а не глубоко-надрѣзные; въ остальномъ сходна съ var. *alpina* *Ledb.*

1901. На сланцевыхъ скалахъ въ окрестностяхъ озера Карапуль, 13.700', 5. VII. въ цвет. (*Б. и О. Федченко!!*).

var. *alpina* *Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 220, № 13.

1901. На сланцевыхъ скалахъ между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.800' 15. VII. въ цвет. (*Б. и О. Федченко!!*).

var. *angustifolia* *O. Fedtsch.* (var. n.).

Foliis angustis non profunde dentatis, longe petiolatis, foliorum inferiorum lamina longioribus. Planta major quam in 2 varietatibus praecedentibus.

Листья узкие, съ мелкими зубчиками (а не глубоко-надрѣзными зубцами), на длинныхъ черешкахъ, которые у нижнихъ листьевъ длиниче пластинки. Все растеніе крупинье двухъ предыдущихъ разновидностей.

1901. Между Памирскимъ Постомъ и Карасу въ уро-чищѣ Джаманталъ, на каменистомъ берегу р. Карасу, 13.800', 15. VII. въ цвет. и съ незрѣлыми плодами (*Б. и О. Федченко!!*).

Геогр. распр.: а) Джунгарский Алатау, Тарбагатай, Памиръ, горы Заравшана, Тяньшань. — б) Алтай, Байкалъ, Даурія.

335. *Veronica Anagallis* L.²⁾. *Linné*, Spec. pl. ed. I, p. 12. — *Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 236, № 10. — *Boiss.*, Fl. Or. IV p. 437, № 1. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, 293, № 6.

1878. Карасу, 29. VII. цв. и 31. VIII. цв. (*Кушакевичъ!*).

Растеніе, собранное Кушакевичемъ, имѣть очень широкіе листья и пушистые вверху стебли.

Геогр. распр.: а) Джунгарія и Джунгарский Алатау, Тяньшань, долина Сырь-дары (Ташкентъ), долина и горы Заравшана, Алайский хребетъ, Памиръ. — б) Всѧ Европа, Средняя и южная европейская Россия, Крымъ, Кавказъ.

¹⁾ Въ гербаріи Спб. Бот. сада есть также экземпляръ съ надписью „Аксу, Kuschakewicz, VII 1878“, но почеркъ не Кушакевича и онъ на Памирскомъ Аксу былъ въ августѣ.

²⁾ *Dodartia orientalis* L. собрана Бржезицкимъ 26. VII 1891 г. въ цвет. на р. Суксуровать въ Гиндукушъ.

бири, съв. Америка, Китай, Япония, Индия, Гималаи, Тибетъ, Афганистанъ, Персія, Абиссинія, съв. и южн. Африка, Канарськіе острова.

336. *Veronica cardiocarpa* Walp., Repert. III, p. 335.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 252, № 44.—*Veronica biloba* L. var. *platysepalala* Trautv., Enum. Song. № 850 (in „Bull. de Moscou“, XXIX (1866), p. 440).

По Гукеру (Fl. of Br. Ind. IV, p. 295) это только одна изъ формъ *V. biloba* L.

1878. Рангъ-куль, 14. VIII. плоды (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Заравшанская долина, Тяньшань.—б) Кавказъ.

337. *Veronica biloba* Linné, Mant. p. 172.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 252, № 45.—*Boiss.*, Fl. Or. IV, p. 464, № 74.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 294, № 11.

var. *dasyarpa* Trautv.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 164.

1901. Отъ Чатыръ-таша до Сассыкъ-куля, 13.540—13.100', на песчано-щебниевыхъ осыпяхъ, 17. VII. въ плодахъ и на перевалѣ Кой-тезекъ, въ плодахъ (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Шугцанъ, Джунгарія и предгорья Джунгарского Алатау, Тяньшань, долина Заравшана, долина Сыръ-Дарьи, Алайскій хребеть, Памиръ.—б) Кавказъ, Алтай, западные Гималаи и зап. Тибетъ, Афганистанъ, Персія, Малая Азія.

338. *Euphrasia Regelii* Wetst.¹⁾, Monogr. d. Gattung Euphrasia, p. 81, № 3 („Arbeiten des bot. Instituts der k. k. deutschen Universität in Prag“, № IX.—1866).

Указ. для Памира: О. Федченко Растенія Памира, № 165.

1901. На сырыхъ лужайкахъ близъ Памирского Поста, 12.650', 11 и 14. VII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!) (Teste Wetstein).—Цвѣты бѣлые съ лиловыми полосками.

Геогр. распр.: а) Шугцанъ, Памиръ, Алайскій хребеть, Тяньшань, Джунгарскій Алатау.—б) Кавказъ, Персія, Гималаи, Тибетъ.

339. *Pedicularis interrupta* Steph., ex Willd. sp. pl. III, p. 214, № 21.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 269, № 1.

¹⁾ *Euphrasia* sp. собрана Бржезинскимъ! 26. VII. 1891 г. въ цв. на перевалѣ Юнова, въ Гиндукушъ, на выс. до 18000'.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 8, № 158.—О. Федченко, Раст. Пам., № 166.

1878. Чонъ-су, 6. VIII. цв. и пл.; отъ Чонъ-су на Акъ-Байталъ, 7. VIII. пл.; Рангъ-куль, 14. VIII. пл.; Карасу, 29. VIII. цв. (*Кушакевичъ!*).—1891. Р. Истыкъ, 18. VII. въ цв. (*Бржезинский!*; имъ же указывается, на этикеткѣ гербарія, для р. Аксу и р. Шинда [Наїза-ташъ] на Памирѣ).—1892. Карасу (*Назаровъ!*).—1901. Въ уроцищѣ Чичикты, 12.750', на каменистой бесплодной равнинѣ, 9. VII. въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 15. VII. въ цв.; между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—13.540', 16. VII. въ цв. и 4. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Джунгарія.—б) Алтай.

340. *Pedicularis verticillata* Linné, Spec. pl. ed. I, p. 608.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 270, № 3.—*Boiss.*, Fl. Or. IV, p. 485, № 3.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 309, № 11.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 347.

1893. Кизыль-артъ (Poncins; non vidi).

Геогр. распр.: а) Тяньшань.—б) Европа, Сибирь, Китай, Гималаи и арктическая Америка.

341. *Pedicularis cheilanthalifolia* Schrenk in Bull. phys. math. de l'Acad. de St. Pétersb. I, p. 79.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 273, № 10.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 308, № 10.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, pl. 347.—Duthie, Alcock's pl., p. 25, № 71.—О. Федченко, Раст. Пам., № 167.

1878. Переваль Кизыль-артъ, верхъ, 22. VII. цв.; р. Чонъ-су, 6. VIII. цв.; Акъ-Байталъ 9. VIII. пл.; верховья Акъ-Байтала, 9. VIII. цв. (*Кушакевичъ!*).—1891. Переваль Бенкъ, 15.000', въ цв. 20. VII. (*Бржезинский!*).—1893. Кара-Джилыга (Poncins; non vidi).—1895. Р. Вахджиръ, 3. VII. цв.; Яшиль-куль, 8. VI. цв. (*Богоявленский!*).—1895. Обыкновенно, на сырой почвѣ по берегамъ р. Аксу и ея притокамъ, до высоты не менѣе 14.000' (Alcock; non vidi).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. По р. Акъ-Байталъ и подъ самымъ переваломъ того же имени, 14.500—15.700', 8. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты малиновые.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Тяньшань, алайской область Алайскаго хребта.—б) Тибетъ и западный Тибетъ, Монголія, Китай, с.-з. Индія.

342. *Pedicularis rhinanthoides* Schrenk, Enum. pl. nov. I, p. 22.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 276, № 15.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 314, № 26.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 25, № 69 (typica).—*Б. Федченко*, Мат. фл. Пам., р. 8, № 159.—*О. Федченко*, Раст. Пам., № 168.

1891. Переваль Найза-ташъ (Шинда) 20. VII. въ цв. (*Бржезицкий!*; имъ же, на этикеткѣ гербарія, указывается для пер. Бенкъ, до 15.000').—1892. Карасу; Мургабъ (*Назаровъ!*).—1895. На болотистой почвѣ по р. Аксу, мѣстами обыкновенно, 13—14.000' (Alcock; non vidi).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. На болотистомъ лугу у Памирскаго Поста, 12.650', 10, 11 и 14. VII. въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 15. VII. въ цв.; на кочкарномъ болотѣ у озера Сассыкъ-куль, 13.100', 17. VII. въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*).—1902. Мургабъ, сырьи луга (*Тулиновъ!*) (цвѣты бѣлые).—Цвѣты бывають красные, бѣлые или пестрые.

Геогр. распр.: а) Джунгарский Алатау, Тяньшань, Малый Алай.—б) Альпы Гималаевъ, Афганистанъ, Тибетъ, Монголія, Китай, Персія.

343. *Pedicularis dubia* B. Fedtsch.—*Б. А. Федченко*, Материалъ для флоры Шугнана, р. 46, № 222 („Труды Бот. Муз. Ак. Наукъ“ вып. 1, 1902 г., р. 155).—*Pedicularis songorica* var. *versicolor* Krasnow in sched. Horti Petrop.

Указ. для Памира: *О. Федченко*, Растенія Памира, № 169.

1901. Выше перевала Кой-тезекъ; на альпійскихъ лужайкахъ до 16.000', 20. VII. въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*).

Геогр. распр.: Памирскія растенія совершино тожественны съ собранными нами же въ 1901 г. въ Шугнанѣ, а также Красновымъ на Текесѣ въ Тяньшанѣ! (въ герб. Имп. Бот. Сада подъ именемъ *P. songorica* var. *versicolor* Krasnow).

344. *Pedicularis uliginosa* Bunge, Ind. Sem. Horti Dorpat. p. a. 1839, p. VIII.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 290, № 39.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 25, № 70.—*О. Федченко*, Растенія Памира, № 170.

1878. Урочище Кокъ-сай, 22. VII. въ цв.; р. Чонъ-су, 6. VIII. пл. (*Кушакевичъ!*).—1895. На болотистой почвѣ у р. Аксу, 13—14.000' (Alcock; non vidi).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. Между Маркансу и озеромъ Кара-куль, на луговинѣ по ручью, 13.100—13.400', 4. VII. въ цв.; на бо-

лотистыхъ луговинахъ по берегу озера Кара-куль, 5. VII. въ цв.; между Мусколомъ и Акъ-Байталомъ, 14.100—14.400', 7. VII. въ цв.; на болотистомъ лугу у Памирскаго Поста, 12.650', 11 и 14. VII. въ цв.; между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, на лугу по Аличуру, 13.540—13.100', 17. VII. въ цв.; между Сассыкъ-кулемъ и Яшиль-кулемъ, 13.100—12.500', 18. VII. въ цв.; между урочищемъ Ходжа-Назарь и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII. въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*).—Замѣчено также на солонцеватой луговинѣ на Мусколѣ, 6. VII. въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*).—1901. Пер. Кизыль-артъ; р. Акъ-Байталъ, сырой лугъ; Чатыръ-ташъ (*Тулиновъ!*).—Цвѣты малиновые.

Очень обыкновенно на болотистыхъ луговинахъ и по берегамъ ручьевъ, гдѣ встрѣчается вмѣстѣ съ *Primula sibirica*.

Геогр. распр.: а) Джунгарский Алатау, Шугнанъ, Алайскій хребеть (ледникъ Щуровскаго).—б) Алтай, Монголія.

345. *Pedicularis dolichorrhiza* Schrenk, Enum. pl. nov. II, p. 23.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 291, № 40.

Указ. для Памира: *Б. Федченко*, Мат. фл. Пам., р. 8, № 160 (*Pedicularis*).

Собрano *Кушакевичемъ!* на перевалѣ Кизыль-артъ 22. VII. въ цв., но, вѣроятно, на сѣверномъ склонѣ перевала. Совершенно тожественное растеніе, только меньшихъ размѣровъ, собрано въ 1892 г. *Назаровымъ!* на р. Кизыль-артъ, т. е. на сѣверномъ склонѣ Заалайскаго хребта (а не на Памирѣ, какъ ошибочно указано у *Б. Федченко*, л. с.).

Геогр. распр.: а) Джунгарский Алатау, Тяньшань, горы Заравшана (Искандеръ-куль), Алайскій хребеть (Малый Алай).—б) Трансильванія.

346. *Pedicularis comosa* Linné, Sp. pl. ed. I, p. 609.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 292, № 42.—*Boiss.*, Fl. Or. IV, p. 491.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.

Указывается Франши (l. c.) для перевала Талдыкъ, т. е. Алайскаго хребта, а не Памира.

Геогр. распр.: а) Джунгарія, Памироалай (Аучи-дага).—б) Европа и европейская Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Сибирь, Персія.

347. *Pedicularis Oederi* Vahl. in Hornem Dansk. Oek. Plantel. ed. II. 580.—*Pedicularis versicolor* Wahlenb. Fl.

Helv. p. 118 (non Fl. suec.). — *P. versicolor* Wahlenb. *Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 300, № 55.—*P. versicolor* Wahlenb. *Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 316, № 34.

Указ.: *Duthie*, Alcock's pl. p. 25, № 72.

На болотистой почвѣ по р. Аксу, 13—14.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.: а) Тяньшань.—б) Исландія, Норвегія, сѣв. Швеція, арктическая евр. Россія, Ураль, горы средней Европы, арктический Алтай, Байкалъ, восточная Сибирь, земля Чукчей, Камчатка, арктическая Америка, Тибетъ, Китай.

Представителей семейства *Orobanchaceae* не собрано еще на Памирѣ. Въ гербаріи Сиб. Ботанич. Сада лежитъ, правда, *Orobanche amoena* C. A. Meyer f. *O. Regeiana* Beck (teste Beck) съ этикеткой: „Turkestan, Pamir, 14. VII. 78, leg. Kuschakewicz“, но написана она не его рукой, и собирая Кушакевичъ 14. VII. 1878 года въ ущельи Арчаты, т. е. въ Алайскомъ хребтѣ, а не на Памирѣ. *Orobanche amoena* встречается въ Джунгаріи и Тяньшанѣ.

XXXIII. Selaginaceae.

348. *Lagotis glauca* Gaertn.—*Maxim.*, Diagn. plant. novarum asiaticarum IV (Bull. Acad. Imp. d. Sc. de St. Petersbourg, XXVII, p. 523, (1881).—*Lagotis glauca* Gaertn., *Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 559, № 4.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 171.

1901. На перевалѣ Кої-тезекъ, 15.000', 20. VII. и 1. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты синіе.

Геогр. распр.: а) Тарбагатай и Джунгарскій Алатау, Тяньшань, алтайская область Алайскаго хребта.—б) Арктическая европейская и азиатская Россія, Ураль, Алтай, Байкалъ, Даурія, Камчатка, Монголія, Китай, арктическая Америка, Тибетъ (var. *kunawurensis* (Royle) *Hook.*), Алтайские Гималаи (var. *kunawurensis* и var. *cashmeriana* *Hook.*).

349. *Lagotis decumbens* Rupr. — *Osten Sacken et Kirgr.*, Sert. tianschan. p. 64. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 558, № 2. — *Lagotis glauca* Gaertn. subsp. *australis* (= *L. decumbens* Rupr.), *Maxim.* Diagnoses plantarum novarum asiaticarum IV („Bull. Acad. Imp. d. Sc. d. St. Petersb.“, XXVII, p. 524, (1881).

Указ. для Памира: *Коржинский*, Очерки растит. Туркест. p. 96.—О. Федченко, Растенія Памира, № 172.

1878. Переяраль Кизыль-артъ, на вершинѣ, 22. VII. цв. (на той же этикеткѣ приписано рукой Кушакевича: на солонцахъ); близъ Кара-куля, 5. VIII. цв.; при устьѣ р. Узбилия въ Чонъ-су 6. VIII. цв.; р. Чонъ-су, 6. и 7. VIII; перевалъ Акъ-Байтала 8. VIII. (*Кушакевичъ!*). Кокъ-сай, 30. VII. цв. (*Скорняковъ!*). — 1895. Кизыль-артъ 14.000'; въ долинѣ р. Кокъ-сай близъ Кизыль-арта 13.500'; 8. VII. въ цв. (*Коржинский!* въ герб.; въ „Очеркахъ“: 15—20. VII, очевидно по новому стилю, такъ какъ въ эти числа старого стиля Коржинскій не былъ на Кизыль-арте). — 1901. На солонцеватой луговинѣ у Мускола, 14.100', 6. VII. въ цв.; на сѣверномъ склонѣ у подошвы Акъ-Байтала, на берегу рѣчки, 14.400', 7. VII. въ цв.; между Карасу и Чатырь-ташемъ, 13.100—14.300', 16. VII. въ цв.; на перевалѣ Акъ-Байтала, 14.500—15.700', 8. VIII. въ цв.; между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизыль-артъ, 13.400—14.600', 10. VIII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты синіе.

Растеть на каменистыхъ мѣстахъ и солончакахъ.

Геогр. распр.: а) Тяньшань.—б) Тибетъ и зап. Тибетъ (въ Каракорумѣ на выс. 16—18.000'), Монголія.

XXXIV. Labiateae.

350. *Mentha silvestris* Linné, Spec. pl. ed. II p. 804.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 336, № 1.—*Boiss.*, Fl. Or. IV, p. 543, № 2.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 647.

1891. Р. Кара-чукуръ, 22. VII. въ цв. (*Бржезинский!*; имъ же указывается для р. Ваханъ-дары).

Геогр. распр.: а) Озеро Балхашъ и Джунгарскій Алатау, Джизакъ, долина и горы Заравшана, Маргіанъ, Алайскій хребтъ, Шугнанъ, Тяньшань.—б) Вся Европа и средн. и южн. евр. Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Алтай, зап. Гималаи и зап. Тибетъ, Гиндукушъ, Афганистанъ, сѣверная Индія, Абиссинія, сѣв. Африка, Канарскіе острова, мысъ Доброй Надежды.

351. *Thymus serpyllum* Linné, Sp. pl. ed. I, p. 590.—*Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 345, № 1.—*Boiss.*, Fl. Or. IV, p. 554, № 1.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 649.

1878. Памиръ-Харгони, 6. VIII. цв.; Акъ-Байташъ 8. VIII. цв. (Ашурбаев!).—Цвѣты розовые.

Геогр. распр.: а) Джунгарія, Тяньшань, горы Заравшанской долины, Алайский хребетъ.—б) Вся Европа и вся Европейская Россия съ Крымомъ, Кавказомъ и Ураломъ, Сибирь, Западные Гималаи и западный Тибетъ, Персія, Абиссинія, съв. Африка, Гренландія, Исландія, Манджурія, Японія, Китай.

352. *Ziziphora clinopodioides* Lam., Ill. I, p. 63.—*var. dasyantha* (MB.) Ledb.—*Ledebour, Fl. Ross.* III, p. 369, № 1.—*Boiss., Fl. Or. IV*, p. 586, № 1.—*Ziziphora dasyantha* MB., *M. a* *Bieb.*, *Fl. taur.-cauc.* I, p. 18, 414; III, p. 21.

Указ. для Памира: *Franchet, pl. Poncins*, p. 347 (*Z. dasyantha* MB.).

1893. Бозай-Гумбезъ (Poncins; non vidi).

Геогр. распр. вида: а) Тарбагатай, Джунгарский Алатау, степи Джунгаріи, Алайский хребетъ, Тяньшань.—б) Кавказъ, Ураль, Сибирь, Персія, Афганистанъ, Белуджистанъ.

Геогр. распр. var. *dasyantha*: а) Горы Заравшана и Алайский хребетъ, Шуганъ.—б) Кавказъ и Закавказье, съверная Персія.

353. *Nepeta pamirensis* Franchet, Note sur une coll. de pl. rapp. par. Poncins, p. 345.—„*Nepeta pamirensis* sp. nov.—(Руценепета Benth.). E basi fruticulosa multicaulis, caulis inferne ramosis tenuiter floccigeris; folia 10—15 millim. longa; limbus late ovatus vel ovato-rhomboideus, obtusus, utrinque latere 5—6 crenatus vel crenato-dentatus, in petiolum cuneatum attenuatus, utraque facie corrugatus et lana brevi floccigerus; flores dense capitato-spicati, cum verticillastro dissito; bracteae lineares, mucronatae, calyce breviores; calyx totus parce lanatus, obscure bilabiatus, vix ad medium 5-dentatus, dentibus e basi lanceolatis, mucronatis, trinerviis; corolla (2 cent. longa) calycem plus duplo superans, tenuiter et parce pubescens, labiis purpurascensibus, tubo pallido“.

„Rappelle le *N. podostachya* Benth., dont les feuilles étroites sont glabrescentes, ou seulement un peu poilues, les fleurs disposées en épis étroit“.

Указ. для Памира: *Franchet, l. c.* p. 347.

1893. Бозай Гумбезъ (Poncins; non vidi).

354. *Nepeta oxicola* Franchet, Note sur une coll. de pl. rapp. par. Poncins, p. 346.—„*Nepeta oxicola* sp. nov. (Руценепета). Affinis *N. pamirensis*; caulis tenuissime pubescens; folia ovato-deltoidea, subacuta, supra glabra, subtus brevissime cinereo-pilosa, inclusa petiolo 10—15 millim. longa; flores dense spicati, absque verticillastro dissito, calycis tubus glaber, ultra medium in dentes linearès aristato-subpungentes partitus; corolla 12—15 millim. longa“.

„Se distingue du *N. pamirensis*, par la forme de ses feuilles, leur indument et surtout par les dents du calice plus étroites, longuement ciliées sur les bords“.

Указ. для Памира: *Franchet, l. c.*, p. 347.

1893. Бозай-Гумбезъ (Poncins; non vidi).

355. *Nepeta*¹⁾ *kokanica* Rgl.—*E. Regel, Deser. pl. nov. a cl. O. Fedtschenko lectarum in „Путешеств. въ Туркест. А. П. Федченко“, вып. 18. стр. 65, № 152.*

Указ. для Памира: *O. Федченко, Растения Памира*, № 174. (*Nepeta cephalotes*).

1878. Р. Аличуръ, верховье, въ августѣ, въ цвѣту; Карабасу, 31. VIII. въ цв. (Кушакевичъ!).—(Сюда же, въроятно, относятся растенія, собранныя въ 1893 г. Poncins [см. выше: *N. pamirensis* Franch. и *M. oxycola* Franch.] и въ 1895 г. Олькоккомъ [см. ниже: *Nepeta supina* Duthie].—1901. Между Карабасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.000', 16. VII. въ цв.; между Чатыръ-ташемъ и Сассыкъ-кулемъ, 13.540—13.100', 17. VII. въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Цвѣты синие.

Геогр. распр.: Альпийская область Алайского хребта, Памиръ.

356. *Nepeta supina* Stev., in Mém. d. l. Soc. d. Natur. d. Moscou. III, p. 265.—*Ledb. Fl. Ross.* III, p. 373, № 4.—*Boiss., Fl. Or. IV*, p. 642.—*Hook., Fl. of Br. Ind.*, IV, p. 658, № 9.

Указ. для Памира: *Duthie, Alcock's pl.* p. 26, № 73. 1895. Массами по склонамъ горъ, до 14.000', но не часто (Alcock; non vidi).

По всей въроятности, это не что иное, какъ *N. kokanica* Rgl. Сколько мнѣ известно, *N. supina* никъмъ не была еще найдена не только на Памирѣ, но и вообще въ Туркестанѣ.

Геогр. распр.: Кавказъ, Гималаи, Тибетъ.

¹⁾ Определенія *Nepeta* и *Dracocephalum*, собранныхъ Б. и О. Федченко, проверены В. И. Липскимъ.

357. *Nepeta longibracteata* Benth., Lab. 737. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV, p. 660, № 14.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 9, № 165 (*Dracocephalum* sp.) и № 168 (*Dracocephalum kocanicum*). — О. Федченко, Растения Памира, № 173.

1892. Аличуръ (*Назаровъ!*). — 1901. Отъ озера Кара-куль до Мускола, 13.400—14.300', 6. VII въ цв.; подъ переваломъ Акъ-Байталь, на южной сторонѣ, 14.500—14.000', 8. VIII въ цв., на щебниѣ у ручья (Б. и О. Федченко!!). — Цвѣты синіе.

Геогр. расп.: а) Памирь.—б) Западные Гималаи и западный Тибетъ, альпийская область, 14—17.000'.

Для Туркестана, и вообще для Россіи указывается впервые.

358. *Nepeta Daenensis* Boiss. Diagn. Ser. I, 7 p. 53.—*Boissier*, Fl. Or. IV, p. 667.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 8, № 162 (*Ziziphora tenuior*). — Липсій, Мат. по фл. Ср. Азіи, р. 105.

1878. Булунъ-куль¹), 25. VIII, въ цвѣту и отцвѣтшія (*Ашурбасовъ!*). — 1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*). — Цвѣты тѣлеснаго цвѣта.

Геогр. расп.: а) Шугнанъ, Памирь.—б) Персія.

359. *Nepeta spathulifera* Benth. in DC. Prodr. XII, p. 380.—*Boiss.*, Fl. Or. IV, p. 668, № 82.

Указ. для Памира: Липсій, Мат. фл. Ср. Азіи, р. 106, № 70.

1878. Булунъ-куль по Сассыкъ-куль²) 26. VIII. (*Ашурбасовъ!*). — 1897. Перевалъ Малый Марджанай, 20. VIII. (*Коржинскій!*).

Геогр. расп.: а) Памирь.—б) Афганистанъ.

360. *Dracocephalum palmatum* Steph. in Willd. Spec. plant. III p. 151.—*Ledb.* Fl. Ross. III, p. 382, № 1.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl., p. 26, № 75.

1895. Одно изъ обыкновенныхъ растеній Большого и Малаго Памировъ, на сухой почвѣ открытаго Памира (Alcock, non vidi).

Dracocephalum palmatum ни для Памира, ни для Туркестана вообще никѣмъ болѣе, сколько мнѣ известно, не

¹⁾ Липсій (l. c.) не указываетъ области, въ которой лежитъ Булунъ-куль, но это — Памирь.

²⁾ Липсій (l. c.) ошибочно относитъ эту мѣстность къ Сырдарьинской области.

указывается. Не относится ли растеніе Олькокка къ довольно обыкновенному на Памирѣ *Dr. discolor* Bge?

Геогр. расп.: Восточная Сибирь.

361. *Dracocephalum discolor* Bge.—*Bunge*, Enum. alt. p. 38.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 383, № 3. — *Dracocephalum origanoides* Ledb., Fl. alt. II p. 383 (excl. syn.).

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Памира р. 9, № 169 (*D. discolor* Rgl.—ошибка, вместо Bge). — О. Федченко, Растенія Памира, № 175.

1878. Акъ-Байталь, 9. VIII цв.; ущелье р. Акъ-Байталь, 3. IX (*Кушакевичъ!*)¹). — 1892. Акъ-Байталь (*Назаровъ!*). — 1895. Р. Вахджеиръ, 3. VII въ цв.; Бозай-Гумбезъ, 4. VII въ цв.; Машали 23. VI въ цв. (*Богоявленскій!*). — 1901. На сѣверномъ склонѣ Акъ-Байтала, 14.400', у рѣчки, 7. VII въ цв.; на перевалѣ Акъ-Байталь, 14.500—15.700', 8. VII въ цв.; между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.300', 16. VII въ цв.; на перевалѣ Кой-тезекъ, на щебниевыхъ розсыпяхъ, 14.500—15.100', 20. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). — Замѣчено также на песчано-щебниевыхъ осыпяхъ между уроцищемъ Чатыръ-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540—13.100', 17. VII и въ щебневой пустынѣ между уроцищемъ Ходжа-Назарь и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.800—13.100', 2. VIII (Б. и О. Федченко!!). — 1901. На ледниковыхъ холмахъ передъ Сассыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!*). — Цвѣты синіе.

Геогр. расп.: а) Тяньшань, Шугнанъ, Памирь, Алайскій хребеть, Туркестанскій хребеть (Аучи-дагана). — б) Алтай.

362. *Dracocephalum origanoides* Steph. in Willd. Sp. pl. III, p. 151.—*Dracocephalum pinnatum* L. var. *pallidiflorum* Kar. et Kir., *Ledb.* Fl. Ross. III p. 384, № 4.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl. p. 26, № 74.

1895. На выс. 13—16.000', встрѣчается большими группами, но не часто (Alcock; non vidi).

Геогр. расп.: *Dracocephalum origanoides* Steph. (= *D. pinnatum* L. var. *pallidiflorum* Kar. et Kir.) встречается: а) на Тарбагатаѣ, въ Джунгарскомъ Алатау, Тяньшанѣ и

¹⁾ Бржеziцкій, на этикеткѣ гербарія, указываетъ этотъ видъ для переваловъ Вахджеиръ, Марджанай, Кайнды и Тахта-Гурумъ на Памирь, до 18.000'; но собранный имъ экземпляръ взятъ на перевалѣ Юнова, т. е. въ Гиндукушѣ!

б) на Алтай. Растение же, собранное Олькоккомъ, въроятно относится къ *D. heterophyllum* Benth.

**363. *Dracocephalum heterophyllum* Benth., Lab. 738.—
Hook. Fl. of Br. Ind. IV, p. 665, № 4.**

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Памира р. 9, № 167 (v. minus Rgl.). — О. Федченко, Растения Памира, № 176.

1878. Памирь-Харгоши 30. VII. (*Кушакевичъ!*, *Ашурбаевъ!*) и 7. VIII (*Скорняковъ!*); Канынгъ Хатынь 4. VIII (*Козловский!*); предгорья Кара-куля 5. VIII; р. Чонъ-су, 6. VIII цв.; Аксу 31. VIII (*Кушакевичъ!*). — 1888. Аксу 27. VII. цв. (*Громбчевский!*). — 1891. Р. Марджанай, 12. VIII въ цв. (*Бржезинский!*; имя же указывается для р. Мурабъ, до 14.000'). — 1892. Акъ-Байталъ; Рангъ-куль; Карасу (*Назаровъ!*) (v. minus Rgl.). — 1901. Въ уроцищѣ Маркансу, 13.100', 3. VII съ еще не распестившимися цветами; между Маркансу и озеромъ Каракуль 4. VII въ цв.; на песчаномъ берегу озера Каракуль, 13.400', 5. VII въ цв.; отъ Каракуль до Мускола, 13.400—14.300; 6. VII въ цв.; на перевалѣ Акъ-Байталъ, 14.500—15.700', 8. VII въ цв. и 8. VIII; въ уроцищѣ Чичикты, среди гальки на берегу рѣчки, 12.750', 9. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Ша-Джаномъ, 12. VII въ цв.; отъ Памирского Поста до Карасу, 12.650—13.100', 15. VII въ цв. и 5. VIII въ цв.; отъ Карасу до Чатыръ-таца, 13.100—14.000', 16. VII въ цв. и 4. VIII въ цв.; между озеромъ Каракуль и переваломъ Кизыль-артъ, 13.400—14.000', 10. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!). — 1901. Каракуль, солончаки; пески передъ Мусколомъ; сырьи пески р. Акъ-Байталъ (*Тулиновъ!*). — Цвѣты бѣлые.

Очень обыкновенно среди камней на сырьихъ мѣстахъ. По Громбчевскому это, какъ и *Serratula procumbens*, Памирский чай.

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Малый Алай, Памирь, Дарвазъ. — б) Тибетъ, Монголія.

**364. *Dracocephalum stamineum* Kar. Kir.—Karel. et Kiril., Enim. pl. Soongor., № 646.—Ledb., Fl. Ross. III p. 384, № 6.—
Hook., Fl. of Br. Ind. IV p. 666, № 6.**

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 347.—
Б. Федченко, Мат. фл. Памира, р. 9, № 166. — О. Федченко,
Растения Памира, № 177.

1878. Акъ-Байталъ, въ цв. (*Кушакевичъ!*; почеркъ не его, и безъ числа и мѣсяца); Памирь Аличуръ, отцвѣтие; верховье р. Аличура, 28. VIII отцвѣтие (*Кушакевичъ!*) — 1892. Карасу (*Назаровъ!*). — 1893. Бозай-Гумбезъ (Poncins; non vidi). — 1901. Между Памирскимъ Постомъ и Ша-Джаномъ, 12. VII въ цв., въ каменистыхъ оврагахъ; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, на скалахъ по берегу рѣчки Карасу, 15. VII и 5. VIII въ цв.; на перевалѣ Акъ-Байталъ, 14.500—15.700'; 8. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!). — 1901. Сырые пески р. Акъ-Байталъ (*Тулиновъ!*) — Цвѣты синіе.

Геогр. распр.: а) Джунгарский Алатау, Тяньшань, алтайская область Алайского хребта, Памирь. — б) Западные Гималаи и Западный Тибетъ.

365. *Dracocephalum nodulosum* Rupr., Sertum Tianschanicum, p. 65.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 347.

Указывается Франши для перевала Талдыкъ, т. е. для Алайского хребта, а не Памира.

Геогр. распр.: Алтайская область горъ Заравшана и Алайского хребта; Тяньшань; Гиссарь.

**366. *Scutellaria alpina* L.—Linne, Sp. pl. ed. I p. 599.—
Ledb. Fl. Ross. III, p. 394, № 1.—Boiss., Fl. Or. IV, p. 683, № 4.
var. *prostrata* Trautv.**

f. *pamirica* O. Fedtsch. (forma nova).

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 178.

1878. Памирь-Харгоши, 6. VIII въ цв. (*Ашурбаевъ!*). — 1891. Перевалъ Бейкъ, 15.000', 20. VII въ цв. (*Бржезинский!*). — 1895. Бозай Гумбезъ, цв. (*Боголюбенский!*). — 1899. Памирь (*H. Вельманъ!*). — 1901. Между Карасу и уроцищемъ Чатыръ-ташъ, среди камней въ сухомъ руслѣ верховьевъ рѣки Карасу, на высотѣ около 13.500', 16. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!). — Цвѣты желтые, съ синимъ пятномъ на верхней губѣ и боковыхъ лопастяхъ.

На Памирѣ встречается рѣдко.

Геогр. распр. а) Джунгарский Алатау и Тарбагатай, Памирь. — б) Южная Россія, Ураль, Алтай, горы южной Европы и Альпы.

367. *Scutellaria orientalis* L.—Linne, Sp. pl. ed. I p. 598.—Ledb., Fl. Ross. III p. 395 № 2.—Boiss., Fl. Or. IV p. 682 № 1.

var. *chamaedrifolia* Rchb.

Указывается Бржезицкимъ для Памира (р. Марджанай и р. Вахдиръ) на этикеткѣ; но экземпляръ въ герб. собранъ имъ на р. Сукураватъ въ Гиндукушѣ, 26. VII. 1891 г. въ цв! Указ. для Памира: *Sideritis montana* L.—*Linné*, Sp. pl. ed. I p. 575.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 401, № 2.—*Boiss.*, Fl. Or. 706, № 4.

Въ гербаріи Спб. Бот. Сада есть это растеніе съ этикеткой: „Pamir, Ak-Baital, Kuschakewicz (18) 78“, но писанной не его рукой, а уже въ Петербургѣ; а рядомъ лежать точно такіе же экземпляры съ Акъ-буры въ Онгъ отъ 27. VI. 1878 г., собранные дѣйствительно Кушакевичемъ! Возможно, что и яко-бы памирскія растенія того же происхожденія (т. е. не съ Акъ-Байтала, а съ Акъ-буры, значить изъ Алайского хребта).

Геогр. распр.: а) Джунгарія и Джунгарскій Алатау, горы Заравшана.—б) Южная Европа, южная Европейская Россія, Крымъ, Кавказъ, Персія, Афганистанъ, сѣв. Африка.

369. *Lamium rhomboideum* Benth.—*Benth.*, Lab. 59.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV p. 678, № 1.

1878. Каръ-артъ, 2. VIII цв. (*Козловский!*)¹⁾.

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Алайский хребетъ (перевалъ Кавукъ; Малый Алай)—б) Альпійская область западныхъ Гималаевъ, Тибеть, Монголія, Афганистанъ.

370. *Lamium* sp.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.

Приводится Франшие для пер. Талдыкъ, т. е. Алайского хребта.

371. *Lagochilus diacanthophyllus* (Pall.) Benth.—*Benth.*, Lab. p. 641.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 432, № 2.—*Moluccella diacanthophylla* Pall. in „Nov. act. Acad. Petropol.“ X, p. 380, t. 11.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 9, № 173.

1878. Памиръ-Алицуръ, 20. VIII (*Кушакевичъ!*); Булунъ-куль, 25. VIII (*Кушакевичъ!*).—1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*).—Цвѣты белые.

Геогр. распр.: Горы Заравшана, Уратюбе, Алайский хребетъ, Тяньшань, Шугнань, Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Памиръ.

372. *Phlomis oreophila* Karel. et Kiril. Enum. pl. Soongor. № 655.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 438, № 8.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. IV p. 692, № 1, (sub *Ph. spectabilis* Falc. mss.).

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347 (*Phlomis* sp.).

1895. Зорь-куль, въ цв. (*Боголюбенский!*). Къ этому же виду, вѣроятно, относится *Phlomis* sp., который приводится Франшие (I. c.), но онъ не принадлежитъ къ числу Памирскихъ растеній, такъ какъ собранъ на перевалѣ Талдыкъ, т. е. въ Алайскомъ хребтѣ.

Мы собирали этотъ видъ въ лѣсной области Алайского хребта (въ Акъ-Басагъ), на окраинахъ можжевеловыхъ зарослей, и указаніе его для такой чисто Памирской мѣстности, какъ озеро Зорь-куль, нуждается въ подтверждении.—Цвѣты розовые.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Алайский хребетъ, Тяньшань.—б) Гукеръ полагаетъ, что *Phlomis oreophila* Kar. et Kir. только болѣе мелкая форма *Ph. spectabilis* Falc., встрѣчающаяся въ западныхъ Гималаяхъ и Афганистанѣ.

373. *Eremostachys laciniata* (L.) Bge. in *Ledb.*, Fl. alt. II p. 416 in adnot.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 439, № 1.—*Boiss.*, Fl. Or. IV p. 793, № 1.—*Phlomis laciniata* L. Sp. pl. ed. I. p. 585.

1895. Р. Балыидъ-кіикъ 20. VIII. (*Бржезицкий!*; указывается имъ же, на этикеткѣ гербарія, для р. Каиниды, до 14.000').—Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Басмандинское ущелье, горы Заравшана, Алайский хребетъ, Шугнань, Тяньшань.—б) Кавказъ и Закавказье, Сирія, Ливанъ, Палестина.

374. *Eremostachys speciosa* Rupr.—*Osten-Sacken* et *Ruprecht*, Sertum tianschanicum, p. 68.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.

1893. Указывается Франшие (I. c.) для перевала Талдыкъ, т. е. для Алайского хребта, а не для Памира.

Геогр. распр.: Тяньшань.

¹⁾ Бржезицкимъ указывается, для р. Марджанай на Памире, но собранъ имъ 26. VII. 1891 г. на р. Сукураватъ, т. е. въ Гиндукушѣ.

375. *Otostegia Olgae* (Rgl.) Korsh. — Коржинский, Очерки растит. Турк. р. 96, № 17. — *Chartocalyx Olgae* Rgl., Регель въ Путешествии въ Туркестань А. П. Федченко, вып. 18, р. 71, № 167.

1891. Переяль Бенкъ, 22. VII въ цв. (*Брюсселлский!*; имъ же указывается для р. Мургабъ и пер. Каниды, до 13.000'). — Цвѣты бѣлые.

Геогр. расп. Алайскій хребетъ.

XXXIV. Plumbagineae.

376. *Acantholimon alatavicum* Bge. — *Bunge*, Die Gattung Acantholimon Boiss., („Mém. de l'Acad. d. Sc. de St. Petersbourg“, XVIII, № 2. 1872, р. 40, № 39).

Указ. для Памира: *Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 8, № 137.—*О. Федченко*, растенія Памира, № 179.

1878. Каръ-артъ, 2. VIII цв. (*Козловскій!*). Яшиль-куль, 22—24. VIII цв. (*Кушакевичъ!*).—1891. По р. Ваханъ-даръ, въ цв. 1. VIII (*Брюсселлский!*; имъ же указывается для р. Каракурупъ на Памирѣ).—1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*).—1901. Между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13100—14,300'; 16. VII въ бутонахъ; на каменистыхъ склонахъ близъ озера Яшиль-куль, 12,500', 18. VII зацвѣтающіе; между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13100—12650', 5. VIII въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*).—Замѣчено также на песчано-щебневыхъ осыпяхъ между уроцищемъ Чатыръ-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540—13.100', 17. VII (*Б. и О. Федченко!!*). Цвѣты розовые.

Геогр. расп. Алайскій хребетъ, горы Заравшана, Джунгарскій Алатау, Залійскій Алатау, Тяньшань.

377. *Acantholimon diapensioides* Boiss. in DC. Prodr. XII p. 624.—Boiss., Fl. Or. IV p. 830, № 14.—*Bunge*, Die Gattung Acantholimon, p. 21, № 12.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., р. 24, № 57.—*Б. Федченко*, Мат. фл. Пам., р. 8, № 136.—*О. Федченко*, Раст. Памира, № 180.

1878. Памиръ-Харгоши, 6. VIII, цв.; Акъ-Байталъ, VIII, цв. (*Кушакевичъ!*).—1892. Переяль Найзаташъ (*Назаровъ!*).—1895. Машали, 23. VI, въ цв. (*Богоявленскій!*).—1895. Одно изъ самыхъ обыкновенныхъ растений Большаго и Малаго Памира (Alcock; non vidi).—1901. Между уроцищемъ Мар-

ансу и озеромъ Кара-куль, 13.100—13.400', 4. VII въ бутонахъ; въ окрестностяхъ озера Кара-куль 5. VII въ бутонахъ; на съверномъ склонѣ перевала Акъ-Байталъ, у его подошвы, 14.400', 7. VII въ цв.; между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—13.800', 16. VII въ цв.; между Чатыръ-ташемъ и озеромъ Сассыкъ-куль, на песчано-щебневыхъ осыпяхъ, 13.540—13.100', 17. VII въ цв. и 3. VIII въ цв.; въ щебневой пустынѣ между уроцищемъ Ходжа-Назаръ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.800—13.100', 2. VIII въ цв. (*Б. и О. Федченко!!*).—Замѣчено также въ щебневой пустынѣ между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', 18. VII и на щебневыхъ россыпяхъ выше перевала Кой-тезекъ, до 16.000', 20. VII (*Б. и О. Федченко!!*).—Ледниковые холмы передъ Сассыкъ-кулемъ (*Тулуновъ!*).—Цвѣты розовые.

Растетъ низкими, сильно развѣтвленными кустиками, образующими плотныя подушки, иногда до аршина и болѣе въ діаметрѣ. Употребляется киргизами, какъ топливо.

Туземное название: Кампермышъ (кирг.).

var. *longifolia* O. Fedtsch. (var. nov.). Folia duplo longiora quam in typō; calycis tubus breviter pubescens. Листья вдвое длиннѣе, чѣмъ у типической формы; трубка чашечки коротко пушистая.

1978. Памиръ-Харгоши, 2—5. VIII, въ цв. (*Кушакевичъ!*).—Цвѣты розовые. Характеръ роста такой же, какъ у типической формы.

Геогр. расп. вида: а) Малый Алай, Тяньшань.
б) Афганистанъ.

XXXV. Plantagineae.

378. *Plantago Griffithi* Decaisne in DC. Prodr. XIII p. 700.—Boiss., Fl. Or. IV p. 880, № 5.

var. *pamirica* O. Fedtsch. (var. n.); spica abbreviata capituliformis.

Указ. для Памира: *О. Федченко*, Растенія Памира, № 181.

1891. Между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', 18. VII плоды (*Б. и О. Федченко!!*).—1901. Чатыръ-ташъ (*Тулуновъ!*).

Изъ всѣхъ видовъ рода *Plantago*, которые я видѣла въ богатомъ гербаріи Имп. Бот. Сада, наше растеніе всего ближе къ растенію, собранному въ ю.-вост. Персіи (провин-

ция Керманъ). *Boroniollleron*, и опредѣленному имъ первоначально какъ *P. Griffithi* Deen. var. *alpina* Bornm.; въ экземплярахъ нашего собственнаго гербарія Борнимюллеръ правильнѣо относить свое растеніе къ *P. gentianoides* Smith var. *scardica* Griseb. (*Boiss. Fl. Or. IV*, p. 879, № 4), виду, очень близкому и отличающемся, между прочимъ, голой стручкой и голымъ стержнемъ колоса, которые у *P. Griffithi* пушистые.

Геогр. распир.: а) Памиръ.—б) Афганистанъ, Персія.

379. *Plantago arachnoidea* Schrenk. Enum. pl. nov. I, p. 16.—*Ledb. Fl. Ross. III* p. 484, № 19.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.—*O. Федченко*, Растенія Памира, № 182.

1878. Карасу, пл. (*Кушакевичъ!*).—1893. Кизыльтъ-артъ (*Poncins; non vidi*).—1901. Между урочищами Чатыръ-ташъ и Карасу, 13.100—13.800', 4. VIII въ цв.; между Памирскимъ постомъ и урочищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII въ плодахъ (Б. и О. Федченко!!).—Замѣчено также въ щебневой пустынѣ между озеромъ Кара-куль и урочищемъ Мусколъ, 13.400—14.400', 6. VII; на каменистыхъ склонахъ близъ урочища Гурумды, 14.000', 9. VII; въ щебневой пустынѣ между урочищемъ Ходжа-Назаръ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.800—13.100', 2. VIII (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распир.: Алайскій хребеть, Тяньшань, горы Джильт-карагай въ Джунгарскомъ Алатау.

XXXVI. Salsolaceae.

380. *Chenopodium vulvaria* L., Sp. pl. ed. I p. 220.—*Ledb. Fl. Ross. III* p. 695, № 4.—*Boiss. Fl. Or. IV* p. 901, № 2.

Указ. для Памира: *Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 9, № 176.

1892. Мургабъ (*Назаровъ!*), съ еще не распустившимися цветами.

Геогр. распир.: а) Алайскій хребеть, Тяньшань.—б) Европа, южная Россія, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Персія, Ливанъ, сѣв. Африка (Египетъ).

381. *Blitum virgatum* L., Sp. pl. ed. I p. 4.—*Ledb. Fl. Ross. III* p. 706, № 1.—*Boiss. Fl. Or. IV* p. 905.—*Chenopodium Blitum* Hook. in Gen. Plant. 52.—*Chenopodium Blitum* Hook., Fl. of Br. Ind. V p. 5, № 8.

Указ. для Памира: *Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 9, № 177.

1878. Кизыльтъ-артъ, 23. VII цв. (*Кушакевичъ!*. Едва ли на Памирскомъ, вѣроятно на сѣверномъ склонѣ перевала).—1892. Мургабъ (*Назаровъ!*).

Геогр. распир.: а) Джунгарія, Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, горы Заравшана, Алайскій хребеть, Тяньшань.—б) Европа и евр. Россія, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Ураль, Алтай, с.-з. Индія, западный Тибетъ, Афганистанъ, Персія, сѣверная Африка.

382. *Blitum rubrum* (L.) Rehb., Fl. germ. exc. p. 582.—*Boiss. Fl. Or. IV* p. 905, № 2.—*Chenopodium rubrum* L. Spec. pl. ed. I p. 218.—*Blitum polymorphum* C. A. M., *Ledb. Fl. Ross. III* p. 707, № 3.

Указ.: *Б. Федченко* Мат. фл. Пам. р. 9, № 178, (B. rubrum? Koch.).

1892. Акъ-Байталь, зацвѣтающій экземпляръ (*Назаровъ!*).

Геогр. распир.: а) Долина Сырь-Дары; Алайскій хребеть.—б) Почти вся Европа, евр. Россія, Кавказъ, Ураль, Алтай, Байкалъ, Даурія.

383. *Atriplex rosea* L., Sp. pl. ed. II, p. 1493.—*Ledb. Fl. Ross. III* p. 717, № 4.—*Boiss. Fl. Or. IV* p. 911, № 9.—*A. rosea* L? *Hook. Fl. Br. Ind. V* p. 7, № 3.—*Atriplex laciniiata* L. var. *rosea* (L.) Trautv.—*Trautvetter*, Enum. pl. Songor. in Bull. Soc. Mosc. 1867. № III p. 53, № 948.

Указ. для Памира: *Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 9, № 174 (*Atriplex* sp.).—*О. Федченко*, Растенія Памира, № 183.

1878. Памиръ - Харгоши 30. VII пл. (*Ашурбаевъ!*). Растеніе Ашурбаева совершило тождество съ молодыми экземплярами, собранными въ 1901 г. на Сассыкъ-куль (Б. и О. Федченко!!).—Рашъ-куль 14. VIII пл. (*Кушакевичъ!*). У растеній Кушакевича травянистая часть чашечки у плодовъ шире, чѣмъ у Ашурбаевскихъ.—1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*).—1901. На солонцеватыхъ, бесплодныхъ берегахъ озера Сассыкъ-куль, 13.100', 18. VII, молодые экземпляры (Б. и О. Федченко!!).—1901. Сассыкъ-куль; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (*Тулковъ!*).

У Памирского растенія листья цѣльнокрайніе или почти цѣльнокрайніе, отчасти съ железистыми волосками; железистые волоски сильно покрываютъ стебель, особенно въ верхней части, и широкіе, травянистые съ выдающимися ребрами чашечники при плодахъ.

Геогр. распр.: а) Джунгарія.—б) Въ Европѣ по берегамъ моря, на Рейнѣ, по Дунаю, вся евр. Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Алтай, Западный Тибетъ, Сирія, Египетъ.

384. *Atriplex laciniata* L. — *Linné*, Sp. pl. ed. I p. 1053.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 718.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 26, № 76.

1895. Памиръ 13.000—14.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.: а) Джунгаро-киргизскія степи, долина Сыръ-Дары, Тяньшань, долина Заравшана, Шугнанъ.—б) Южная Европа и вся европейская Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Сибирь.

385. *Eurotia ceratoides* (L.) C. A. Mey.—*Axyris ceratoides* L. Sp. pl. ed. I p. 979.—*Eurotia ceratoides* C. A. M. *Ledb.*, Fl. Ross. III p. 738, № 1.—*E. ceratoides* C. A. M., *Boiss.*, Fl. Or. IV p. 917, № 1.—*E. ceratoides* C. A. M., *Hook.*, Fl. of Br. Ind. V p. 8.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 26, № 77.—*Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 9, № 179.—*О. Федченко*, Растенія Памира, № 184.

1878. Памиръ-Харгопи: Карап-куль 30. VII пл. (*Ашурбаевъ!*); предгорья горъ, ограничивающихъ озеро Карап-куль съвера, 30. VII пл. (*Кушакевичъ!* и *Ашурбаевъ!*); Акъ-Байталь, Рангъ-куль, всюду на Памирѣ, 8, 9, 10, 11 и 12. VIII пл. (*Кушакевичъ!*—въ герб. 1 экз.); Памиръ-Аличуръ, всюду, 24, 25 и 26. VIII пл. (*Кушакевичъ!*).—1891. Ур. Бода по р. Кизиль-джінкъ (*Брэсезицкій!*; имъ же указывается, на этикеткѣ гербарія, для озера Рангъ-куль, устья р. Акъ-Байталь, р. Съв. Бенкъ, р. Карап-чукуръ, р. Вахджиръ, Маз. Бозайгумбезъ и для всѣхъ Памировъ, до перевала Каиды, отъ 12.000 до 16.000').—1892. Шоръ-куль, Рангъ-куль, бол. Карап-куль (*Назаровъ!*).—1895. Одно изъ самыхъ обыкновенныхъ растеній Большаго и Малаго Памира; растеть всюду на сухой почвѣ (Alcock; non vidi).—1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*).—1901. На скалахъ и на песчано-каменистыхъ склонахъ между Маркансу и озеромъ Карап-куль, 13.100—13.400', 4. VII; на склонахъ съ пескомъ и на песчаномъ берегу озера Карап-куль 5. VII въ цв.; возлѣ Памирского Поста, въ каменистой пустынѣ, 11. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 15. VII; въ песчано-галльковой пустынѣ между урочищемъ Чатыръ-ташъ и озеромъ Сассыкъ-

куль, 13.540—13.100', 17. VII въ цв.; между озеромъ Карап-куль и переваломъ Кизиль-артъ, 13.400—14.000', 10. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—1901. Чатыръ-ташъ; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (*Тулитовъ!*). Небольшіе кустики съ толстымъ, деревянистымъ корнемъ; главнѣйшее памирское тоцливо. Цвѣты красные. Мѣстное название: терекентъ.

Геогр. распр.: а) Джунгарія, Тарбагатай, Тяньшань, Шугнанъ, долина и горы Заравшана, Алайскій хребетъ, Памиръ, пески Кизиль-кумъ.—б) Испанія, Австрія и Моравія, ю.-в. и южная Россія, Кавказъ, Ураль, Алтай, Байкалъ, западные Гималаи, Тибетъ, Монголія, Китай, Белуджистанъ, Афганистанъ, Персія, съв.-зап. Америка.

386. *Kochia prostrata* (L.) Schrad., Neues Journal 1809, III St., p. 85.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 747, № 3.—*Boiss.*, Fl. Or. IV p. 923, № 1.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. V p. 10, № 1.—*Salsola prostrata* L. Sp. pl. ed. I p. 222.

Указ. для Памира: *О. Федченко*, Растенія Памира, № 185.

1878. Памиръ, Акъ-Байталь (*Кушакевичъ!*; почеркъ не его и безъ числа), не распустившіеся цвѣты.—1901. Между Сассыкъ-кулемъ и Яшиль-кулемъ, 13.100—12.500', 18. VII (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Джунгарія, Тяньшань, горы и долина Заравшана, пески Кизиль-кумъ.—б) Южная и средняя Европа, южн. и ср. Евр. Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Алтай, Байкалъ, Даурія, зап. Гималаи и зап. Тибетъ, съв. Африка.

387. *Echinopsilon divaricatus* Kar. et Kir., Enum pl. Fl. alt. № 760.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 752, № 2.—*Chenolea divaricata* *Hook. f.*, Hooker, Fl. br. Ind. V p. 10, № 1.

1878. Аксу, 30. VIII (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распр. а) На южномъ берегу озера Нортъ-Зайсанъ.—б) Китай, с.-з. Индія.

388. *Corispermum hyssopifolium* L., Sp. pl. ed. I p. 4, (1753).—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 759, № 2.—*Boiss.*, Fl. Or. IV p. 930, № 5.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. V p. 9.

Указ. для Памира: *О. Федченко*, Растенія Памира, № 186 (var. *pamiricum*).

1878. Карасу 31. VIII пл. (*Кушакевичъ!*).
var. *pamiricum* O. Fedtsch. (var. n.) *Nanum*, *glutinosum*, *annuum*; *floribus glomeratis*. Карликовое растеніе съ очень

тонкими и короткими стеблями и скученными цветами, однолетнее, покрытое железистыми волосками.

1901. Между Мусколомъ и озеромъ Кара-куль, 14.100—13.400', 9. VIII съ изрѣлыми плодами (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. расп. вида: а) Джунгарія, Тяньшань, Памиръ.—б) Южная Франция, Испания, ю.-в. Германия, по Дунаю, Турция, средняя и южная Россія, Кавказъ, Ураль, Алтай, Байкалъ, Даурія, Китай, западный Тибетъ, съверная Америка.

389. *Suaeda maritima* (L.) Dumort., Fl. belg. p. 22.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 786, № 12.—*Boiss.*, Fl. Or. IV p. 941, № 11.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. V, p. 14, № 14.—*Chenopodium maritimum* L., Sp. pl. ed. I p. 221.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 187.

1878. На полуостровѣ озера Кара-куль, 1—2. VIII цв.; Чонъ-су, 6. VIII цв.; Чонъ-су на Акъ-Байталъ 8. VIII цв.; Раингъ-куль, 15. VIII зреѣлые плоды (*Кушакевичъ!*).—1901. Между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.500', на сырой луговинѣ между болотистымъ лугомъ и скалами, 12. VII въ цв.; на кочкарномъ солонцеватомъ берегу озера Сасыкъ-куль, 13.100', 18. VII въ цв.; между Сасыкъ-кулемъ и уроцищемъ Чатыръ-ташъ, 13.100—13.540', 3. VIII въ цв.; между Чатыръ-ташемъ и Карасу, 13.100—13.800', 4. VIII въ цв.; подъ переваломъ Акъ-Байталъ, на южной сторонѣ, 14.000', 8. VIII въ цв.; въ горномъ ущельи близъ озера Кара-куль, въ сырой котловинѣ, 13.500—14.000', 10. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!)

Однолѣтняя, маленькая растенія, распространеныя на земль; растутъ группами.

Геогр. расп.: а) Джунгарія.—б) Всѧ, кроме арктической, приморская область Европы, съв., средн. и южная Россія, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Ураль, Байкалъ, восточная Сибирь, Китай, Индія, Цейлонъ, Сіамъ, Персія, Канарскіе острова, с. Африка, с. Америка.

390. *Halogeton glomeratus* (M. B.) C. A. M.—*C. A. Meyer* in *Ledb.*, Fl. alt. I p. 378.—*Ledb.*, Fl. Ross. III p. 832, № 2.—*Boiss.*, Fl. Or. IV p. 985, № 2.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. V p. 20.—*Anabasis glomerata* M. a *Bieb.* in Mem. Soc. nat. Mosq. I ed. 2 p. 110; IV p. 19.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 26, № 78.—Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 9, № 180 (?) и 181 (?) и вмѣстѣ съ № 182.—О. Федченко, Растенія Памира, № 188.

1878. Каръ-артъ, 2. VIII пл. (*Козловский!*); близъ Кара-куля 5. VIII пл.; Акъ-Байталъ, 9. VIII пл.; Шоръ-куль 26. VIII пл.; Памиръ-Серезъ VIII, пл.; Аксу 31. VIII пл. (*Кушакевичъ!*). Мѣстныя названія: шура; ишкаръ.—1892. Карасу; Мургабъ; Яшиль-куль, цв.; Раингъ-куль, юв. (*Назаровъ!* въ Мат. фл. Пам. Б. Федченко, не опредѣлено).—1895. Найдено только разъ на каменистомъ пригоркѣ между Кизыль-Рабатомъ и Mihmanyol (Alcock; non vidi).—1901. На Карасу и между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 15. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). Мохнатое у основанія стебля; листья съ длинными волосками на концѣ.

Геогр. расп.: Джунгарія, Тяньшань, Туркменія у Каспийского моря, Индерское озеро, Заравшанская долина.—б) Тибетъ, Афганистанъ.

XXXVII. *Polygonaceae*.

391. *Rheum spiciforme* Royle, Ill. 318, t. 78.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. V p. 55, № 1.

Указ. для Памира: Alcock, Report on the Natural History of the Pamir Boundary Commission p. 4 (a species of Rhubarb).—Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 9, № 188.—О. Федченко, Раст. Памира, № 189.

1878. Памиръ-Харгоши: Кара-куль, 30. VII (*Ашурубаевъ!*); съверные предгорья озера Кара-куль, 30. VII въ плодахъ (*Кушакевичъ!*).—1892. верховья Аличура (*Назаровъ!*).—1901. На южномъ склонѣ перевала Кизыль-артъ, 3. VII въ цв.; въ уроцищѣ Маркансу, въ каменистой пустынѣ, вмѣстѣ съ Parrya exscapa C. A. M., 13.100', 3. VII, въ цв.; на берегу озера Кара-куль, 13.400'; 5. VII, въ цв.; между озеромъ Кара-куль и уроцищемъ Мусколъ, 13.400—14.100', 6. VII, въ цв.; подъ переваломъ Акъ-Байталъ, на южной сторонѣ, 14.000', 8. VIII, въ плодахъ; между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизыль-артъ, 10. VIII, въ пл. (Б. и О. Федченко!!).—1901. Мокрый песокъ на Мусколѣ (*Тулиновъ!*).

Растетъ въ сырыхъ каменистыхъ мѣстахъ и между галькой въ высохшихъ руслахъ рѣкъ.

Цвѣты желтые, невзрачные; плоды крупные, пунцовы. Къ этому же виду относится, конечно, ревень, которого не собралъ на Памирѣ Alcock (l. c.), не найдя его въ цвѣту.

Геогр. распр.: а) Алайский хребетъ (переваль Кавукъ). — б) Западные Гималаи и зап. Тибеть, Афганистанъ, Китай.

392. *Oxyria digyna* (L.) Hill, Hort. Kew. p. 158 (1769). — *O. digyna* Hill, Hook., Fl. of Br. Ind. V p. 58. — *O. digyna* Campd., Mon. p. 155 tab. 3. — *O. digyna* (L.) Boiss. Fl. or. IV p. 1004. — *O. reniformis* Hook. Fl. Scot. p. 111. — *O. reniformis* Hook., Ledb., Fl. Ross. III, p. 498, № 1. — *Rumex digynus* Linné, Sp. pl. ed. I p. 337.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl., p. 26, № 82. 1895. По берегамъ ручьевъ на каменистой почвѣ, на высотѣ около 14.000', не часто (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Шугнанъ, Алай и Алайский хребетъ, горы Заравшана, Туркестан. хреб. — б) Шпицбергенъ, Новая земля, арктическая Европа и горы сѣв. и средн. Европы, арктическая евр. Россія, Сибирь до Камчатки, арктическая Америка, Альпы Гималаевъ и западный Тибеть, Персія, Закавказье.

393. *Rumex domesticus* Hartm. — Hartm., Scandin. p. 148. — Ledb., Fl. Ross. III p. 506, № 9.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 9 № 187 (*R. crispus*). — О. Федченко, Растенія Памира, № 190.

1878. Р. Джаманталь, верховья, 17. VIII, въ цв. и пл. (Кушакевичъ!). — 1892. Карасу (Назаровъ!). — 1901. Въ водѣ близъ берега въ рѣчкѣ Карасу, 13.100', 15. VII, зацвѣтающій (Б. и О. Федченко!!).

Наше растеніе совершенно тождественно съ тамъ же собраннымъ Кушакевичемъ.

Геогр. распр.: а) Долина и горы Заравшана, Шугнанъ, Тяньшань. — б) Европа, арктическая, сѣв. и средняя Россія, Кавказъ, Сибирь, Камчатка, арктическая Америка.

394. *Polygonum Bistorta* L., Sp. pl. ed. I p. 360. — Ledb., Fl. Ross. III p. 518, № 1. — Boiss., Fl. Or. IV p. 1027.

Въ гербаріи Импер. Бот. Сада есть это растеніе съ этикеткой „Карабу, Кушакевичъ, 78“, но безъ числа и написанная не его рукой; мнѣ кажется сомнительнымъ, чтобы оно было собрано на Памирѣ. Другие экземпляры этого же вида со-

бранны Кушакевичемъ 22. VII 1878 г. въ цвѣту, между Бордабой и Кизылъ-артомъ, т. е. въ Заалайскомъ хребтѣ.

Геогр. распр.: а) Тарбагатай и Джунгарскій Алатау, Заалайскій и Алайскій хребты, Туркестанскій хребетъ (Аучидагана). — б) Горы всей сѣверной и средней Европы, вся евр. Россія, Кавказъ, Ураль, Алтай, Байкалъ, вост. Сибирь, Даурія, земля Чукчей, Камчатка, сѣв. Америка, Китай, Монголія, Тибеть, Персія.

395. *Polygonum viviparum* L. — Linné, Sp. pl. ed. I p. 360. — Ledebour, Fl. Ross. III p. 519, № 2. — Boiss. Fl. Or. IV p. 1027, № 1. — Hook., Fl. of Br. Ind. V p. 31, № 16.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl. p. 26, № 80. — Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 9, № 183. — О. Федченко, Растенія Памира, № 191.

1878. Акъ-Байталъ, близъ перевала, 8. VIII; первый переваль къ Акъ-Байталу, 8. VIII (Кушакевичъ!). — 1891. Р. Мургабъ 17. VII; р. Аксу 17. VII (Бржезинскій); имъ-же на этикеткѣ гербарія, указывается для р. Истыкъ, верховьевъ р. Ваханъ-дары, р. Памиръ и р. Аличуръ). — 1892. Яшилькуль (Назаровъ!). — 1895. Очень обыкновенно на кочкарныхъ болотахъ по берегамъ рѣкъ системы Аму-Дары (Alcock; non vidi). — 1901. Между озеромъ Яшиль-куль и уроцищемъ Ходжа-Назаръ, 12.500 — 13.800', на сырыхъ лужайкахъ и по берегамъ рѣчекъ, 19. VII, въ цв. и пл. (Б. и О. Федченко!!). Цвѣты блѣдые.

Геогр. распр.: а) Тарбагатай и Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Алайскій хребетъ. — б) Альпийская область сѣверной и арктической Европы, евр. Россія, Кавказъ, Ураль, вся Сибирь съ Камчаткой, арктическая Америка, альпийская и субальпийская область Гималаевъ, Тибеть, Монголія, Китай.

396. *Polygonum pamiricum* Korsh., Коржинский, Очерки растит. Туркест. p. 98.

Указ. для Памира: Коржинский, l. c. — Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 9, № 182. — О. Федченко, Растенія Памира, № 192.

1878. Прибрежье Кара-куля 27. VII, въ цв.; прибрежье Кара-куля и по рѣчкамъ солонцеватымъ, Памиръ-Харгоши, VII, VIII, въ цв.: Акъ-Байталъ 9. VIII, въ цв. (Кушакевичъ!); близъ Кара-куля 5. VIII, въ цв. (Кушакевичъ! и Ашурбаевъ!). Аксу 16. VIII (Кушакевичъ!); экземпляры съ Аксу отличаются более вытянутыми стеблями и болѣе длинными листьями: въ-

роятию росли въ травѣ или на мокромъ мѣстѣ). — 1892. Яшиль-куль; Рангъ-куль (*Назаровъ!*). — 1895. На каменистой равнинѣ у озера Кара-куль, во множествѣ, 9 — 10. VII, въ цв. (*Коржинскій*). — 1901. На южномъ склонѣ перевала Кизыль-артъ, 14.000', 3. VII; на сырыхъ, песчаныхъ берегахъ озера Кара-куль, 13.400', 5. VII въ цв. и 10. VIII въ цв.; на сырыхъ мѣстахъ близъ Памирскаго Поста, 12.650', 10. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Шаджаномъ 12. VII въ цв.; на бесплодной солонцеватой равнинѣ у озера Сассыкъ-куль, 13.100', 17. VII въ цв.; между урочищемъ Мусколъ и озеромъ Кара-куль, 14.100 — 13.400', 9. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). — Замѣчено также въ песчано-щебниевой пустынѣ и на склонахъ между урочищемъ Маркану и озеромъ Кара-куль, 13.100 — 13.400', 4. VII; въ солонцевато-глинистой пустынѣ между урочищемъ Чатыръ-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540 — 13.100', 17. VII и на песчаныхъ склонахъ между озеромъ Яшиль-куль и урочищемъ Ходжа-Назаръ, 12.500 — 13.800', 19. VII (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Кара-куль; мокрый песокъ на Мусколѣ; Мургабъ, сырье луга; Сассыкъ-куль (*Тулиновъ!*). — Цвѣты бѣлые.

Геогр. распир.: Нигдѣ, кромѣ Памира, не найдено.

397. *Polygonum paronychioides* C. A. Meyer, Talysch.
Енум.р. 120.—*Boiss.*, Fl. Or. IV, p. 1040, № 37.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. V, p. 26, № 6. — P. Paronychia C. A. Meyer, Ind. cauc. p. 158, non Cham. et Schlecht. — *Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 534, № 31.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 26, № 79. — Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 9, № 186 (f. compactum B. F.). — О. Федченко, Растенія Памира, № 193.

1878. Яшиль-куль, 22 и 24. VIII (*Кушакевичъ!*), Аксу 31. VIII (*Кушакевичъ!*). — 1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*) (f compactum B. F.). — 1895. На высотѣ около 16.000' (Alcock; non vidi). — 1901. Между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100 — 13.800', 16. VII; между Чатыръ-ташемъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540 — 13.100', 17. VII; между Сассыкъ-кулемъ и озеромъ Яшиль-куль, 13.100 — 12.500', 18. VII; между Яшиль-кулемъ и урочищемъ Ходжа-Назаръ, 12.500 — 13.800', 19. VII (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Чатыръ-ташъ; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!*). — Цвѣты розовые.

Геогр. распир.: а) Шугнань, Памиръ. — б) Закавказье, Персія, Западные Гималаи, Афганистанъ.

398. *Polygonum acerosum* Meisn.—Meisn. in DC. Prodr. XIV, 92.

1878. Памиръ-Харгоши, 7. VIII (*Кушакевичъ!*).

Геогр. распир.: Джунгарія, горы Заравшана, Тянъ-шань, Алай, Шугнань.

399. *Polygonum molliaeforme* Boiss.—Boiss., Diagn. sér. I, 7, p. 84. — Boiss., Fl. Or. IV, p. 1043, № 44. — Hook., Fl. of Br. Ind. V, p. 27, № 10.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 26, № 81.—

0. Федченко, Раств. Пам., № 194.

1878. Памиръ-Харгоши, 7. VIII; Акъ-Байталъ, 8. VIII; по дорогѣ отъ Булунъ-куля на Сассыкъ, 26. VIII (*Кушакевичъ!*); Памиръ-Аличуръ, 28. VIII (*Кушакевичъ!* и Ашурбасевъ!). — 1895. Памиръ, 13 — 14.000' (Alcock; non vidi). — 1901. Между урочищемъ Чатыръ-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540 — 13.100', 17. VII въ цв.; на Акъ-Байталъ 8. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Чатыръ-ташъ или ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ? (*Тулиновъ!*). — Цвѣты розовые.

Растетъ маленькими группами на каменистой почвѣ.

Геогр. распир.: а) Сѣверный склонъ Заалайскаго хребта (истоки р. Кизыль-су), Шугнань, Памиръ. — б) Западный Тибетъ, Персія.

XXXVIII. Salicineae.

400. *Salix oxycarpa* Anders., in Journ. Linn. Soc. IV, 45.—
Hook., Fl. of Br. Ind. V, p. 636.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 9, № 189 (*S. alba*). — О. Федченко, Раств. Памира, № 195.

1878. Р. Джаманталъ, притокъ Аксу, 17. VIII, вѣтви со взрослыми листьями и молодые побѣги; устье р. Аличуръ въ Яшиль-куль, 24. VIII, вѣтви со взрослыми листьями и молодые побѣги (*Кушакевичъ!*). — 1892. Урочище Джаманталъ, Карасу (*Назаровъ!*). — 1901. Кустарникъ, образующій заросли по берегу р. Карасу въ урочищѣ Джаманталъ (что значитъ: плохой ивнякъ); собранъ 15. VII въ плодахъ (Б. и О. Федченко!!).

Намъ этотъ кустарникъ встрѣтился на Памирѣ только разъ, въ томъ же мѣстѣ, гдѣ его собирали Кушакевичъ и Назаровъ, въ урочищѣ Джаманталъ, защищенному подсту-пающими съ обѣихъ сторонъ къ рѣкѣ Карасу отвѣсными

склонами горъ. На Яшиль-куль мы его уже не нашли, хотя горный инженеръ (нынѣ начальникъ Иркутскаго Горнаго Управления) Д. Л. Ивановъ, изъѣздившій Памиръ въ 1883 году, еще засталъ кустики ивняка на восточномъ берегу озера Яшиль-куль. Въ Джаманталъ онъ, конечно, также истребляется; между прочимъ, имъ пользуются окрестные киргизы для своихъ кладбищъ: на стволы ивняка настилаются сланцевыя плиты, которыми закрываются могилы.

Памирскій ивнякъ¹⁾ совершенно тождественъ съ образцами того же вида, собранными нами въ Шугнанѣ, и, по свидѣтельству Б. А. Федченко, съ экземплярами S. oxycarpa And. въ гербаріи Кью (Kew); отъ описанія Гукера онъ отличается болѣе короткими сережками, не достигающими 4 дюймовъ длины (что соотвѣтствуетъ var. *breviscula* And.). Характеренъ для нашего растенія красный цвѣтъ молодыхъ вѣтвей.

Молодые побѣги съ красной корой, серповидными прилистниками и рѣдко сидящими, ланцетовидными, тонко-заостренными, зубчатыми листьями; зубцы тонкіе, загнутые къ листу; самые молодые листочки прижато шелковисто пушистые. На двухлѣтнихъ вѣтвяхъ кора желтая (у джамантальскихъ экземпляровъ Кушакевича) или бурая, прилистниковъ нѣть, листья сидѣтъ гуще, нижніе лѣпіевидные, тупые, верхніе острые, почти всѣ цѣльнокрайніе, голые, только самые верхніе съ рѣдкими зубчиками и опушениемъ указанного выше характера. У яшиль-кульскихъ экземпляровъ листья тощѣ, а вѣтви вверху и отчасти почки—коротко-пушистые.

По Серебренникову²⁾, Карасу—восточная граница древесной растительности; ниже по течению р. Мургабъ встрѣчается тальникъ, въ ущельи Іелы-су— круиний; растетъ онъ также, небольшими ронцами, западнѣе перевала Пшартъ (въ ущельяхъ Джанъ-каинды и Каинды) и встрѣчается на р. Кударъ (вероятно въ нижнемъ течении, т. е. уже въ Рошанѣ).

Геогр. распр.: а) Шугнанъ, Рошанъ, Памиръ.—б) Западные Гималаи.

¹⁾ При любезномъ содѣйствіи полковника В. Н. Зайцева я получила весною нынѣшняго (1903) года живые черенки этого вида съ Памира и культивирую ихъ въ Ольгинѣ (Можайскаго уѣзда).

²⁾ Серебренниковъ, Памиръ и Памирскія ханства („Инженерный Журналъ“ 1896 г., № 12, р. 1424).

XXXIX. Betulaceae.

401. *Betula alba* L. — *Linné*, Sp. pl. ed. I, p. 982. — *Ledb.*, Fl. Ross. III, p. 650, № 1. — *Boiss.*, Fl. Or. IV, p. 1180.

1878. Аксу 31. VIII (Кушакевичъ!). Этикетка писана не Кушакевичемъ, уже въ гербаріи Императ. Ботан. Сада, и образцы такъ сходны съ вѣтвями березы, лежащими въ той же общей обложкѣ и снабженными собственноручной этикеткой Кушакевича „Биль-ауліе (Белавли) 12. IX. 78“¹⁾, что я усомнилась бы отнести ихъ къ числу памирскихъ растеній, если бы мы не имѣли другихъ указаний²⁾, что береза встрѣчается по нижнему течению р. Мургабъ (= Аксу), въ ущельи Мадіанъ. Серебренниковъ же указываетъ березу для р. Кудары (очевидно, для нижнаго течения, выходящаго уже изъ предѣловъ собственнаго Памира) и для ущелій Джанъ-каинды и Каинды, западнѣе перевала Пшартъ (небольшія рощи).

На восточной окраинѣ Памира первыя березы появляются въ долинѣ Сарыколъ — въ тощихъ березокъ около Каинды-мазара,—и первая березовая роща — за 15 миль отъ Малаго Кара-куля³⁾.

Геогр. распр.: а) Джунгарія и Джунгарскій Алатау (горы Каркаралы, Алатау и Улутау), долина Сырь-дары (Ногай-курганъ), Тяньшань, горы Заравшана, Маргандъ, Алайский хребеть, Шугнанъ. — б) Вся Европа, Кавказъ и Закавказье, Уралъ, Сибирь, Японія.

XL. Najadeae.

402. *Potamogeton pectinatus* L., Sp. pl. ed. I, p. 127. — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 30, № 20. — *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 18, № 11. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 567, № 9.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 27, № 86. — Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 9, № 199. — О. Федченко, Раст. Пам., № 196.

1878. По озеркамъ береговъ восточнаго Кара-куля 5. VIII пл. (Кушакевичъ!). — 1892. Рангъ-куль (*Назаровъ!*). — 1895.

¹⁾ Беляулы—ущелье въ Алайскомъ хребѣ, близъ Гульши.

²⁾ См. Серебренниковъ, Памиръ и Памирскія ханства („Инженерный Журналъ“ 1896 г., № 12, р. 1424).

³⁾ Свѣн Гедингъ, Въ сердѣ Азіи, р. 300.

Обыкновененъ въ болотцахъ по берегамъ р. Аксу, 13—14.000' (Alcock; non vidi). — 1901. Близъ Памирского Поста, 12.650', 10 и 14. VII; между Памирскимъ Постомъ и Шаджаномъ, 12. VII; между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', 18. VII; въ озеръ Яшиль-куль, 19. VII; между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Джунгарія, долина Заравшана, долина Сырь-Дары (Ташкент), Фергана, Тяньшань, Памиръ. — б) Вся Европа, аркт., сѣв. и средняя европейская Россія, Кавказъ, Ураль, Алтай, Байкалъ, Китай, Монголія, Тибетъ, Индія, Гималаи, Цейлонъ, Персія, Афганістанъ, вся Африка, Сѣв. и Южн. Америка, Австралія, Новая Зеландія.

XLI. Juncagineae.

403. *Triglochin maritimum* L. Linne, Sp. pl. ed. I, p. 339. — Ledb., Fl. Ross. IV, p. 35, № 1. — Boiss., Fl. Or. V, p. 13, № 1. — Hook., Fl. of Br. Ind. VI, p. 563, № 2.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl. p. 27, № 85. — Franchet, pl. Poncins, p. 347. — Б. Федченко, Мат. фл. Пам., p. 9, № 198. — О. Федченко, Раст. Пам., № 197.

1878. Акъ-Байталъ, 9 и 10. VIII пл.; р. Джаманталъ, въ верховьяхъ, по сазамъ, 17. VIII пл. (Кулиакевичъ!). — 1892. Карасу (Назаровъ!). — 1893. Шаджанъ (Poncins; non vidi). — 1895. Памиръ, 13—14.000' (Alcock; non vidi). — 1901. На болотистомъ лугу у Памирского Поста, 10. VII въ цв.; на сырому лугу у переправы на Мургабъ, близъ уроцища Шаджанъ, 15. VII въ цв.; на солонцеватомъ болотѣ на берегу озера Сассыкъ-куль, 13.100', и на кочкарныхъ лугахъ, 17. VII въ цв. и пл. (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Мургабъ, сырье луга (Тулиновъ!).

Геогр. распр.: а) Алай, Тяньшань. — б) Европа и вся европейская Россія, Арменія, Сибирь, сѣв. Америка и сѣв. Африка, умѣр. и алы. Гималаи и зап. Тибетъ.

404. *Triglochin palustre* L. — Linne, Sp. pl. ed. I, p. 338. — Ledb., Fl. Ross. IV, p. 32, № 2. — Boiss., Fl. Or. V, p. 13, № 2. — Hook., Fl. of Br. Ind. VI, p. 563, № 1.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 347. — О. Федченко, Раст. Памира, № 198.

1893. Шаджанъ (Poncins; non vidi). — 1901. На берегу озера Кара-куль, 13.400', 4. VII въ цв.; на болотистомъ лугу на берегу Мургаба, близъ Памирского Поста, 12.650', 10 и 14. VII въ цв.; на солончаковомъ болотѣ у озера Сассыкъ-куль, 13.100', 17. VII въ цв. и пл.; озерца между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', 18. VII въ цв. и пл.; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 5. VIII въ плодахъ (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Мургабъ, сырье луга (Тулиновъ!).

Геогр. распр.: а) Долина и горы Заравшана, Магіанъ, Алайский хребеть, Тяньшань. — б) Вся, особенно сѣв. и средняя, Европа и вся евр. Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Сибирь съ Камчаткой, сѣв. и южна Америка, Китай, Монголія, Тибетъ, умѣренные и альпійские Гималаи, Афганістанъ, Персія.

XLII. Orchideae.

405. *Orchis turkestanica* Klinge. — *Orchis orientalis* Klinge, subsp. *Orchis turkestanica*, Klinge, Dactylorch. monogr. prodr. („Acta Horti Petrop.“ XVII, I, p. 183).

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам., p. 9, № 190. — О. Федченко, Раст. Пам., № 199.

1892. Карасу (Назаровъ!). — 1901. На болотистомъ лугу близъ Памирского Поста, 11 и 13. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 15. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Мургабъ, песчаный лугъ (Тулиновъ!).

Геогр. распр.: Долина и горы Заравшана, Алай и Алайский хребеть, Шуганъ, Тяньшань, Памиръ.

XLIII. Irideae.

406. *Iris ruthenica* Dryand. in Ait. h. Kew. ed. 2. I, p. 117 (1810). — *Iris ruthenica* Ait., Ledb., Fl. Ross. IV, p. 94, № 6. — *Iris caespitosa* Pall., Nyman, Conspl. Fl. Europ. p. 702, № 45. — *Iris uniflora* auct. transs. sec. Borb. (Nyman, l. c.).

var. uniflora (Pall.). — *Iris uniflora* Pall. in Willd. herb. № 995. — Ledb., Fl. Ross. IV, p. 95, № 7.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. p. 9, № 191.

1892. Карасу (Назаровъ!).

Геогр. распр.: а) Тяньшань. — б) Трансильванія, Сибирь.

XLIV. Liliaceae.

407. *Gagea stipitata* Merckl. in *Bunge*, Rel. Lehman. p. 512 (1851). — Регель, Пут. въ Турк. А. П. Федченко, вып. 12, р. 116, т. XIX, ф. 5—8. — *Gagea Persica* Boiss. var. *ebulbillosa* Boiss., Fl. Or. V, p. 210, № 14.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 9, № 193. 1892. Мургабъ (*Назаровъ!*). — Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Горы Заравшанской долины, Ташкентъ, Алайский хребетъ. — б) Перея, Афганистанъ.

408. *Gagea bulbifera* (L.) Schult., Syst. veget. VII, p. 552. — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 142, № 16. — *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 210, № 13. — Регель, Пут. въ Турк. А. П. Федченко, вып. 12, р. 111, № 8. — *Ornithogalum bulbiferum* L. fil. Suppl. 149.

Указ. для Памира: О. Федченко, Раст. Пам., № 200.

1901. На южномъ (памирскомъ) склонѣ перевала Кизиль-артъ, 14.600', на альпійскихъ лужайкахъ, 3. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!). — Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Долина Заравшана, Тяньшань, Джунгарскій Алатау, Иnderское озеро. — б) Южная Россія, Крымъ, Кавказъ, на р. Обь, Алтай; Перея.

409. *Gagea reticulata* (Pall.) Schult., Syst. Veget. VII, p. 542. — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 142, № 17. — *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 208, № 16. — Регель, Пут. въ Турк. А. П. Федченко, вып. 12, р. 110, № 7. — *Ornithogalum reticulatum* Pall., It. III, p. 553.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 201.

1901. На перевалѣ Кой-тезекъ, у тающаго снѣга, 15.000', 20. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!). — Цвѣты желтые.

Геогр. распр.: а) Долина Заравшана, Ташкентъ, Иnderское озеро. — б) Болгарія, ю.-в. Россія, Крымъ, Кавказъ, Закавказье, Персія, Сирія, Палестина, Афганистанъ, сѣверная Африка.

410. *Lloydia serotina* (L.) Rehb. Fl. excurs. p. 102. — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 144, № 1. — *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 202, № 1. — Hook., Fl. of Br. Ind. VI, p. 354. — *Anthericum serotinum* L., Spec. pl. ed. II, p. 444.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 347. — Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 9, № 192. — О. Федченко, Растенія Памира, № 202.

1892. Акъ-Байталъ (*Назаровъ!*). — 1893. Кизиль-артъ (Poncins; non vidi). — 1901. На сѣверномъ склонѣ, у по-

дошви Акъ-Байталы, на берегу рѣчки, 14.400', 7. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!). — Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Алайский хребетъ, Шугианъ, Тяньшань, Памиръ. — б) Альпійская область Европы, арктическая европейская Россія и Сибирь, альпійская область Кавказа, Ураль, Алтай, Байкалъ, земля Чукчей, арктическая и сѣверная Америка, альпы Гималаевъ и Тибетъ.

411. *Allium sativum* L. — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 162, № 1.

Указ. для Памира: E. Regel, Allii species („Acta Horti Petrop.“ X p. 303 № 1).

Указывается для Памира Регелемъ, который даже считаетъ Памирское плато родиной этого вида; на самомъ же дѣлѣ, приводимыя Регелемъ мѣстности лежать въ сѣв. Ферганѣ (Майли-сай 1. VI — а не юль — 1878 г. Кушакевичъ!) и въ сѣв. предгорьяхъ Алайского хребта (Акъ-бура, близъ Оша). Родина этого растенія остается неизвѣстной; какъ разводимое оно широко распространено.

412. *Allium Pallasi* Murr.—Murr. in Comment. Götting. VI, 1775, p. 32, т. 3. — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 170, № 22. — Regel, Mon. Allium p. 101. — Regel, Allii species, p. 316, № 30. var. *stipellatum* Regel, Allii species p. 317.

1878. Карасу (*Кушакевичъ!*). Регель (I. c. p. 317) пишетъ: „In jugo Pamir, — inter Wernoje et Illiisk prope stationem Karasu“, но на этикеткѣ гербарія: „Кара-су, Kuschakewicz, 78“.

Геогр. распр.: а) Джунгарія, горы Заравшанской долины, Тяньшань. — б) Алтай.

413. *Allium sairamense* Rgl. („Acta Horti Petrop.“ VI, p. 52).

Указ. для Памира: Regel, Allii species („Acta Horti Petrop.“ X, p. 322).

1878. Акъ-Байталъ (*Кушакевичъ!*). Есть въ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада также экземпляръ съ этикеткой: „Pamir, Аксаи, VII. 78, Kuschakewicz“, но такой мѣстности на Памирѣ вовсе нѣть; обѣ этикетки писаны не са-мимъ Кушакевичемъ, а уже въ Саду¹).

¹) Бржезинскимъ (1891 г.) указывается, на этикеткѣ гербарія, для р. Карап-чукуръ на Памирѣ, по собраніи имъ на р. Суксууовать, въ Гиндукушѣ.

Геогр. распр.: Близъ озера Сайрамъ, горы Иренхабирга, Тяньшань, Алайскій хребетъ.

414. *Allium blandum* Wall., Pl. As. rar. III, 38, tab. 260. — Regel, Monogr. Allium № 108 („Acta Horti Petrop.“ III, p. 129).

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl., p. 27, № 84.

1895. На склонѣ горы, около 14.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.: Западный Тибетъ; Китайскій Туркестанъ.

415. *Allium¹⁾ polypodium* Kar. et Kir., Enum. pl. Soongor. № 812. — Ledb., Fl. Ross. IV, p. 174, № 31. — Regel, Monogr. Allium p. 129 („Acta Horti Petrop.“ III). — Регель, въ А. П. Федченко, Пут. въ Турк., вып. 12, р. 71, табл. XII. — Regel, Allii species p. 329 („Acta Horti Petrop.“ X).

Указ. для Памира: Regel, Allii spec. p. 329²⁾. — Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 9, № 195. — О. Федченко, Раст. Пам., № 203.

1878. Памиръ-Харгоши, предгорья восточныя³⁾ 30. VII (Ашурбаевъ!); Чонъ-су, 7. VIII, Аксу 16. VIII (Кушакевичъ!).

1891. Р. Аксу 18. VII (Бражесицкий!!); имъ же, на этикеткѣ гербарія, указывается для р. Бенкъ, р. Кара-чукуръ и озера Яшиль-куль, на Памирѣ). — 1892. Карасу (Назаровъ!). — 1901. Возлѣ озера Кара-куль, 13.400', 5. VII, въ бутонахъ; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 16. VII, въ бутонахъ и 4. VIII въ цв.; между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, 12.500—13.800', 19. VII въ цв.; между Ходжа-Назаромъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.800—13.100', 2. VIII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).

var. *nudicaule* Rgl.

Указ. для Памира: Regel, Allii species „Acta H. Petrop. X, p. 329.

¹⁾ Определенія Allium, собранныхъ Б. и О. Федченко, привѣрены В. И. Липскимъ.

²⁾ Мѣстности у Э. Регеля перепутаны до неузнаваемости: Чонъ-су и Аксу онъ называетъ „кокандскими альпами Чанъ-саи и Аксай“; Памиръ-Харгоши у него „плоская возвышенность Памиръ близъ Харгоша“, истоки Кизыль-су, гдѣ былъ Скорняковъ, онъ относить къ Памиру и сборъ въ нихъ приписываетъ Кушакевичу.

³⁾ Подразумѣвается: озера Кара-куль.

1878. Долина, идущая на югъ отъ Кара-куля (Кчи-Акъ-Байталъ) (Кушакевичъ! въ герб. Сиб. Бот. Сада; Регель же [l. c.] пишеть: „ad lacum Ränkul“). — Цвѣты розовые.

Геогр. распр.: Джунгарскій Алатау, Заалайскій и Алайскій хребты, Тяньшань, Памиръ.

416. *Allium platyspathum* Schrenk, Enum. pl. nov. I, p. 7, II, p. 8. — Ledb., Fl. Ross. IV, p. 184, № 33. — Regel, Allii species („Acta Horti Petrop.“ X, p. 330, № 58).

var. *majus* Ledb.

Указ. для Памира: Regel, l. c. p. 332.

1878. Предгорья Кара-куля 6. VIII (Кушакевичъ!).

(Другія мѣстности, приводимыя Регелемъ къ Памиру не относятся). — Цвѣты розовые.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау и Джилькарагай, Тяньшань, горы Заравшана, Шугнанъ, Алайскій и Заалайскій хребты. — б) Гиндукушъ (Богоявленскій! въ 1895 г., въ цв.).

417. *Allium Oreoprasum* Schrenk in Bull. d. l'Acad. d. St. Petersb., X, p. 354. — Ledb., Fl. Ross. IV, p. 185, № 57. — Hook., Fl. of Br. Ind. VI, p. 344, № 23.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 9, № 194. — О. Федченко, Раст. Пам., № 205.

1892. Мургабъ (Назаровъ!). — 1901. На сланцевыхъ скалахъ у озера Кара-куль, 13.400', 5. VII въ цв.; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 16. VII въ цв.; между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.000', 16. VII (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Акъ-Байталъ, сырой лугъ (Тулиновъ!). — Цвѣты блѣдые.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау (переваль Кульасу), Тяньшань, Алайскій хребетъ, Памиръ. — б) Гималаи, зап. Тибетъ, Керія.

418. *Allium globosum* M. B. et Redouté. — Redouté, Lill. III tab. 179 (anno 1807). — M. Bieb., Fl. taur.-cauc. I, 262 (1808). — Regel, Monogr. Allium № 179 („Acta H. P.“ III, p. 197). — var. *albidum* Rgl.

Указ. для Памира: Regel, Allii spec. („Acta H. Petrop.“ X, p. 352 (v. albidum Rgl.). — О. Федченко, Растенія Памира, № 204.

1878. Акъ-Байталъ, 15. VIII; Карасу, 31. VIII (Кушакевичъ!). — 1901. Между Карасу и Чатыръ-ташемъ 16. VII и 17. VIII (193).

4. VIII въ цв. (цвѣты въ живомъ состояніи желтые); между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII въ цв. и пл. (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Джунгаро-киргизскія степи, Алайскій хребетъ. — б) Южная Россія, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Сибирь, Истрія, Трансильванія.

419. *Allium oreophilum* C. A. M.¹⁾ — Ind. cauc. p. 37. — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 188, № 64. — *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 268. — *Regel*, Monogr. *Allium* p. 210 („Acta H. Petrop.“ III). — *Regel*, Allii species, p. 355 („Acta H. Petrop.“ X).

1891. Собраний Бражецикими! на перевалѣ Кизылъ-артъ, до 14.000', 10. VII, но, по всей вѣроятности, на сѣверномъ склонѣ его, т. е. не на Памирѣ.

Геогр. распр.: а) Въ Джунгарскомъ Алатау (перевалѣ Кульсасу), на Тяньшанѣ и въ Алайскомъ хребтѣ и въ горахъ Заравшана. — б) Кавказъ.

XLV. Melanthaceae.

420. *Colchicum Alberti* Rgl. („Acta Horti Petrop. VIII, 1884. p. 647).

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 9, № 197.

Собраний Назаровыми (!) въ 1892 г. въ Бордабѣ, т. е. въ сѣверныхъ предгорьяхъ Заалайскаго хребта, а не на Памирѣ. — Тамъ же собраній въ 1901 г. Б. и О. Федченко!! — Цвѣты бѣлые.

Геогр. распр.: Ферганскій и Заалайскій хребты.

XLVI. Juncaceae.

421. *Juncus Thomsoni* Fr. Buchenau. — *Fr. Buchenau*, Monogr. Juncacearum („Engler, Bot. Jahrbücher XII, 1900“, p. 390, № 20). — *Juncus leucomelas* Royle, ex Don in „Trans. Linn. Soc.“ XVIII, 320. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 397, № 15 ex parte.

¹⁾ Въ гербаріи Импер. Бот. Сада есть роскошный экземпляр этого вида, соответствующій разновидности var. *Ostrowskianum* Rgl. (*Regel* in *Acta H. Petrop.* X, p. 356), собранный 24. VI 1889 г. Громбечевскимъ! на озерѣ Яшиль-куль; но это не Памирское, а другое озеро того же имени, въ Каратегинѣ (Гориа Бухара).

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 206. 1901. Между урошищемъ Чатыръ-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540—13.100', 17. VII, въ цв. (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Мургабъ, сырье луга (Тулиновъ!) — Цвѣты бѣлые.

Для Туркестана (и вообще для Россіи) указывается мною впервые.

Геогр. распр.: а) Памиръ. — б) Западные Гималаи, Тибетъ, Монголія.

XLVII. Cyperaceae¹⁾.

422. *Scirpus pauciflorus* Light. — *Light*, Flora Scot. p. 1078. — *Meinshausen*, Die Cyperaceen d. Fl. Russlands („Acta H. P.“ XVIII, p. 257). — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 246, № 2. — *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 379, № 2. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 654.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 27, № 87, (*Scirpus* sp.). — О. Федченко, Растенія Памира, № 207.

1895. Очень обыкновененъ по р. Аксу, 13—14.000' (Alcock; non vidi). — 1901. У Памирского Поста, 12.650—14. VII, въ цв. и между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 12.650—13.100', 5. VIII, на кочкарныхъ болотахъ (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Джунгарскій Алатау. — б) Сѣверная и средняя Европа, сѣв., средняя и южная Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Даурія, Забайкалье, западный Тибетъ, Сѣверная Америка.

423. *Kobresia schoenoides* (CAM.) Boeck. — *Boeck*, in Linnaea XXXIX, 7. — *Meinshausen*, Die Cyperaceen d. Fl. Russlands „Acta H. P.“ XVIII, 1901, p. 278 (58), № 6. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 697. — *Elyna schoenoides* CAM. in *Ledb.*, Fl. alt. IV, p. 235 in adnot. — *E. schoenoides* CAM., *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 262, № 3. — *Boiss.*, Fl. Or. V p. 394, № 1.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 27, № 88. — О. Федченко, Раст. Памира, № 208.

1878. Акъ-Байталъ, 9. VIII пл. (Кушакевичъ!). — 1895. Памиръ, 13—14.000' (Alcock; non vidi). — 1901. На сѣверномъ склонѣ перевала Акъ-Байталъ, у рѣчки, 14.400', 7. VII; на озера Сассыкъ-куль, 13.100', 17. VII; между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', 18. VII въ цв.; на

¹⁾ Cyperaceae, собранные Б. и О. Федченко, обработаны Кларкомъ (elaboravit C. B. Clarke).

болотистой лужайкѣ между Памирскимъ Постомъ и урочищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII плоды (Б. и О. Федченко!!).—1901. Чатыръ-ташъ (Тулиновъ!).

Въ письменномъ сообщеніи Кларкъ высказываетъ предположеніе, что *Elyna stenocarpa* (Kar. et Kir.) Meinh. и *Elyna kokanica* Regel относятся сюда же; однако, за неимѣніемъ достаточнаго материала, не решаетъ этого вопроса окончательно.

var. *humilis* (CAM.)—(*Elyna humilis* C. A. Meyer).

1901. Между урочищемъ Ходжа-Назарь и переваломъ Кой-тезекъ, 13,800—15,100', 20. VII, въ цв. (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Джунгарскій Алатау, Памиръ.—б) Кавказъ, Алтай, земля Чукчей, Гималаи, Тибетъ.

424. Kobresia Royleana Boeck.—*Boeck.* in Linnaea, XXXIX, 8.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 698.—(*Carex paniculata* Regel et Herder in pl. Semenow. p. 145 non L.).—(*Kobresia paniculata* Meinshausen, Die Cyperaceen d. Fl. Russl. l. c. p. 279).—*Elyna stenocarpa* Kar. et Kir. in Bull. Soc. Imp. Moscou XV, (1842) p. 526.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 262, № 5.

Указ. для Памира: *Duthie*. Alcock's pl. p. 27, № 89. (K. Royleana Nees).—О. Федченко, Растенія Памира, № 209.

1895. Памиръ, 13—14,000' (Alcock; non vidi).—1901. На кочкарномъ болотѣ у озера Сассыкъ-куль, 13,100', 17. VII въ цвѣту (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Памиръ, Джунгарскій Алатау.—б) Альпійские Гималаи, зап. Тибетъ, Афганистанъ.

425. Carex parva Nees in Wight, Contribut. 120.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 712, № 35.—*Carex macrorhyncha* Kar. et Kir. in „Bull. Soc. Mosc.“ XV, № 3, (1842), p. 521.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 266, № 7.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.

1893. Ша-джанъ (Poncins; non vidi).

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау.—б) Гималаи.

426. Carex microglochin Wahlbg., Fl. Lapp., p. 224.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 269.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 398, № 8.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 711, № 34.—*Meinshausen*, Die Cyperaceen d. Fl. Russl. l. c. p. 309.

Указ. для Памира: О. Федченко, Раст. Памира, № 210.

1891. На болотистомъ лугу у Памирскаго Поста, 12.650',

10. VII и на кочкарномъ солоноватомъ болотѣ около озера Сассыкъ-куль, 13.100', 17. VII (Б. и О. Федченко!!).

Совершенно сухіе колосья собраны были также въ болотцѣ съ *Primula sibirica* и *Pedicularis uliginosa*; на берегу озера Кара-куль, 5. VII (Б. и О. Федченко).

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Памиръ.—б) Сѣверъ и Алпы Европы, арктическая европейская Россія, альпійская область Кавказа, Алтай, Даурія, западные Гималаи и западный Тибетъ, Гренландія.

427. Carex curaica Kunth., Enum. II, p. 375.—*Meinshausen*, Die Cyperaceen d. Fl. Russl. l. c. p. 316.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 402, № 14.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 702.—(*C. incurva* Lightf. var. β, *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 270, № 19).

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.—О. Федченко, Растенія Памира, № 211.

1878. Памиръ-Харгоши: Кара-куль, 30. VII цв. (*Ашурбаевъ!*); по р. Чонъ-су, 6. VIII пл. (*Кушакевичъ!*; на этикеткѣ, очевидно, по ошибкѣ, 6. VII)—1893. Ша-джанъ; Кара-Джилыга (Poncins; non vidi).—1901. На южномъ склонѣ перевала Кизылъ-артъ, на альпійскихъ лужайкахъ, 14.500', 3. VII въ цв.; у озера Кара-куль, на сырыхъ лужайкахъ, 13.400', 5. VII въ цв.; на болотистомъ лугу у Памирскаго Поста, 12.650', 14. VII въ цв.; между урочищемъ Чатыръ-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540'—13.100', 17. VII въ цв.; между Ходжа-Назаромъ и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', на альпійскихъ лужайкахъ, 20. VII въ цв.; на Акъ-Байталъ 8. VIII въ цв.; между урочищемъ Мусколъ и озеромъ Кара-куль, 14.100'—13.400', 9. VII, пл. (Б. и О. Федченко!!).—1901. Кизылъ-артъ; р. Акъ-Байталъ, сырой лугъ; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (Тулиновъ!).

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Джунгарскій Алатау.—б) Кавказъ, Сибирь, Кашмиръ. Буассье (l. c.) указываетъ этотъ видъ для Афганистана, экземпляръ оттуда онъ не выдалъ, но Литвиновъ относить афганское растеніе къ своему новому виду, *Carex desertorum* Litw. (*Litwinow*, Flora turkestanicae fragmenta I, p. 9, № 9).

428. Carex stenophylla Wahlb.—Wahlb., Acta Holm. 1803, p. 142, № 21.—*Meinshausen*, d. Cyper. d. Fl. Russl. l. c. p. 316.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 270, № 20.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 400, № 11.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 700, № 2.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Памира, р. 10, № 201.—О. Федченко, Раст. Пам., № 212.

1892. Карасу (*Назаровъ!*).—1901. На Акъ-Байталъ, 8. VII въ цв.; между Сассыкъ-кулемъ и Чатыръ-ташемъ, 13.100—13.540', 3. VIII, въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—Замѣчено также на песчаныхъ мѣстахъ ниже перевала Найза-ташъ, 14.000', 16. VII, (Б. и О. Федченко!!).—1901. Чатыръ-ташъ; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!!*).

Геогр. распр.: а) Долина Сыръ-Дары, Тяньшань, Джунгария, Памирь.—б) Восточная Германия, по Дунаю, арктическая, средняя и южная Россия, Кавказъ, Алтай, Байкалъ, Камчатка, Китай, с.-з. Гималаи и западный Тибетъ, Тибетъ, Афганистанъ, Персія, Палестина, аркт. и сѣв. Америка.

429. *Carex Regelii* C. B. Clarke (in herb. Kew.).—*C. melanantha* Karel. et Kiril. №№ 2072, 2073. *C. melanantha* var. *baicalensis* Turcz.; *C. nigra* var. *orientalis* Rgl., Descr. pl. VII, Suppl. 1880, p. 28.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl., p. 27, № 91. (*C. melanantha* CAM.).—О. Федченко, Раст. Памира, № 213.

„Въ нашемъ растеніи верхній колосокъ всегда мужской; у *C. melanantha* CAM., какъ въ описаніи автора, такъ и у имѣющихся здѣсь (въ гербаріи Кью) экземпляровъ, верхній колосокъ всегда женский на вершинѣ. По мнѣнию Кюккенталя это не составляетъ разницы. Duthie, Boott, Boeckeler, Meinshausen называютъ это растеніе *C. Moorcroftii* Boott., и я думаю, едва ли слѣдуетъ его отдѣлять отъ *C. Moorcroftii*. (C. B. Clarke in sched. herb. Fedtschenkoani, 7. VII. 1902).

1895. Довольно обыкновенно по р. Аксу и ея прито-камъ (Alcock; non vidi).—1899. Памирь (*H. Вельманъ!*).—1901. На болотистомъ лугу близъ Памирского Поста и Ка-расу, 12.650—13.100', 15. VII въ цв.; на алпийскихъ лужай-кахъ выше перевала Кой-тезекъ, до 16.000', 20. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).—1901. Мургабъ, сырье луга; Чатыръ-ташъ (*Тулиновъ!*).

Геогр. распр.: а) Алайскій хребетъ, Тяньшань, Памирь, Джунгарскій Алатау.—б) Гималаи, Тибетъ, Монголія, Китай.

430. *Carex tristis* M.B. Fl. taur.-cauc. III, p. 615.—Meinshausen, Die Cyper. d. Fl. Russl. I. c. p. 358, № 118.—

Ledb., Fl. Ross. IV, p. 294, № 75.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 423, № 73.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 738.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 10, № 200, (*C. turkestanica* Rgl?).—О. Федченко, Растенія Памира, № 214.

1892. Шоръ-куль (*Назаровъ!*).—1901. Между Карабу и уроцищемъ Чатыръ-ташъ, 13.100—13.800', 16. VII и 4 VIII, (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Тяньшань.—б) Альпы Трансильвании, Кавказъ, арктическая Сибирь, Алтай, Байкалъ, Даурія, Кашмиръ, Каракорумъ.

431. *Carex nivalis* Boott, Illustr. I, p. 18, t. 35.—Meinshausen, Die Cyper. d. Fl. Russl. I. c. 355, № 113.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 732.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl., p. 27, № 90.

1895. Памиръ 13—14.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Карагинъ.—б) Гималаи и западный Тибетъ, Афганистанъ.

432. *Carex ustulata* Wahlenb. Act. Holm. 1803, № 92.—Meinshausen, Die Cyper. d. Fl. Russl. I. c. p. 356, № 114.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 295, № 76.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 734.

1878. Акъ-Байталъ, 8. VIII, пл. (*Кушакевичъ!*). Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Алайскій хребетъ.—б) Арктическая Россия, Алтай, Байкалъ, Даурія, Гималаи, Тибетъ, сѣверъ и горы Европы.

433. *Carex nitida* Host. Gram. I, 71.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 306, № 103.—*Carex obesa* All., *Boiss.* Fl. Or. V, p. 414, № 48.

Указ. для Памира: Franchet, pl. Poncins, p. 347.

Указывается Франши (I. c.) для перевала Талдыкъ, т. е. Алайскаго хребта, а не Памира.

Геогр. распр.: а) Джунгарскій Алатау и Тарбагатай, Тяньшань.—б) Средняя Европа, средняя и южная европей-ская Россия, Крымъ, Кавказъ, Алтай (Иртышъ, Бухтарминскъ).

434. *Carex rigida* Gooden. Transact. of Linn. Soc. II, p. 193.—Meinshausen, Die Cyper. d. Fl. Russl. I. c. p. 336.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 419, № 69.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 711.—*C. saxatilis* Wahlb., Acta Holm. 1803, № 140; *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 309.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. *Poncins*, p. 347 (C. *saxatilis* *Wahlbg.* var. *squamis hyalinis*).—Б. Федченко, Мат. фл. Памира, р. 10, № 202 (C. *vulgaris* *Fries*).—О. Федченко, Растения Памира, № 215.

1892. Карасу; Рангъ-куль (*Назаровъ!*).—1893. Ша-джань, Кара-джильга (*Poncins*, var. *squamis hyalinis*; non *vidi*).—1901. На Памирскомъ Посту, 14. VII, въ цв. и пл., 12.650'; у озера Сассыкъ-куль, 13.100', 17. VII въ цв. и пл. (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Памиръ, Джунгарскій Алатау.—б) Альпійская область Европы, Исландія, Гренландія, арктическая, съверная и средняя Россія, Кавказъ, Ураль, арктическая Сибирь, Алтай, Байкалъ, вост. Сибирь, Даурія, арктическая Америка, Гималаи, Тибетъ, Афганистанъ.

435. *Carex caespitosa* *Palmstr.*¹⁾ *Svensk. Botanik*, IV, p. 222.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 216.

Относя наше растеніе къ C. *caespitosa* *Palmstr.*, Кларкъ дѣлаетъ это съ оговоркой, что листья у него слишкомъ широки для этого вида, и что оно соотвѣтствуетъ той формѣ, которую Регель выдѣлилъ подъ именемъ C. *caespitosa* L. 3. Кларкъ вообще не видѣть другихъ отлічий C. *caespitosa* *Palmstr.* отъ C. *rigida* *Gooden.*, кромъ болѣе узкихъ листьевъ.

1901. На сырой лужайкѣ между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', 18. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!).

436. *Carex vesicaria* *Linné*, Sp. pl. ed. I, p. 979.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 317.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 429, № 87.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 740, № 118.

var. *pamirica* O. Fedtsch. (var. n.).—Rostrum breve, breviter aristatum; utriculi castanei nitidi; squamae castaneae, carina dorsalis pallida. Отличается отъ типической формы

¹⁾ Цитируемъ, какъ автора, *Palmstruch'a*, согласно *Clarke'y*, обработавшему наши памирскія *Cyperaceae*; другіе авторы называютъ этотъ видъ C. *caespitosa* L. (распр. въ средней Европѣ), принимая его въ болѣе широкомъ смыслѣ и относя къ нему предыдущій, какъ одну изъ формъ; другія формы встрѣчаются въ Джунгаріи и въ Джунгарскомъ Алатау, близъ Кульджи и въ области Зайсана (ср. *Regel*, in „Acta H. P.“ VII p. 574).

болѣе короткимъ носикомъ и очень короткими зубчиками его (носикъ выемчатый); плоды (мѣшечки) блестяще-каштановые или при основаніи желтовато-блѣлые; прицѣвѣники блестяще-каштановые съ блѣловатымъ килемъ.

1878. Рангъ-куль, 14. VIII пл. (*Кушакевичъ!*); р. Аличуръ, 21. VIII пл. (*Ашурабаевъ!*).

Геогр. распр. вида: а) Тибетъ. — б) Европа и европейская Россія, Кавказъ и Закавказье, Ураль, Алтай, Байкалъ, Камчатка, арктическая С. Америка, Кашмиръ, съверная Африка.

437. *Carex rostrata* *Stokes* in *With.*, Arrangement veg. pl. Great Brit. ed. II, p. 1059.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VI, p. 740, № 117.—C. *ampullacea* *Good.* in „Trans. of Linn. Soc.“ II, p. 297, (1794).—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 318, № 126.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 429, № 86.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 27, № 92 (*Carex ampullacea* *Good.*).

1895. На болотистыхъ мѣстахъ по р. Аксу, 13—14.000', но не часто (Alcock; non *vidi*).

Геогр. распр. а) Омскъ.—б) Европа и европейская Россія, Кавказъ и Закавказье, Ураль, Алтай, Кашмиръ, Съверная Америка.

438. *Carex* s. p.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. *Poncins*, p. 347.

1893. Кизиль-артъ (*Poncins*; non *vidi*).

XLVIII. Gramineae¹⁾.

439. *Hordeum pratense* L.—*Linné*, It. scan., 214.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 328, № 4.—*Hordeum secalinum* Schreb., *Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 372, № 3.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 687, № 5.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 28, № 104. (*H. violaceum* *Boiss.* et *Hohen.*).—*Franchet*, Pl. *Poncins*, p. 347 (*H. secalinum* *Trin.*? var. *glumis scabris*).—Б. Федченко, Мат. (Пам. р. 10, № 217).—О. Федченко, Растения Памира № 217.

1878. Переходъ отъ Кара-куля на югъ 5. VIII (*Кушакевичъ!*).—1891. У озера Яшиль-куль 10. VIII (*Бржезинскій!*).

¹⁾ Образцы злаковъ, собранныхъ Б. и О. Федченко, посланы были для проверки определений Гаккелю (teste E. Hackel).

1892. Рангъ-куль (*Назаровъ!*).—1893. Ша-джанъ (*Poncins non vidi; var glumis scabris*).—1895. Довоально обыкновенно на Памирѣ, на выс. 13—14.000' (*Alcock; non vidi*).—1901. Между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.650—12.450', 12. VII; возлъ Памирского Поста 13. VII; между озеромъ Сассыкъ-куль и Чатыръ-ташемъ, 13.100—13.540', 3. VIII; между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650, 5. VIII; на Акъ-Байталъ 8. VIII; между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизылъ-артъ, 13.400—14.000', 10. VIII (*Б. и О. Федченко!!*).—1901. Р. Акъ-Байталъ, сырой лугъ (*Тулиновъ!*).

Геогр. распр.: а) Джунгарский Алатау, Тяньшань, долина и горы Заравшана, Алайский хребетъ. — б) Средняя и ю. Европа, ю. Россія, Кавказъ, Уралъ, Алтай, Байкалъ, вост. Сибирь, С. и Ю. Америка, Кашмиръ, западный Тибетъ, Палестина, сѣв. Африка.

440. *Elymus sibiricus* L., Sp. pl. ed. I, p. 83.—*Ledb.* Fl. Ross. IV, p. 330, № 4.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 373, № 1.

Указ. для Памира: *Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 10, № 218.—*О. Федченко* Растенія Памира, № 218.

1878. Акъ-Байталъ 8. VIII (*Кушакевичъ!*); Акъ-Байталъ, 10. VIII пл. (*Ашурбаевъ!*).—1892. Мургабъ, Рангъ-куль (*Назаровъ!*).—1901. Акъ-Байталъ 8. VIII; въ уроцищѣ Чичикты, 12.750', 9. VII; между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.650—12.450', 12. VIII; между Памирскимъ Постомъ и Ка-расу, 15. VII; между уроцищемъ Ходжа-Назаръ и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII; отъ Памирского Поста до уроцища Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII (*Б. и О. Федченко!!*).—Замѣчено также на кочкарныхъ лугахъ между уроцищемъ Чатыръ-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540—13.100', 2. VIII (*Б. и О. Федченко!!*).—1901. Кара-куль; Мургабъ, сырые луга; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!*)

Геогр. распр.: а) Шугнанъ, Тяньшань, Джунгарский Алатау, Памиръ.—б) Уралъ, Алтай, Байкалъ, восточная Сибирь, Даурія, умѣр. и альп. Гималаи, вост. и зап. Тибетъ, Афганистанъ, Монголія, Абиссинія, Сѣв. Америка.

441. *Elymus lanatus* Korsh.—*Коржинский*, Очерки растительности Туркестана, р. 102, № 24 („Зап. Имп. Акад. Наукъ“, VIII серія, 1896 г.).

Указ. для Памира: *О. Федченко*, Растенія Памира, № 219.

1901. Между Сассыкъ-кулемъ и уроцищемъ Чатыръ-ташъ, 13.100—13.540', 3. VIII (*Б. и О. Федченко!!*).—1891. Ледниковые холмы передъ Сассыкъ-кулемъ, VIII (*Тулиновъ!*).

Геогр. распр.: а) Алай и Памиръ, Шугнанъ. Въ Туркестана не найдено.

442. *Elymus mollis* Trin. in *Spreng.*, Neue Entd. II, p. 72 nec R. Br.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 332, № 11.

Указ. для Памира: *Franchet*. pl. *Poncins*, p. 347.

1893. Ша-джанъ (*Poncins; non vidi*).

Растеніе, собранное *Poncins* и определенное *Франшет* какъ *E. mollis*, по всей вѣроятности не что иное, какъ *E. dasystachys*, который мы собирали въ той же местности въ 1901 г.

Геогр. распр.: Арктическая и восточная Сибирь, Камчатка, арктическая Америка, и островъ Ситхъ.

443. *Elymus dasystachys* Trin. in *Ledb.*, Fl. alt. I, p. 120.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 333, № 13.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 374, № 3.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 28, № 105.—*Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 10, № 220 (var. *glabrior*) и № 221 (var. *pamirica* B. F).—*О. Федченко*, Растенія Памира, № 220 (var. *glabrior* Rgl. et var. *nova pubescens*).

1895. Памиръ 13—14.000' (*Alcock; non vidi*).
var. *glabrior* Rgl.:

1892. Шоръ-куль (*Назаровъ!*).—1901. Между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.650—12.450', 12. VII; между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 5. VIII (*Б. и О. Федченко!!*).

var. *pamirica* B. Fedtsch. 1892. Карасу (*Назаровъ!*).
var. *pubescens* O. Fedtsch. (var. n.). Отличается пушистыми листьями.

1878. Памиръ - Харгоши: Кара-куль 30, VII (*Ашурбаевъ!*). Суйкъ-Чубыръ 6. VIII; верховье Акъ-Байтала 8. VIII; Акъ-Байталъ 9 и 15. VIII; р. Джаманталь, въ верховьяхъ, 17. VIII; Аксу 17. VIII (*Кушакевичъ!*).—1901. Въ уроцищѣ Маркансу, 13.100', старые колосья; между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', 18. VII; между озеромъ Сассыкъ-куль и уроцищемъ Чатыръ-ташъ, 13.100—13.540', 3. VIII; между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII; на Акъ-Байталъ 8. VIII; между уроцищемъ 12.650', 5. VIII; на Акъ-Байталъ 8. VIII; между уроцищемъ

Гурумды и озеромъ Каракуль, 14.000—13.400', 9. VIII; между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизылъ-артъ, 13.400—14.000', 10. VIII (Б. и О. Федченко!!).—Видъ этот замѣченъ также въ песчано-щебниевой пустынѣ между Маркансу и Кара-кулемъ и на песчано-каменистыхъ склонахъ на сѣверномъ берегу озера Кара-куль 4. VII, и на склонахъ съ пескомъ близъ озера Кара-куль 5. VII (Б. и О. Федченко!!).

1901. Уй-булакъ; Кара-куль, ледниковые холмы за Сасыкъ-кулемъ (*Тулиновъ!*).

Геогр. распр.: а) Шугнанъ, Тяньшань, Джунгарскій Алатау, Памиръ.—б) Сибирь, Кашмиръ, Тибетъ, Монголія, Китай.

444. *Elymus angustus* Trin. in *Ledb.*, Fl. alt. I, p. 119.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 334.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 10, № 219.

1892. Рангъ-куль (*Назаровъ!*).

Геогр. распр.: а) Алай, Тяньшань, Памиръ, степи Джунгаріи.—б) Алтай.

445. *Triticum strigosum* Less. in *Linnaea* IX, p. 179.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 339, № 12.

var. *microcalyx* Rgl.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам. р. 10, № 216.

1892. Шоръ-куль (*Назаровъ!*).

var. *planifolium* Rgl. (Колосья синие).

1891. Р. Истыкъ 18. VII. (*Бржезицкій!*).

Геогр. распр.: а) Степи Джунгаріи, Тарбагатай, Тяньшань, Алайскій хребетъ (Караказукъ, морены).—б) Крымъ, Кавказъ, Ураль (Ильменскія горы), Алтай, Байкаль, Даурія.

446. *Triticum rigidum* Schrad., Sem. Gott. 1803, Fl. germ. I, p. 392.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 341, № 16.—*Agropyrum elongatum* Host. Gram. Austr. II, p. 18, t. 23.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 665, № 14.

var. *tomentosum* Rgl.

Указывается Бржезицкимъ (на гербарной этикеткѣ) для устья р. Истыкъ на Памиръ, но собранный имъ экземпляръ взять въ Алайскомъ хребтѣ (въ ущельи Агачъ-артъ, 5. VII. 1891 г.).

Геогр. распр.: а) Долина Заравшана, Фергана.—б) Южная Европа и южная европейская Россія, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, сѣверная Африка.

447. *Agropyrum striatum* Nees.—*Nees* ex Steud. Syn. Gram. 346.—*Hook.*, Fl. Br. Ind. VII, p. 369, № 3. (= *Triticum striatum* Steud. l. c.)

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 28, № 103.

1895. На мѣстѣ бывшихъ киргизскихъ кочевокъ, 13—14.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.: Кашмиръ 8—12.000', Тибетъ. По Гукеру (l. c.) *A. striatum* Nees можетъ быть представлять только гигантскую форму *A. semicostatum*; такимъ образомъ, собранное Alcock'омъ растеніе вѣроятно относится къ слѣдующему виду.

448. *Agropyrum semicostatum* Nees.—*Nees* ex Steud. Syn. Gram. 346.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 662, № 7.—*Agropyron semicostatum* Nees, *Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 369, № 2.

var. *subvillosum* Hackel (var. n.), *spiculis subvillosis distinctum*.

Указ. для Памира: О. Федченко, Раст. Памира, № 221.

1901. У озера Кара-куль, на кочкиахъ на песчаномъ берегу, 13.400', 5. VII; между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 15. VII (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Джунгарскій Алатау.—б) Умбрейные Гималаи, Афганистанъ, Непалъ.

449. *Lolium temulentum* L.—*Linné* Sp. pl. ed. I, p. 83.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 345, № 4.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 681, № 6.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 364, № 1.

1891. Р. Кара-булакъ, 16. VIII. (*Бржезицкій!*).—Растеніе это собрано, вѣроятно, вмѣстѣ съ *Pisum sativum*, т. е. въ культурной полосѣ и виѣ предѣловъ собственного Памира.

Геогр. распр.: а) Долина Заравшана.—б) Почти вся Европа и южная Россія, Кавказъ и Закавказье, Ураль, Персія, Афганистанъ, сѣверная Африка, Индія.

450. *Festuca ovina* L.—*Linné*, Sp. pl. ed. I, p. 73.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 350.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 617, № 1.

var. *pubeascens* Hack.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 28, № 99.

1895. Памиръ 13—14.000' (Alcock; non vidi).

var. *Valesiacae* Hack.

Указ. для Памира; *Duthie*, Alcock's pl., p. 28, № 100.
1895. Памиръ 13—14.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распир.: а) Горы Улутау, Джунгарской Алатау, Алайский хребет, Тяньшань.—б) Вся Европа и вся европейская Россия, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Уралъ, сѣв. и вост. Азія, Афганистанъ, Персія, Сѣв. Африка, Новая Зеландія, С. Америка, Австралия.

451. Festuca duriuscula L.—*Linné* Sp. pl. ed. I, p. 74.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.

Приводится Франше для перевала Талдыкъ, въ Алайскомъ хребтѣ, и къ числу памирскихъ растеній не относится.

452. Festuca rubra L.—*Linné* Sp. pl. ed. I, p. 74.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 352, № 5.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 621, № 4.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 352, № 9.

Указ. для Памира: О. Федченко. Раст. Памира, № 222.

1878. Карасу, 29. VIII (Кушакевичъ!).—1901. Между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, 12.500—13.800', 19. VII (Б. и О. Федченко!!).

var. *barbata* Hack., Monogr. Fest. (forma *humilior*).

1901. Акъ-Байталъ 8. VIII (Б. и О. Федченко!!).—Р. Акъ-Байталъ, сырой лугъ (Тулиновъ!).

Геогр. распир.—а) Тяньшань.—б) Вся Европа и европейская Россия, Сибирь, Сѣв. Америка, Кавказъ, умѣр. и субальп. Гималаи.

453. Festuca violacea Schleich.—*Schleich.* ap. Gaud. agr. helv. I, p. 231, (1811).—*Festuca rubra L.* var. *violacea* Hackel, *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 621, № 4.

var. *kashmiriensis* Hack.—(= *F. kaschmiriana* Stapf in *Hooker*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 351, № 6).

Указ. для Памира: (О. Федченко), Растенія Памира, № 223.

1878. Акъ-Байталъ, 9. VIII пл. (Кушакевичъ!).—1901. На альпийскихъ лужайкахъ на южномъ склонѣ Кизиль-арта, на красной глини, 14—14.600', з. VII; между уроцищемъ Ходжа-Назарь и переваломъ Кой-тезекъ 13.800—15.100', 20. VII; между озеромъ Сассыкъ-куль и уроцищемъ Чатыръташъ, 13.100—13.540', з. VIII (Б. и О. Федченко!!)—1901. Каракуль; сырые пески на р. Акъ-Байталъ; Чатыръташъ; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (Тулиновъ!).

Геогр. распир. вида:—а) Алайский хребетъ, Тяньшань, Джунгарский Алатау.—б) Македонія, Арmenія, Скалистыя горы въ Америкѣ.

Геогр. распир. var. *kashmiriensis*:—а) Шугианъ, Памиръ.—б) Умбрренная и альпийская область Гималаевъ.

454. Festuca bellula Regel, Descr. pl. nov., („Acta H. Petrop.“ VII, 2, p. 594).

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира № 224.

1901. На бесплодныхъ мѣстахъ въ солонцевато-глинистой пустынѣ у озера Сассыкъ-куль, 13.100', вмѣстѣ съ *Capsella procumbens* и *Capsella draboides* Korsh., 17 и 18. VII (Б. и О. Федченко!!).—1901. Сассыкъ-куль (Тулиновъ!).

Геогр. распир.: Тяньшань, Памиръ.

455. Bromus cegestus Huds.—*Huds.*, angl. p. 39.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 356, № 2.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 644, № 9.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 28, № 102.

1895. Памиръ 13—14.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распир.: а) Въ Тяньшань (въ горахъ Каратау на р. Бугунь, Сѣверцовъ) и Джунгаріи (на островахъ р. Лепсы, Карелинъ и Кириловъ).—б) Почти вся Европа, средняя и южная европейская Россия, Крымъ, Кавказъ, Сирія, Афганистанъ, с. Африка.

456. Bromus crinitus Boiss. et Hoh. Pl. Pers. Sched. 1846.—*Boiss.*, Diagn. Ser. I, 13, p. 64.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 647, № 17.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 359, № 4.—(B. gracillimus Bge., Rel. Lehman., p. 527 (351), № 1495).

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 28, № 101.—О. Федченко, Растенія Памира, № 225.

1892. Яшиль-куль (Назаровъ); въ Мат. фл. Пам. Б. Федченко пропущено).—1895. Памиръ, 13—14.000' (Alcock; non vidi).—1901. Между уроцищемъ Чатыръташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540—13.100', 17. VII и з. VIII; между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 18. VII; между озеромъ Яшиль-куль и уроцищемъ Ходжа-Назарь, на песчаныхъ склонахъ, 12.500—13.800', 19. VII (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распир.:—а) Шугианъ, Тяньшань, горы Зарваница, пески Каракумъ, Памиръ.—б) Западный Тибетъ, Белуджистанъ, Афганистанъ, Персія.

457. *Poa alpina* L., Sp. pl. ed. I, p. 67.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 370, № 1.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 605, № 16.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 338, № 3.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 226. 1899. Памирь (Н. Вельманъ!).—1901. Возлъ Памирского Поста 14. VII въ цв.; между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.300', 16. VII въ цв.; между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, 12.500—13.800', 19. VII; между уроцищемъ Ходжа-Назарь и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII; между Сассыкъ-кулемъ и Чатыръ-ташемъ, 13.100—13.540', 3. VIII (Б. и О. Федченко!!). Сюда же, можетъ быть, относятся нѣсколько экземпляровъ, собранныхъ на юномъ склонѣ Кизылъ-арта, 3. VII, съ сухими колосьями и которые въ точности не могутъ быть опредѣлены (Б. и О. Федченко!!).—1901. Чатыръ-ташъ (Тулиновъ!).

Геогр. распр.: — а) Тарбагатай и Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Алайскій хребетъ (ледникъ Щуровскаго). — б) Горы Скандинавіи, Британіи, Франціи, Испаніи, Италіи; по Дунаю; арктическая и сѣв. европ. Россія, Кавказъ, Алтай, западные Гималаи, Тибетъ, Монголія, Китай, арктическая Америка.

458. *Poa attenuata* Trin.—*Trin.* in Bunge, Enum. alt. p. 5.—*Ledb.*, Fl. Ross. VI, p. 371, № 3.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 608, № 25.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 340, № 7.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 28, № 97.—*Franchet*, pl. Poncins, p. 347, (var. *desertorum* Rgl.).—Б. Федченко, Мат. фи. Пам., р. 10, № 212.—О. Федченко, Растения Памира, № 227 (var. *versicolor* Rgl. и var. *desertorum* Rgl.).

1892. Рангъ-куль (Назаровъ!)—1895. Одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ злаковъ Большого и Малаго Памировъ, растетъ и на плоскогорья и на склонахъ горъ до предѣла растительности, 14—16.000' ((Alcock; non vidi).—1901. Каракуль, солончики; Чатыръ-ташъ; ледниковые холмы передъ Сассыкъ-кулемъ; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (Тулиновъ!).

Var. *versicolor* Rgl. 1901.

На юномъ склонѣ перевала Кизылъ-артъ, на красной глине, 14—14.600', 3. VII; на берегу рѣчки у подошвы сѣверного склона Акъ-Байтала, 14.400' 7. VII; между Карасу и Чатыръ-ташемъ, 13.100—14.000', 16. VII и 4. VIII; между

урочищемъ Чатыръ-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540—13.100', 17. VII и 3. VIII; между уроцищемъ Ходжа-Назарь и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII; на щебневыхъ розсыпяхъ, и выше перевала Кой-тезекъ, на альпийскихъ лужайкахъ, до 16.000', 20. VII; на Акъ-Байталь 8. VIII въ цвету (Б. и О. Федченко!!)—Замѣчено также на солонцеватой луговинѣ у Мускола, 14.000', 6. VII и на глини у самаго перевала Акъ-Байталь, 15.700', 8. VII (Б. и О. Федченко!!).

Var. *desertorum* Rgl.

Франше (l. c.) указываетъ эту разновидность для перевала Талдыкъ, (т. е. Алайскаго хребта, а не Памира), гдѣ ее собралъ въ 1893 г. Poncins.

1901. На Памирѣ она собрана у озера Карапуль 5. VII и между Чатыръ-ташемъ и Карасу 4. VIII въ цвету (Б. и О. Федченко). Экземпляры съ Карапуля стоять, по мнѣнію Гаккеля, ближе къ типической формѣ этого вида, чѣмъ къ var. *desertorum*, и самую эту разновидность онъ считаетъ лишь очень слабо выраженной формой.

Геогр. распр.: — а) Джунгарскій Алатау, Тяньшань, Алайскій хреб., Шугнанъ.—б) Киргизская степь, Закавказье (Арагатъ), Алтай, Даурія, Монголія, Тибетъ, западные Гималаи, Персія.

459. *Poa pratensis* L.—*Linné*, Spec. ed. I, p. 67.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 378.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 601, № 7.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 339, № 5.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 28, № 98 (var. *alpigena*).
Var. *typica*.

1891. Маз. Бозай-гумбезъ, 1. VIII (Бржезицкій).

Var. *alpigena* Fr.

1895. Памирь, 13—14.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.: — а) Долина Сыръ-Дары, Тяньшань, Шугнанъ.—б) Всѧ Европа, вся европейская Россія, Крымъ, Кавказъ, Закавказье, Ураль, вся Сибирь и Камчатка, Сѣверная Америка, Тибетъ, Монголія, Китай, западные Гималаи, Персія.

460. *Poa tianschanica* (Rgl.) Hack. (nom. nov.)—*Poa macrocalyx* Trautv. et Mey. (*Florula ochotensis* in Midd. Reise

p. 103) var. *tianschanica* Rgl., Descr. pl. nov. fasc. VIII („Acta H. P.“ VII p. 619), № 14.

Указ. для Памира; О. Федченко, Растения Памира, № 228.

Hackel считает эту форму за самостоятельный видъ, отличный какъ оть *P. macrocalyx* Trautv., такъ и оть *P. attenuata* Trim.

1901. Между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.650—12.450', 12. VII въ цв.; возлъ Памирского Поста 14. VII; между Памирскимъ Постомъ и Карасу, 12.650—13.100', 15. VII (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: Тяньшань, Памиръ.

461. *Colpodium altaicum* Trin. in *Ledb.*, Fl. alt. I, p. 100 et Ic. Fl. Ross. t. 226.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 385, № 3.—(= *Catabrosa altaica* (Trin.) Boiss., *Boissier*, Fl. Or. V, p. 579).

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 229.

1901. Близъ перевала Акъ-Байталъ 8. VIII (Б. и О. Федченко!!)—1901. Сырые пески р. Акъ-Байталъ (*Тулуновъ!!*).

Геогр. распр.:—а) Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тяньшань.—б) Алтай, Кавказъ.

462. *Atropis distans* (L.) Grisb.—*Poa distans* L.—*Linné* Mant. 32.—*Atropis distans* Grisb. in *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 388, № 1.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 615, № 2.—*Glyceria distans* Wahlbg., Ups. p. 36.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 347, № 2.

Указ. для Памира: *Franchet* pl. *Poncins*, p. 347 (*Glyceria distans* L.).—О. Федченко, Растения Памира, № 230.

1878. Кизыль-артъ 23. VII; Кара-куль 5. VIII (*Кушакевичъ!!*).—1893. Ша-джанъ, Кара-джильга (*Poncins*; non vidi).

Forma pauciramea: *Paniculae ramis solitariis vel binis.*

1901. Между уроцищемъ Ходжа-Назаръ и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII въ цв. (Б. и О. Федченко!!). Колоски синіе.

Геогр. распр.:—а) Долина Заравшана, Тяньшань, Джунгарія.—б) Европа, вся европейская Россія, Крымъ, Кавказъ, Закавказье, Алтай, Тибетъ, Монголія, Америка.

463. *Atropis convoluta* Grisb. in *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 389, № 2.—*Atropis distans* (L.) Grisb. var. *convoluta*, *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 615, № 2.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 231.

1878. По р. Чонъ-су 6. VIII (*Кушакевичъ!!*). У экземпляровъ Кушакевича очень узкое соцвѣтіе, мало вѣточекъ и онъ вверхъ стоящія и очень короткія.—1901. Отъ Чатыръ-таша до Сассыкъ-куля, 13.540—13.100', 17. VII; выше перевала Акъ-Байталъ, до 16.400', 8. VIII; между Мусколомъ и Акъ-Байталомъ, 14.100—14.400', 7. VII (Б. и О. Федченко!!).

Var. *acutiuscula* Hackel (var. nova).

1901. Между озеромъ Кара-куль и переваломъ Кизыль-артъ, 13.400—14.600', 10. VIII (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.:—а) Долина Сыръ-Дары (Ташкентъ), Алай, Тяньшань, степи Джунгаріи.—б) Южная Россія: солончаки въ Крыму, Кавказъ, Киргизская степь, Алтай.

464. *Atropis tenuiflora* Grisb. in *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 389, № 3.—*Glyceria distans* Wahlb. var. *convoluta*, *Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 347, № 2.—*Glyceria distans* var. *tenuiflora* Turez. in herb. Led.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 232.

1901. Возлъ Памирского Поста 10. VII; у озера Сассыкъ-куль, въ солонцеватой глинистой пустынѣ, 13.100', 17. VII; между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, на сырыхъ лужайкахъ, 13.100—12.500', 18. VII; на Акъ-Байталъ 8. VII; между уроцищемъ Мусколъ и озеромъ Кара-куль, 14.100—13.400', 9. VIII (Б. и О. Федченко!!).

Оригинальные экземпляры Турчанинова выше ростомъ и съ болѣе крупнымъ и развѣистымъ колосомъ, но въ строеніи цвѣтка Hackel не видѣтъ разницы и считаетъ Памирскія растенія тожественными съ собранными (О. Федченко!! въ 1869 г.) въ Заравшанской долинѣ. Разница между *A. convoluta* и *A. tenuiflora*, по его мнѣнію, очень незначительна.

Геогр. распр.:—а) Долина Заравшана, Тяньшань.—б) Байкалъ, Восточная Сибирь и Даурія.—По Гукеру, который считаетъ этотъ видъ тожественнымъ съ *A. distans* var. *convoluta*, онъ обыкновенъ въ Тибетѣ и встрѣчается также въ сѣверной Европѣ.

465. *Arundo Phragmites* L.—*Linné*, Spec. ed. I, p. 81.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 393, № 1.—*Phragmites communis* Trin., *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 563, № 1.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 303, № 1.

Указ. для Памира: *Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 10, № 210.—*О. Федченко*, Растения Памира, № 233.

1878. Карасу 17. VIII, Аксу 31. VIII (*Кушакевичъ!* Мѣстное название куракъ).—1892. Яшиль-куль (*Назаровъ!*)—1901. Между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, 12.500—13.800', 19. VII (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Долина Заравшана, Магіанъ, Алай и Алайский хребетъ, Шугнанъ, долина Сырт-Дары, Тяньшань, степи Джунгарии и Джунгарский Алатау, Памиръ.—б) Вся Европа и европейская Россія, Крымъ, Кавказъ, Закавказье, Уралъ, Алтай, Байкалъ, Даурія, Китай, Монголія, Тибетъ, Кашмиръ, Персія, Сирія, Палестина, Абиссинія, Египетъ, Мысъ Доброй Надежды, Австралія, С. и Ю. Америка.

466. Avena (Trisetum) spicata (L.).—*Aira spicata* Linné, Sp. pl. ed. I, p. 64, (1753).—*Aira subspicata* Linné Syst. ed. XII, p. 91 (1767).—*Avena airoides* Koel., Descr. gram. p. 298 (1802).—*Avena subspicata* Clairv., man. p. 17 (1811).—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 418, № 20.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 278, № 7.—*Trisetum subspicatum* Beauv., agr. p. 88 (1812).—*Trisetum spicatum* (L.) Richter, Pl. Europeae p. 59.—*Ascherson et Graebner*, Syn. d. Mittel-Eur. Flora II, p. 270, № 290.

1891. Переялъ Кизыль-артъ (*Тулиновъ!*).

Весьма вѣроятно, что растеніе это взято на сѣверномъ склонѣ Кизыль-арта; мы, по крайней мѣрѣ, собирали его только въ Бордабѣ (2. VII. 1901, Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Джунгарский Алатау.—б) Сѣверная Швеція, Лапландія, Норвегія, Исландія, Шпицбергенъ, Альпы Европы, арктическая Россія, Кавказъ, Уралъ, Алтай, Байкалъ, восточная Сибирь, Камчатка, Алеутскіе острова, островъ Уналашка, арктическая Америка, Гималаи и Тибетъ, Монголія, Китай.

467. Deschampsia koelerioides Rgl.—*Regel et Herder*, Enum. pl. Semenov. (Bull. d. l. Soc. d. Nat. d. Mosc. 1868). IV, p. 299.—*Regel*, Descr. pl. nov. („Acta H. P.“ VII, 2, p. 637, 638.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 273, № 2.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 28, № 96.—*Б. Федченко*, Мат. фл. Пам. р. 10, № 213 (*Atropis distans*).—*О. Федченко*, Раст. Пам. № 234.

typica Rgl.:

1895. Памиръ 13—14.000' (Alcock; non vidi; D. koelerioides).—1901. Акъ-Байталъ 8. VIII; (Б. и О. Федченко!!). var. *elatior* Rgl.

1892. Карасу (*Назаровъ!!*)—1901. Возлѣ Памирского Поста 10. VII, 12.650'; между Памирскимъ Постомъ и Карабу 15. VII и 5. VIII; между Чатыръ-ташемъ и Карабу, 13.100—14.000', 4. VIII (Б. и О. Федченко!!).—1901. Мургабъ, сырьи луга (*Тулиновъ!*).

Геогр. распр.: а) Тяньшань, Джунгарский Алатау.—б) Кашмиръ и Балтистанъ.

468. Deschampsia sp.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 28, № 95.

1895. Памиръ, 13.000—14.000' (Alcock; non vidi).

469. Calamagrostis anthoxanthoides (Munro) Rgl.—*Regel*, Descr. pl. nov. („Acta H. P.“ VII, 2, p. 639, 640).—*Regel*, Descr. pl. nov. (А. П. Федченко, Путеш. въ Туркест., III, вып. 18, p. 85).—*Deyeuxia anthoxanthoides* Munro, *Henderson et Hume*, Lahore to Yarkand, p. 339.

Указ. для Памира: *О. Федченко*, Растения Памира, № 235.

1878. 5. VIII (*Кушакевичъ!*): безъ указанія мѣстности, но очевидно у Кара-куля.—1892. Верховья Аличура (*Назаровъ!*).—1901. На южномъ склонѣ перевала Кизыль-артъ, на альпийскихъ лужайкахъ, 14.600—14.000', 3. VII и 10. VIII; у подошвы Акъ-Байтала, на сѣверномъ склонѣ его, на берегу рѣки, 14.400', 7. VII; на перевалѣ Акъ-Байталь и выше перевала, до 16.400', 8. VIII; между Памирскимъ Постомъ и уроцищемъ Гурумды, 12.650—14.000', 7. VIII (Б. и О. Федченко!!).—1901. Сырые пески у р. Акъ-Байталь (*Тулиновъ!*).

Геогр. распр.: а) Алайский хребетъ, Тяньшань.—б) Китайскій Туркестанъ.

470. Calamagrostis arundinacea Roth., Tent. Fl. Germ. I, 33.—*C. sylvatica* DC., Ledb., Fl. Ross. IV, p. 426, № 1.—*C. sylvatica* (Schrad.) DC., Boiss., Fl. Or. V, 526, № 10.—*Deyeuxia sylvatica* Kunth., Hook., Fl. Br. Ind. VII, p. 266, № 1.

Указ. для Памира: *О. Федченко*, Растения Памира, № 236.

Var. *pamirensis* Hackel (var. n.). Culmo humiliore (circ. 20 cm. alto), foliis glaucis rigidis, spiculis obscure violascens, tibus, arista glumas steriles vix superante distineta.

1901. У озера Сассыкъ-куль, 13.100', 17. VII (Б. и О. Федченко!!).—1901. Переялъ Кизыль-артъ; Мургабъ; сырьи

луга; Сассыкъ-куль; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (Тулиновъ!).

Геогр. распр.:—а) In deserto soongoro-kirghisico (Sievers).—Ни Ледебуръ, ни Регель не видали экземпляровъ Сиверса, и Регель („Acta H. P.“ VII, р. 639) считаетъ возможнымъ, что въ указание это вкрадлась ошибка.—б) Средняя Европа, Европейская Россія, Крымъ, Кавказъ, Ураль, Алтай, Байкалъ, Даурія, западные Гималаи.

471. Calamagrostis tianschanica Rupr., Sertum tianschanicum, p. 34.—(= Deyeuxia compacta Munro in Hook., Fl. of Br. Ind. p. 267, № 4).

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 237.

1878. Памиръ-Харгоши: Кара-куль, 30. VII (Ашурабаевъ!); Кара-куль 5. VIII; верховье р. Акъ-Байталь 8. VIII; р. Аличуръ, 20—21. VIII (Кушакевичъ!).—1901. Между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.650—12.450', 12. VII; Акъ-Байталь 8. VIII (Б. и О. Федченко!!).

Наше растеніе совершенно тождественно съ типичнымъ экземпляромъ, собраннымъ барономъ Ф. Р. Остенъ-Сакеномъ и находящимся въ гербаріи Академіи Наукъ. Я не вижу также, чѣмъ бы оно отличалось отъ растенія, собранного на Тяньшанѣ же (близъ Кетменского перевала) Красновымъ и названного имъ, въ герб. Импер. Ботаническаго Сада, *Avena sesquiflora* Gray.

Геогр. распр.:—а) Тяньшань, Памиръ.—б) Гималаи, Тибетъ, Монголія.

472. Oryzopsis lateralis Staph.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 234, № 1.—*Milium laterale Rgl.*, Descr. pl. nov. fasc. VIII („Acta H. P.“ VII, 2, p. 645).

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 238.

1878. Булунъ-куль 26. VIII (Кушакевичъ!)—1901. Между Яшиль-кулемъ и Ходжа-Назаромъ, 12.500—13.800', на песчаныхъ склонахъ, 19. VII плоды (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: Гималаи, Тибетъ.

473. Agrostis alba L.—*Linné*, Spec. Pl. ed. I, p. 63.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 436, № 2.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 514, № 3.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 254, № 1.

1891. Озеро Яшиль-куль, 12. VIII, до 13.000' (Бржезинскій!).

Геогр. распр.:—а) Горы Заравшана, Алайскій хребетъ, Шугнанъ, Тяньшань.—б) Всѧ Европа, вся европейская

Россія, Крымъ, Кавказъ, Закавказье, Ураль, Алтай, Байкалъ, восточная Сибирь, Даурія, Китай, западные Гималаи, западный Тибетъ, Афганистанъ, Персія, съверная Африка, съверная Америка.

474. Stipa splendens Trin. in *Spreng.*, n. Ent. II, p. 54.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 232, № 13.—*Lasiagrostis splendens* Kunth., *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 446, № 1.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 239.

1878. Низовье р. Карасу 17. VIII; Карасу 29 и 31. VIII. пл. (Кушакевичъ!).—1892. Мургабъ (Назаровъ; въ Мат. фл. Пам. Б. Федченко пропущено).—1901. Между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.650—12.450', 12. VII и 5. VIII; отъ уроцища Чатыръ-ташъ до Карасу, 13.100—13.200', 4. VIII (Б. и О. Федченко!!).—1901. Песчаные сухие берега Мургаба (Тулиновъ).

Геогр. распр.:—а) Джунгарія, Тарбагатай, Тяньшань, Алайскій хребетъ, Шугнанъ.—б) Ураль, Алтай, Байкалъ, Даурія, западный Тибетъ.

475. Stipa mongholica Turcz., Cat. baikal. № 1269.—*Trin.* in Bull. de l'Acad. de St. Pétersb. I, p. 67.—*Ptilagrostis mongholica* Gris. in *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 447, № 1.—*Lasiagrostis mongholica* *Trin.* in Mém. de l'Acad. de St. Pétersb. VI, Sér. 7, p. 87.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347 (*Lasiagrostis subsessiliflora* Rupr.?).—Федченко Б., Мат. фл. Пам., p. 10, № 204 (*Ptilagrostis mongolica* *Trin.*).

1892. Передъ переваломъ Акъ-берды (Назаровъ!).—1893. Кара-джильга (Poncins; non vidi; *Lasiagrostis subsessiliflora* Rupr.?).

Геогр. распр.:—а) Тяньшань, Памиръ.—б) Байкалъ.

476. Stipa orientalis Trin. in *Ledb.*, Fl. alt. I, p. 83 et Ic. pl. Fl. Ross. t. 223.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 449, № 6.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 504, № 12.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 229, № 1.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 28, № 94.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 504, № 12.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 229, № 1.—*Fl. Or. V*, p. 504, № 12.—*Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 229, № 1.

Б. Федченко, Мат. фл. Пам., p. 10, № 206.—О. Федченко, Раст. Памира, № 240.

1878. Съверные предгорья озера Кара-куль 30. VII; близъ Кара-куля 5. VIII (Кушакевичъ!).—1892. Рангъ-куль, Яшиль-куль, Мургабъ, (Назаровъ!).—1895. Памиръ, 13—

14.000' (Alcock; non vidi). — 1901. У озера Кара-куль, на сланцевыхъ скалахъ, 5. VII; между Памирскимъ Постомъ и Шаджаномъ, 12. VII; близь Памирского Поста, 12.650', 14. VII; между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100—12.500', 18. VII; между Сассыкъ-кулемъ и урочищемъ Чатыръ-ташъ, 13.100—13.540', 3. VII; между Карасу и Памирскимъ Постомъ, 13.100—12.650', 5. VIII; на Аксъ-Байталъ 8. VIII (Б. и О. Федченко!!). — 1901. Кара-куль; ледниковые холмы передъ Сассыкъ-кулемъ (Тулиновъ!).

Геогр. распир.: — а) Джунгарский Алатау, горы Заравшана (ущелье Саратагъ), пески Кизылъ-кумъ (гора Каракъ). — б) Алтай, Китай, Монголія, Тибетъ и западный Тибетъ, Персія.

477. *Stipa Lessingiana* Trin. — *Trin. et Rupr.* in Mém. de l'Acad. Pétersb. VI sér., 7, p. 79. — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 450, № 8. — *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 502, № 9.

Указ. для Памира: Б. Федченко, Мат. фл. Пам., р. 10, № 205.

1891. Ущелье Каинды, до 12.000' (Бржезицкий!). — 1892. Яшиль-куль (Назаровъ!).

Геогр. распир.: — а) Пески Кизылъ-кумъ, долина Заравшана, Памиръ, Шугнанъ, Тяньшанъ, долина Сырт-Дары. — б) Южная Россія, Уралъ (Оренбургская губернія), Трансильванія, Персія.

478. *Alopecurus mucronatus* Hackel (sp. n.).

По письменному сообщенію Гаккеля, діагнозъ этого вида будеть опубликованъ имъ въ спискѣ памирскихъ растеній Ove Paulsen'a.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's plants, p. 27, № 93 (*A. alpinus* Sm.). — О. Федченко, Растенія Памира, № 241.

1895. Памиръ 13—14.000', (Alcock; non vidi). Я не сомнѣваюсь, что растеніе, собранное Alcock'омъ, относится сюда, такъ какъ *A. mucronatus* чрезвычайно похожъ на *A. alpinus*. — 1899. Памиръ (Н. Вельманъ!). — 1901. Между урочищемъ Чатыръ-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль 13.540—13.100', 17. VII въ цв.; на солонцеватой, сырой почвѣ у озера Сассыкъ-куль, 17. VII въ цв. и 18. VII въ цв.; на сырой лужайкѣ между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль, 13.100', 18. VII въ цв.; между урочищемъ-Ходжа-Назаръ и переваломъ Кой-тезекъ, 13.800—15.100', 20. VII (Б. и О. Федченко!!). —

1901. Чатыръ-ташъ; Сассыкъ-куль; ледниковые холмы за Сассыкъ-кулемъ (Тулиновъ!).

Геогр. распир.: Найдено только на Памирѣ.

479. *Alopecurus pratensis* L. — *Linné*, Spec. pl. ed. I, p. 60. — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 462, № 7.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347.

Собраний Poncins на перевалъ Талдыкъ, т. е. въ Алайскомъ хребтѣ, а не на Памирѣ.

Геогр. распир.: — а) Алайский, Туркестанъ хребтъ, б) Средняя и южная Европа и вся европейская Россія, Крымъ, Кавказъ, Уралъ, Алтай, Байкалъ, восточная Сибирь, Даурія.

480. *Setaria viridis* (L.) P. d. Beauv. — *P. d. Beauv.*, Agrostogr. p. 51. — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 471, № 2. — *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 443, № 2. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 80, № 5. — *Panicum viride* L., Spec. pl. ed. I, p. 870.

1891. Озеро Яшиль-куль, 10. VIII (Бржезицкий!).

Геогр. распир.: — а) Долина и горы Заравшана, Фергана, Шугнанъ, степи Джунгаріи. — б) Средняя и южная Европа, вся европейская Россія, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Уралъ, Алтай, Байкалъ, Даурія, Японія, Китай, Гималаи и западный Тибетъ, Афганистанъ, Персія, Аравія, съверная Африка.

481. *Andropogon Ischaemum* L. — *Linné*, Spec. pl. ed. I, p. 1047. — *Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 477, № 1. — *Boiss.*, Fl. Or. V, p. 463, № 2. — *Hook.*, Fl. of Br. Ind. VII, p. 171, № 14.

1891. Р. Вахджеиръ 25. VII (Бржезицкий!).

Геогр. распир.: — а) Туркменія, степи Джунгаріи, степь къ ю. и з. отъ Тарбагатая, горы Заравшана, Фергана, Алайский хребтъ, Тяньшанъ. — б) Средняя и южная Европа, Аладжай хребтъ, Крымъ, Кавказъ и Закавказье, Персія, Афганистанъ, Тибетъ, съверо-западная Индія.

XLIX. *Balanophoreae*.

482. *Cynomorium coccineum* Linné, Sp. pl. ed. I, p. 970. — *Willd.*, Spec. pl. IV, p. 177. — *Rich.*, Mém. sur les Balanoph. in Mém. du Mus. d'hist. natur. VIII, p. 420, tab. 21.

Въ гербарии Имп. Бот. Сада я видѣла нѣсколько экзemplяровъ этого растенія съ этикеткой („Pamir, Kuschakewicz, 1878“) написанной не его рукой, а уже въ Саду; весьма со- мнительно, чтобы оно было собрано на Памирѣ.

Геогр. распр.:—а) У озера Балхашъ и на Иссыкъ-куль. — б) Испанія, Сардинія, Сицилія, Италия, Критъ, Мавританія.

L. Gnetaceae.

483. *Ephedra monosperma* C. A. Meyer, Versuch Monogr. *Ephedra*, p. 89 t. 8 fig. 11.—*Stapf*, Die Arten der Gattung *Ephedra* (besonders abgedruckt aus dem LVI Bande d. Denkschr. d. math. naturw. Classe d. Kais. Ak. d. Wiss., Wien, 1889), p. 73, № 18, tab. III, xix, fig. 1—9, xxxi, fig. 3.

Указ. для Памира: *Franchet*, pl. Poncins, p. 347 (*E. dubia*¹⁾ Regel?.—Б. Федченко, Мат. фл. Памира, p. 10, № 223 (*Ephedra* sp.).—О. Федченко, Растенія Памира, № 242.

1878. Сѣверныя предгорья Карапуля, 30. VII незрѣлые плоды (var. *disperma* Rgl.; Кушакевич!).—1892. Акъ-Байталь съ мужскими цвѣтами (Назаровъ!).—1893. Карапжилга (Poncins; non vidi; *E. dubia* Rgl?).—1899. Памиръ, съ мужскими цв. (Н. Вельманъ!).—1901. На сланцевыхъ скалахъ возлѣ озера Карапуль, 5. VII; въ каменистой степи возлѣ Памирского Поста, по склонамъ овраговъ, 12.650', 14. VII; между озерами Сассыкъ-куль и Яшиль-куль 13.100—12.500', 18. VII, въ каменистой пустынѣ; между озеромъ Яшиль-куль и урошищемъ Ходжа-Назарь, 12.500—13.800', на песчаныхъ склонахъ, 19. VII съ мужскими цвѣтами (Б. и О. Федченко!!).

Карликовый полукустарникъ; растетъ группами; съро- зеленые вѣточки прижаты къ землѣ и едва замѣты.

Геогр. распр.:—а) Джунгарскій Алатау, Тянъшань, Кульджа, Шугнанъ.—б) Сибирь, Амуръ, Китай, Монголія, Тибетъ.

484. *Ephedra Gerardiana* Wall.—*Wallich*, A num. list of dried spec. № 6048.—*Stapf*, l. c. pp. 75 et 76, № 19. Tab. III, tab. xviii, fig. 1—9; tab. xxxi, fig. 1.

¹⁾ *Stapf* въ своей монографіи относить *E. dubia* Rgl. отчасти къ *E. monosperma* C. A. M., отчасти къ *E. distachya* L., географическое распространение которой, однако, нѣсколько иное.

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl., p. 26, № 83.

1895. На высотѣ болѣе 14.000', не часто (Alcock, non vidi).

Геогр. распр.: Афганистанъ, Гималаи, Каракорумъ, Тибетъ, Китай.

LI. Polypodiaceae.

485. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. — *Bernhardi* in Schrad. n. Journ. I, 2, p. 26.—*Ledb.*, Fl. Ross. IV, p. 516.—*Boiss.*, Fl. Or. V, p. 740, № 1. — *Polypodium fragile* L., Sp. pl. ed. 2, II, p. 1553 (1763).

Указ. для Памира: *Duthie*, Alcock's pl. p. 28, № 106.—Б. Федченко, Мат. фл. Пам. p. 10, № 226.

1892. Верховья Аличура (Назаровъ!).—1895. У тающаго снѣга, на высотѣ около 15.000' (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.:—а) Аиръ-тау! Горы Аркатъ! Карка-ралы, Тарбагатай и Джунгарскій Алатау, Улутау, Тянъшань, Памироалай (горы Заравшана, Туркест. хребеть, Алайскій хребеть).—б) Вся Европа и вся европейская Россія, Крымъ, Кавказъ и Закавказье вся Сибирь, Камчатка, острова Курильские и Уналашка, арктическая Сѣв. и Южн. Америка, Китай, Персія, Афганистанъ, Австралия, Канарскіе острова, сѣв. Африка.

Musci Frondosi¹⁾.

LI. Ditrichaceae.

486. *Distichium capillaceum* Br. eur.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 243.

1901. На альпійскихъ лужайкахъ выше перевала Кой-тезекъ, 15—16.000', 20. VII пл. (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: а) Алайскій хребеть. — б) Встрѣчается почти на всемъ земномъ шарѣ, въ Европѣ обыкновенно.

LI. Pottiaceae.

487. *Pottia Heimii* (Hedw.) Br. eur.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растенія Памира, № 244.

1901. На солонцеватомъ берегу озера Сассыкъ-куль, 13.100', 18. VII молодые плоды и сухія коробочки старыхъ (Б. и О. Федченко!!).

¹⁾ Мхи, собранные Б. и О. Федченко, обработалъ В. Ф. Бро-терес (elaboravit V. F. Brotherus).

Геогр. распр.:—а) Германия, Нидерланды, Британия, южный Тироль.

488. Desmatodon cernuus (Hüb.) Br. eur.

Указ. для Памира: Warming, Dupla Musei Hauniensis (ms.), 1900.

Памиръ (ex Warming; non vidi).

Геогр. распр.: Арктическая Европа, Швеция, Норвегия, Альпы Баварии и Тироля, Канада.

LIV. Encalyptaceae.

489. Encalypta rhabdocarpa Schwaegr.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 245.

1901. На альпийскихъ лужайкахъ выше перевала Койтезекъ, 15—16.000', 20. VII (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: Альпы Европы.

LV. Bryaceae.

490. Bryum leptoglyphon Philib.

Указ. для Памира: Warming, Dupla Musei Hauniensis (ms.), 1900.—О. Федченко, Растения Памира, № 246.

Памиръ (ex Warming, l. c.; non vidi).—1901 г. Между уроцищемъ Чатырь-ташъ и озеромъ Сассыкъ-куль, 13.540—13.100', 17. VII пл. (Б. и О. Федченко!!).

var. *hypophila* Philib.

Памиръ (ex Warming, l. c.; non vidi).

Геогр. распр.:—а) Памироалай (Аучи дагана, Караказукъ, Малый Алай).—б) Кавказъ (Бортерусъ).

491. Bryum Schleicheri Schwaegr.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 247.

1899. Памиръ (*H. Вельманъ!*; teste Brotherus).—1901. Въ рукавѣ Мургаба, между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.650—12.450', 12. VII пл. (Б. и О. Федченко!!).

Геогр. распр.: Пиренеи, Сиerra Невада, Казбекъ, Синай, Гималаи.

492. Bryum pamiricomucronatum Philib.

Указ. для Памира: Warming, Dupla Musei Hauniensis (ms.), 1900.

Памиръ (ex Warming; non vidi).

493. Bryum sp., fruct. immaturis.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 248.

1901. На альпийскихъ лужайкахъ выше перевала Койтезекъ, 15—16.000', вмѣстѣ съ *Distichium capillaceum*, 20. VII незрѣлые плоды (Б. и О. Федченко!!).

494. Bryum sp. (sterile).

Указ. для Памира: О. Федченко. Растения Памира, № 249.

1901. На южномъ склонѣ перевала Кизыль-артъ, около 14.600', 3. VII (Б. и О. Федченко!!).

LVI. Hypnaceae.

495. Amblystegium fallax (Brid.) Lindb.

Указ. для Памира: Warming, Dupla Musei Hauniensis (ms.), 1900.

Памиръ (ex Warming, l. c.; non vidi).

Lichenes¹.

LVII. Lecanoraceae.

496. Placodium elegans (Link.) Ach.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 250.

1901. На камняхъ. Весьма обильно. Памиръ (Б. и О. Федченко!!).

497. Dimelaena oreina (Ach.) Norm.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира № 251.

1901. На камнѣ. Памиръ (Б. и О. Федченко!!).

LVIII. Parmeliaceae.

498. Physcia caesia (Hoffm.) Nyl.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 252.

1901. На камнѣ вмѣстѣ съ *Placodium elegans*. Памиръ (Б. и О. Федченко!!).

Algae².

LIX. Chlamydomacteriaceae.

499. Thiothrix tenuis Winogr.—сѣрия бактерія.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 253.

1901. Въ заводяхъ р. Мургабъ, между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.600', 12. VII (Б. и О. Федченко!!).

¹) Обработалъ А. А. Еленкинъ (elaboravit A. Elenkin).

²) Водоросли, собранные Б. и О. Федченко, обработалъ Г. А. Надсонъ (elaboravit G. Nadson).

LX. Chroococcaceae.

500. Chroococcus turgidus (Ktz.) Nág.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 254.

1901. Въ заводяхъ р. Мургабъ, между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.600', 12. VII (Б. и О. Федченко!!). Нерѣдко.

501. Gomphosphaeria aponina Kütz.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 255.

1901. Въ заводяхъ р. Мургабъ, между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.600', 12. VII (Б. и О. Федченко!!). Нерѣдко.

LXI. Oscillatoriaceae.

502. Spirulina major Kütz.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 256.

Синезеленая водоросль, которая попадается (рѣдко) среди слизи, образованной Stigeoclonium sp. (см. № 508).

1901. Въ горько-соленомъ озерѣ Сассыкъ-куль, 17. VII (Б. и О. Федченко!!).

LXII. Nostocaceae.

503. Nostoc Zetterstedtii Aresch.

Указ. для Памира: Duthie, Alcock's pl., p. 29, № 112.

1895. Памиръ (Alcock; non vidi).

Геогр. распр.: Швеція.

LXIII. Zygnemataceae.

504. Spirogyra sp., толщина нитей 40 м.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 257.

1901. Въ заводяхъ р. Мургабъ, между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.600', 12. VII (Б. и О. Федченко!!).

505. Spirogyra sp., толщина нитей 20 м.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 258.

1901. Въ заводяхъ Мургаба, между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.600', 12. VII (Б. и О. Федченко!!).

LIV. Pleurococcaceae.

506. Scenedesmus quadricauda Bréb.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 259.

1901. Въ заводяхъ р. Мургабъ, между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.600', 12. VII (Б. и О. Федченко!!). Рѣдко.

LXV. Hydrodictyaceae.

507. Pediasium ellipticum Ralfs.

Указ. для Памира: (О. Федченко, Растения Памира, № 260.

1901. Въ заводяхъ р. Мургабъ, между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.600', обильно, въ различныхъ стадияхъ развитія (Б. и О. Федченко!!).

LXVI. Chaetophoraceae.

508. Stigeoclonium sp.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 261.

Зеленые слизистые кустики, со множествомъ покояющихся клѣтокъ (хламидоспоры или цисты). Вѣроятно новый видъ.

1901. Въ горько-соленомъ озерѣ Сассыкъ-куль, 13.100', 17. VII (Б. и О. Федченко!!). Слизистые комки волненіемъ прибиваются къ берегу.

LXVII. Oedogoniaceae.

509. Oedogonium sp., толщина нитей 17 м.

Указ. для Памира: О. Федченко, Растения Памира, № 262.

1901. Въ заводяхъ р. Мургабъ, между Памирскимъ Постомъ и Ша-джаномъ, 12.600', 12. VII (Б. и О. Федченко!!).

Водоросли №№ 504, 505 и 509) образуютъ зеленую тину. Spirogyra безъ зиготъ, а Oedogonium безъ оспоръ, и потому виды не могли быть определены съ точностью.

Среди этой тины найдены слѣдующіе 5 видовъ: №№ 499, 500, 501, 506 и 507.

**Сравнительная таблица
распространения Памирскихъ растеній
въ другихъ странахъ.**

№№ соотвѣтствуютъ номерамъ въ спискѣ; (въ скобкахъ постасы №№ тѣхъ растеній, которыя для собственного Памира не достоини). Пропущены тѣ растенія, для которыхъ опредѣлено только довое название, а равно и тѣ, которыя собраны не на Памирѣ указываются для него ошибочно. Не включены также въ нашу блицу мхи, лишайники и водоросли, распространение которыхъ есть вообще космополитический характеръ.

№	Памирь											
	1 Памирь	2 Тибет.	3 Джунгарскій Алатау и Тарбагатай.	4 Афганистанъ, Гиндукушъ и Гималай.	5 Тибет.	6 Китайский Туркестанъ и Монголія.	7 Китай, Японія, Корея.	8 Северная Азія.	9 Остальная Туркестанъ.	10 Персия, Передній Алай и Кавказъ.	11 Европа (и Ураль).	12 Другія страны.
1	Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.	..	+	..	+	+	+
2	Clematis orientalis L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Thalictrum alpinum L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Pulsatilla Albana (Stev.) Spreng.	+	+	+	+
7	Anemone biflora DC.	+	+	+	+
10	Ranunculus aquatilis L. v. pantothenrix	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Ranunculus Aucheri Boiss.	+
13	Ranunculus flexicaulis Komar.	+	+
14	Ranunculus pulchellus C. A. M. var. pseudo-hireulus (Schrenk) Trautv.	+	+	+	+	+	+	+
	var. longicaulis (C. A. M.) Trautv.	+	+	+
	var. tridentatus O. Fedtsch.
16	Ranunculus Cymbalariae Pursh. var. alpinus Koch.	+	+

№	Памирь				
	1 Памирь	2 Тибет.	3 Джунгарскій Алатау и Тарбагатай.	4 Афганистанъ, Гиндукушъ и Гималай.	5 Тибет.
17	Ranunculus hyperboreus Rottb. var. natans (C. A. M.) Rgl.	+	+
	var. parvispatulus (Bruhl)
18	Ranunculus Pamiri Korsh.
(19)	Ranunculus sulphureus Soland.
19	var. Alberti (Rgl. et Schmalh.) Maxim.
20	Ranunculus songoricus Schrenk	+	+
21	Ranunculus rubrocalyx Rgl.	+
22	Ranunculus rufosepalus Franchet	+
23	Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bge.	+
27	Isopyrum anemonoides Kar. Kir. var. brevistylum Korsh.
28	Isopyrum grandiflorum Fisch.
29	Delphinium dasyanthium Kar. Kir. var. undulatum Huth.
30	Delphinium Brunonianum Royle
31	Aconitum rotundifolium Kar. Kir.
32	Papaver alpinum L. var. croceum Ledb.
33	Corydalis stricta Steph.
34	Corydalis Gortschakowii Schrenk
35	Corydalis capnoides (L.) Pers.
36	Arabis kokanica Rgl. et Schmalh.
37	Parrya nudicaulis (L.) Boiss. var. turkestanica Korsh.
38	Parrya labellata Rgl.
39	Parrya eriocalyx Rgl. et Schmalh.
40	Parrya exscapa C. A. M.
41	Meniocus linifolius (Steph.) DC.
42	Draba alpina L. var. pamirica m. var. Korshinskii m.
43	Draba Transzschelii Litw.
44	Draba altaica Bge.
45	Draba incana L. var. multicaulis Rgl.
(46)	Draba lasiophylla Royle
47	Draba media Litw.

	Памир-Алай.	Тяньшань.	Джунарский Алай. Тау и Тарбагатай.	Афганистан, Гин- дукуш и Гималаи.	Тибет.	Киргизский Турк- естан и Монголия. Курах, Илий, Копет- Даг.	Северная Азия. Осетийский Ту- ркестан.	Персия, Переходный Алай и Кавказ.	Европа (и Урал).	Другие страны.	№	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) ? <i>Draba hyperborea</i> Desv.												
0) <i>Chorispora exscapa</i> Bge.	+	+	+	+								
1) <i>Chorispora macropoda</i> Trautv.	+	+	+	+								
2) <i>Chorispora sibirica</i> DC. var. <i>songorica</i> (Schrenk)				+								
3) <i>Chorispora sabulosa</i> Camb.	+			+								
4) <i>Sisymbrium glandulosum</i> (Kar. Kir.) Maxim.				+								
5) <i>Sisymbrium brassicaeforme</i> C. A. M.	+	+		+								
6) <i>Sisymbrium Sophia</i> L. f. <i>nana</i>	+	+		+								
7) <i>Sisymbrium pumilum</i> Steph. var. <i>alpinum</i> Korsh.	+	+		+								
8) <i>Sisymbrium sulphureum</i> Korsh.												
9) <i>Sisymbrium Korolkowi</i> Rgl. et Schmli.	+	+										
10) <i>Sisymbrium nanum</i> DC.												
11) <i>Sisymbrium humile</i> C. A. M.		+		+								
12) <i>Sisymbrium mollissimum</i> C. A. M.	+			+								
13) <i>Erysimum sisymbrioides</i> C. A. M.	+	+		+								
14) <i>Erysimum altaicum</i> C. A. M.	+	+		+								
15) <i>Christolea crassifolia</i> Cambess.				+								
16) <i>Christolea pamirica</i> Korsh.												
17) <i>Didymophysa Fedtschenkoana</i> Rgl. et Schmli.												
18) <i>Tetraclae quadricornis</i> (Steph.) Bge.	+	+										
19) <i>Braya rosea</i> Bge. var. <i>albiflora</i> Maxim.	+	+		+								
20) <i>Braya Scharnhorstii</i> Rgl. et Schm.			+									
21) <i>Braya pamirica</i> (Korsh.) m.				+								
22) <i>Eutrema Przewalskii</i> Maxim.												
23) <i>Capsella draboides</i> Korsh. var. <i>sagittata</i> Korsh.												
24) <i>Capsella procumbens</i> (L.) Fries	+	+		+	+			+	+	+		
25) <i>Capsella Thomsonii</i> Hook. fil.				+	+							
26) <i>Smelevskia calycina</i> (Steph.) C. A. M.	+	+		+	+			+				
27) <i>Smelevskia annua</i> Rupr.												
28) <i>Lepidium ruderale</i> L. var. <i>micranthum</i> Led.												

	Памир-Алай.	Тяньшань.	Джунарский Алай. Тау и Тарбагатай.	Курах, Илий, Копет-Даг.	Афганистан, Гин- дукуш и Гималаи.	Тибет.	Киргизский Турк- естан и Монголия.	Персия, Переходный Алай и Кавказ.	Европа (и Урал).	Другие страны.	№	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82) <i>Lepidium latifolium</i> L. var. <i>pubescens</i> Ledb.	+	+	+									
83) <i>Lepidium cordatum</i> Willd.												
84) <i>Dilophia salsa</i> Thoms.												
85) <i>Tauscheria lasiocarpa</i> Fisch.												
86) <i>Goldbachia laevigata</i> (M. B.) DC.												
87) <i>Viola tianschanica</i> Maxim.												
88) <i>Parnassia Laxmanni</i> Pall.												
89) <i>Gypsophila Gmelini</i> Bge. var. <i>caespitosa</i> Turcz.												
90) <i>Gypsophila fastigiata</i> L. var. <i>cephalotes</i> Schrenk												
91) <i>Gypsophila pseudoverticillata</i> Komar.												
92) <i>Saponaria Griffithiana</i> Boiss.												
93) <i>Saponaria dichotoma</i> Komar.												
94) <i>Saponaria Vaccaria</i> L.												
95) <i>Silene caucasica</i> Boiss. var. <i>pamirensis</i> H. Winkl.												
96) <i>Melandryum longicarpophor</i> Komar.												
97) <i>Melandryum apetalum</i> Fenzl.												
98) <i>Melandryum triste</i> (Bge.) Fenzl.												
99) <i>Arenaria Meyeri</i> Fenzl.												
100) <i>Stellaria humifusa</i> Rottb. var. <i>caespitosa</i> Rgl. <i>lus. oxyse-</i> <i>pala</i> Rgl.												
101) <i>Stellaria glauca</i> With.												
102) <i>Stellaria brachypetala</i> Bge.												
103) <i>Stellaria rigida</i> Bge.												
104) <i>Cerastium trigynum</i> Viñl. var. <i>glandulosum</i> Led.												
105) <i>Cerastium alpinum</i> L.												
106) <i>Cerastium vulgatum</i> L.												
107) <i>Linum perenne</i> L.												
108) <i>Althaea nudiflora</i> Lindl.												
109) <i>Malva mauritiana</i> L.												
110) <i>Geranium collinum</i> Steph. var. <i>eglandulosum</i> Led.												
111) <i>Geranium tuberaria</i> Camb.												

- 117 *Erodium tibetanum* Edgew.
 118 *Zygophyllum Rosowii* Bge.
 119 *Zygophyllum brachypterum* Kar. Kir.
 120 *Nitraria Schoberi* L.
 (121) *Thermopsis alpina* (Pall.) Led.
 (122) *Medicago lupulina* L.
 123 *Trigonella cachemiriana* Cambess.
 (124) *Trifolium repens* L.
 126 *Oxytropis bella* B. Fedtsch.
 (127) *Oxytropis leucocyania* Bge.
 128 *Oxytropis pagobia* Bge.
 129 *Oxytropis humifusa* Kar. et Kir.
 130 *Oxytropis glabra* (Lam.) DC.
 var. *n. pámirica* B. Fedtsch.
 131 *Oxytropis platonychia* Bge.
 132 *Oxytropis cachemiriana* Cambess.
 133 *Oxytropis Póenelnsii* Franchet
 134 *Oxytropis chiliophylla* Royle
 var. *albida* B. Fedtsch.
 135 *Astagalus ophiocarpus* Benth.
 136 *Astragalus Kuschakewiczi* B. F. (sp. n.)
 137 *Astragalus densiflorus* Kar. Kir.
 138 *Astragalus brachytropis* (Stev.) C. A. M.
 139 *Astragalus tianschanicus* Bge
 var. *pámiricus* B. Fedtsch.
 141 *Astragalus alataicus* Kar. Kir.
 var. *pamirensis* (Franchet) B. F.
 142 *Astragalus lasiospermus* Boiss.
 143 *Astragalus Tulinovii* B. Fedtsch. (sp. n.)
 144 *Astragalus tibetanus* Benth.
 145 *Astragalus n. sp.* B. Fedtsch.
 (146) *Astragalus physodes* L.
 147 *Astragalus Chomutovi* B. Fedtsch.
 148 *Astragalus Alitschuri* B. Fedtsch.
 149 *Astragalus Muschketowi* B. Fedtsch.
 150 *Astragalus nivalis* Kar. Kir.
 (151) *Astragalus djilgensis* Franchet
 153 *Cicer songoricum* Steph.

Памирский.		Тибет.		Киргизский Турско-степан и Монголия.		Китай, Япония, Корея.		Синегорий Алай.		Остальной Турско-степан.		Персия, Передняя Азия и Кавказ.		Европа (и Урал).		Другие страны.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- (155) *Vicia peregrina* L.
 (156) *Vicia Cracca* L.
 (157) *Lathyrus tuberosus* L.
 158 *Hedysarum pumilum* (Led.) B. Fedt.
 159 *Hedysarum cephalotes* Franchet
 subsp. *pamiricum* B. Fedtsch.
 subsp. *schugnanicum* B. Fedtsch.
 162 *Sibbaldia tetrandra* Bge.
 163 *Chamaerhodos sabulosa* Bge.
 164 *Potentilla sericea* L.
 var. *akbaitalensis* m.
 165 *Potentilla polyschista* Boiss.
 166 *Potentilla multifida* L.
 167 *Potentilla bifurca* L.
 168 *Potentilla anserina* L.
 (169) *Potentilla recta* L.
 170 *Potentilla dealbata* Bge.
 171 *Potentilla reptans* L.
 172 *Potentilla nivea* L.
 173 *Potentilla floribunda* Pursh.
 174 *Comarum Salessovii* Bge.
 175 *Myriophyllum spicatum* L.
 177 *Hippuris vulgaris* L.
 f. *minima* B. Fedtsch.
 178 *Ceratophyllum demersum* L.
 179 *Myricaria germanica* Desv.
 var. *alopecuroides* Schrenk
 var. *squamosa* Maxim.
 180 *Umbilicus leucanthus* Led.
 181 *Umbilicus Semenovii* Rgl. et Herd.
 182 *Umbilicus alpestris* Kar. et Kir.
 183 *Umbilicus platyphyllus* Schrenk
 184 *Sedum gelidum* (Schrenk) Led.
 185 *Sedum Rhodiola* DC.
 var. *heterodontum* (Hook. et Th.)
 186 *Sedum crenulatum* Hook. et Th.
 187 *Saxifraga flagellaris* Willd.
 188 *Saxifraga Hirculus* L.
 189 *Saxifraga cernua* L.

№

- 190 Eryngium macrocalyx Schrenk
 (192) Chamaesciadum albiflorum Kar. et Kir.
 193 Bupleurum kokanicum Rgl. et Schm.
 194 Libanotis condensata Fisch. f. *gymnocarpa* B. Fedtsch.
 195 Neogaya simplex Meisn.
 196 Selinum papyraceum C. B. Clarke
 197 Zozimia tragoides Boiss.
 (198) Daucus Carota L.
 199 Hymenolaena Lindleyana Klotsch
 200 Trachydium Roylei Lindl.
 202 Galium verum L.
 203 Cephalaria syriaca Schrad.
 204 Scabiosa caucasica M. B. var. *songorica* Schrenk
 205 Aster alpinus L.
 206 Aster flaccidus Bge.
 207 Erigeron (*Diplopappus*) turkestanicus (Rgl. et Schm.) m.
 208 Erigeron andryaloides (DC.) Benth.
 209 Erigeron pulchellus DC.
 210 Erigeron uniflorus L.
 211 Inula rhizocephala Schrenk
 (212) Achillea trichophylla Schrenk
 213 Pyrethrum transiliense Rgl. var. *tomentosum* Rgl.
 var. *subvillosum* Rgl.
 214 Pyrethrum pulchrum Led.
 215 Chrysanthemum (*Pyrethrum*) *djilgense* Franchet
 216 Pyrethrum pamiricum O. Fedtsch.
 217 Artemisia Dracunculus L.
 218 Artemisia Pamirica C. Winkl. var. *Aschurbajewi* C. Winkl.
 (219) Artemisia desertorum Spreng.
 220 Artemisia maritima L.
 221 Artemisia sacrorum Led. var. *minor* Led.

Памирский.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тяньшань.	Джунгарский Алатау и Тарбагатай.	Афганистан, Гиндукуш и Гималаи.	Тибет.	Киргизский Турсистан и Монголия.	Китай, Япония, Корея.	Северная Азия.	Остальная Турсистан.	Персия, Иран и Кавказ.	Европа (и Урал).	Другие страны.	

№

- 222 Artemisia chamaemelifolia Vill.
 223 Artemisia Skorniakowi C. Winkl. var. *ramosa* C. Winkl.
 var. *pleiocephala* C. Winkl.
 224 Artemisia Kuschakewiczii C. Winkl.
 225 Artemisia Aschurbajewi C. Winkl. var. *ramosa* C. Winkl.
 226 Artemisia rupestris L. var. *viridifolia* DC.
 227 Artemisia macrocephala Jacquem.
 228 Tanacetum fruticosum Led.
 229 Tanacetum gracile Hook. et Th.
 230 Tanacetum tenuifolium Jacquem.
 (241) Tanacetum tibeticum Hook. et Th.
 (242) Tanacetum nanum C. B. Clarke
 243 Tanacetum Kuschakewiczi O. Fedtsch. sp. n.
 244 Leontopodium alpinum Cass. var. *subalpinum* Led.
 var. *sibiricum* (Led.).
 245 Ligularia altaica DC.
 246 Waldheimia tridactylites Kar. et Kir.
 247 Senecio coronopifolius Desf.
 (248) Senecio Renardi C. Winkl.
 249 Senecio songoricus Fisch. et Mey. var. *arachnoideus* C. Winkl.
 250 Saussurea pygmaea Spreng.
 251 Saussurea salsa (MB.) Spreng.
 252 Saussurea alpina (L.) DC.
 253 Saussurea colorata C. Winkl.
 254 Saussurea pamirica C. Winkl. f. *albiflora*
 255 Saussurea sorocephala (Schrenk) Hook. et Th.
 257 Cousinia submutica Franchet
 261 Cousinia rava C. Winkl.
 265 Cousinia auriculata Boiss.
 (265) Cousinia semidecurrens C. Winkl.
 (268) Centaurea squarrosa W.

№

	Памироалай											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	<i>Kentrophyllum lanatum</i> DC.	+
270	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. var. <i>incanum</i> Led.	+	+	+	+	+	+
271	<i>Serratula procumbens</i> Rgl.	..	+
272	<i>Jurinea depressa</i> (Stev.) C. A. M.
(273)	<i>Tragopogon major</i> Jacq.	..	+
274	<i>Tragopogon pratensis</i> L.
275	<i>Tragopogon brevirostris</i> DC.	..	+
(276)	<i>Tragopogon gracile</i> G. Don
277	<i>Scorzonera stricta</i> Horn. var. <i>villosa</i> (MB.) C. Winkl.	..	+
278	<i>Taraxacum officinale</i> Wigg. var. <i>corniculatum</i> (DC.) Rgl. var. <i>dissectum</i> (Led.) var. <i>palustre</i> (DC.) Rgl.	+	+
279	<i>Taraxacum leucanthum</i> Led.
281	<i>Youngia diversifolia</i> Led.
282	<i>Youngia flexuosa</i> Led. var. <i>gigantea</i> C. Winkl.	..	+
283	<i>Youngia pygmaea</i> Led. var. <i>purpurea</i> C. Winkl.
284	<i>Mulgedium tataricum</i> (L.) DC. f. <i>pumilum</i> B. Fedtsch.	..	+
285	<i>Utricularia vulgaris</i> L.
286	<i>Primula farinosa</i> L. var. <i>algida</i> (Adam) Trautv. var. <i>armena</i> C. Koch, forma <i>albo-</i> <i>farinosa</i> Kusnez. var. <i>armena</i> C. Koch f. <i>Nazarenensis</i> Derganc.	..	+
288	<i>Primula sibirica</i> Jacquin	..	+
289	<i>Primula nivalis</i> Pall. var. <i>purpurea</i> (Royle) Rgl. var. <i>turkestanica</i> Regel forma <i>glabrata</i> m. forma <i>farinosa</i> Schrenk	..	+
290	<i>Androsace villosa</i> L. α. <i>typica</i> Trautv. var. <i>dasyphylla</i> (Bge)	..	+

№	Памироалай.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	<i>Androsace chamaejasme</i> Koch	+	+
292	<i>Androsace akbaitalensis</i> Derganc(sp. n.)
293	<i>Corfusa Matthioli</i> L. var. <i>glabrata</i> Borbas.	+	+
294	<i>Glaux maritima</i> L.	+	+
295	<i>Lysimachia dubia</i> Ait.	+
296	<i>Gentiana falcata</i> Turcz.	+	+
297	<i>Gentiana pygmaea</i> Rgl. et Schmih.	+	+
298	<i>Gentiana umbellata</i> M. B.	+	+
299	<i>Gentiana barbata</i> Fröl.	+	+
300	<i>Gentiana detonsa</i> Rottb.
301	<i>Gentiana leucomelaena</i> Max.	+	+
302	<i>Gentiana prostrata</i> Haenke	+	+
303	<i>Gentiana tianschanica</i> Rupr.
304	<i>Gentiana Kaufmanniana</i> Rgl.
305	<i>Gentiana Olgae</i> Rgl. et Schmalh.
306	<i>Pleurogyne carinthiaca</i> (Wulf.) Grisb.	..	+
307	<i>Pleurogyne Thomsonii</i> C. B. Clarke
308	<i>Pleurog. brachyanthera</i> C. B. Clarke
309	<i>Swertia marginata</i> Schrenk
310	<i>Cuscuta pedicellata</i> Led.
311	<i>Cuscuta planiflora</i> Ten.? .. var. <i>approximata</i> Eng.?
312	<i>Macrotomia perennis</i> (DC.) Boiss.
313	<i>Arnebia guttata</i> Bge.
314	<i>Stenosolenium saxatile</i> Turcz.
315	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.
316	<i>Eritrichium pamiricum</i> B. Fedtsch. (sp. n.)
317	<i>Eritrichium rupestre</i> Bge
318	<i>Eritrichium dubium</i> O. Fedtsch.(sp. n.)
319	<i>Echinospermum barbatum</i> (M. B.) Lehm.
320	<i>Echinospermum omphaloides</i> Schrenk
321	<i>Echinospermum strictum</i> Led.
322	<i>Echinospermum microcarpum</i> Led.
323	<i>Solenanthus nigricans</i> Schrenk var. <i>hispidus</i> Rgl.
324	<i>Paracaryum heliocarpum</i> A. Kerner

№	ПамироАзия.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	<i>Rocheia stellulata</i> Rehb.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
331	<i>Hyoscyamus pusillus</i> L.	+	+	..	+	+	+	+	+	+
332	<i>Linaria odora</i> (M. B.) Chav.	+	+	+	+	+	+	+	+	..
333	<i>Scrophularia aquatica</i> L.	+	+	+
334	<i>Scrophularia incisa</i> Weinm. var. <i>pamirica</i> m.	+	+	..	+
	var. <i>alpina</i> Led.											
	var. <i>angustifolia</i> m.											
335	<i>Veronica Anagallis</i> L.	+	+	+	+
336	<i>Veronica cardiocarpa</i> Walp.	+	+	+
337	<i>Veronica biloba</i> L. var. <i>dasyarpa</i> Trautv.	+	+	+	+
338	<i>Euphrasia Regelii</i> Wettst.	+	+	+	+
339	<i>Pedicularis interrupta</i> Steph.
(340)	<i>Pedicularis verticillata</i> L.	+	+	+	+
341	<i>Pedicularis cheilanthifolia</i> Schrenk	+	+	+	+
342	<i>Pedicularis rhinanthoides</i> Schrenk	+	+	+	+
343	<i>Pedicularis dubia</i> B. Fedtsch.	+	+
344	<i>Pedicularis uliginosa</i> Bge.	+	+
(345)	<i>Pedicularis dolichorrhiza</i> Schrenk	+	..	+
(347)	<i>Pedicularis Oederi</i> Vahl.
348	<i>Lagotis glauca</i> Gaertn.	+	+	+	+
349	<i>Lagotis decumbens</i> Rupr.
(350)	<i>Mentha silvestris</i> L.	+	+	+
351	<i>Thymus Serpyllum</i> L.	+	+
(352)	<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam. var. <i>dasyantha</i> (M. B.) Led.
(353)	<i>Nepeta pamirensis</i> Franchet
(354)	<i>Nepeta oxycola</i> Franchet
355	<i>Nepeta kakanica</i> Rgl.	+
(356)	<i>Nepeta supina</i> Stev.
357	<i>Nepeta longibracteata</i> Benth.
358	<i>Nepeta Daenensis</i> Boiss.
359	<i>Nepeta spathulifera</i> Benth.
(360)	<i>Dracocephalum palmatum</i> Steph.
361	<i>Dracocephalum discolor</i> Bge.
(362)	<i>Dracocephalum organoides</i> Steph.
363	<i>Dracocephalum heterophyllum</i> Benth.
364	<i>Dracocephalum stamineum</i> Kar. Kir.

№	ПамироАзия.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	<i>Scutellaria alpina</i> L. var. <i>prostrata</i> Trautv. <i>f. pamirica</i> m.
366	<i>Scutellaria orientalis</i> L. var. <i>chamaedrifolia</i> Rehb.
367	<i>Sideritis montana</i> L.
368	<i>Lamium rhomboideum</i> Benth.
369	<i>Lagochilus diacanthoph.</i> (Pall.) Benth.
370	<i>Phlomis oreophila</i> Kar. Kir.
371	<i>Eremostachys laciniata</i> (L.) Bge.
372	<i>Otostegia Olgae</i> (Rgl.) Korsh.
373	<i>Acantholimon alatavicum</i> Bge. <i>Acantholimon diapensioides</i> Boiss.
374	<i>Plantago Grifithi</i> Decaisne var. <i>pamirica</i> m.
375	<i>Plantago arachnoidea</i> Schrenk
376	<i>Chenopodium vulvaria</i> L.
377	<i>Blitum virgatum</i> L.
378	<i>Blitum rubrum</i> (L.) Rehb.
379	<i>Atriplex rosea</i> L.
380	<i>Atriplex laciniata</i> L.
381	<i>Euotia cerafoides</i> (L.) C.A.M.
382	<i>Kochia prostrata</i> (L.) Schrad.
383	<i>Echinopsilon divaricatum</i> Kar. Kir.
384	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L. var. <i>pamiricum</i> m.
385	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.
386	<i>Halogeton glomeratus</i> (M.B.) C.A.M.
387	<i>Rheum spiciformae</i> Royle
388	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Campd.
389	<i>Rumex domesticus</i> Hartm.
390	<i>Polygonum Bistorta</i> L.
391	<i>Polygonum viviparum</i> L.
392	<i>Polygonum pamiricum</i> Korsh.
393	<i>Polygonum paronychioides</i> C.A.M.
394	<i>Polygonum acerosum</i> Meisn.
395	<i>Polygonum molliaeforme</i> Boiss.
396	<i>Salix oxycarpa</i> And.

	Памироалтай.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	Betula alba L.	+	+	+
402	Potamogeton pectinatus L.	+	+	..	+
403	Triglochin maritimum L.	+	+
404	Triglochin palustre L.	+	+
405	Orchis turkestanica Klinge	+	+
406	Iris ruthenica Dryand.	+	+
	var. uniflora Pall.
407	Gagea stipitata Merckl.	+	+	..	+
408	Gagea bulbifera Schult.	+	+
409	Gagea reticulata (Pall.) Schult.	+	+	..	+
410	Lloydia serotina (L.) Rehb.	+	+	..	+
(412)	Allium Pallasii Murr.	+	+
	var. stipellatum Rgl.
(413)	Allium sairamense Rgl.	+	+	..	+
(414)	Allium blandum Wall.	+	+	..	+
415	Allium polypyllum Kar. Kir.	+	+	..	+
416	Allium platyspathum Schrenk	+	+	..	+
417	Allium oreoprasum Schrenk	+	+	..	+
418	Allium globosum M. B.	+
(419)	Allium oreophilum C. A. M.	+	+	..	+
421	Juneus Thomsoni Fr. Buchenau
422	Scirpus pauciflorus Light.
423	Kobresia schoenoides (C. A. M.) Boeck.
	var. humilis C. A. M.
424	Kobresia Royleana Boeck.
(425)	Carex parva Nees
426	Carex microglochin Wahlenb.
427	Carex curaica Kunth.
428	Carex stenophylla Wahlb.
429	Carex Regelii C. B. Clarke
430	Carex tristis M. B.
(431)	Carex nivalis Boott.
432	Carex ustulata Wahlenb.
434	Carex rigida Good.
435	Carex caespitosa Palmstr.
436	Carex vesicaria L.?
	var. pamirica m.
(437)	Carex rostrata Stokes in With.
439	Hordeum pratense L.

	Памироалтай.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Таштаки.
	Джуяганский Алатау и Тарбагатай.
	Афганистан, Гиндукуш и Гималаи.
	Тибет.

	Памироалтай.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Таштаки.
	Джуяганский Алатау и Тарбагатай.
	Афганистан, Гиндукуш и Гималаи.
	Тибет.

№

	Памиромъл.	Тибетъ	Джуңгарскій Алатау и Тарбагатай.	Афганістанъ, Гиндукушъ и Гималаи.	Тибетъ	Китайскій Туркестанъ и Монголія.	Китай, Японія, Корея.	Сіверна Азія.	Остальна Туркестанъ.	Персія, Передній Азія и Кавказъ.	Європа (и Уралъ).	Інші
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	<i>Atropis convoluta</i> Gris.	+	+	+	+	+	+	..
	var. <i>acutiuscula</i> Hackel.
464	<i>Atropis tenuiflora</i> Gris.	+	+	+
465	<i>Arundo Phragmites</i> L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	..
(466)	<i>Avena (Trisetum) spicata</i> (L.)	..	+	+	+	+	+
467	<i>Deschampsia koelerioides</i> Rgl.	..	+	+
	typica Rgl.	..	+
	var. <i>elatior</i> Rgl.	..	+
469	<i>Calamagrostis anthoxanthoides</i> (Munro) Rgl.	+	+	+
470	<i>Calamagrostis arundinacea</i> Roth.	+	+	+	+	+
	var. <i>pamirensis</i> Hackel.
471	<i>Calamagrostis tianschanica</i> Rupr.	..	+	..	+	+
472	<i>Oryzopsis lateralis</i> Stapf	+
473	<i>Agrostis alba</i> L.	..	+	..	+	..	+
474	<i>Stipa splendens</i> Trin.	..	+	+	+	+
475	<i>Stipa mongholica</i> Turcz.	..	+
476	<i>Stipa orientalis</i> Trin.	..	+	+	+	+	+	+	+
477	<i>Stipa Lessingiana</i> Trin.	..	+	+	+
478	<i>Alopecurus mucronatus</i> Hackel (sp. n.)
480	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. d. Beauv.	+	+	..	+	+	+	+
481	<i>Andropogon Ischaemum</i> L.	..	+	..	+
(482)	<i>Cynomorium coccineum</i> L.	..	+
483	<i>Ephedra monosperma</i> C. A. M.	..	+
484	<i>Ephedra Garardiana</i> Wall.	+
485	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	..	+

350

+(72)

Всего 422, въ томъ числѣ эндемическихъ для Памира 29 или 7%.

27

+(2)

	227	229	141	195	95	98	74	167	116	133	132	112
+	(36)	(36)	(26)	(33)	(11)	(7)	(13)	(30)	(19)	(28)	(33)	(24)

Общихъ съ Памиромъ 263 265 167 228 106 105 87 197 135 161 165 136

Въ процентахъ:

Общихъ съ Памиромъ	62	63	40	54	25	25	21	47	32	38	39	32
------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Какъ видно изъ прилагаемой таблицы, наиболѣе сходна флора Памира съ флорой Тинь-шапя (63%) и Памироалая (62%), затѣмъ съ флорой Афганістана, Гиндукуша и Гималаевъ (54% общихъ видовъ);ими слѣдуютъ Съверная Азія (47%), Джунгарскій Алатау съ Тарбагатаемъ (40%), Европа (39%), Персія, Переднія Азія и Кавказъ (3%). Съ другими, кромъ перечисленныхъ горныхъ, равнинными местностями Туркестана Памиръ имѣеть 32% общихъ видовъ; во внутреннемъ Тибетѣ видовъ, общихъ съ Памиромъ, 25%, что, при бѣдности Тибетской флоры, уже представляеть замѣтную величину; въ Кинескомъ Туркестанѣ и Монголіи ихъ тоже 25%. Наименѣе сходенъ съ Памиромъ—Китай съ Японіей и Кореей (21%), что и естественно, при разницахъ въ климатѣ и влажности.

Кромъ того, значительное количество памирскихъ растеній имѣеть очень широкое распространеніе, встрѣчаясь не только въ Туркестанѣ, Средней и Съверной Азіи и Европѣ, но и въ другихъ странахъ (Америкѣ, Африкѣ, Австраліи), не выдѣленныхъ особо въ нашей таблицѣ; такихъ растеній тоже насчитывается до 32%.

Наконецъ, 29 видовъ (около 7%) до сихъ поръ найдены только въ Памире; эти **эндемические** виды отмѣчены въ таблицѣ жирнымъ шрифтомъ.

Само собою разумѣется, что данные эти имѣютъ лишь временное значение: при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ Памира число видовъ, выдѣленныхъ ему, конечно возрастетъ, хотя и не особенно значительно; некоторые изъ видовъ, которые для него теперь указываются, можетъ быть окажутся собраными въ мѣстностяхъ не памирского характера и на оборотъ, могутъ подтвердиться для собственно Памира такія указанія, достовѣрность которыхъ теперь подвергается сомнѣнию.

КАРТА ПАМИРА.



Брокгауз и Ефрон. Энцикл. словарь.

Маршрут экспедиции О.И. и Б.Л. Федченко в 1901 г.
Границы собственно Памира.

Картографическое зав. Я.М. Лапинера. В.Мастерская ул. № 7/85.

INDEX ALPHABETICUS

SPECIERUM ET SYNONYMORUM

tomi XXI.

Nomina admissa litteris crassis expressa sunt. Synonyma et passim adducta litteris ordinariis).

- Abutilon Avicennae Gaert. 221.
Acantholimon alataicum Bge. 406, 467.
" diapensioides Boiss. 406, 467.
" " v. longifolia O. Fedtsch. 407, 467.
Acanthopanax ricinifolium Seem. 222.
Acer Lobelii Ten. v. platanoides Miyabe 219.
" truncatum Bge. 220.
Achillea Millefolium L. 79, 82, 109, 116.
" trichophylla Schrenk 344, 462.
Achyrophorus aurantiacus DC. 231.
" grandiflorus Ledb. 231.
Aconitum Napellus L. 259.
" v. rotundifolium Hook 259.
" rotundifolium Kar. Kir. 259, 457.
" septentrionale Kölle, 70, 86, 107,
" 109.
" tianschanicum Rupr. 259.
Actaea spec. 70, 84.
Adenophora denticulata Fisch. 228.
" liliifolia Ledb. 228.
" v. Lamarckii Fisch. 228.
Adonis sibirica Patr. 27, 82, 86.
Adoxa Moschatellina L. 72, 86, 107, 109.
Agrimonia pilosa Ledb. 214.
Agropyrum elongatum Host. 436.
" repens P. de B. 79.
" semicostatum Nees 437, 469.
" v. subvillosum Hack. 437, 469.
" striatum Nees 437, 469.
Agrostis alba L. 116, 119, 446, 470.
Aira spicata L. 444.
Alchemilla vulgaris L. 73, 82, 109, 323.
Alisma Plantago L. 96.
Allardia glabra Decne. 356.
Allium blandum Wall. 424, 468.
" globosum MB. 425, 468.
" v. albidum Rgl. 425.
" macrostemon Bge. 208.
" odorum L. 208.
" oreophilum CAM. 426, 468.
" v. Ostrowskianum Rgl. 426.
Oreoprasum Schrenk 425, 468.
Pallasi Murr. 423, 468.
" v. stipellatum Rgl. 423, 468.
" platyspathum Schrenk 425, 468.
" v. majus Ledb. 425.
" polyphyllum Kar. Kir. 424, 468.
" v. nudicaule Rgl. 424.
" sairamense Rgl. 423, 468.
" sativum L. 423.
" Schoenoprasum L. 46, 83, 89
" 107, 109, 111, 119.
Alnaster fruticosus Led. 85, 126.
Alnus incana L. 85, 122, 126.
Alopecurus alpinus Sm. 448.
" arundinaceus Poir. 61.
" mucronatus Hack. 448, 470.
" pratensis L. 73, 81, 86, 107, 109,
" 112, 119, 449.
Alsine biflora Wahlenb. 113.
" verna Bartl. 93, 94, 95.
Althaea officinalis Aut. 298.
" nudiflora Lindl. 298, 459.

- Allyssum linifolium* Steph. 265.
Amblystegium fallax Lindb. 453.
Amethystea caerulea L. 226.
Ampelopsis aconitifolia Bge. 220.
 " *heterophylla* Thunb. v. *Bungei* Pl. 220, 494.
 " *humulifolia* Bge. 220.
 " *serianaeifolia* Bge. 220.
Anabasis glomerata MB. 412.
Andreoskia dentata Bge. 212.
Andromeda polifolia L. 75, 101, 103.
Andropogon Ischaemum L. 449, 470.
 " *Sorghum* Brot. 204.
Androsace akbaitalensis Leo Derg. 375, 465.
 " *chamaejasme* Host. 374.
 " *chamaejasme* Koch. 374, 465.
 " *dasyphylla* Bge. 374.
 " *saxifragaeifolia* Bge. 223.
 " *villosa* L. 373, 464.
 " " *v. dasypylla* Kar. Kir. 374, 464.
 " " *v. dasypylla* Duby 374.
 " " *v. typica* Trautv. 374, 464.
Anemone Albana Stev. 246.
 " *altaica* Fisch. 87.
 " *biflora* DC. 246, 256, 456.
 " *chinensis* Bge. 212.
 " *Gortschakowii* Kar. Kir. 246.
 " *Kostyczewi* Korsh. 247.
 " *narcissiflora* L. 247.
 " *nemorosa* L. 86.
 " *ranunculoides* L. 87.
 " *silvestris* L. 26, 27, 82, 86, 93, 94, 95.
Angelica silvestris L. 71, 82, 86, 107.
Antennaria alpina R. Br. 112.
 " *dioica* Gärtn. 93.
 " *Steetziana* Turcz. 229.
Anthericum serotinum L. 422.
Anthistiria vulgaris Hack. 206, var. *major*, subv. *japonica* Hackel 206.
Antirrhinum odoratum MB. 390.
Anthoxanthum odoratum L. 109.
Anthriscus silvestris Hoffm. 79, 86.
Anthyllis Vulneraria L. 82, 93.
Aplotaxis gnaphalodes Royle 360.
 " *sorocephala* Kar. Kir. 360.
Apochoris pentapetala Duby 223.
Apocynum sibiricum Pall. 224.
 " *venetum* L. 224.

- Arabis Alpina* L. 113.
 " *fruticulosa* CAM. 3.
 " *Gerardi* Bess. 82.
 " *kokanica* Rgl. et Schmalh. 262, 457.
 " *petraea* Lam. 82, 93, 94, 95.
 " *rupicola* Kryl. 3, 11.
Archangelica officinalis Hoffm. 46, 81, 107, 109, 111, 119.
Arctostaphylos alpina Spr. 22, 26, 35, 93, 95, 101, 112, 114, 121, 123.
 " *uva ursi* Spr. 65, 92.
Arenaria glaucescens H. Winkl. 293.
 " *Griffithii* Boiss. 293.
 " *holosteoides* Edgew. 293.
 " *Meyeri* Fenzl. 293, 450.
 " " *f. glabra* O. Fedtsch. 293.
Armeria sibirica Turcz. 116.
Arnebia guttata Bge. 383, 384, 465.
 " *perennis* DC. 382.
 " *saxatilis* Benth. et Hook. 383.
Artemisia argyrophylla Ledb. 350.
 " *Aschurbajewii* C. Winkl. 349, 463.
 " " " *v. ramosa* C. Winkl. 349, 463.
 " *chamaemelifolia* Vill. 348, 463.
 " *desertorum* Spreng. 347, 462.
 " *Dracunculus* L. 346, 462.
 " *eriopoda* Bge. 230.
 " *fragrans* W. 347.
 " *Griffithiana* Boiss. 349.
 " *igniaria* Maxim. 230.
 " *japonica* Thbg. 230.
 " *Kuschakewiczi* CWinkl. 348, 463.
 " *latifolia* Ledb. 93.
 " *macrocephala* Jaquem. 349, 463.
 " *maritima* L. 347, 462.
 " *pamirica* CWinkl. 346, 462.
 " " *v. Aschurbajewii* CWinkl. 347, 462.
 " *rupestris* L. 349, 463.
 " " *v. viridiflora* DC. 349, 463.
 " *sacrorum* Ledb. 348, 462.
 " " *v. minor* Ledb. 348, 462.
 " *scoparia* W. K. 230.
 " *Skorniakowi* CWinkl. 348, 463.
 " " *v. pleiocephala* CWinkl. 348, 463.
 " " *v. ramosa* CWinkl. 348, 463.
 " *Tilesii* Ledb. 112.

- Artemisia vulgaris* L. 79, 83, 112, 230.
 " sp. 346, 350, 351.
Arundo Phragmites L. 443, 470.
Asclepias paniculata Bge. 224.
Aspidium spinulosum Sw. 67, 70, 84, 107.
Aster alpinus L. 340, 343, 462.
 " " *v. pulchellus* Trautv. 343.
fastigiatus Fisch. 228.
flaccidus Bge. 341, 462.
heterochaeta Benth. 341.
holophyllus Hemsl. 228.
integrifolius Franch. 228.
Poncinsii Franchet 342.
 " *pulchellus* W. 343.
sibiricus L. 30.
Tripolium L. 118.
turkestanicus Franchet 341, 342.
 " sp. 341.
Astragalus alataicus Kar. Kir. 313, 314, 460.
 " " *v. pamirensis* B. Fedtsch. 313, 460.
Alitschuri B. Fedtsch. 317, 460.
alpinus L. 110.
brachytropis CAM. 312, 460.
Chomutovi B. Fedtsch. 317, 460.
dasyglossis Fisch. 15.
densillorus Kar. Kir. 311, 460.
djilgensis Franch. 319, 460.
hypoglossis L. 30, 82, 93, 94.
hypoglossis L. γ tschujensis Kryl. 15.
Kurrumensis Bge. 314.
Kuschakewiczi B. Fedtsch. 310, 460.
Iasiosiemius Boiss. 315, 460.
macropus Fedtsch. 317.
monophyllus (Franch.) 314.
multicaulis Ledb. 311.
Muschketovi B. Fedtsch. 318, 460.
myriophyllus Bge. 314.
nivalis Kar. Kir. 318, 460.
Onobrychis v. *alpina* Sieb. 319.
ophiocarpus Benth. 310.
oroboides Ledb. 312.
pamirensis Franch. 313, 314.
physodes L. 317, 460.
purpureus Lam. 312.
rytidocarpus Ledb. 7, 11.
taldigensis Franch. 313.
Thomsonianus Benth. 319.
- Astragalus tianschanicus* Bge. 312, 313, 460.
 " " *v. pamiricus* B. Fedtsch. 312, 460.
 " *tibetanus* Benth. 316, 460.
 " *Tulinovii* B. Fedtsch. 315, 460.
 " *verticillaris* Aitch. 314.
 " sp. 316, 319.
- Athyrium alpestre* Nyl. 110, 112.
Atragene sibirica L. 65, 67, 73, 85.
Atriplex laciniata L. 410.
 " " *v. rosea* Trautv. 409, 467.
litorale L. 119.
rosea L. 409, 467.
- Atropis convoluta* Grisb. 442, 443, 470.
 " " *v. acutiuscula* Hack. 443, 470.
 " *distans* (B. Fedtsch.) 444, 470.
distans Grisb. 442, 469.
 " " *f. pauciramea* O. Fedtsch. 442, 469.
 " " *v. convoluta* Boiss. 442.
tenuiflora Grisb. 443, 470.
- Avena airoides* Koel. 444.
sesquiflora Gray 446.
 " *sesquiflora* Krasnow 444.
 " *spicata* L. 444, 470.
 " *subspicata* Clairy. 444, 470.
- Axyris ceratoidea* L. 410.
- Bartschia alpina* L. 101, 115, 116.
Betula alba L. 419, 468.
 " *alpestris* Fries. 108, 120, 124, 125.
 " *intermedia* Thom. 106, 120, 126.
 " *nana* L. 34, 51, 75, 101, 106, 109, 111, 114, 120, 121, 124, 127.
 " *pubescens* Ehrh. 40, 49, 51, 64, 66, 69, 78, 97, 120, 122, 125.
 " *verrucosa* Ehrh. 26, 64, 66, 84, 122, 126.
- Bidens parviflora* W. 229.
Blitum polymorphum C.A.M. 409.
 " *rubrum* Rehb. 409, 467.
 " *virgatum* L. 408, 467.
- Boltonia pekinensis* Hance 228.
Bothriospermum secundum Maxim. 225.
Brassica Rapa L. 79.
Braya aenea Bge. 278.
 " " *v. multicaulis* Korsh. 278.
 " " *alpina* Stern. et Hoppe 280.

- Braya glabella* Rich. 280.
 " *oxyacarpa* Hook. et Th. 281.
 " *oxyacarpa* Korsh. 281.
 " *pamirica* O. Fedtsch. 280, 458.
 " *rosea* Bge. 278, 458.
 " " *v. albiflora* Maxim. 278, 458.
 " " *f. gracilis* O. Fedtsch. 279, 458.
 " " *v. simplicior* Korsh. 278.
 " " *f. glabra* et *pubescens*
 Korsh. 278.
 " *Scharnhorstii* Rgl. et Schmalh. 274,
 458.
Bromus crinitus Boiss. et Hoh. 439, 469.
 " *erectus* Huds. 439, 469.
 " *gracillimus* Bge. 439.
 " *inermis* Leyss. 81.
Brunella vulgaris L. 79.
Bryum leptoglyphon Philib. 452.
 " " *v. hypophila* Philib. 452.
 " *pamircomucronatum* Philib. 452.
 " *Schleicheri* Schwaeg. 452.
 " sp. 452, 453.
Bupleurum divaricatum Benth. et Hook.
 222.
 " *exaltatum* MB. 3. *multicaule*
 Ledb. 18.
 " *falcatum* L. 222.
 " " *v. linearifolium* 18.
 " " *v. scorzoneraefolium* W. 222.
 " " var. (B. Fedtsch.) 18.
 " *kokanicum* Rgl. et Schmalh. 336, 462.
 " *longeinvolutratum* Kryl. 17.
 " *Martjanovi* Kryl. 17.
 " *multinerve* DC. 17.
 " *pusillum* Kryl. 18.
 " *ránunculoides* L. 17.

Cacalia aconitifolia Bge. 230.
 " *hastata* L. 86.
Calamagrostis anthoxanthoides Rgl. 445,
 470.
 " *arundinacea* Roth. 445, 470.
 " " *v. pamirensis* Hack. 445, 470.
 " *Epigeios* Roth. 124.
 " *neglecta* Fr. 107, 116, 124.
 " *sylvatica* DC. 445.
 " *tianschanica* Rupr. 446, 470.
Calimeris altaica Nees 341.
 " *integrifolia* Turcz. 228.

- Callianthemum alatavicum* Freyn 254,
 255.
 " *rutaefolium* C.A.M. 255.
Calluna vulgaris Salish. 65, 67, 70, 84,
 107, 123.
Caltha palustris L. 71, 74, 88, 89, 96,
 103, 105, 107, 119.
Calypso borealis L. 26, 86.
Campanula glomerata L. 370.
 " *rotundifolia* L. 83.
Calystegia pellita Ledb. 225.
 " *Soldanella* RBr. 225.
Capsella Bursa pastoris Mönch. 79.
Capsella draboides Korsh. 282, 283, 458.
 " " " *v. typica* O. Fedtsch. 282.
 " " " *v. sagittata* Korsh. 282
 458.
 " *procumbens* Fries 282, 458.
 " *Thomsonii* Hook. 283, 285, 458.
Caragana frutescens DC. 216.
 " *jubata* Poir. 302.
Cardamine pratensis L. 75, 83, 88, 89,
 105, 109.
Carduus segetum Franchet 230.
Carex acuta L. 88, 89.
 " *ampullacea* Good. 74, 88, 105, 433.
 " *aquatilis* Wahlenb. 32, 74, 88, 89,
 105, 119, 124.
 " *caespitosa* L. 3... 432.
 " *caespitosa* Palmstr. 432, 468.
 " *caespitosa* L. 74, 88, 89.
 " *canescens* L. 88, 107, 119, 120,
 122, 123, 124, 128.
 " *chordorrhiza* Ehrh. 74.
 " *curaica* Knth. 429, 432.
 " *desertorum* Litw. 429.
 " *digitata* L. 68, 73, 86.
 " *dioica* L. 74.
 " *ericetorum* Poll. 82, 93.
 " *globularis* L. 74, 120.
 " *incurva* 3. Light. 429.
 " *lagopina* Wahlenb. 110.
 " *limosa* L. 74.
 " *melanantha* C.A.M. 430.
 " *melanantha* Kar. Kir. 430.
 " *melanantha* var. *baicalensis*
 Turcz. 430.
 " *macrorhyncha* Kar. Kir. 428.
 " *microglochin* Wahlenb. 428, 468.

- Carex Moorcroftii* Boott 430.
 " *neurocarpa* Maxim. 207.
 " *nigra* v. *orientalis* Rgl. 430.
 " *nitida* Host 431.
 " *nivalis* Boott 431, 468.
 " *norvegica* Willd. 107, 119.
 " *ornithopoda* Willd. 93.
 " *paniculata* Rgl. et Herd. 428.
 " *parva* Nees 428, 468.
 " *pauciflora* L. 74.
 " *pediformis* C. A. Mey. 93.
 " *rariflora* Smith. 103.
 " *Regelii* CBClarke 430, 468.
 " *rigida* Good. 113, 115, 431, 432, 468.
 " *rostrata* Stokes 433, 458.
 " *rotundata* Wahlenb. 103.
 " *salina* Wahlenb. 119.
 " *saxatilis* Wahlenb. 431.
 " *stenophylla* Wahlenb. 429, 468.
 " *stricta* Good. 88.
 " *teretiuscula* Good. 74.
 " *tristis* MB. 430, 468.
 " *turkestanica* Rgl. 431.
 " *ustulata* Wahlenb. 431, 468.
 " *vaginata* Tausch. 71.
 " *vesicaria* L. 74, 88, 432, 468.
 " " *v. pamirica* O. Fedtsch. 432,
 468.
 " " *vulpina* L. 74, 88.
 " " sp. 433.
Carthamus lanatus L. 362.
Carum sp. 336.
Cassandra calyculata Don. 24, 75, 78,
 101.
Cassia mimosoides L. 215.
Cassiope hypnoides Don. 112, 115.
Castanea sativa Mill. 209.
Castilleja pallida Kunth. 95, 110.
Catalpa *Kaempferi* S. et Z. 227.
Catabrosa altaica Boiss. 442.
Celastrus orbiculatus Thunb. 219.
Cenolophium Fischeri Koch. 87, 119.
Centaura grandiflora Pall. 230.
 " *monanthos* Georgi 230.
 " *Scabiosa* L. 82.
 " *squarrosa* W. 362, 463.
 " *virgata* Lam. v. *squarrosa* Boiss.
 362.
Cephalaria Syriaca Schrad. 339, 462.
- Cerastium alpinum* L. 94, 116, 296, 459.
 " *arvense* L. 297.
 " *glomeratum* Thuill. 83.
 " *schizopetalum* H. Winkl. 295.
 " *trigynum* Vill. 295, 459.
 " " *v. glandulosum* Ledb. 296, 459.
 " *triviale* Lk. 83, 107.
 " *vulgatum* L. 207, 459.
 " sp. 296.
Ceratophyllum demersum L. 331, 461.
Cetraria islandica Ach. 77.
Chaerophyllum Prescotti DC. 46, 81.
Chamaerhodos sabulosa Bge. 324, 461.
Chamaesciadium albiflorum Kar. Kir. 336,
 462.
Chartocalyx Olgae Rgl. 406.
Chenolea divaricata Hook. 411.
Chenopodium salsa Moq. 211.
Chenopodium album L. 211.
 " *Blitum* Hook. 408.
 " *glaucum* L. 79.
 " *maritimum* L. 412.
 " *rubrum* L. 409.
 " *vulvaria* L. 408, 467.
Chloris caudata Trin. 206.
Chondrilla sp. 368.
Chorispora Bungeana F. & M. 269.
 " *escapa* Bge. 269, 458.
 " *macropoda* Trautv. 270, 458.
 " " *v. glabra* Trautv. 270.
 " " *sabulosa* Camb. 271, 458.
 " " *sibirica* DC. 270, 458.
 " " " *v. songarica* (O.F.) 270, 271,
 458.
 " " *songarica* Schrenk 270.
 " " sp. 271.
Christolea crassifolia Camb. 269, 276, 458.
 " " *v. pamirica* Korsh. 277.
 " " *v. pamirica* Korsh. 277, 458.
Chroococcus turgidus Nüg. 454.
Chrysanthemum djilicense Franchet 345.
 " *Indicum* L. 229.
 " *Richteria* Benth. 344.
 " *sinense* Sabine 229.
Chrysosplenium alternifolium L. 25, 71,
 84, 107, 109, 111.
Cicer songoricum Steph. 319, 460.
Cicuta virosa L. 96.
Cirsium arvense Scop. 79, 363, 464.

- Cirsium arvense* v. *Incana* Ledb. 363, 464.
" *heterophyllum* All. 67, 70, 72, 82,
86, 107, 109, 124.
" *segetum* Bge 230.
Cladonia rangiferina Hoffm. 77, 101.
Clematis angustifolia Jacq. 212.
" *orientalis* L. 244, 456.
" " *v. acutifolia* Hook. et Th. 244.
" " *v. tangutica* Maxim. 243.
" *recta* L. 212.
" " *v. mandshurica* Maxim. 212.
" *tangutica* Korsh. 243, 456.
Cnicus arvensis Hoffm. 363.
" *japonicus* Maxim. 230.
" *segetum* Maxim. 230.
Cochlearia officinalis L. 110, 111.
" *spathulata* Schlecht. 269.
Codonopsis ovata Benth. 370.
Colchicum Alberti Rgl. 426.
Colpodium altaicum Trin. 442, 470.
Comarum palustre L. 71, 74, 83, 88, 89,
103, 105, 107.
" *Salesovii* Bge 329, 461.
Commelinia communis L. 208.
Convolvulus arvensis L. v. *sagittaefolius*
Fisch. 224.
Conyza andryalooides DC. 342.
Conioselinum cenolophioides Turcz. 95.
" *Fischeri* W. et Gr. 79, 110, 111.
Coriandrum sativum L. 339.
Corispermum hyssopifolium L. 411, 467.
" " *v. pamiricum* O. Fed. 411, 467.
Cornus suecica L. 22, 28, 109, 112, 116,
120, 124.
Cortusa Matthioli L. 87, 375, 465.
" " *v. glabrata* Borbas 375, 465.
Corydalis capnoides Pers 262, 457.
" " *v. tenella* Fedtsch. 262.
" *Gortschakowi* Schrenk 261, 457.
" *Gortschakowi* Hook. 261.
Lebedouriana Kar. Kir. 261.
" *solida* Sm. 23.
" *stricta* Steph. 261, 262, 457.
" *thyrsiflora* Prain 261.
Corylus mandshurica Maxim. 209.
" *rostrata* Ait. var. *mandshurica*
Rgl. 209.
Cotoneaster vulgaris Lindl. 85, 93.
Cotyledon leucantha Ledb. 213, 332.

- Cotyledon spinosa* L. 213.
" *spinosa* Clarke (non L.) 213.
" *thyrsiflora* Maxim. 213.
Cousinia arachnoidea F. et M. 361.
" *aurea* CWinkl. 361, 463.
" *auriculata* Boiss. 361.
" *decurrans* Rgl. 361.
" *hastifolia* CWinkl. 361.
" *microcarpa* Boiss. 361.
" *rava* CWinkl. 360, 463.
" *semidecurrans* CWinkl. 362, 463.
" *speciosa* CWinkl. 361.
" *submutica* Franch. 360, 463.
" sp. 362.
Craniospermum canescens DC. 10, 11.
" *subfloccosum* Kryl. 10, 11.
" *subvillosum* Lehm. 10.
Crataegus pinnatifida Bge. 215.
Crepis paludosa Mönch. 71, 84, 107.
" *sibirica* L. 70, 86.
" *tectorum* L. 79.
" *tenuifolia* W. 368.
Crossostephium turkestanicum Rgl. et
Schmalh. 351.
Cuscuta pedicellata Ledb. 382, 465.
" *planiflora* Ten. 382, 465.
" " *v. approximata* Eng. 382, 465.
Cynanchum amplexicaule Hemsl. 224.
" *chinense* RBr. 224.
" *mandshuricum* Hemsl. 224.
" *sibiricum* RBr. 224.
Cynoglossum macrostylum Bgg. 289.
Cynomorium coccineum L. 449, 470.
Cyperus Iria L. 208.
Cypripedium Calceolus L. 72, 86, 93.
Cystopteris fragilis Bernh. 451, 470.
Dactylis glomerata L. 81.
Daphne Mezereum L. 61, 70, 73, 84.
Datura Stramonium L. 226.
Daucus Carota L. 338, 462.
Delphinium Brunonianum Royle 258, 259,
457.
" " *v. Jacquemontianum* Huth. 258.
" *cashmirianum* Royle 258.
" " *v. Jacquemontianum* (Camb.)
258.
" *cashmirianum* Ostenf. 258.
" *caucasicum* v. *bracteosum* Schr.
256.

- Delphinium dasyanthum* Kar. Kir. 256,
257, 258, 337, 457.
" " *v. undulatum* Huth 257.
" " *elatum* L. 70, 86, 107.
" *Jacquemontianum* (Camb.) Huth
258, 259.
" *speciosum* MB. 257, 258.
" " *v. bracteosum* Schrenk
256.
" " *v. dasyantha* f. *Tagarkaktensis*
Korsh. 256.
" *speciosum* f. *Tagarkaktensis*
Korsh. 257.
" *speciosum* Ostenf. 256.
Deschampsia alpina R. et S. 102, 107,
113, 115.
" *caespitosa* P. deB. 81, 86.
" *flexuosa* Trin. 65, 68, 71, 73, 84,
107, 120, 124, 128.
" *koeleriodes* Rgl. 444, 470.
" " *v. typica* Rgl. 444, 470.
" " *v. elatior* Rgl. 445, 470.
" sp. 445.
Desmatodon cernuus (Hüb.) Br. eur. 452.
Deutzia grandiflora Bge. 213.
Deyeuxia anthoxanthoides Munro 445.
" *compacta* Munro 466.
" *sylvatica* Kunth 445.
Dianthus chinensis L. 211.
" " *α. asper* Rohrb. 211.
" " *β. sylvaticus* Rohrb. 211.
" *superbus* L. 82, 109, 116, 211.
Diapensia lapponica L. 112, 115.
Diarthron vesiculosum F. et M. 222.
Didymophysa Fedtschenkoana Rgl.
et Schmalh. 277, 458.
Digitaria commutata Schult. 206.
Dilophia kaschgarica Rupr. 286.
" *salsa* Thoms. 286.
Dimelaena oreina Norm. 453.
Diplachne serotina Link.
" " *v. chinensis* Maxim. 207.
" *sinensis* Hance 207.
Diplopappus turkestanicus Rgl. et
Schmalh. 341, 343.
Distichium capillaceum Br. eur. 451.
Dodartia orientalis L. 391.
Dolichos sinensis 204.
specierum et synonymorum XXI
479

- Dontostemon dentatus* Ledb. 212.
Draba alpina L. 94, 265, 457.
" " *v. Korshinskii* O. Fedtsch. 266,
457.
" " *v. pamirica* O. Fedtsch. 266,
457.
" *altaica* Bge 267, 457.
" *fladnitzensis* Wulf. 267.
" " *v. homotricha* Hook. 267.
" *grandis* DC. 268.
" *hirta* L. 94, 110, 112, 113.
" *hyperborea* Desv. 268, 269, 458.
" *incana* L. 94, 267, 457.
" " *v. contorta* Lindl. 267.
" " *v. multicaulis* Rgl. 268, 457.
" *lasiophylla* Royle 268, 457.
" *media* Litw. 268, 457.
" *nemorosa* L. var. *leiocarpa* Lindl.
94, 95.
" *physocarpa* Komar. 266.
" *Tranzschelii* Litw. 267, 457.
" *Wahlenbergii* Hartm. 265.
Dracocephalum discolor Bge. 401, 466.
" *discolor* Rgl. 401.
" *heterophyllum* Benth. 363, 402,
466.
" *kokanicum* B. Fedtsch. 400.
" *nodulosum* Rupr. 403.
" *organoides* Ledb. 401, 466.
" *organoides* Steph. 401.
" *palmatum* Steph. 400, 466.
" *pinnatum* L. v. *pallidiflorum* Kar.
et Kir. 401.
" *stamineum* Kar. Kir. 401, 466.
Drosera rotundifolia L. 75, 76, 78.
Dryadanthe Bungeana Ledb. 323.
Dryas octopetala L. 26, 92, 94, 95, 112,
115.
Dupontia Fischeri R. Br. 119.
Echinopsilon divaricatus Kar. Kir. 411.
Echinospermum amisanthum Forb.
et Hemsl. 225.
" *barbatum* Lehm. 386, 465.
" *deflexum* Lam. 386.
" *Lappula* L. 225.
" *microcarpum* Ledb. 387, 465.
" *omphaloides* Schrenk 387, 465.
" " *f. coeruleum* O. Fedtsch. 387.

- Echinospicum strictum* Ledb. 387, 465.
" sp. 387, 388.
Echinops dauricus Fisch. 230.
" Gmelini Ledb. 230.
Eclipta alba Hassk. 229.
" erecta L. 229.
" terminalis Bge. 229.
Elymus angustus Trin. 436, 469.
" arenarius L. 115.
" dasystachys Trin. 435, 469.
" " v. glabrior Rgl. 435, 469.
" " v. pamirica B. Fedtsch. 435,
469.
" " v. pubescens O. Fedtsch. 435,
469.
" lanatus Korsh. 434, 460.
" mollis Trin. 435, 469.
" sibiricus L. 434, 469.
Elyna kokanica Rgl. 428.
" schoenoides CAM. 427.
" stenocarpa Meinh. 428.
Empetrum nigrum L. 24, 46, 65, 67, 70,
75, 84, 101, 106, 112, 114, 116.
Encalypta rhabdocarpa Schwaegr. 452.
Ephedra distachya L. 460.
" dubia Rbl. 450.
" Gerardiana Wall. 450, 470.
" monosperma CAM. 450, 470.
" " v. disperma Rgl. 450.
Epilobium angustifolium L. 67, 71, 72,
84, 107, 109, 123.
" davuricum Fisch. 107.
Epipactis latifolia All. 96.
Equisetum arvense L. 46, 79, 83, 107,
109, 115.
" Heleocharis Ehrh. 74, 89, 95, 103,
119.
" palustre L. 74.
" pratense Ehrh. 46, 83.
" ramosissimum Desf. 205.
" silvicum L. 67, 71, 84, 107, 109,
120.
Eragrostis ferruginea Beauv. 207.
" orientalis Trin. 207.
Eremostachys laciniata Bge. 405, 467.
" speciosa Rupr. 405.
Erigeron acer L. v. elongata Led. 343.
" alpinus L. 110.
" andryaloides Hook. 342, 462.

- Erigeron andryaloides* Benth. 342, 462.
" canadensis L. 229.
" Olgae Rgl. et Schmalh. 342.
" " v. pamirica C. Winkl. 342.
" pulchellus DC. 343, 462.
" turkestanicus O. Fedtsch. 341, 462.
" uniflorus L. 343, 462.
Eriophorum alpinum L. 74.
" angustifolium Roth. 88, 103, 105.
" gracile Koch 74.
" latifolium Hoppe 88.
" russeolum Fries 103.
" Scheuchzeri Hoppe 103, 107.
" vaginatum L. 24, 49, 63, 70, 71, 74,
78, 102, 103, 122, 128.
Eritrichium dubium O. Fedtsch. 385, 465.
" pamiricum B. Fedtsch. 385, 386, 465.
" rupestre Bge. 385, 465.
" sp. 386.
Erodium oxyrrhynchum M.B. 300.
" Stephanianum W. 218.
" tibetanum Edgew. 300, 460.
" " v. pamiricum O. Fedtsch. 300.
Eryngium macrocalyx Schrenk 336, 462.
Erysimum altaicum CAM. 275, 276, 458.
" Cheiranthus Pers. 275.
" cheiranthoides L. 82.
" hieracifolium L. 82, 93.
" lanceolatum RBr. 275.
" pamiricum Korsh. 280.
" pumilum Gaud. 275.
" quadricorne Steph. 278.
" sisymbrioides CAM. 274, 458.
" sp. 275, 276.
Euonymus alata Sieb. 219.
" Thunbergiana Thunb. 219.
Euphorbia pekinensis Rupr. 219.
Euphrasia officinalis 109.
" Regellii Wettst. 392.
" sp. 392.
Eurotia ceratoides CAM. 410, 467.
Eutrema Przewalskii Maxim. 281, 458.
Fagopyrum emarginatum Meisn. 210,
495.
Festuca elatior L. 81.
" bellula Rgl. 282, 283, 439, 469.
" duriuscula L. 438.
" kaschmiriana Stapf 438.

- Festuca ovina* L. 65, 82, 93, 102, 109, 113,
114, 115, 116, 438, 469.
" v. pubescens Hack. 437, 469.
" " v. valesiaca Hack. 437, 469.
" rubra L. 81, 119, 438, 469.
" " v. barbata Hack. 438, 469.
" " v. violacea Schleich. 438, 469.
" " v. kashmirensis Hack. 438,
469.
Ficaria glacialis Fisch. 254.
Fillipendula Ulmaria Maxim. 71, 72, 75,
83, 86, 88.
Fragaria vesca L. 72, 86.
Fumaria capnoides L. 262.
Gagea bulbifera Schult. 422, 468.
" persica Boiss. v. ebulbillosa Boiss.
422.
" reticulata Schult. 422, 468.
" stipitata Merckl. 422, 468.
Galeopsis Tetrahit L. 79.
Galium boreale L. 82, 93.
" palustre L. 83, 88.
" uliginosum L. 83, 88, 105, 107.
" verum L. 228, 339, 462.
Gaya sp. 337.
Gentiana aquatica L. 379.
" barbata Fröl. 377, 465.
" detonsa Rottb. 377, 465.
" falcata Turcz. 376, 465.
" Kaufmanniana Rgl. 379, 465.
" leucomelaena Maxim. 367, 378, 465.
" Olgae Rgl. et Schmalh. 380, 465.
" prostrata Haenke 307, 378, 465.
" " v. Karelina Kusnez. 379.
" pygmaea Rgl. et Schmalh. 377, 465.
" Regeli Kusnez. v. glomerata 379.
" tenella Rothb. 95, 119.
" tianschanica Rupr. 379, 465.
" " v. glomerata Kusnez. 379.
" " v. intermedia Kusnez. 379.
" umbellata MB. 377, 465.
Geranium collinum MB. 299.
" collinum Steph. 299, 459.
" " v. alpinum Rgl. 299, 459.
" " v. eglandulosum Ledb. 299, 459.
" pratense L. 79.
" siloticum L. 33, 67, 71, 72, 82,
86, 107, 109, 124.
- Geranium tuberaria* Camb. 299, 459.
Gerbera Anandria Sch. Bip. 231.
Geum rivale L. 71, 73, 75, 83, 86, 88, 107,
109, 124.
Glaux maritima L. 177, 375, 465.
Glossocomia clematidea Schrenk 370.
Glyceria distans Wahlbg. 442.
" v. convoluta Hook. 443.
Glycine tomentosa Benth. 218.
Gnaphalium Leontopodium Scop. 355.
" " v. sibiricum Franchet 355.
" norvegicum Gunn. 109.
" supinum L. 112.
Goldbachia laevigata DC. 287, 459.
" tetragona Ledb. 287.
" torulosa DC. 287.
Gomphosphaeria aponina Kütz. 454.
Gouffea holosteoides CAM. 292.
Gueldenstediella multiflora Bge. 216.
" pauciflora Fisch. 216.
Gymnadenia conopea R. Br. 72, 93.
Gypsophila fastigiata L. 289.
" " v. cephalotes Schrenk 289.
" " v. Gmelini Bge. 288.
" " v. caespitosa Turcz. 288.
" " Oldhamiana Miq. 211.
" " planifolia H. Winkl. 289.
" " pseudoverticillata Komar. 289.
" " uralensis Less. 93.
Halogeton glomeratus CAM. 412, 467.
Haplaxis sorocephala Schrenk 360.
Hedysarum elongatum Fisch. 28, 37.
" cephalotes Franchet 322, 461.
" " v. clatius B. Fedtsch. 322.
" " subsp. pamiricum B. Fedtsch.
322, 461.
" " subsp. schugnanicum B. Fed.
322, 461.
" microphyllum Franch. 322.
" obscurum L. 94.
" polymorphum v. pumilum Ledb.
321.
" Poncinsii Franch. 322.
" pumilum B. Fedtsch. 321, 461.
Heleocharis palustris R. Br. 95.
" uniglumis L. 89, 95.
Helianthemum oelandicum Wahlenb.
27, 93.

- Hemerocallis graminea* Andr. 208.
" minor Mill. 208.
Heracleum sibiricum L. 81, 117.
" *Thomsoni* C. B. Clarke. 338.
Heterocaryum minimum B. Fedtsch. 389.
Hibiscus ternatus Cav. 221.
" *Trionum* L. 221.
Hieracium alpinum L. 113, 114, 115.
" *boreale* Fr. 67.
" *caesium* Fr. 93.
" *muronum* L. 82.
" *praealtum* Vill. 93.
" *vulgatum* Fr. 65, 67, 82, 86, 109, 112.
Hierochloë borealis R. S. 81, 86, 107, 109.
Hippuris maritima Hell. 119.
" *vulgaris* L. 89, 95, 103, 105, 119,
330, 461.
" " *f. minima* B. Fedtsch. 331,
461.
Hordeum pratense L. 433, 468.
" *secalinum* Schreb. 433.
" *secalinum* Trin. 433.
" *violaceum* Boiss. et Hoh. 433.
Hutchinsia annua Rupr. 228.
" *calycina* Desv. 283.
" " *a. typica* Rgl. & Herd. 283.
" " *r. pectinata* Rgl. & Herd.
283.
" *flavissima* Ledb. 285.
" *pectinata* Bge. 283.
" *tibetica* Thoms. 283.
Hymenolaena Lindleyana Klotzsch. 338,
462.
Hyoscyamus pusillus L. 389, 466.
Hypericum Ascyron L. 221.
" *attenuatum* Choisy 221.
" *perforatum* L. 299.
Hypochaeris grandiflora Ledb. 231.
Imperata sacchariflora Maxim. 205.
Incarvillea sinensis Lam. 227.
Indigofera Kirilowii Maxim. 216.
" *macrostachya* Vent. 216.
Inula britanica L.:
" " *v. chinensis* Rgl. 229.
" " *v. linearifolia* Rgl. 229.
" *chinensis* Rupr. 229.
" *rhizocephala* Schrenk 334, 462.
" *salicina* L. 229.

- Iris caespítosa* Pall. 421.
" *ensata* Thunb. v. *communis* Maxim. 208.
" *ruthenica* Dryand. 421, 468.
" " *v. uniflora* (Pall.) 421, 468.
" *uniflora* Pall. 421.
" *uniflora* auct. 421.
Isopyrum anemonoides Kar. Kir. 256, 457.
" " *v. brevistylum* Körsh. 256,
457.
" *grandiflorum* Fisch. 256, 457.
" *thalictroides* Hook. 256.
Ixeris versicolor DC. 231.
Ixophorus viridis Nash. 206.
Juncus arcticus Willd. 110.
" *castaneus* Sm. 110.
" *effusus* L. var. *decipiens* Fr. Buch.
208.
" *filiformis* L. 103.
" *Gerardi* Lois 119.
" *leucomelas* Royle 426.
" *Thomsoni* Fr. Buch. 426, 468.
" *trifidus* L. 102, 113, 115, 116.
Juniperus communis L. 65, 67, 70, 84,
106, 120, 125, 127.
" " *f. nana* Willd. 112.
Jurinea depressa CAM. 364, 464.
Kalopanax ricinifolius Miq. 222.
Kentrophyllum lanatum DC. 362, 464.
Kobresia paniculata Meinh. 428.
" *Royleana* Boeck. 428, 468.
" *schoenoides* Boeck. 427, 468.
" " *v. humilis* CAM. 428,
468.
Kochia prostrata Schrad. 411, 467.
Koeleria cristata Pers. 207, 467.
Lactuca amurensis Rgl. 231.
" *brevirostris* Champ. 231.
" *denticulata* Maxim. 231.
" " *v. sonchifolia* Maxim. 231.
" *squarrosa* Miq. 231.
" *tatarica* CAM. 369.
" *versicolor* Sch.-Bip. 231.
Lagochilus diacanthophyllus Benth.
404, 467.
Lagoséris bifida Boiss. 368.
Lagotis decumbens Rupr. 396.

- Lagotis decumbens* subsp. *australis*
Maxim. 396.
" *glaucia* Gaert. 396.
Lamium album L. 79.
" *rhomboideum* Benth. 404, 467.
" sp. 404.
Larix sibirica Ledb. 49, 66, 84, 126,
127.
Laserpitium simplex L. 337.
Lasiagrostis mongholica Trin. 447.
" *splendens* Kunth. 447.
" *subsessiliflora* Rupr. 447.
Lathyrus maritimus Bigel. 117, 218.
" *pratensis* L. 67, 72, 82, 86.
" *tuberous* L. 321, 461.
Ledum palustre L. 65, 67, 70, 75, 84,
101, 107, 113, 114.
Leontodon autumnale L. 79.
Leontopodium alpinum Cass. 355, 463.
" " *v. sibiricum* Franchet 355,
463.
" " *v. subalpinum* Ledb. 355,
463.
" *sibiricum* Cass. v. *depauperatum*
Turcz. 229.
Leonurus sibiricus L. 226.
Lepidium calycinum Steph. 283.
" *cordatum* W. 286, 459.
" *incisum* Roth. 285.
" *latifolium* L. 285, 459.
" " *v. pubescens* Ledb. 285, 459.
" *micranthum* Ledb. 285.
" *procumbens* L. 282.
" *ruderale* L. 212, 285, 458.
" " *v. micranthum* 285.
Lepyrodielis holosteoides Fenzl 292, 293.
Lespedeza bicolor Turcz. 216.
" *floribunda* Bge. 217.
" *junccea* Pers. v. *sericea* Miq. 217.
" *medicagineoides* Bge 217.
" *stipulacea* Maxim. 217.
" *striata* Hook. 217.
" *trichocarpa* Pers. 217.
" *villosa* Pers. 217.
Leucanthemum sibiricum DC. 27, 28, 93,
94, 95.
" *vulgare* Lam. 79, 82.
Leucostemma latifolium Benth. 4.
" *Webbianum* Benth. 4.
- Libanotis condensata* Fisch. 337, 338, 462.
" " *v. gymnocarpa* B. Fedtsch. 337,
462.
Ligularia altaica DC. 355, 356, 463.
" *sibirica* Cass. 74, 103, 107.
Ligusticum scoticum L. 117.
" *simplex* All. 337.
Linaria linifolia Bge. 227.
" *macroura* MB. 390.
" *odora* Chav. 390, 466.
" *quadrifolia* Hance 227.
" *vulgaris* Mill. 227.
Linnaea borealis L. 67, 70, 124.
Linum davuricum Miq. 218.
" *perenne* L. 297, 459.
" *stelleroides* Planch. 218.
Lithospermum dispermum L. 389.
" *officinale* L. 225.
Lloydia serotina Rehb. 422, 468.
Loiseleuria procumbens Desv. 101,
112, 114, 115, 123.
Lolium temulentum L. 437, 469.
Lonicera chinensis Wats. 223.
" *coerulea* L. 67, 70, 72, 85, 125, 127.
" *flexuosa* Thunb. 228.
" *hispida* Pall. 370.
" *japonica* Thunb. 228.
Lophanthus chinensis Walp. 226.
" *rugosus* F. et M. 226.
Luzula arcuata Wahlenb. 115.
" *campestris* DC. v. *multiflora*
Celak. 110.
" *confusa* Lindeb. v. *latifolia* Buche-
nau 112.
" *pallescens* Wahlenb. 93.
" *parviflora* Desv. v. *fastigiata*
Buchenau 107, 110.
" *pilosa* Willd. 65, 67, 73, 84.
" *spadicea* DC. 102.
" " *v. Wahlenbergii* Buche-
nau 110, 113, 115.
Lychnis apetala L. 292.
" " *v. himalayensis* Rohrb. 292.
" *Flos cuculli* L. 83.
" *himalayensis* Edgew. 292.
" *tristis* Bge. 292.
Licium chinense Mill. 226.
Lycopodium alpinum L. 115, 120.
" *annotinum* L. 68, 70, 107.

- Lycopodium complanatum* L. 65.
" *Selago* L. 113, 115.
Lysimachia barystachys Bge. 223.
" *davurica* Ledb. 223.
" *dubia* Ait. 376, 465.
" *linearifolia* Hook. et Arn. 223.
" *pentapetala* Bge. 223.
" *thyrsiflora* L. 96.
Lythrum Salicaria L. 222.
" *virgatum* Forb. et Hemsl. 222.
" *virgatum* L. 222.
- Macrotomia onosmoldes* Rgl. et Smirn. 382.
" *perennis* Boiss. 382, 465.
Majanthemum bifolium Schmidt 65, 67,
71, 73, 84.
- Malcolmia nana* Boiss. 273.
- Malva mauritiana* L. 298, 459.
" *sylvestris* L. v. *mauritiana* Boiss.,
Hook. 298.
- Matricaria inodora* L. 79.
- Mazus stachydifolius* Maxim. 226.
- Medicago lupulina* L. 301, 460.
- Melampyrum pratense* L. 67, 71, 73,
84, 107, 124.
" *silvaticum* L. 67, 73, 84.
- Melandryum apetalum* Fenzl 291, 459.
" *longicarpophorum* Komar. 291, 459.
" *triste* Fenzl 292, 459.
- Melica nutans* L. 68, 73, 84.
- Melilotus alba* L. 215.
" *dentatus* Pers. 216.
- Meniococcus linifolius* DC. 265, 456.
- Mentha sylvestris* L. 397.
- Menyanthes trifoliata* L. 71, 74, 88, 96,
103, 105.
- Mespilus pinnatifida* C. Koch 215.
- Metaplexis Stauntoni* R. et Sch. 224.
- Milium effusum* L. 68, 73, 84.
" *laterale* Rgl. 446.
- Misanthus saccharifer* Benth. 205.
" *sacchariflorus* Hackel 205.
- Mohringia lateriflora* Fenzl 83.
- Molinia serotina* Maxim. 207.
- Moluccella diacanthophylla* Pall. 404.
- Mulgedium tataricum* DC. 369, 464.
" " *v. pumilum* B. Fedtsch. 369,
464.
- Myosotis alpestris* Schm. 384.

- Myosotis barbata* MB. 386.
" *palustris* Rth. 83, 86, 107, 109.
" *sylvatica* Hoffm. 94, 107, 109, 112,
384, 465.
- Myricaria alopecuroides* Schr. 332.
" *davurica* Ehrbg. 332.
" *Germanica* Desv. 331, 462.
" " *v. alopecuroides* (Schrenk)
332, 462.
" " *v. squamosa* Maxim. 332,
462.
- Myriophyllum spicatum* L. 96, 330, 461.
" sp. 330.
- Nardosmia frigida* Hook. 107.
" *laevigata* DC. 89.
- Nasturtium palustre* DC. 96, 212.
- Nephrodium euspinulosum* Diels 205.
" *spinulosum* Desv. 205.
- Neogaya simplex* Melsn. 257, 337, 462.
- Nepeta cephalotes* Boiss. 399.
" *Daenensis* Benth. 400, 466.
" *kokanica* Rgl. 399, 466.
" *longibracteata* Benth. 400, 466.
" *oxicola* Franch. 399, 466.
" *pamirensis* Franch. 398, 399, 466.
" *podostachya* Benth. 398.
" *spathulifera* Benth. 400, 466.
" *supina* Duthie 400.
" *supina* Stev. 399.
- Nitraria Schoberi* L. 301, 460.
- Nostoc Zetterstedtii* Aresch. 454.
- Oedogonium* sp. 455.
- Onobrychis pulchella* Schrenk 323.
- Ophelia chinensis* Bge. 224.
" *diluta* Ledb. 224.
- Orchis incarnata* L. 74, 88.
" *maculata* L. 74, 82, 88, 120.
" *orientalis* Kluge. v. *turkestanica*
Kluge 421.
" *Russowii* Kluge. 74, 88.
" *turkestanica* Kluge 421, 468, 495.
- Ornithogalum bulbiferum* L. f. 422.
" *reticulatum* Pall. 422.
- Orobanche amoena* CAM. 396.
- Orobus vernus* L. 67, 71, 72, 84.
- Oryza sativa* 204.

- Oryzopsis lateralis* Stapf 446, 470.
Ostostegia Olgae Korsh. 406, 467.
- Oxalis Acetosella* L. 68, 84.
" *fontana* Bge. 218.
" *stricta* L. 218.
- Oxyccocos palustris* Pers. 46, 75, 103.
- Oxygraphis glacialis* Bge. 254, 457.
- Oxyria digyna* Camp. 414.
" *digyna* Hill. 414, 467
" *reniformis* Hook. 113, 414.
- Oxytropis aciphylla* Ledb.
" *β. gracilis* Kryl. 15.
" *bella* B. Fedtsch. 303, 460.
" *cachemiriana* Camb. 307, 460.
" *chiliophylla* Royle 309, 460.
" *β. albida* B. Fedtsch. 309, 310,
460.
" *confusa* Bge. 7.
" *filiformis* DC. 5.
" *glabra* DC. 306, 460.
" " *v. humilis* Rgl. 306.
" " *v. pamirica* B. Fedtsch. 306,
460.
" *hirta* Bge. 216.
" *humifusa* Kar. Klr. 5, 305, 460.
" *Ladyginii* Kryl. 5, 11.
" *leucocyanea* Bge. 304, 460.
" *Martjanovi* Kryl. 6, 11.
" " *f. humilis* Kryl. 7.
" " *f. longifolia* Kryl. 7.
" " *f. longiscapa* Kryl. 7.
" *microphylla* DC. 310.
" *pagobia* Bge. 5, 304, 460.
" *platonychia* Bge. 307, 460.
" *Poncinsii* Franchet 308, 310, 460.
" *Saposhnikovi* Kryl. 4, 11.
" *songorica* Pall. 7.
" *sordida* DC. 94, 109, 112, 113, 115.
" *tatarica* Camb. 303, 304.
" *tibetica* Bge. 310.
" sp. 310.
- Paeonia anomala* L. 27, 72, 86.
- Panax ricinifolium* S. et Z. 222.
- Panicum commutatum* Nees 206.
" *Crus Galii* L. 206.
- " *frumentaceum* 204.
- " *miliaceum* L. 204.
- " *viride* L. 206, 449.
- Papaver alpinum* L. 260, 457.
" " *v. croceum* Ledb. 260, 457.
" " *f. parviflora* O. Fedtsch. 260.
" *nudicaule* L. 260.
" " *v. aurantiaca* Korsh. 260.
" " *v. rubroaurantiaca* Fisch. 260.
- Paracaryum heliocarpum* A. Kern. 389,
465.
- Paris quadrifolia* L. 67, 71, 72, 84.
- Parnassia Laxmanni* Pall. 298, 459.
" *ovata* Ledb. 288.
" *palustris* L. 83, 89, 107, 109.
- Parrya eriocalyx* Rgl. et Schmalh. 263, 264,
456.
- " " *f. media* Korsh. 264.
- " *exscapa* CAM. 264, 456.
- " *flabellata* Rgl. 263, 456.
- " *macrocarpa* RBr. 262.
- " *nudicaulis* Boiss. 262, 456.
" " *v. aspera* Rgl. 262, 456.
" " *v. turkestanica* Korsh. 263,
456.
- Paspalum sanguinale* Lam. var. 2. *com-*
mutatum Hook. f. 206.
- Passerina vesiculosa* F. et M. 222.
- Pastinaca sativa* L. 337.
- Pediastrum ellipticum* Ralfs 455.
- Pedicularis cheilanthifolia* Schrenk 393.
" *comosa* L. 95, 395.
- " *dolichorrhiza* Schrenk 395.
- " *dubia* B. Fedtsch. 394.
- " *interrupta* Steph. 392.
- " *lapponica* L. 101, 113, 115.
- " *Oederi* Vahl. 395.
- " *palustris* L. 103, 105.
- " *rhinanthaloides* Schrenk 394.
- " *Sceptrum* L. 74, 88, 89, 103, 105.
- " *songorica* var. *versicolor* Krasn.
394.
- " *sudetica* Willd. 46, 88, 110, 112,
115, 116.
- " *ulligiosa* Bge. 372, 394.
- " *versicolor* Wahlenb. 395, 396.
- " *verticillata* L. 95, 107, 110.
- Pennisetum japonicum* Trin. 206.
- Peristylis viridis* Lindl. 72, 82, 109.
- Petasites spurius* Rchb. 83.
- Peucedanum Chabraeli* Rchb. 9,
" *salsugineum* Kryl. 8, 11.

- Phaca brachytropis* Stev. 312.
Phaseolus minimus Roxb. 218.
 " *radiatus* L. 204.
Phegopteris Dryopteris Fée 67, 71, 84,
 124.
Phlomis laciniata L. 405.
 " *oreophila* Kar. Kir. 405, 467.
 " *spectabilis* Falc. 405.
 " *sp.* 405.
Phragmites communis Trin. 443.
Phryma leptostachya L. 227.
Phyllocoete taxifolia Salisb. 112, 115.
Physalis Alkekengi L. 227.
Physcia caesia Nyl. 453.
Picea excelsa Link. 49, 66, 68, 69, 84, 127.
Picris hieracoides L. 231.
 " *japonica* Thunb. 231.
Pimpinella Saxifraga L. 65, 82, 93.
Pinguicula alpina L. 89.
 " *vulgaris* L. 107, 110, 120.
Pinus silvestris L. 51, 64, 66, 69, 77,
 84, 93, 97, 126.
Pisum maritimum L. 118.
 " *sativum* L. 320.
Placodium elegans Ach. 453.
Plantago arachnoidea Schrenk 408,
 467.
 " *depressa* W. 227.
 " *gentianoides* Sm. v. *sardica*
 Griseb. 408.
 " *Griffithi* Deen. 407, 467.
 " " *v. alpina* Bornm. 408.
 " " *v. pamirica* O. Fedtsch. 407,
 467.
 " *major* L. 79, 83.
 " *maritima* L. 118.
 " *media* L. 82.
Platycodon grandiflorus DC. 228.
Pleurogyne brachyantha Clarke 381,
 465.
 " *carinthiaca* Griseb. 380.
 " *rotata* S. et Z. 224.
 " *Thomsonii* C.B.Clarke 381, 465.
Pleurospermum stellatum Benth. 338.
 " " *v. Lindleyanum* Hook. 338.
 " *uraense* Hoffm. 46.
Poa alpina L. 81, 107, 109, 112, 113, 440,
 470.
 " *annua* L. 79.

- Poa attenuata* Trin. 440, 469.
 " " *v. desertorum* Rgl. 440, 441, 469.
 " " *v. versicolor* Rgl. 440, 569.
 " *cenisia* All. 107, 110, 112, 113, 119.
 " *compressa* L. 81.
 " *macrocalyx* Trautv. et Mey. 441,
 442.
 " *pratensis* L. 73, 81, 86, 107, 109,
 119, 441, 469.
 " " *v. alpigena* Fr. 441, 469.
 " " *v. typica* 441, 469.
 " *serotina* Ehrh. 81, 86.
 " *Sphondyloides* Trin. 207.
 " *tianschanica* Hack. 441, 469.
 " *trivialis* L. 81.
Polemonium coeruleum L. 72, 82, 86,
 107, 111.
Polygala amara L. 82, 93.
 " *sibirica* L. 3 angustifolia Ledb. 219.
 " *tenuifolia* W. 219.
Polygonum acerosum Melsn. 417, 467.
 " *alpinum* All. 210.
 " *aviculare* L. 79, 210.
 " *Bistorta* L. 71, 72, 74, 82, 88, 89,
 107, 111, 414, 467.
 " *emarginatum* Melsn. 210, 495.
 " *emarginatum* Roth. 210, 495.
 " *Fagopyrum* L. 210.
 " *glutinosum* Wall. 210.
 " *Ianigerum* RBr. 210.
 " *Iaphathifolium* L. 210.
 " *molliaeforme* Boiss. 417, 467.
 " *orientale* L. 210.
 " *pamiricum* Korsch. 415, 467.
 " *Paronychia* Cham. et Schl. 416.
 " *Paronychia* CAM. 416.
 " *paronychioides* CAM. 416, 467.
 " *polymorphum* Ledb. 210.
 " *sibiricum* Laxm. 210.
 " *tinctorium* Lour. 210.
 " *viscosum* Hamilt. 210.
 " *viviparum* L. 82, 95, 101, 107, 109,
 113, 115, 124, 415, 467.
Polypodium fragile L. 451.
Populus balsamifera L. v. *Simoni* Wesm. 209.
 " *tremula* L. 64, 66, 69, 84, 122,
 123, 124.
Potamogeton pectinatus L. 419, 468.
 " *rufescens* Schrad. 95.

- Potentilla anserina* L. 79, 119, 213, 327,
 461.
 " *bifurca* L. 321, 461.
 " *chinensis* Ser. 213.
 " *dealbata* Bge. 328, 461.
 " *discolor* Bge. 213.
 " *flagellaris* W. 214.
 " *floribunda* Pursh. 329, 461.
 " *fragarioides* L. 214.
 " " var. *typica* Max. 214.
 " *fruticosa* L. v. *pumila* Hook. 329.
 " var. 329.
 " *multifida* L. 326, 461.
 " *multifida* Baket Moore 213.
 " *nivea* L. 328, 329, 461.
 " *polyschista* Boiss. 325, 561.
 " *recta* L. 328, 461.
 " *reptans* L. 328, 461.
 " *Salisburgensis* Hänke 110, 113,
 115.
 " *Salesoviana* Hook. 330.
 " *Salesovii* Steph. 329.
 " *sericea* L. 324.
 " " *v. akhatalensis* O. Fedtsch.
 325, 461.
 " " *v. polyschista* Lehm. 325.
 " " *supina* L. 214.
Poterium officinale Benth. et Hook. 215.
 " " *Sanguisorba* L. 323.
Pottia Heimii (Hedw.) Br. eur. 451.
Prenanthes sonchifolia Bge. 231.
Primula auriculata Lam. 372.
 " *farinosa* L. 370, 464.
 " " *v. algida* Trautv. 370, 464.
 " " *v. armena* C.Koch 371, 464.
 " " " *f. albo-farinosa* Kus-
 nez. 371, 464.
 " " " *f. Nazarensis* Derg.
 371, 464.
 " *nivalis* Pall. 373, 464.
 " " *v. purpurea* Rgl. 373, 464.
 " " *v. turkestanica* Rgl. 373,
 464.
 " " *f. farinosa* Schrenk. 373,
 464.
 " " *f. glabrata* O. Fedtsch. 373,
 464.
 " " *sibirica* Jacq. 119, 371, 372, 464.
Prunus Armeniaca L. 215.
 " *Prunus communis* L. 215.
 " *Padus* L. 46, 73, 85, 122, 126.
 " *Persica* L. 215.
 " *tomentosa* Thunb. 215.
Pseudobraya Kisylarti Korsh. 265.
Pteridium aquilinum Kuhn. 205.
Pterotheca bifida F. et M. 368.
Ptilagrostis mongholica Grisb. 447.
Pulsatilla Albana Sprg. 246, 456.
 " *patens* Mill. 28, 93, 94.
Pycnostelma chinense Bge. 224.
 " *paniculata* K. Schm. 224.
Pyrethrum ambiguum Ledb. 82, 110,
 117, 119.
 " *Athanasia* Boiss. 351.
 " *bipinnatum* Ledb. 107, 109, 111,
 115, 116, 119.
 " *djilicense* (Franchet) 345, 462.
 " *indicum* Cass. 229.
 " *pamiricum* O. Fedtsch. 345, 462.
 " *pulchrum* Ledb. 345, 462.
 " *sinense* DC. 229.
 " *transiliense* Rgl. 344, 462.
 " *v. subvillosa* Rgl. 345, 462.
 " *v. tomentosa* Rgl. 344, 462.
Pyrola grandiflora Radius 107, 110, 112.
 " *minor* L. 107, 110.
 " *rotundifolia* L. 68, 71, 75, 84,
 107, 370.
 " *secunda* L. 107, 110, 112.
Pyrus aucuparia Gärtn. 26, 46, 49, 65,
 67, 70, 73, 84, 100, 124, 125, 127.
 " *Quercus dentata* Thunb. 209.
 " " *v. Mc. Cormicki* Skan. 209.
 " " *mongolica* Fisch. 209.
 " " *serrata* Thunb. 204, 209.
Ranunculus acer L. 67, 73, 79, 82, 86,
 109, 111.
 " *Albertii* Rgl. et Schmalh. 253.
 " *altaicus* Laxm. 252.
 " *aquatilis* L. 247, 331.
 " " *v. pantothrix* Ledb. 247, 456.
 " " *v. trichophyllus* Chaix 247.
 " " *v. trichophyllus* Hook. 247.
 " " *Aucherii* Boiss. 248, 456.
 " " *f. minor* O. Fedtsch. 248.
 " *auricomus* L. 82, 86.

- Ranunculus cassubicus* L. 82, 86.
 " *chinensis* Bge. 212.
 " *Cymbalariae* Pursh 251, 456.
 " " *v. alpinus* Koch 251, 456.
 " " *v. minor* B. Fedtsch. 251.
 " *flexicaulis* Kom. 249, 456.
 " *frigidus* W. 252.
 " *hyperboreus* Rottb. 251, 457.
 " " *v. natans* Rgl. 251, 457.
 " " *v. parvispatulus* (Bruhl.) 252,
 457.
 " *natans* CAM. 251.
 " *Pallasii* Schlecht. 119.
 " *Pamiri* Korsh. 252, 457.
 " *paucistamineus* Tausch. 247.
 " *pensylvanicus* L. 212.
 " *plantaginifolius* Murr. 250.
 " *polyanthemus* L. 82, 93.
 " *propinquus* CAM. 67, 73, 82, 86,
 109, 111.
 " *pulchellus* CAM. 249, 456.
 " " *v. longicaulis* Trautv. 250, 456.
 " " *v. pseudohirculus* Trautv.
 249, 456.
 " " *v. tridentatus* O. Fedtsch. 250,
 456.
 " " " *f. parviflora* O. Fedtsch.
 250.
 " *pygmaeus* Wahlenb. 94, 113.
 " *repens* L. 71, 79, 83, 86, 89.
 " *rubrocalyx* Rgl. 253, 457.
 " *rufosepalus* Franchet 253, 254, 457.
 " *Sewerzowi* Rgl. 248.
 " *songoricus* Schrenk 253.
 " *sulphureus* Soland. 252, 457.
 " " *v. Alberti* Maxim. 253, 457.
Raphanus laevigatus MB. 237.
Rhamnus crenata Bak. et Moore 220.
 " *parvifolia* Bge. 220.
 " *virgata* Maxim. 220.
Rhaponticum uniflorum DC. 230.
Rheum spiciforme Royle 413, 467.
Rhinanthus Crista galli L. 79, 83.
Rodiola gelida Schrenk 333.
Rhododendron micranthum Turcz. 223.
Ribes nigrum L. 46, 70, 73, 85.
 " *rubrum* L. 46, 70, 73, 85, 127.
Richteria pyrethroides Kar. Kir. 344.
Ricinus communis L. 219.

- Robinia jubata* Pall. 302.
Rochelia stellulata Rehb. 389, 466.
Rosa acicularis Lindl. 26, 65, 66, 67, 70,
 73, 85.
 " *cinnamomea* L. 83.
 " *multiflora* Thunb. 214.
 " *rugosa* Thunb. 214.
Rubia cordifolia L. 228.
Rubus arcticus L. 67, 70, 75, 84, 107,
 109, 112, 124.
 " *Chamaemorus* L. 35, 46, 70, 75,
 78, 101, 102, 107, 121, 124.
 " *Idaeus* L. 46, 65, 67, 72, 84.
 " *humulifolius* CAM. 70, 84.
 " *parviflorus* Palib. 214.
 " *parvifolius* L. 214.
 " *saxatilis* L.
Rumex Acetosa L. 79, 82, 109, 111, 116,
 124.
 " *Acetosella* L. 72, 82, 107.
 " *aquaticus* L. 100.
 " *chinensis* Campd. 211.
 " *crispus* B. Fedtsch. 414.
 " *digynus* L. 414.
 " *domesticus* Hartm. 83, 414, 467.
 " *maritimus* L. 211.
Sagina Linnaei Presl. 110.
Sagittaria sagittifolia L. 96.
Salix acutifolia W. 193, 194, 195.
 " *alba* L. 185.
 " " *f. acuminata* Rgl. 187, 188.
 " " *f. coerulea* Rgl. 187.
 " " *f. concolor* Rgl. 188, 189.
 " " *f. viridis* Rgl. 187, 189.
 " " *α. splendens* Anders 187.
 " " *β. coerulea* Anders. 187.
 " " *δ. tristis* Ledb. 188.
 " " *ε. turkestanica* Rgl. 188, 189.
 " *alba* B. Fedtsch. 417.
 " *alba* × *pentandra* 188.
 " *alba* × *purpurea?* Anders. 181.
 " *alba* × *viminalis* Rgl. 190.
 " *Alberti* Rgl. 137, 170.
 " *amygdalina* Trautv. 182, 183, 184.
 " *amygdalina* α. *discolor* Ledb. 183.
 " *amygdalina* β. *concolor* Ledb. 184.
 " *androgyna* Trautv. 182, 183, 184.
 " *angustifolia* Anders. 153.

- Salix angustifolia* α. *eriocarpa* Ledb.
 " *angustifolia* β. *leiocarpa* Trautv.
 " *Arbuscula* L. 106, 122—124.
 " *babylonica* L. 185, 192, 208.
 " *bicolor* Ehrh. 70, 75, 85, 88.
 " *caesia* α. *glabra* Turcz. 141.
 " " β. *minutiflora* Anders. 141.
 " " *pubescens* Turcz. 143.
 " " *subsessilis* Rgl. 143.
 " *Caprea* L. 67, 70, 84, 122, 126.
 " *Capusi* Franchet 185.
 " *cardiophylla* Trautv. et Mey. 175, 177.
 " *coerulea* Wolf. 137, 157.
 " *coeruleascens* Turcz. 194.
 " *dahurica* Turcz. 145.
 " *daphnoides* Vill. 193, 194, 197.
 " " *acutifolia* Döll. 195.
 " " *angustifolia* Weinm. 195.
 " *dracunculifolia* Boiss. 154.
 " *fragilis* Rgl. 181.
 " *glabra* Ledb. 142.
 " *glaуca* L. 101, 102, 106, 109, 111,
 114, 116, 120—124.
 " *hastata* L. 85, 88, 89, 95, 109, 111.
 " *Helix* Sm. 150.
 " *Helix* Trautv. 148.
 " *Helix* auct. 149.
 " *herbacea* L. 101, 106, 109, 111, 114.
 " *lliensis* Rgl. 136, 174.
 " *Kirillowiana* Stschegl. 190.
 " *Kochiana* Trautv. 136, 139, 143.
 " *Komarovii* Wolf 193, 195.
 " *Lambertia* Sm. 149.
 " *lanata* L. 101, 106, 109, 111, 114,
 116, 121, 122.
 " *lapponum* L. 75, 102, 106, 116, 121.
 " *Ledebouriana* Trautv. 136, 150.
 " " *tenuijulis* Anders. 146.
 " *linearifolia* Wolf 136, 160.
 " *livida* And. 85.
 " *loniceræfolia* Turcz. 144.
 " *macrolepis* Turcz. 175, 176, 178, 176.
 " *macrostachya* Wolf 136, 165.
 " *margaritifera* Wolf 136, 162.
 " *microstachya* Turcz. 136, 138, 156,
 157, 161.
 " *minutiflora* Turcz. 139, 141.
- Salix minutiflora* β. *subsessilis* Wolf 143.
 " " γ. *pubescens* Wolf 143.
 " *Myrsinites* L. 106.
 " *mytilloides* L. 75.
 " *nigricans* Smith 67, 70, 75, 85,
 88, 106.
 " *Olgae* Rgl. 152, 153, 191.
 " *oxycarpa* Anders 417, 418, 467.
 " *pallida* Ledb. 136, 151.
 " *pentandra* L. 85, 88, 89, 122, 126,
 176, 179.
 " *Pontederana* Ledb. 144.
 " *præcox* Ledb. 194.
 " *pseudalba* Wolf 136, 167, 169.
 " *purpurea* L. 136, 138, 140, 148,
 161, 173.
 " " v. *styligera* Wimm. 149.
 " " b. *longifolia* Dipp. 149.
 " " β. Turcz. 145.
 " " α. *typica* Wolf 149.
 " " δ. *Helix* Wolf 149.
 " " γ. *Helix* Anders. 149.
 " " δ. *pallescens* Anders. 150.
 " *purpurea* Ledb. 146.
 " *purpurea* Trautv. 146.
 " *purpurea* Sm. 149.
 " *pyrolæfolia* Led. 85, 88, 121, 126.
 " *reticulata* Wimm. 106, 109, 111.
 " *rosmarinifolia* L. 75.
 " *rubra* Huds. 138, 159.
 " " *dahurica* Turcz. 145.
 " *rubra* L. 191.
 " *Sarawschanica* Rgl. 136, 173, 191.
 " *Schrenkiana* Anders 148.
 " *serratifolia* Wolf 136, 163.
 " *sibirica* α. *glabra* Ledb. 142.
 " *Smithiana* Willd. 85.
 " *songorica* Anders. 176, 181.
 " *tenuifolia* Turcz. 136, 139, 145, 148.
 " *tenuijulis* Ledb. 136, 146, 148, 150,
 173.
 " *triandra* Trautv. 184.
 " *triandra* L. 176, 182, 189.
 " " α. *discolor* Anders. 183.
 " " β. *concolor* 184.
 " " γ. *macrolepis* 175, 176, 178, 176.
 " *Trautvetteriana* Rgl. 136, 154, 155.
 " *Villarsiana* Trautv. 182, 183, 184.
 " *viminalis* L. 81, 85, 89, 122, 126,
 190.

- Salix viminalis* Kar. et Kir. 191.
 " *viminalis* × *purpurea* Wimm. 159.
 " *Wilhelmsiana* Trautv. 136, 141, 153,
 155.
 " × *microstachya* 156.
Salsola collina Pall. 211.
 " *prostrata* L. 411.
Salvia miltiorhiza Bge. 225.
 " *minutiflora* Bge. 225.
 " *plebeja* RBr. 225.
Sanguisorba carnea Fisch. 215.
 " *officinalis* L. 82, 215.
Saponaria dichotoma Komar. 290, 459.
 " *Griffithiana* Boiss. 290, 459.
 " *sileneoides* H. Winkl. 290.
 " *Vaccaria* L. 290, 459.
Saussurea alpina DC. 67, 82, 86, 107,
 111, 358, 463.
 " *v. Kuschakewiczi* CWinkl. 368.
 " *colorata* CWinkl. 359, 463.
 " *crassifolia* DC. 358.
 " *gnaphalodes* Sch. Bip. 360.
 " *odontolepis* Sch. Bip. 230.
 " *pamirica* CWinkl. 359, 463.
 " *f. albiflora* O. Fedtsch. 359,
 463.
 " *pectinata*? *amurensis* Maxim. 230.
 " *pygmaea* Spreng. 358.
 " *salsa* Spreng. 358, 463.
 " *sorocephala* Hook. et Th. 360, 463.
 " *ussuriensis* ? *odontolepis* Herd.
 230.
Saxifraga androsacea L. ? *uniflora* Kryl. 18.
 " *cernua* L. 95, 111, 335, 461.
 " *comosa* Poir. 103, 107.
 " *decipiens* Ehrh. *caespitosa* Engl.
 113, 115.
 " *flagellaris* W. 334, 461.
 " *hieracifolia* W. et K. 110, 111.
Hirculus L. 75, 335, 461.
 " *nivalis* L. 94, 111.
 " *rivularis* R. Br. 111.
 " *stellaris* L. 103, 111.
Scabiosa caucasica MB. 340, 462.
 " " *v. songorica*, 340,
 462.
 " *songorica* Schrenk 340.
Scenedesmus quadricauda Breb. 454.

- Scirpus caespitosus* L. 103.
 " *pauciflorus* Light 427, 468.
Scorzonera austriaca W. 93, 231.
 " *Marschalliana* CAM. 365.
 " *stricta* Horn. 365, 464.
 " " *v. villosa* CWinkl. 365.
Serophularia aquatica L. 390, 366.
 " *incisa* Weinm. 390, 466.
 " " *v. alpina* Ledb. 391, 466.
 " " *v. angustifolia* O. Fedtsch.
 391, 466.
 " " *v. pamirica* O. Fedtsch. 391,
 466.
Scutellaria alpina L. 403, 467.
 " " *v. prostrata* Trautv. 403,
 467.
 " " *f. pamirica* O. Fedtsch. 403,
 467.
 " *baicalensis* Georgi 226.
 " *grandiflora* Adams. 226.
 " *macrantha* Fisch. 226.
 " *orientalis* L. 403, 467.
 " " *v. chamaedrifolia* Rehb. 403,
 467.
 " *strigilosa* Hemsl. 226.
Sedum crenulatum Hook. et Th. 334.
 461.
 " *gelidum* Ledb. 333, 461.
 " *heterodontum* Hook. et Th. 334.
 " *kamtschaticum* Fisch. 213.
 " *maximum* Sut. 79.
 " *Rhodiola* DC. 112, 334, 461.
 " " *v. heterodontum* Fedtsch. 334.
 461.
 " *sarmentosum* Bge. 213.
Selaginella mongolica Rupr. 205.
Selinum papyraceum C. B. Clarke 337.
Senecio aconitifolius Turcz. 230.
 " *alabugensis* CWinkl. 357.
 " *altaicus* Schultz 355.
 " *altaicus* Franchet 356.
 " *campestris* DC. 89, 94, 95, 107,
 109, 111.
 " *coronopifolius* Desf. 357, 463.
 " *nemorensis* 67, 70.
 " *Renardi* CWinkl. 357, 463.
 " *songoricus* F. et M. 357, 463.
 " " *v. arachnoidea* CWinkl. 357,
 463.

- Serratula depressa* Stev. 364.
 " *procumbens* Rgl. 363, 464.
Sesamum indicum L. 227.
Setaria italica P.B. 204, 206.
 " *viridis* P.B. 449, 470.
Sibbaldia procumbens L. 113.
 " *tetrandra* Bge. 323, 461.
Sideritis montana L. 404, 467.
Silene acaulis L. 115.
 " *aprica* Turcz. 211.
 " " *a. typica* Rohrb. 211.
 " *caucasica* Boiss. 291, 459.
 " " *v. pamirensis* H. Winkl. 291, 459.
 " *commutata* Guss. 291.
 " *inflata* Sm. 79, 82.
Oldhamiana Miq. 211.
 " *Otites* Sm. 93, 94.
 " *noctiflora* L. 79.
 " *Tatarinowii* Rgl. 212.
 " *venosa* Aschers. 291.
Sisymbrium binerve CAM. 273.
 " *brassicaefolium* CAM. 271, 458.
 " *glandulosum* Maxim. 271, 458.
 " *humile* CAM. 274, 458.
 " *Korolkovi* Rgl. et Schmalh. 273, 458.
 " *mollissimum* CAM. 274, 458.
 " *mongolicum* Maxim. 273.
 " *nanum* DC. 273, 458.
 " *pumilum* Steph. 272, 458.
 " " *v. alpinum* Korsh. 272, 458.
 " *Sophia* L. 272, 458.
 " " *f. nana* O. Fedtsch. 272.
 " *sulphureum* Korsh. 272, 458.
Sium latifolium L. 96.
Smelovskia annua (Rupr.) 284, 458.
 " *calycina* CAM. 283, 458.
 " *flavissima* Kar. Kir. 285.
 " sp. 283.
Soja hispida Moench. 204.
Solenanthus nigricans Schrenk 388, 465.
 " " *v. hispidus* Rgl. 388, 465.
Solidago Virga aurea L. 65, 67, 70, 72, 82,
 86, 107, 109, 111, 115, 116.
Sonchus arvensis L. 231.
 " " *v. umbrosa* Hook. 231.
 " " *v. maritimus* 117, 118.
 " *brachyotus* DC. 231.
 " *tataricus* L. 369.
 " *uliginosus* MB. 231.
- Sophora alpina* Pall. 301.
Sphagnum capillifolium Ehrh. 104.
 " *compactum* Brid. 104.
Spiraea flavescentia Alt. 215.
 " *media* Schmidt 73, 85.
 " *sorbifolia* L. 215.
Spirogyra sp. 454.
Spirulina major Kütz. 454.
Spodiopogon sibiricus Trin. 206.
Stachys aspera Michx. *v. chinensis* Maxim.
 226.
 " *chinensis* Bge. 226.
Statice bicolor Bge. 223.
 " " *a. laxiflora* Bge. 223.
 " *Bungeana* Boiss. 223.
Stellaria brachypetala Bge. 295, 459.
 " " *a. procumbens* Bge. 295.
 " *cerastioides* L. 110, 113, 115.
 " *crassifolia* Ehrh. 119.
 " *glauca* With. 83, 294, 459.
 " *graininea* L. 83, 295.
 " " *v. brachypetala* Bge. 295.
 " *Holosteia* L. 83, 86.
 " *humifusa* Rottb. 294, 459.
 " " *v. caespitosa* Rgl. f. *oxy-*
sepala Rgl. 294, 459.
 " *latifolia* Benth. 4.
 " *Martjanovi* Kryl. 3, 11.
 " *media* Vill. 79.
 " *nemorum* L. 83, 86.
 " *rigida* Bge. 295, 459.
 " *Webbiana* Benth. 4.
 " sp. 295.
Stenocaelium divaricatum Turcz. 222.
Stenosolenium saxatile Turcz. 383, 465.
Stigeoclonium sp. 455.
Stipa arguens Hout. 206.
 " *Lessingiana* Trin. 448, 470.
 " *mongolica* Turcz. 447, 470.
 " *orientalis* Trin. 447, 470.
 " *splendens* Trin. 447, 470.
Suaeda maritima Dumort. 412, 467.
 " *salsa* Pall. 211.
Swertia chinensis Franch. 223.
 " *marginata* Schrenk 376, 381,
 465.
Syneilesis aconitifolia Maxim. 231.
Tamarix germanica L. 331.

- Tanacetum fruticosum Ledb. 351, 463.
 " gracile Hook. et Th. 351, 463.
 " Kuschakewiczi O. Fedtsch. 353, 463.
 " nanum C.B.Clarke 353, 463.
 " tenuifolium Jacquem. 352, 463.
 " tibeticum Hook. 352, 463.
 " vulgare L. 79, 83, 117.
- Taraxacum bicolor DC. 367.
 " corniculatum DC. 365.
 " dissectum Ledb. 366.
 " leucanthum Ledb. 367, 464.
 " officinale Wigg. 82, 109, 112, 365, 464.
 " " v. corniculatum Rgl. 365, 464.
 " " v. dissectum (Ledb.) 366, 464.
 " " v. glaucescens Koch 365.
 " " v. lividum Koch 366.
 " " v. parvula Hook. 366.
 " " v. palustre Rgl. 366, 367, 464.
 " palustre DC. 366.
- Tauschia desertorum Ledb. 287.
 " lasiocarpa Fisch. 287, 459.
- Tetragone quadricornis Bge. 278, 458.
- Thalictrum alpinum L. 244, 456.
 " flavum L. 82, 86.
 " isopyroides CAM. 245.
 " minus L. 30, 72, 82, 86, 93, 94, 245.
 " " v. elatum Lec. 245.
- Themeda Forskallii Hackel 206.
- Thermopsis alpina Ledb. 301, 460.
- Thiothrix tenuis Winogr. 453.
- Thlaspi arvense L. 79.
 " alpinum Jacq. v. Poncinsii Franch. 269.
- Thymus angustifolius Ledb. 226.
 " Serpyllum L. 93, 94, 95, 226, 397, 466.
- Titmannia stachydisfolia Turcz. 226.
- Tournefortia Arguzia R. et Sch. 225.
 " sibirica L. 225.
- Tofieldia palustris Huds. 93, 95.
- Trachydium Roylei Lindl. 339, 462.
 " sp. 339.
- Tragopogon brevirostris L. 364, 464.
 " gracile Don 364, 464.
 " major Jacq. 364.
 " pratensis L. 364, 464.
- Tribulus terrestris L. 218.
- Trichocrepis bifida Vis. 368.
- Trientalis europaea L. 27, 67, 70, 72, 84, 101, 107, 109, 112, 120.

- Trifolium Lupinaster L. 216.
 " repens L. 82, 302, 460.
 " medium L. 82.
 " pratense L. 82.
- Triglochin maritimum L. 118, 420, 468.
 " palustre L. 420, 468.
- Trigonella cachemiriana Camb. 302, 460.
 " Emodi Benth. 302.
- Trisetum spicatum Richt. 444.
 " subspicatum Beauv. 110, 444.
- Triticum rigidum Schrad. 436, 469.
 " " v. tomentosum Rgl. 436, 469.
 " strigosum Less. 436, 469.
 " " v. microcalyx Rgl. 436, 469.
 " " v. planifolium Rgl. 436, 469.
- Trollius altaicus CAM. 255.
 " " v. latilobus Rupr. 255.
 " dschungaricus Rgl. 255.
 " " v. alpinus B. Fedtsch. 255.
 " Europaeus L. 27, 67, 70, 72, 82, 86, 107, 124.
 " " v. songoricus Rgl. 255.
 " songoricus Rgl. 256.
- Turczaninowia fastigiata DC. 228.
- Turritis glabra L. 82, 93.
- Tussilago Farfara L. 83.
- Umbilicus alpestris Kar. Kir. 333, 461.
 " leucanthus Ledb. 332, 461.
 " platyphyllus Schrenk 333, 461.
 " Semenovii Rgl. et Herd. 333, 461.
- Urostelma chinense Bge. 224.
- Urtica dioica L. 79.
 " urens L. 79.
- Utricularia vulgaris L. 370, 464.
 " intermedia Hayne. 76.
- Vaccaria segetalis Garcke 290.
 " vulgaris Host. 290.
- Vaccinium Myrtillus L. 65, 67, 70, 72, 89, 109, 111.
 " uliginosum L. 46, 65, 67, 70, 72, 75, 84, 101, 107, 109, 113, 115.
 " Vitis idaea L. 46, 65, 67, 70, 72, 75, 84, 101, 107, 109, 113, 115.
- Valeriana capitata Pall. 94, 107, 110, 112.
 " Martjanovi Kryl. 9, 11.
 " officinalis L. 86.
 " petrophila Bge. 9, 11.

- Veratrum album L. 72, 82, 86, 107, 111.
- Verbesina prostrata Hook. et Arn. 229.
- Veronica alpina L. 110.
- Anagallis L. 391, 466.
 " angustifolia Fisch. 227.
 " biloba L. 392, 466.
 " " v. dasycarpa Trautv. 392, 466.
 " " v. platysepala Trautv. 392.
 " cardiocarpa Walp. 392, 466.
 " Chamaedrys L. 79, 83.
 " longifolia L. 46, 71, 72, 82, 86, 107, 109, 111.
 " paniculata L. 227.
 " spuria L. 227.
- Vicia amoena Fisch. 217.
 Cracca L. 82, 320, 461.
 " megalotropis Ledb.
 " " v. intermedia Kryl. 16.
 " " v. multicaulis Trautv. 16.
 " peregrina L. 320, 461.
 " sepium L. 73, 82, 86, 109.
 " silvatica L. 67, 73, 84.
 " unijuga A. Br. 217.
- Vincetoxicum sibiricum Dene 224.
- Viola arenaria DC. 82, 93.
 " biflora L. 107, 112.
 " canina L. 67, 72, 82, 84.
 " chinensis Don. v. prionatha Bge 221.
 " collina Bess. 87.
 " dissecta Ledb. 221.
 " epipsila Ledb. 71, 107, 112.
 " mirabilis L. 87.
 " palustris L. 71.
 " Patrinii DC. var. chinensis Ser. 221.
 " phalacrocarpa Maxim. 221.
 " pinnata L. var. dissecta Turcz. 221.
-
- Viola tianschanica Maxim. 286, 459.
 " tricolor L. 79, 82, 86.
 " variegata Fisch. 221.
- Vitis heterophylla Thunb. 220.
 " " v. Bungei Pl. 220, 494.
 " serianaefolia Maxim. 220.
 " uniflora L. 287.
- Wahlenbergia clematidea Schrenk 370.
- Waldheimia tridactylites Kar. Kir. 356, 463.
- Wedelia prostrata Hemsl. 229.
- Wollastonia prostrata Hook. et Arn. 229.
- Xanthium Strumarium L. 229.
- Xanthoceras sorbifolia Bge. 220.
- Youngia diversifolia Ledb. 368, 464.
 " flexuosa Ledb. 368, 464.
 " " v. gigantea CWinkl. 369, 464.
 " pygmaea Ledb. 369, 464.
 " " v. purpurea CWinkl. 369, 464.
- Zanthoxylum Daniellii Benn. 218.
 " mandshuricum Benn. 219.
 " schinifolium S. et Z. 219.
- Zea Mays L. 204.
- Ziziphora clinopodioides Lam. 398, 466.
 " dasyantha MB. 398, 466.
 " tenuior B. Fedtsch. 400.
- Zizyphus vulgaris Lam. 220, 494.
- Zoysia japonica Steud. 206.
 " pungens W. 206.
- Zozimia tragoides Bolss. 238, 462.
 " v. bipinnata Lipsky 238.
- Zygophyllum brachypterum Kar. Kir. 300, 460.
- Rosowii Bge. 300, 460.

Corrigenda (опечатки).

Стр.	Строка.	Напечатано:	Слѣд. читать:
104	11—12 (сверху)	Sph. compactum Bris.	Sph. compactum Brid.
115	8	" S. arcuata.	L. arcuata.
120	3	" Rutida.	Kutina.
210	9—11	{ 35. <i>Polygonum emarginatum</i> Roth. 36. <i>Fagopyrum emarginatum</i> Meisn.	{ 35. <i>Polygonum emarginatum</i> Roth. Sy n. <i>Fagopyrum emarginatum</i> Meisn.
212	6	" <i>Chematis.</i>	<i>Clematis.</i>
218	23	" <i>103. L. stelleroides</i> Pl.	<i>103. L. stelleroides</i> Pl.
220	14 (сверху)	<i>Zizyphus.</i>	<i>Zizyphus.</i>
220	8 (снизу)	v. <i>Bungei</i> Pl.	— Var. <i>Bungei</i> Pl.
223	6 (снизу)	a. <i>laxiflora</i> Bge.	a. <i>laxiflora</i> Bge.
229	12	" <i>Hassk.</i>	<i>Hassk.</i>
289	24 (сверху)	для	для
421	17	" <i>Orchis turkestanica.</i>	<i>Orchis turcestanica.</i>
440	4 (снизу)	{ Var. <i>versicolor</i> Rgl. 1901.	{ Var. <i>versicolor</i> Rgl.
"	5	{ На южномъ	{ 1901. На южномъ
468	5	" <i>Orchis turkestanica.</i>	<i>Orchis turcestanica.</i>