

23.62

# АСТА HORTI PETROPOLITANI.

TOMUS XXIII.  
FASCICULUS II.

## ТРУДЫ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА.

ТОМЪ XXIII.  
ВЫПУСКЪ II.

### СОДЕРЖАНИЕ:

Федченко Б. А., Флора Западного Тянь-Шаня. Ботанические результаты экспедиций 1897 и 1902 гг. и сводъ предшествующихъ наслѣдований. I . . . . .	249—532
---	---------

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-литографія „Герольдъ“ (Вознесенскій пр. № 3).  
1904.

# **ФЛОРА**

## **Западнаго Тянь-Шаня.**

---

Ботаническіе результаты экспедицій  
1897 и 1902 гг.

и  
сводъ предшествующихъ изслѣдований.

---

**Б. А. Федченко.**

**I.**

---

I.

Лѣтомъ 1897 г., по порученію и отчасти на средства Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, по инициативѣ покойнаго проф. И. В. Мушкетова, въ первый разъ удалось мнѣ посѣтить Туркестанскій край и пройти къ ледникамъ Западнаго Тянъ-Шаня. Въ экспедиціи 1897 г. приняли участіе, кромѣ меня, Ольга Александровна Федченко, подробно изслѣдовавшая растительность интересной долины р. Чимган; затѣмъ присоединились товарищи мои, натуралистъ, а нынѣ врачъ, А. Н. Арсеньевъ и геологъ П. Е. Воларовичъ. Къ экспедиціи былъ прикомандированъ, для производства съемокъ, землемѣръ В. Р. Крошковъ. Нѣкоторое время совмѣстно съ нами ъхали также чиновникъ особыхъ поручений И. И. Гейеръ и горный инженеръ Г. Б. Леоновъ.

Ботаническіе результаты этого первого моего путешествія были довольно обильны и интересны, такъ какъ большая часть нашего маршрута пролегала по мѣстамъ, ботаниками не посѣщеннымъ. Коллекціи 1897 года были обработаны О. А. Федченко и мною, при участіи нѣсколькихъ специалистовъ, но опубликованы лишь отчасти.

Въ 1901 г. райономъ нашихъ изслѣдований былъ Памиръ, Шугнанъ и Алай. Но передъ путешествіемъ на Памиръ мы (О. А. Федченко, я и М. И. Тулиновъ) провели нѣсколько дней въ Ташкентѣ и собранные въ это время материалы также войдутъ въ настоящую Флору. Одинъ изъ участниковъ нашей экспедиціи, М. И. Тулиновъ, оставался въ Ферганѣ и Ташкентѣ до октября и сдѣлалъ нѣсколько экскурсій послѣ нашего отѣзда изъ Ташкента.

Лѣтомъ 1902 г. мною было предпринято, по порученію Императорскаго Русскаго Географическаго Общества и Имп-

(3).

раторского Ботанического Сада; путешествие для изслѣдованія, главнымъ образомъ, флоры Западнаго Тянъ-Шаня. Съ двумя казаками я обѣздилъ; сколько было возможно, горные хребты и ущелья, и собранные мною ботаническіе материалы всецѣло вошли въ настоящій трудъ.

Я считаю своимъ долгомъ принести искреннюю благодарность всѣмъ тѣмъ, кто содѣствовалъ успѣху моихъ путешествий, въ особенности же Г. Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, А. С. Ермолову, Г. Министру Путей Сообщенія кн. М. И. Хилкову, Г. Вице-Предсѣдателю Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, П. П. Семенову, Г. Директору Императорскаго Ботаническаго Сада, А. А. Финнеру фойль Вальдгейму—въ С.-Петербургѣ; Г. Туркестанскому Генералт-Губернатору Н. А. Иванову, помощнику его Е. О. Мацѣевскому, Г. Начальнику Штаба Туркестанскаго Военнаго Округа В. В. Сахарову, Г. Губернатору Сырь-Дарьинской области Н. И. Королькову, помощнику его П. И. Хомутову—въ Ташкентѣ; Г. Губернатору Ферганской области Г. А. Арендаренко и помощнику его В. П. Наливкину—въ Новомъ Маргеланѣ.

Кромѣ своихъ собственныхъ сборовъ, я пользовался также и всѣми миѣ доступными материалами по флорѣ Западнаго Тянъ-Шаня. Въ особенности цѣнныы материаы, собранные еще въ 1869—71 гг. Ол. Ал. Федченко, и затѣмъ—обильные сборы А. Э. Регеля (1876—1882), С. И. Коржинскаго (1895) и Д. И. Литвинова (1899).

## II.

Мои личныя изслѣдованія ограничивались исключительно Западнымъ Тянъ-Шанемъ, поэтому и райономъ своей флоры я взялъ только Западный Тянъ-Шань, къ тому же сравнительно малоизвѣстный до сего времени, тогда какъ для Центральнаго и Восточнаго Тянъ-шана мы имѣемъ пре-восходныя коллекціи П. П. Семенова, барона Ф. Р. Остен-Сакена—обѣ обработанныя и опубликованныя; имѣемъ книгу А. Н. Краснова; имѣемъ чрезвычайно обильный материалъ,

(4)

собранный А. Э. Регелемъ, А. М. Фетисовымъ, А. А. Кушакевичемъ и ожидающейся обработки.

Определеніе точныхъ границъ для области избранной мною флоры представило серьезная затрудненія. О какихъ либо достаточно рѣзкихъ физико-географическихъ предѣлахъ говорить нельзя, такъ какъ наша область представляеть не-посредственное продолженіе Центральнаго Тянъ-Шаня.

Избрать границы чисто административныя, напр., оставивъ въ сторонѣ Семирѣченскую область, мнѣ показалось неудобнымъ и нежелательнымъ въ виду того, что границы эти часто меняются и на картахъ обозначаются певѣро. Оставалось ограничить область чисто искусственно, меридианами и параллелями. Такъ я и сдѣлалъ — съ трехъ сторонъ, а на югѣ принялъ границей „живое урошище“ — теченіе р. Сырь-дары и ся верховьяевъ, р. Кара-дары. На востокѣ границей нашей области служить меридианъ  $74\frac{1}{2}^{\circ}$  (отъ Гринича); этотъ меридианъ проходитъ чрезъ горный узель (близъ перевала Суфокъ къ западу отъ озера Чатыръ-куль), гдѣ соединяются Памироалай съ Тянъ-Шанемъ; далѣе къ сѣверу этотъ меридианъ прорѣзываетъ хребетъ Джаманъ-даванъ, идеть западнѣе озера Сонъ-куль, прорѣзываетъ Александровскій хребетъ и проходить близъ города Пиншека.

На сѣверѣ границей я принялъ параллель  $43^{\circ}$  N,—такимъ образомъ, къ нашей области относятся всѣ сѣвернія предгорья западной части Александровскаго хребта съ почтовымъ трактомъ отъ Пиншека до Ауліе-ата; на западѣ эта параллель прорѣзываетъ горы Кара-тау въ верховьяхъ р. Бугунь.

Оттуда западную границу области я провожу по меридиану  $69^{\circ}$ ; который проходитъ западнѣе Чимкента и Ташкента и перерѣзываетъ Сырь-дарью немногіо восточнѣе Чиназа. Оттуда южная граница идеть, какъ уже сказано, по Сырь-дарѣ и Кара-дарѣ, до меридиана  $74\frac{1}{2}^{\circ}$ .

Такимъ образомъ, къ области нашей флоры на западѣ относятся часть горъ Карагату, верховья рекъ Арыса и Келлеса, окрестности Ташкента, на югѣ—горы Моголь-тау, весь Наманганскій и значительная часть Андижанскаго уѣзда. Вся срединна нашей области занятая горными хребтами со сѣверными вершинами, достигающими 17—18.000'.

(5)

## III.

Благодаря тому, что въ области нашей флоры входят и окрестности Ташкента и, вообще, места легко доступные и пахотные, мы можемъ привести довольно длинный список лицъ, собравшихъ болѣе или менѣе значительные материалы по флорѣ Западнаго Тянъ-Шаня.

Такъ какъ мнозѣ изъ нынѣпоименованныхъ лицъ собирали въ разное время, къ тому же не всегда точно известно, когда именно, то я и избрать алфавитный, а не хронологический порядокъ для своего перечия.

1) **Арсеньевъ** Александръ Николаевичъ, зоологъ; нынѣ врачъ—участникъ моей экспедиціи 1897 г., во время своихъ экскурсій собирая также и растенія.

2) **Бродовскій** Михаилъ Ивановичъ (бывшій Управляющій Канцеляріей Туркестанскаго Генераль-Губернатора) занимался изученіемъ различныхъ сельско-хозяйственныхъ и промышленныхъ растеній.

3) **Бротерусъ** В. Ф. (Dr. V. F. Brotherus), известный Гельсингфорскій бріологъ, посѣтилъ Среднюю Азію въ 1896 г. Въ нашей области Бротерусъ экспурировалъ лишь по пути отъ Ташкента до Чимкента, Ауліе-ата и Токмака.

4) **Бунаковскій** Александръ Викторовичъ (статскій совѣтникъ, столоначальникъ Д—та Торговли и Мануфактуръ) въ 1869 г. экспурировалъ въ долинѣ Чирчика, съ цѣлью определить барометрически предѣльныя высоты, которыхъ достигаютъ различные виды растеній.

5) **Вальневъ** Евгений Михайловичъ, чиновникъ Министерства Землемѣрія и Государственныхъ Имуществъ, собралъ въ 1899 г. коллекцію весеннихъ растеній въ г. Ташкентѣ и его окрестностяхъ.

6) **Воларовичъ** Павелъ Егоровичъ—горный инженеръ, участникъ моей экспедиціи 1897 года.

7) **Гейеръ** Иванъ Ивановичъ,—нынѣ совѣтникъ Сырь-Дарьинскаго Областного Правленія. Миого путешествовалъ по Сырь-Дарьинской и отчасти Ферганской области; издалъ описание своихъ поѣздокъ, гдѣ, между прочимъ, говорить и о растительности.

8) **Ивановъ** А. въ 1872 г. проѣхалъ по долинамъ Чирчика и Пскема для изслѣдованія лѣсовъ.

9) **Ивановъ** Дмитрій Львовичъ, горный инженеръ, нынѣ Начальникъ Иркутскаго Горнаго Управленія. Д. Л. миого путешествовалъ по Туркестану и постоянно обращалъ вниманіе на флору страны. Въ частности, въ области Западнаго Тянъ-Шаня Д. Л. предпринялъ большія работы по чрезвычайно интереснымъ и обширнымъ маршрутамъ лѣтомъ 1879 года. Результаты его изслѣдований выразились въ цѣломъ рядѣ географическихъ и геологическихъ открытій. Въ его статьяхъ объ экспураіяхъ 1879 г. встречаются также характеристики растительности и указанія отдѣльныхъ растеній.

10) **Казанскій** К. К., докторъ. Лѣтомъ 1891 г. проѣхалъ въ составѣ экспедиціи Туркестанскаго Генераль-Губернатора барона Вревскаго на Чаткаль и оттуда на Андижанъ и на Алай. Въ своей книжѣ д-ръ Казанскій дѣлаетъ некоторые указанія на растительность посѣщенныхъ имъ мѣстностей.

11) **Капю** Гильомъ (Guillot Capus), нынѣ—завѣдующій сельскимъ хозяйствомъ въ Индо-Китаѣ. Посѣтилъ Туркестанскій край вмѣстѣ съ Г. Бонвало неоднократно и во время своего длиннаго путешествія 1881 года собралъ довольно значительную ботаническія коллекціи, между прочимъ, и въ предѣлахъ нашей области. Въ юлѣ и началѣ августа (новаго стиля) Капю собирая около Ташкента, а затѣмъ 16-го августа и. с., вмѣстѣ съ Бонвало, отправился вверхъ по Чирчику и Искему до перевала Торнакъ-бель, а оттуда чрезъ перевалъ Куль-ашу въ долину Чаткала и далѣе чрезъ Афлатунскій перевалъ въ Фергану и прибылъ въ Наманганъ 8-го сентября. 17-го числа того же мѣсяца французские путешественники были уже снова въ Ташкентѣ.

12) **Каульбарсъ**, баронъ Александръ Васильевичъ (нынѣ генераль-отъ-кавалеріи, Командующій войсками Одесского Военного Округа). Совершилъ несколько путешествій по Тянъ-Шаню, изъ которыхъ главное относится къ 1869 году. Результаты изслѣдований барона А. В. Каульбарса опубликованы въ видѣ общаго очерка Тянъ-Шаня, что дѣлаетъ пользованіе ими весьма удобнымъ. Кромѣ

массы данныхъ общегеографического характера, мы находимъ тамъ множество чрезвычайно цѣнныхъ свѣдѣній о распространеніи лѣсовъ и отдельныхъ древесныхъ породъ. Маршрутъ бар. Каульбарса въ предѣлахъ нашей области проходитъ по такимъ мѣстамъ, которыхъ отчасти съ тѣхъ поръ и до настоящаго времени остались неизслѣдованными ближе. Баронъ Каульбарсъ обслѣдовалъ съверные склоны Ферганскаго хребта, Нарынъ до его выхода изъ горъ, долину рѣки Узунъ-ахмата, верховья р. Таласа и систему р. Сусамыръ.

13) Копманъ (Koortmann), нѣмецкій садовникъ, Garten-inspector, въ Новомъ Маргеланѣ, въ 1879 — 80 г.г. занимался разведеніемъ садовыхъ растений и обращалъ также вниманіе и на дикорастущую флору; преимущественно, однако, въ предѣловъ нашей области, на югѣ Ферганы, гдѣ, между прочимъ, вторично открылъ *Incarvillea Olgae*.

14) Коржинский Сергеѣ Ивановичъ, академикъ (скончался 18 ноября 1900 г.). Дважды посѣтилъ Туркестанъ. Въ 1895 году С. И. изслѣдовалъ растительность Закаспійской области, а затѣмъ посѣтилъ Фергану, гдѣ спачала прошелъ чрезъ Алайскій хребеть на Памиръ до озера Каракуль, а потомъ чрезъ г. Ошъ и Андижанъ вышелъ въ область Западнаго Тянъ-Шаня. Здѣсь С. И. изслѣдовалъ спачала южные склоны Ферганскаго хребта, проѣхалъ чрезъ Джелабадъ въ ур. Тарапъ-базаръ, къ перевалу Кугартъ, а затѣмъ въ сел. Червахъ и Арсланбобъ, гдѣ поднимался, между прочимъ, на вершину горы Баубашъ-ата; затѣмъ чрезъ пер. Кенколъ С. И. перенесъ въ долину р. Карасу и по ней до впаденія р. Каракуль, по которой поднялся до перевала, идущаго въ бассейнъ р. Майли. Оттуда С. И. спустился по р. Майли чрезъ кишлаки Испасканъ и Тода въ г. Наманганъ и Коканъ.

Въ 1897 г. изслѣдованія С. И. Коржинского не затронули нашей области.

15) Корольковъ Николай Ивановичъ, генералъ-лейтенантъ, Военный Губернаторъ Сырь-Даринской области. Съ начала 70-хъ годовъ ревностно занимается изслѣдованиемъ и собираниемъ Туркестанской флоры, въ особенности же растений красицвѣтущихъ. Въ 1872 г. собиралъ въ

(8)

горахъ Карагату, и по Чирчику: близъ Ходжакента, Бричъ-Муллы и Чимгана, а также на горахъ Акъ-тагъ-тау. Въ 1873 году участвовалъ въ трудномъ Хивинскомъ походѣ, откуда прислалъ превосходный гербарій, собранный вмѣстѣ съ I. И. Краузе. Часть этого гербарія собрана въ предѣлахъ нашей области (по пути отъ Ташкента до Сырь-Дары). Впослѣдствіи Н. И. собиралъ растенія въ Ферганѣ и бл. Ташкента.

16) Краузе Іеронимъ Ивановичъ, аптекарь въ гор. Ташкентѣ. Съ 1869 г. занимается собираниемъ туркестанскихъ растеній; главные сборы I. И. были бл. Ташкента, по горамъ въ верховьяхъ Чирчика, Арасана и Терса, затѣмъ — по р. Майли, Андиж. у. Во время работы Краузе это было еще независимое Кокандское ханство. Въ 1873 г. Краузе принялъ участіе въ Хивинскомъ походѣ. На конецъ, я имѣю въ своемъ гербаріи растеніе, собранное I. И. уже въ 1899 г. на горѣ Мадыгенъ, Кокандскаго уѣзда. Нельзя не пожалѣть, что значительная часть собранныхъ I. И. материаловъ остается неопубликованными и даже необработанными.

17) Кушакевичъ Аполлонъ Александровичъ. Покойный А. А. много лѣтъ служилъ въ Туркестанскомъ краѣ, будучи уѣзднымъ начальникомъ въ Ходжентѣ, Сергіополѣ, паконецъ, — въ Вѣриомъ, а потомъ состоялъ при Туркестанскомъ Генералъ-Губернаторѣ. Въ 1881 г. А. А. вышелъ въ отставку. Всюду А. А. ревностно собиралъ, вмѣстѣ съ своей супругой, Mariей Егоровной, пасынкомъ и растенія, которыя и жертвовалъ постоянно въ Императорскій Ботаническій садъ. Главнѣе сборы Кушакевича были въ центральномъ Тянъ-Шанѣ, и въ особенности на Памирѣ и Алай въ 1878 г., когда имъ былъ собранъ первый и чрезвычайно полный гербарій Памирской флоры. Въ нашей области А. А. собиралъ очень мало, имѣются лишь отдельные растенія, собранныя «близъ Ташкента», судя по этикеткамъ Туркестанскаго гербарія, иссаннымъ уже въ Петербургѣ. Оригинальные этикеты Кушакевича иногда позволяютъ, однако, установить ошибочность этихъ показаній (например, Андерсай въ Ходжентскомъ уѣздѣ).

18. Лейтнеръ собралъ нѣсколько растеній близъ Чимгана (въ 1881 г.).

(9)

19. Леоновъ Георгій Борисовичъ, горный инженеръ. Въ 1897 г. было командировано Туркестанскимъ отдѣломъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, совмѣстно съ моей экспедиціей въ Таласскій Алатау. Въ своемъ отчетѣ Г. Б. сообщаетъ иѣкоторыя данныя по флорѣ. Г. Б. Леоновъ изъ Ферганы прошелъ на Чаткаль, Пекемъ, Майданталь и Гуручкель, а, возвращаясь съ Ошгацка, Г. Б. прошелъ по среднему и нижнему течению р. Санталаша, а затѣмъ черезъ пер. Чапачъ въ Фергану.

20. Лидскій Семенъ Александровичъ, бывшій завѣдующій Ташкентскимъ Музеемъ и Публичной библиотекою — неоднократно экспериментировалъ въ Сырь-Даринской области и обращалъ при этомъ вниманіе и на растительность.

21. Лисневскій Василій Ивановичъ, лѣсничій. Въ концѣ 70-хъ и началѣ 80-хъ годовъ служилъ въ Ферганѣ, нынѣ — въ Ташкентѣ. Подробно осмотрѣлъ во время своихъ служебныхъ поѣздокъ горные лѣса болѣшей части Ферганской области и опубликовалъ часть своихъ наблюдений.

22. Литвиновъ Дмитрій Ивановичъ, Ученый Хранитель Ботаническаго Музея Императорской Академіи Наукъ. Въ 1899 г. совершилъ крайне интересное путешествіе по Западному Тянь-шаню. Начавъ съ окрестностей Андижана и южныхъ склоновъ Ферганскаго и Чаткальскаго хребтовъ, Д. И. подробно изучилъ растительность еловыхъ лѣсовъ Ферганы; затѣмъ черезъ перевалъ Афлатунъ Д. И. прошелъ въ долину Чаткала, спустился внизъ и далѣе по Чирчику прошелъ въ Ташкентъ.

23. Маевъ Николай Александровичъ, бывшій долгое время редакторомъ "Туркестанскихъ Вѣдомостей" (скончался въ С.-Петербургѣ 3 января 1896 г.). Н. А. неоднократно предпринималъ поѣздки въ разныя части Туркестана и собралъ при этомъ довольно значительный матеріалъ, отчасти и въ предѣлахъ нашей области. На этикетахъ Н. А. Маева, мы часто видимъ название "Каратай". Этимъ именемъ Н. А. называлъ также и горы къ С.-В. отъ Ташкента, т. е. Чимганъ, Акъ-тагъ-тай.

24. Масальскій князь Владиславъ Ивановичъ, членъ Ученаго Комитета Министерства Землемѣдѣлія и Государственныхъ Имуществоў, Ки. В. И. не разъ былъ командированъ въ

(10)

Туркестанъ для изученія различныхъ отраслей сельскаго хозяйства и для содѣйствія сельскому хозяйству края. Для насъ въ особенности интересны данные о распространеніи полыни, дающей цитварное сѣмя, и о культурѣ хлопчатника.

25. Мещерская княжна Ольга Николаевна, съ 1897 г. занимается собираниемъ корней, клубней, луковицъ въ горахъ бл. Чимгана и въ окрестностяхъ Ташкента, для опытовъ культуры въ Ботаническомъ Саду Московскаго Университета, а также въ Ольгинскомъ Саду Ол. Ал. Федченко.

26. Миддендорфъ Александръ Федоровичъ, академикъ (скончался 16 янв. 1894 г.). По приглашенію покойнаго Туркестанскаго Генераль-Губернатора, К. П. фонъ Кауфмана, въ 1878 г. А. Ф. поѣхалъ Туркестанскій край, преимущественно Фергану, для ознакомленія съ сельскимъ хозяйствомъ. Въ своей большой и прекрасной книгѣ А. Ф. подробно перечисляетъ и описываетъ всѣ растенія, имѣющія сельско-хозяйственное значеніе — посѣвныя, сорные, а также деревья и кустарники.

27. Муса — служитель Альберта Регеля, въ маѣ и юнѣ 1880 г. по порученію его собиралъ растенія въ горахъ по Ангрену, Чирчику и Терсу.

28. Наливкинъ Владимирий Петровичъ, помощникъ Военного Губернатора Ферганской области. Одинъ изъ лучшихъ знатоковъ Ферганы. Долго жилъ въ горахъ Наманганскаго уѣзда и подробно ознакомился съ характеромъ и распределеніемъ лѣсовъ. Изучалъ также растительность сыпучихъ песковъ Ферганы.

29. Никитинъ Федоръ Платоновичъ (Директоръ Лѣсного Департамента) во время своей служебной поѣздки въ Туркестанъ въ 1900 г. не только ознакомился подробно съ лѣсами Туркестана; но обратилъ вниманія также и на другія стороны народнаго хозяйства страны.

30. Оттендорфъ Германъ Германовичъ, старший запасный лѣсничій. Одинъ изъ лучшихъ знатоковъ древесной и культурной растительности Ферганы. Нѣкоторыя изъ его наблюдений опубликованы имъ въ его популярной книжкѣ.

31. Ошанинъ Василій Федоровичъ, директоръ женской гимназіи въ г. Ташкентѣ. Одинъ изъ лучшихъ знато-

(11)

ковъ Туркестана и въ то же время извѣстившій специа-  
листъ по Неміртера. Во время своихъ энтомологическихъ  
экскурсій В. Ф. всегда обращалъ внимание и на раститель-  
ность, благодаря чему мы имѣемъ въ его статьяхъ чрезвы-  
чайно цѣнныя указанія на характеръ растительности мно-  
гихъ мѣстностей.

32. Пухляковъ В.—собралъ иѣсколько растеній въ Таш-  
кентскомъ уѣздѣ въ 1892 г. (хранятся въ Императорскомъ  
Ботаническомъ Саду).

33. Пьяновская Юлія (урожденная Баженова), собирала  
лѣтомъ 1897 г. въ долинѣ Чимгана, причемъ поднималась  
до вершины г. Большой Чимганъ.

34. Раунеръ Станиславъ Юльевичъ (бывшій началь-  
никъ Управления земледѣлія Государственныхъ Имуществъ—  
въ Ташкентѣ, нынѣ вице-инспекторъ корпуса лѣсничихъ)—  
ознакомился подробно съ горными лѣсами Туркестана, а  
также содѣйствовалъ культурнымъ работамъ въ горныхъ  
склонахъ нашей области.

35. Регель Альбертъ Эдуардовичъ, докторъ, одинъ изъ  
главныхъ дѣятелей по изслѣдованию флоры Туркестана,  
съ 1876 по 1884 г. непрерывно собирая материалы,  
которые большей частью не обработаны и до сего вре-  
мени. Въ предыдущихъ нашей области А. Э. Регель про-  
шель по слѣдующимъ маршрутамъ.

Въ 1876 г. изъ Европейской Россіи А. Регель прибылъ  
въ г. Туркестанъ, оттуда сдѣлала интересную экскурсію въ  
горы Карагату и 1-го июня вступить въ нашу область, у-  
р. Бугури. Пріѣхавъ 21 июня въ г. Ташкентъ, А. Э. оттуда  
сдѣлала одну только экскурсію къ Чирчику на Куйлюкъ.  
6-го августа (1876 г.) А. Э. выступилъ изъ Ташкента вверхъ  
по Чирчику, 9—12 провелъ въ сел. Сайлыкъ, поднимаясь  
въ горы надъ Сайлыкомъ, 1-го авг. започевалъ въ Брич-  
муллѣ. Оттуда А. Э. пошелъ вверхъ по тѣснинѣ Чаткала,  
дѣлая по временамъ боковыя экскурсіи. 20-го А. Э. Регель  
былъ въ Идрисъ-пей-гамбарѣ, 22-го перевалилъ чрезъ Ка-  
рабуру на сѣверный склонъ Таласскаго Алатау. Дальше  
А. Э. пошелъ вверхъ по Таласу, а затѣмъ чрезъ перевалъ  
Кумбелъ (31-го августа) перешелъ на сѣверный склонъ Алек-  
сандровскаго хребта, 3-го сент. А. Э. былъ на почто-

(12)

вой дорогѣ и затѣмъ направился въ Токмакъ, Вѣрный и  
Кульджу.

Въ 1880 году А. Э. Регель снова экскурсируетъ въ  
нашей области. Выѣхавъ изъ Кульдиги 29 февраля, А. Э.  
18 марта прибылъ въ г. Ниипекъ. Далѣе онъ проѣхалъ,  
при страшной весенней распутицѣ, въ Ауліе-ата, Чимкентъ  
и Ташкентъ, куда и прибылъ 28 марта, успѣвъ собрать по  
дорогѣ иѣсколько интересныхъ весеннихъ растеній. Изъ  
Ташкента А. Э. удалось стѣзжиться въ Самаркандинъ. Выѣхавъ  
8 апрѣля, чрезъ ст. Уральскую, Джанбулакъ, мимо Моголь-  
тау (12—13 апр.), чрезъ Ходжентъ (14 апр.), Уратюбе и Зіа-  
минъ, А. Э. прибылъ въ Самаркандинъ, а вернулся въ Таш-  
кентъ, чрезъ Голодную степь, уже къ 23 апрѣля.

15 мая (1880 г.) А. Э. Регель снова выѣзжаетъ изъ  
Ташкента, направляясь въ Вѣрный и Кульджу, на этотъ  
разъ—черезъ Нарынскія горы<sup>1)</sup>. Чрезъ 2 дня А. Э. былъ въ  
Ходжентѣ, затѣмъ чрезъ Коканъ, Новыї Маргеланъ, Анди-  
жанъ (22—23 мая) А. Э. направляется къ Узгенту, но по  
пути заѣзжаетъ на одинъ день (25 мая) въ г. Ошъ. Изъ  
Узгента А. Э. направляется вверхъ по р. Яссы къ пере-  
валу того же имени, черезъ Ферганскій хребеть, 1-го июня  
переваливается и спускается вдоль рѣкъ Манагильды и Алабу-  
ги къ р. Нарыну, а затѣмъ поднимается по р. Нарыну до  
Нарынского форта. Оттуда А. Э. предпринимаетъ дальнѣй-  
шее путешествіе въ Вѣрный и Кульджу.

Въ 1881 г. А. Э. снова возвращается въ Ташкентъ, но  
изъ сборовъ его за этотъ годъ мы можемъ указать лишь на  
производившіяся имъ изслѣдованія по р. Чирчику (Сай-  
лыкъ, Паркусъ) и въ долинѣ Чимгана.

Весной 1882 г. (мартъ—апрѣль) А. Э. Регель снова  
экскурсируетъ въ нашей области, именно въ окрестностяхъ  
Ташкента, собирая весенняя растенія передъ своимъ отправ-  
ленiemъ въ Горную Бухару.

<sup>1)</sup> Я долженъ обратить вниманіе читателя на то обстоятельство,  
что маршрутъ этой поездки А. Э. Регеля отцомъ его, Э. Л. Реге-  
лемъ, нанесенъ на карту (см. Acta Horti Petropol. vol. VII). Совер-  
шено ошибочно: выходить будто А. Э. все времяѣхалъ вдоль  
рѣки Нарына, до поста того же имени, даже гдѣ вовсе нѣ никакихъ  
тропинокъ и вообще нельзѧ проѣхать!

(13)

36. Симоновъ А. (состоявший при начальнике города Ташкента) экскурсировалъ въ горахъ близъ Чимгана и опи- салъ свои экскурсіи (почти анонимно, подъ буквами А.С.). Позднѣеъ ѿзилъ въ Фергану и на Алай.

37. Скорняковъ Иванъ Ивановичъ, офицеръ Оренбург- скаго казачьяго войска. Скончался въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія. Былъ препараторомъ въ экспедиціяхъ А. П. Федченко и Н. А. Сѣверцова, и много лѣть своей жизни посвятилъ изслѣдованію Туркестана. Большая часть растеній, привезенныхъ экспедиціями Сѣверцова (1865—1868 гг.) была собрана именно Скорняковымъ. Онъ продол- жалъ сборы близъ Ходжента и позже (1876 г.?), а въ 1878 г. собираль растенія сначала также бл. Ходжента, затѣмъ бл. Чу- ста, у Испаскана, цо Майли, Караголу и, наконецъ, па Памирѣ.

38. Смирновъ Сергій Михайловичъ, помощникъ библиотекаря Казанскаго университета. Участвовалъ въ 1878 г. въ экспедиціи академика А. Ф. Миддендорфа и затѣмъ остался въ Ферганѣ. Много экскурсировалъ по горамъ на сѣверъ и югъ Ферганы, но ничего не опубликовалъ. Богатый гербарій С. М. хранится въ Казани и Императорскій Ботаническій Садъ въ С.-Петербургѣ, имѣть лишь нѣ- сколько отдельныхъ растеній изъ числа собранныхъ С. М. въ 1878—1879 годахъ.

39. Сорокинъ Николай Васильевичъ, заслуженный про- фессоръ Императорскаго Казацкаго университета. Посѣ- тилъ Тянь-шань и Фергану въ 1884 г., по порученію Степ- ного Генералъ Губернатора Г. А. Колпаковскаго. Маршрутъ Н. В. былъ чрезвычайно любопытенъ: начавъ съ Вѣриаго и Каракола (нынѣ—Прикальськъ), Н. В. прошелъ къ озеру Сонъ-куль, а оттуда въ дол. Сусамыра, затѣмъ на Кетмень- тюбе и въ г. Наманганъ. Собранныя растенія хранятся от- части въ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада въ С.-Петербургѣ.

40. Сѣверцовъ Николай Алексѣевичъ (скончался въ 1884 г.). Впервые проникъ въ нашу область въ 1864 г., вмѣстѣ съ отрядомъ ген. Черняева. Уже тогда Н. А. уда- лось проникнуть къ перевалу Карабура и спуститься даже внизъ по Чаткалу, а затѣмъ по предгорьямъ дойти до г. Чимкента.

Въ 1865—68 г.г. Сѣверцовъ стоять во главѣ особой „Туркестанской Ученой Экспедиціи“. Для нашей области имѣютъ особый интересъ экспедиціи Скорнякова и самого Сѣверцова въ Карагату, затѣмъ поездка къ верховьямъ Чирчика (т. е. къ сліянію Чаткала, Угама и Пскема — июнь 1866 г.). „Всего,—какъ говорить самъ Сѣверцовъ,—было со- брано около 2000 экземпляровъ растеній, а съ прежними—до 3000. Число видовъ, въ точности, мнѣ неизвѣстно, но пола- гаю, не менѣе 700“. Можно думать, что эти цифры нѣсколько преувеличены.

Въ 1878 г. Н. А. снова въ Туркестанѣ, въ качествѣ начальника Ферганской ученой экспедиціи. Онъ посѣтилъ, между прочимъ, долины Узунъ-ахмата и Сусамыръ, но мнѣ не удалось найти въ печати свѣдѣній о пребываніи Сѣвер- цова въ этихъ мѣстахъ. Послѣ того, Сѣверцовъ направился на Памиръ.

41. Федченко Алексѣй Павловичъ (скончался 3 сентя- бря 1873 г. на Монбланѣ)—въ качествѣ начальника Турке- станской Ученой Экспедиціи Императорскаго Общества Любите- лей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи 1868—71 г.г., руководилъ всѣми работами экспедиціи. Ботаническая часть лежала собственно на О. А. Федченко.

42. Федченко Ольга Александровна,—почетный членъ Императорскаго Общества Любителей Естествознанія—по по- рученію этого Общества приняла участіе въ экспедиціи А. П. Федченко, (1868—71 г.г.). Главнѣйшая часть изслѣдованій экспедиціи производилась виѣ предѣловъ нашей области: на Заравшанѣ, въ Кизыль-кумахъ, на Алаѣ. Мы могли, однако, воспользоваться чрезвычайно цѣннымъ материаломъ по ве- сенней флорѣ окрестностей г. Ташкента и затѣмъ, растені- ями, собранными отчасти между Сыръ-Дарьей и Ташкен- томъ, а также сборомъ въ 1871 г. па сѣверѣ Ферганы (тогда независимаго Кокандскаго ханства) по пути отъ Кара-Дарьи чрѣзъ Наманганъ, Чустъ и перевалъ Кендырь-даванъ.

43. Фетисовъ Алексѣй Михайловичъ, садовникъ въ гор. Шипекѣ (скончался 13 февраля 1894 г.). Предпринималъ съ 1877 по 1883 г. ежегодныя поездки по Тянь-шаню, Куль- джѣ, Джунгарскому Алатау съ цѣлью собирания растеній. Къ нашей области можно отнести лишь незначительную

часть его сборовъ: именно, 1879: апр.—май—съверный склонъ Александровскаго хребта, 1880: май—июнь; тамъ же; 1881—май, тамъ же; июнь—июль въ Сусамырскомъ хребтѣ и на пер. Терекъ на Узунахматъ; въ 1882: июнь—июль съверный склонъ Александровскаго хребта; въ 1883: Андикан. у. по р. Карасу.

Превосходные, чрезвычайно обильные сборы А. М. Фетисова хранятся въ Туркестанскомъ гербаріи Императорскаго СПб. Ботаническаго Сада.

44. **Филипповъ**, бывшій лѣсной обѣздчикъ въ Чимганѣ. Собиралъ немнога растенія во время поѣздокъ по своему участку, а также на г. Большой Чимганѣ.

45—46. **Финкельштейнъ** Николай Яковлевичъ и Надежда Яковлевна—собрали въ 1898 г. небольшой гербарій въ долинѣ Чирчика отъ Таишента до Ходжакента, въ Чимганѣ и Бричъ-муллѣ.

47. **Хомутовъ** Петръ Ивановичъ; помощникъ Военнаго Губернатора Сырь-Даринской области, собиралъ преимущественно весенний растенія въ г. Таишентѣ въ 1898—1900 г.г.

48. **Хомутова** Екатерина Львовна, супруга П. И. Хомутова, собрала превосходный материалъ для ближайшаго познанія флоры долины Чимгана, причемъ (въ 1902 г.) поднималась до вершины г. Большой Чимганъ для собирания высокогорныхъ растеній.

49. **Шахназаровъ** Ариакъ Исааковичъ, бывшій чиновникъ по сельско-хозяйственной и оброчнай частямъ при Управлениі Землемѣдія въ Туркестанскомъ краѣ. Занимался изслѣдованіемъ сельско-хозяйственныхъ растеній Туркестанскаго края.

50. **Яковлевъ** Иванъ, казакъ, участникъ моей экспедиціи 1902 года, былъ по временамъ посыпаемъ мною на боковыя экскурсіи для сбора растеній.

#### IV.

Одной изъ главнѣйшихъ цѣлей настоящаго труда является желаніе возможно полно и детально обработать материалы, собранные въ Западномъ Тянъ-Шанѣ О. А. Фед-

(16)

Р.с.

ченко и мною. При этомъ, разумѣется, приходилось постоянно справляться съ имѣющимися литературными данными и гербарнымъ материаломъ, часто совершенно недоступнымъ лицу постороннему. Желая, чтобы всѣ эти справки и изслѣдованія сдѣлались, по возможности, общимъ достояніемъ, я нашелъ полезнымъ въ настоящемъ труде дать возможно полный сводъ нашихъ свѣдѣній по флорѣ Западнаго Тянъ-Шаня, причемъ попутно во многихъ случаяхъ приходится опубликовывать здѣсь же и данные по флорѣ другихъ мѣстъ Туркестана. Разумѣется, при такой обработкѣ, и самые гербарные материалы, по скольку они принадлежатъ Императорскому Ботаническому Саду, постоянно приводятся въ состояніе удобное для пользованія и справокъ и для постороннихъ ученыхъ.

Я не считаю удобнымъ и возможнымъ, до полной обработки всѣхъ своихъ наблюдений и до подробнаго изученія всѣхъ уже имѣющихся материаловъ, дѣлать общій очеркъ растительности нашего района или начинать свой трудъ описаніемъ растительныхъ формаций области. Всѣ эти вопросы гораздо удобнѣе будетъ размотрѣть впослѣдствіи, когда въ нашихъ рукахъ будетъ подробный критическій перечень всего того, что растеть въ Западномъ Тянъ-Шанѣ.

Я не могу, однако, не сдѣлать иѣсколько предварительныхъ замѣчаній, которая очертятъ иѣсколько общій характеръ всего дальнѣйшаго, укажутъ на ту окраску, которую имѣть флора этой страны. Конечно, всѣ эти замѣчанія могутъ имѣть лишь предварительный характеръ, но они для меня выяснились съ первыхъ шаговъ моихъ изслѣдованій и каждый дальнѣйший шагъ въ этой работе все болѣе и болѣе ихъ подтверждается. Буду надѣяться, что и обработка всего материала не поколеблетъ тѣхъ положеній, которая я сейчасъ изложу. Я хочу намѣтить здѣсь совершение различные элементы флоры, которая составляютъ растительность Западнаго Тянъ-Шаня.

Наибольшій интересъ изъ различныхъ элементовъ представляютъ для меня два: во-первыхъ,—реликтовый и, во-вторыхъ,—юго-западный.

1) Именемъ реликтового элемента я называю всѣ тѣ растенія, которые или эндемичны въ нашей области, или же

(17)

110684

встрѣчаются еще мѣстами въ горныхъ хребтахъ Туркестана, по своимъ систематическимъ отношеніямъ представляютъ связь съ флорой другихъ виѣтропическихъ странъ сѣвернаго полушарія, гдѣ уцѣлѣли остатки тропическихъ флоръ, а по физиологическимъ особенностямъ мало гармонируютъ съ современными физико-географическими условіями. Существование подобной растительности въ Тянъ-Шанѣ было отмѣчено еще С. И. Коржинскимъ, но онъ не останавливается подробно на этомъ вопросѣ. Я перечислю здѣсь цѣлый рядъ подобныхъ растеній.

*Ranunculus tenuilobus* Rgl.

*Delphinium longipedunculatum* Rgl.

*Aconitum Napellus* L. v. *turkestanicum* B. Fedtsch.

*Aquilegia vulgaris* L. v. *Karelini* Baker.

*Berberis heteropoda* Schrenk.

*Megacarpaea laciniata* Rgl.

*Exochorda Korolkowi* Lavall.

*Abelia corymbosa* Rgl.

*Carum platycarpum* Lipsky (n. sp.).

*Seseli giganteum* Lipsky (n. sp.).

*Trigonotis Olgae* B. Fedtsch. (n. sp.).

*Korolkowia Sewerzowi* Rgl.

*Scilla puschkinioides* Rgl.

*Picea Schrenkiana* Fisch. et Mey.

*Abies Semenowi* B. Fedtsch.

2) Именемъ юго-западного элемента я называю гораздо болѣе многочисленную группу растительныхъ формъ, обычныхъ въ странахъ болѣе южныхъ, встрѣчающихся, рѣдко или часто, въ предѣлахъ нашей области, по преимуществу на югѣ и юго-западѣ ея, но не идущихъ далѣе къ сѣверу и востоку. Характеръ распространенія этихъ формъ въ Туркестанѣ вообще говорить за то, что центръ ихъ происхожденія — на югѣ и юго-западѣ и къ намъ пришли онѣ, тѣмъ или инымъ способомъ, недавно. Перечислимъ здѣсь нѣсколько представителей указанной группы растеній:

*Ranunculus arvensis* L.

“ *muricatus* L.

*Nigella integrifolia* Rgl.

*Delphinium persicum* Boiss.

*Delphinium barbatum* Bge.

“ *Batalini* Huth.

*Bongardia Chrysogonum* (L.) Boiss.

*Papaver dubium* L.

*Matthiola flavida* Boiss.

*Hedysarum plumosum* Boiss. et Hausskn.

*Trichodesma incanum* Bge.

Что касается прочихъ элементовъ флоры, то я позволю себѣ здѣсь лишь намѣтить слѣдующіе:

3) Арктическій, который играетъ, повидимому, значительно меньшую роль, чѣмъ та, которая отводилась ему нѣкоторыми изслѣдователями средне-азіатской флоры.

4) Космополитический — очень немногія растенія, общія сѣверному и южному полушаріямъ, таковы, наприм.:

*Nasturtium palustre* DC.

*Capsella bursa pastoris* (L.) Moench.

5) Сѣверный виѣтропническій — очень обширная группа видовъ, которую, вѣроятно, удастся подраздѣлить на нѣсколько.

6) Аralокаспійскій — или скорѣе монголокаспійскій — виды характерные для Туркестанскихъ пустынь и въ нашей области попадающіеся лишь по окраинамъ ея. Назовемъ:

*Leptaleum filifolium* Bge.

*Lachnoloma Lehmanni* Bge.

*Dodartia orientalis* L.

*Hulthemia berberifolia* (Pall.) Boiss.

*Haloxylon Ammodendron* (C. A. Mey) Bge.

Очень значительная группа видовъ, которые, по имѣющимся въ литературѣ данимъ, встрѣчаются исключительно въ предѣлахъ Русского Туркестана, на самомъ дѣлѣ идутъ до Монголіи.

Разумѣется, перечисленными категоріями не исчерпывается все разнообразіе нашей флоры. Повторю, я имѣль въ виду сдѣлать лишь предварительная замѣчанія.

## V.

Предпосылаю еще и несколько специальныхъ указаний относительно того, какъ составлена предлагаемый списокъ.

Я придерживаюсь иѣсколько измѣненной системы Декандоля, такъ какъ по этой системѣ расположены Туркестанскій и Русскій Гербарій Императорскаго Ботаническаго Сада. Принятие болѣе новой, Энглеровской системы вызвало бы значительныя практическія неудобства.

Въ номенклатурѣ родовъ и видовъ я слѣдую Берлинскимъ правиламъ, подобно тому, какъ я уже говорилъ объ этомъ въ другомъ мѣстѣ<sup>1)</sup>.

При всякомъ видовомъ названіи цитируется какъ тотъ авторъ, который впервые далъ это название, такъ и тотъ, который отнесъ этотъ видъ къ данному роду. Далѣе цитируются описанія данного вида—оригинальное описание авторовъ, затѣмъ три главнѣйшихъ флоры: Россіи (*Led., Fl. Ross.*), Востока (*Boiss., Fl. or.*) и Британской Индіи (*Hook. Fl. of br. Ind.*).

Далѣе, въ хронологическомъ порядке я привожу всѣ имѣющіяся въ литературѣ указанія данного вида для нашей области. Затѣмъ слѣдуетъ подробное перечисленіе всѣхъ мѣстоахожденій данного вида (въ предѣлахъ нашей области), причемъ вездѣ обозначено, къ мѣстѣ растеніе въ данномъ мѣстѣ собрано. Если я самъ собиралъ его въ указанномъ мѣстѣ, то стоить знакъ !!, если я только видѣлъ въ гербаріи экземпляры, собранные другими, то стоить знакъ !; наконецъ, если я въ гербаріи экземпляровъ не видѣлъ, стоять буквы п. в. (non vidi). Мѣстоахожденія сгруппированы въ XI районовъ.

Ниже перечислены XI районовъ икоимъ образомъ не имѣютъ претензіи быть вполнѣ опредѣленными флористическими областями. Нѣть сомнѣнія, что по окончательной разработкѣ всего матеріала придется установить иѣсколько иныхъ подраздѣленія территоріи нашей флоры. Моей

<sup>1)</sup> Б. А. Федченко, Обзоръ видовъ рода *Hedysarum* („Acta Horti Petropol.“ XIX. стр. 188).

задачей было лишь раздѣлить область на известное число районовъ, чтобы имѣть хоть какое-нибудь основаніе для группировки мѣстоахожденій. Устанавливая свои XI районовъ, я прежде всего руководствовался расположениемъ бассейновъ рѣкъ, проводя границы по водораздѣламъ. При всей своей искусственности, такой приемъ представляется довольно значительныя удобства прежде всего своей определенностью. Наконецъ, часто собиратель на этикеткѣ только и обозначаетъ имя рѣки, ручья, въ бассейнѣ (напр., въ верховьяхъ) котораго известное растеніе собрано, не дѣлая никакихъ иныхъ указаний. Вмѣстѣ съ тѣмъ, многіе изъ нашихъ XI районовъ представляютъ и достаточно характерныя отличительныя черты по своей растительности.

I. Бассейнъ р. Чу, начиная отъ уровня аракаспійской пустыни и далѣе къ югу, предгорья, полоса арчевыхъ рощъ и, наконецъ, альпійская зона Александровскаго хребта. Растительность степной полосы и предгорій имѣеть въ своемъ составѣ здѣсь иѣсколько сѣверныхъ, Джунгарскихъ формъ, которыхъ мы не увидимъ въ болѣе южныхъ частяхъ нашей области.

II. Бассейнъ р. Таласа, начиная съ той узкой малоизвестной щели, изъ которой Таласъ выходитъ, и кончая пустынными берегами озера Бійли-куля. Съ сѣвера и съ юга этотъ районъ ограниченъ высокими горами, поднимающимися выше границы альпійской зоны; южный хребетъ (Таласскій Алатау) богатъ сиѣгами. На сѣверномъ склонѣ этого хребта есть въ пѣкоторыхъ ущельяхъ остатки еловово-шихтовыхъ лѣсовъ.

III. Бассейнъ р. Арысъ, Бородай, Бугунъ и вообще склоны предгорій Карагату и западныхъ оконечностей Таласскаго Алатау; окрестности г. Чимкента. Начинаясь отъ границъ пустыни, этотъ районъ поднимается высоко къ спѣговымъ вершинамъ Таласскаго Алатау. Растительность его мало изслѣдована. Повидимому, здѣсь нѣть ни словныхъ, ни орѣховыхъ лѣсовъ.

IV. Система рѣкъ Чирчикъ. Сюда входитъ прежде всего чрезвычайно расчлененная горная страна—долины рѣкъ Майдантала, Санталаша, Ойганика, Чаткала, Іскема, составляющихъ рѣку Чирчикъ; затѣмъ среднее и нижнее теченіе

Чирчик по предгорьямъ и равнинѣ, гдѣ, однако, еще иѣть настоящей пустыни.

Растительность этого района чрезвычайно любопытна и, въ то же время, здѣсь можно наблюдать очень рѣзкія вліянія измѣненій климата въ недавнія геологическія эпохи въ сторону чрезвычайного усыханія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по-вѣніиа наблюденія надъ ледниками говорятъ какъ будто въ пользу того предположенія, что въ послѣднее время наблюдалась вновь иѣкоторое увеличеніе влажности (осадковъ и ледниковъ). Здѣсь имѣются остатки орѣховыхъ лѣсовъ, есть въ очень немногихъ мѣстахъ, нанесенныхъ мною на карту, остатки словоныхъ лѣсовъ и даже немногія пихты.

V. Бассейнъ р. Ангренъ, о которомъ имѣются лишь отрывочныя свѣдѣнія. Въ верховьяхъ его—альпійская растительность.

VI. Горы и холмы Моголь-тау и, вообще, правый берегъ рѣки Сырь-Дары близъ Ходжента. Выдѣляемъ эту мѣстность въ особый районъ, такъ какъ растительность представляеть здѣсь не мало особенностей; есть цѣлый рядъ формъ, которыя встрѣчаются исключительно здѣсь.

VII. Горы и предгорья Наманганскаго уѣзда, т. е. бассейнъ правыхъ притоковъ р. Сырь-Дары ниже р. Узунъ-ахматъ. Этотъ районъ—одинъ изъ красивѣйшихъ уголковъ Туркестана и по растительности своей представляеть не мало интереснаго. Здѣсь широко распространены реликтовые орѣховые и словоноихтовые лѣса съ оригиналной ихъ растительностью. Здѣсь встрѣчаются не мало формъ, которыхъ напрасно стали бы искать на сѣверныхъ склонахъ нашихъ горъ, въ районахъ I и II-мъ.

VIII. Долина р. Узунъ-ахматъ—очень мало известная мѣстность; значительная абсолютная высота долины этой позволяетъ тамъ существовать лишь растительности альпійской и хвойной зоны. Въ низовьяхъ Узунъ-ахмата есть однако и зимовки (Кетмень-Тюбе).

IX. Бассейнъ р. Сусамыръ и его притоковъ также лежить на довольно значительной высотѣ. Впрочемъ, тутъ также есть уже и зимовки киргизскія.

X. Бассейнъ р. Алабуги, вообще, лѣвые притоки Нарына до впаденія съ (правой стороны) Узунъ-ахмата.

XI. Айдиканскій районъ: предгорья и южный склонъ Ферганскаго хребта, до водораздѣла.

Послѣ перечисленія мѣстонахожденій, я дѣлаю иногда критическая замѣчанія о систематическомъ достоинствѣ данной формы, о степени ея распространенности по данной области. Затѣмъ приводятся указанія о распространеніи данного вида въ предѣлахъ Русскаго Туркестана, причемъ для большей наглядности я группирую всѣ мѣстонахожденія по четыремъ районамъ, которые и обозначаю по отношенію къ нашей области:

Сѣвернымъ (N).

Восточнымъ (O).

Южнымъ (S).

Западнымъ (W).

Такимъ образомъ, съ полной наглядностью выступаетъ распределеніе данного вида въ предѣлахъ Туркестана и возможное происхожденіе его въ нашей области. Большая часть показаній, приводимыхъ мною въ этомъ отдѣлѣ моей книги, привѣренна по даннымъ гербарія Императорскаго Ботаническаго Сада и значительная часть этихъ показаній не была до сихъ поръ опубликована и самыя растенія хранились въ числѣ не разобранныхъ „материаловъ“.

Далѣе слѣдуетъ указаніе распространенія данного вида въ Туркестанѣ. Въ концѣ каждого рода я перечисляю виды, известные изъ Туркестана, но не найденные въ нашей области.

С.-Петербургъ  
Императорскій Ботаническій Садъ  
9 декабря 1902 г.

Перечень литературы по флорѣ Западнаго  
Тянь-Шаня \*).

Б. (В.).

1. Бродовскій М. И. Каталогъ отдѣла полеводства и сельской промышленности Туркестанской выставки 1890 г. Ташкентъ, 1890 г.

Весьма полная характеристика сельско-хозяйственной культуры края. Относительно многихъ растеній съ достовѣрностью не известно, разводятся ли они и въ предѣлахъ нашей области, или только южнѣе—въ Самаркандѣ, Маргеланѣ. Я цитирую изъ названной брошюры однако и такія не полныя указанія, такъ какъ нѣть сомнѣнія, почти всѣ эти растенія могутъ быть культивируены въ нашей области.

2. Бродовскій М. И., Ивановъ Д. Л., Краузе И. И., Федченко А. П. и Федченко О. А. Каталогъ Туркестанского Отдѣла Политехнической выставки. 76 стр. in 4<sup>o</sup>; Москва, 1872 г.

Встрѣчается множество указаний по Туркестанской флорѣ, но обыкновенно безъ ближайшихъ указаний мѣстонахожденій. (*Липскій*, Фл. Ср. Аз., № 312 не правильно отнесенъ сначала къ *анонимныи*мъ произведеніямъ, что и исправлено въ *Addenda*; пропущено однако Липскимъ въ заголовокъ этой книги имя *O. A. Федченко*).

3. Bunge A. Hypogomphia, eine neue Labiatengattung aus Taschkent (Bull. de l'Académie Impériale des Sciences de St. Petersbourg. XVIII, p. 28—30). 1872.

\* Работы здѣсь перечислены въ алфавитномъ порядкѣ, причемъ при тѣхъ, которыхъ указаны въ книгѣ *B. Н. Липскаго*, Флора Средн. Азіи I, указана ссылка на эту книгу.

Описаніе новаго рода съ однимъ видомъ, открытаго въ окр. Ташкента. (*Липскій*, Фл. Ср. Аз., № 34).

4. Bunge A. Species generis Oxytropis (Mémoires de l'Academie Impériale des Sciences de St. Petersbourg. VII Série, t. XXII, № 1). 1874.

Полная монографія рода *Oxytropis*. Описывается много новыхъ видовъ; около 5 видовъ указывается для нашей области. (*Липскій*, Фл. Ср. Аз., № 36).

5. Бунге А. Астрагаловая (Astragaleae)—выпускъ 15-й издания: Путешествие въ Туркестанъ А. П. Федченко („Извѣстія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи“, т. XVI. в. 2). Спб. и Москва, 1880 г.

Подробная обработка всѣхъ Туркестанскихъ Астрагаловыхъ (роды *Oxytropis* и *Astragalus*). Для нашей области указывается до 50 видовъ. (*Липскій*, Фл. Ср. Аз., № 39).

6. Bunge A. Supplementum ad Astragaleas Turkestaniae („Acta Horti Petropolitani“ VII 363—380). Petropoli, 1880.

Для нашей области указывается 5—6 видовъ. Работа представляетъ дополненіе къ предыдущей. (*Липскій*, Фл. Ср. Аз., № 48).

7. Буняковскій А. В. Замѣтка о растительности Чирчикской долины и свѣдѣнія о географическихъ изслѣдованіяхъ въ Тянь-шанѣ лѣтомъ 1869 г. (Изъ письма къ секретарю Географического Общества, изъ Ташкента, 18 декабря 1869 года. „Извѣстія И. Р. Г. О., VI. 1870 г., Отд. II, стр. 113—115).

Краткія свѣдѣнія о характерѣ растительности и расположении отдельныхъ видовъ древесныхъ и кустарниковыхъ растеній. (*Липскій*, Фл. Ср. Аз., № 44).

В. (W.).

8. Winkler C. Decas compositarum novarum Turkestaniae nec non Buchariae incolarum („Acta Horti Petropolitani“ IX. fasc. II, p. 417 — 228). 1886. — Тоже, отдельные оттиски — 1885 года.

Въ этомъ (первомъ) выпускѣ серии „Decades“ изъ нашей области описанъ 1 видъ. (*Липскій*, Фл. Ср. Аз., № 45).

9. Winkler C. Decas tertia.... („Acta Horti Petropolitani“ X. fasc. I, p. 83—94). 1887.—Отд. отт. 1886 г.

Здесь изъ нашей области описанъ 1 видъ. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 47).

10. Winkler C. Decas quinta... („Acta Horti Petropolitani“ X. fasc. II, p. 465—479). 1888.

Здесь для настъ 2 вида. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 48).

II. Winkler C. Decas octava.... („Acta Horti Petropolitani“ XI. fasc. II, p. 315—326). 1892.—Но отдельные оттиски выпили въ 1890 г.

Для настъ здесь 2 вида. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 52).

12. Winkler C. De Canceriniae Kar. et Kir. genere („Acta Horti Petropol.“ vol. XII, № 2. p. 23—30). 1892.

Для нашей области указывается 1 видъ. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 56).

13. Winkler C. Synopsis specierum generis Cousinia Cass. („Acta Horti Petrop.“ XII. № 7. p. 181—286). 1893.—Но отдельные оттиски выпили въ 1892 г.

Для нашей области указывается 24 вида Cousinia. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 60).

14. Winkler C. Mantissa Synopsis Specierum generis Cousinia Cass. („Acta Horti Petropol.“ XIV. № 9. p. 187—243). 1897.

Дополнение къ предыдущей работе. Для нашей области приводится 6 видовъ. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 61).

## Г. (G. H.).

15. Гейеръ И. И. Отъ Ташкента до Гавы. Ташкентъ (1895). Стр. 1—136. Ц. 60 коп. (Изъ „Туркестанскихъ Вѣдомостей“ 1894—95 гг.).

Авторъ проѣхалъ изъ Ташкента въ Ходжентъ, Уратобе, Новый Маргеланъ и горные лѣса Андижанскаго уѣзда до Гавы; въ книжкѣ указывается для нашей области до 20 видовъ древесныхъ и культурныхъ растений.

16. Гейеръ И. И. Туркестанская скитанія. Ташкентъ 1899—I. Ташкентъ—Туркестанъ; Десять дней на Майданталь (изъ „Туркестанскихъ Вѣдомостей“ 1897—98 гг.).

Описание поѣздки въ г. Чимкентъ, г. Туркестанъ и Казалинскъ, а также къ ледникамъ Майдантала (совмѣстно съ Б. А. Федченко въ 1897 г.). Приводятся указанія около 35 видовъ растеній для нашей области.

17. Henry L. Crataegus Korolkowi, pinnatifida et pentagyna; avec 1 pl. color. („Revue Horticole“ p. 308—311). 1901 г.

Описывается новый видъ боярышника

8. Herder F. ab—, Plantae Severzovianae et Borszcovianae (Supplementum ad enumerationem plantarum in regionibus Cis—et Transiliensibus a cl. Semenovio anno 1857 collectarum). Fasciculus secundus. („Bulletin de la Societé Impériale des Naturalistes de Moscou“, 1870, № 3, p. 263—269).

Имѣются указанія и для нашей области. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 65).

19. Herder F. ab—, Plantae Severzovianae et Borszcovianae (Supplementum etc.). Fasciculus tertius („Bulletin de la Societé Impériale des Naturalistes de Moscou“, 1872, fasc. 2, p. 356—381).

Имѣются указанія и для нашей области. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 65).

20. Herder F. ab—, Lobeliaceae, Campanulaceae, Siphonandraceae, Rhodoraceae, Hypopityaceae, Lentibulariaceae, Primulaceae, Oleaceae, Asclepiadaceae, Gentianaceae, Polemoniaceae, Convolvulaceae, Cuscuteae, Boraginaceae, Hydroleaceae, Solanaceae et Serophularineae a Dr. G. Radde annis 1855—59 in Sibiria orientali collectae („Acta Horti Petropolitani“ I, p. 285—586). 1872.

Два отрывочныхъ указания для нашей области.

21. Herder F. ab—, Emendanda ad plantas Severzovianas et Borszcovianas („Bulletin de la Societé Impériale des Naturalistes de Moscou“, 1878, fasc. 2, p. 395—6).

Поправки къ прежнимъ выпускамъ, отчасти касающіяся и нашей области. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 65).

22. Herder F. ab—, Labiateae, Plumbagineae et Plantagineae a cl. Dr. G. Radde annis 1855—59 in Sibiria orientali collectae. Plantae Raddeanae Monopetalae, bearbeitet von Ferd. v. Herder. („Acta Horti Petropolitani“ X, p. 3—82). 1887.

Три отрывочныхъ указания для нашей области.

**23.** Herder F. ab—, Plantae Raddeanae apetalae. I. („Acta Horti Petropolitani“, X, p. 581—627). 1889.

Три отрывочныхъ указаний.

**24.** Herder F. ab—, Plantae Raddeanae apetalae. II. („Acta Horti Petropolitani“, XI, p. 184—274). 1892; отд. оттиски 1890 г.

Однинадцать указаний.

**25.** Herder F. ab—, Plantae Raddeanae apetalae. III. („Acta Horti Petropolitani“, XI, p. 341 — 368). 1892; отд. оттиски 1891 г.

Три указания.

**26.** Herder F. ab—, Plantae Raddeanae apetalae. IV. („Acta Horti Petropolitani“, XI, p. 395 — 470). 1892; отд. оттиски 1891 г.

Шесть указаний.

**27.** Herder F. ab—, Plantae Raddeanae apetalae. V. („Acta Horti Petropolitani“, XII, p. 33—132). 1892.

Указано пять видовъ.

**28.** Golenkin M. Verzeichniss der Arten der Gattung Acanthophyllum C. A. M. („Acta Horti Petropolitani“, XIII, № 6, p. 77—87). 1893.

Перечень всѣхъ видовъ рода Acanthophyllum. Для нашей области приведено 2 вида. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 68).

**29.** Huth E., Monographie der Gattung Delphinium (Engler's Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. XX. Bd. p. 322 — 499). Leipzig, 1895.

Для нашей области указано 11 видовъ. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 323).

## Д.

**30.** Дейша К. Замѣтки по лѣсоводству. („Туркестанскія Вѣдомости“ 1896 г., №№ 61 и 63).

Краткое описание лѣсныхъ деревьевъ Туркестанского края. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 77).

(28)

## И.

**31.** Ивановъ А. О лѣсахъ въ долинахъ рѣкъ Чирчика и Пекема. („Туркестанскія Вѣдомости“ 1872 г., № 50).

Весьма полезная свѣдѣнія о характерѣ лѣсовъ по долинамъ названныхъ рѣкъ. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 84).

**32.** Ивановъ Д. Л. Поѣздка въ Алатау въ 1879 г. („Туркестанскія Вѣдомости“ 1880 г., № 8, 10, 13, 14 и 16).

Живое описание хода экспедиціи. Мѣстами указывается общий характеръ флоры и отдельные растенія.

## К. (С.).

**33.** Казанскій К. К. Вблизи Памировъ. Ташкентъ, 1895 г. Издание второе, дополненное (изъ „Туркестанскихъ Вѣдомостей“).

Для нашей области указано до двухъ десятковъ видовъ растеній.

**34.** Калмыковъ А. И. Сельско-хозяйственная культура Ташкентскаго уѣзда. (Материалы по изученію Русскихъ почвъ). Вып. 9, стр. 41—67. 1895.

Составлено преимущественно по собственнымъ наблюденіямъ автора.

**35.** Capus G. Indications sur le climat et la vѣg tation du Turk stan. („Annales des Sciences Naturelles“. Botanique. VII. S r. T. XV, p. 129—213). 1883.

Приводятся указания до 20 видовъ растеній. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 85).

**36.** Capus G. Sur les plantes cultiv es qu'on trouve   l' tat sauvage dans le Ti n-Sch n („Annales des Sciences naturelles“. Botanique. S r. VII, t. XVIII, p. 278—292). 1884.

(Липсій, Фл. Ср. Аз., № 86).

**37.** Capus G. A travers le royaume de Tamerlan. Paris. 1892.

Очень краткое описание поѣздки изъ Ташкента весной на югъ, а затѣмъ въ августѣ — къ Ториакъ-белю, на Чаткаль и чрезъ Афлатунъ въ Фергану.

**38.** Каульбарсъ А. В., баронъ. Материалы по географии

(29)

Тянь-шаня, собранные во время путешествия 1869 г. („Записки Императорского Русского Географического Общества по Общай Географии“. Томъ пятый. Стр. 253—539). Спб. 1875 г.

Подробное описание всего Тянь-шаня. Чрезвычайно цѣнныя данные о распределеніи лѣсовъ. Указывается для нашей области 13 видовъ растений, преимущественно — деревья.

39. Кирѣевскій И. Флора нашихъ среднеазіатскихъ владѣній по алфавитному порядку туземныхъ названий растений. Спб. 1874 г.

Для нашей области указывается свыше десяти видовъ. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 96).

40. Комаровъ В. Материалы по флорѣ Туркестанскаго нагорья. Бассейнъ Заравшана. („Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Спб. Университетѣ“. XXVI томъ, стр. 30—162). 1896 г.

Приводятся указания и для нашей области, по даннымъ гербарія Императорскаго Ботаническаго Сада. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 99).

41. Коорманн С. Mitteilungen aus Mittelasien. Nach Angaben des Oberst Korolkow („Monatsschrift des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlichen Preussischen Staaten“. XXII. Jahrg. 1872, p. 189—195, 233—238).

Этой работы я не видѣлъ. Судя по реферату Липскаго, въ ней цѣнныхъ свѣдѣній не заключается. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 101).

42. Коорманн. Fergana's Baum- und Strauchvegetation (Deutscher Garten. 1881, p. 289—293).

Приводится довольно много видовъ, но для нашей области лишь 2—3.

43. Копманъ. Древесная и кустарная растительность Ферганской области („Вѣстникъ Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства“. 1881 г., стр. 201—207).

Переводъ предыдущей статьи. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 102).

44. Коржинскій С. Очерки растительности Туркестана I—III. („Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences à St. Pétersbourg“. VIII-me Sér. T. IV. № 4). Спб. 1896.

(30)

Превосходное описание растительности юго-восточной части нашей области. Приводится до ста видовъ (много культурныхъ). (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 103).

45. Korshinsky S. Fragmenta Flora Turkestaniae. Plantae novae vel minus cognitae Turkestaniae describuntur. I. („Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg“. V. Sér. t. IX. № 5, p. 399—424). Decembre 1898.

Для нашей области приводится всего 3 вида. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 104).

46. Коржинскій С. Замѣтка объ Abies Semenowi Fedcz. („Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg“. V. Sér. t. XII. № 4. Arr. 1900, p. 311—313).

47. Краузе И. И. О медицинскихъ и иѣкоторыхъ промышленныхъ растеніяхъ въ Средней Азіи. („Туркестанская Вѣдомости“ 1871 г., № 25).

Тоже, что и слѣдующая статья. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 114).

48. Краузе И. И. Замѣтка о медицинскихъ и иѣкоторыхъ промышленныхъ растеніяхъ въ Средней Азіи. („Русский Туркестанъ“. Сборникъ, изданный по поводу Политехнической выставки. Вып. II-й, стр. 262—272).

Приводятся для нашей области около 45 видовъ. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 115).

49. Кузнецовъ Н. И. Подродъ Eugentiana рода Gentiana. („Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Спб. Университетѣ“. Т. XXIV, 1—531). Спб. 1894 г.

Полная монографія подрода. Для нашей области указано 3—4 вида. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 119).

50. Kusnezow N. Subgenus Eugentiana Kusn. generis Gentiana Tourn. („Acta Horti Petropolitani“, XV, fasc. 1—2, p. 1—320). 1896—1898, continuabitur.

Переводъ предыдущей работы съ небольшими измѣненіями. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 120).

51. Кушелевскій В. И. Материалы для медицинской географии и санитарного описанія Ферганской области. Т. I—III. Новый Маргеланъ, 1890—1.

Растительность Фергана описывается по печатнымъ источникамъ..

(31)

52. Küenthal G. Auffzählung der von Herrn Dr. V. F. Brotherus im Jahre 1896 in Turkestan gesammelten Cyperaceen („Botanisches Centralblatt“, Bd. LXXV, p. 107 — 109). 1898.

Для нашей области 1 видъ. (*Липский*, Фл. Ср. Аз., № 123).

### Л. (L.).

53. Леоновъ Г. Б. Ледники въ Таласскомъ Алатау („Извѣстія Туркестанского Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества“, т. I, стр. 35 — 59). Ташкентъ, 1898 г.

Приводится 8 видовъ растений.

54. Липский С. А. Горныя окрестности Ташкента („Туркестанская Вѣдомость“ 1897 г. № 48).

Интересное описание природы горъ къ С.-В. оть Ташкента. Приводится около 20 видовъ растений. (*Липский*, Фл. Ср. Аз., № 131).

55. Lipsky W. Revisio generis Aphanopleura (Umbelliferae) („Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg“. T. IV. № 4). Avr. 1896.

Для нашей области 1 видъ. (*Липский*, Фл. Ср. Аз., № 133).

56. Lipsky W. Valerianellae Turkestanicae („Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg“. T. IV. № 4. p. 383—387). Avr. 1896.

Для нашей области 5 видовъ. (*Липский*, Фл. Ср. Аз., № 134).

57. Липский В. И. Материалы для флоры Средней Азии I („Acta Horti Petropolitani“ XVIII, p. 1—146). 1900.

Для нашей области приводится 10 видовъ. (*Липский*, Фл. Ср. Аз., № 136).

58. Липский В. И. Флора Средней Азии, т. е. Русскаго Туркестана и ханствъ Бухары и Хивы. Часть I. Литература по флорѣ Средней Азии. („Труды Тифлисскаго Ботаническаго Сада“ VII в. 1). 1902. и отд. оттиски. Часть II.

Перечень литературы съ изложениемъ содержания многихъ статей. Всего приведено 333 №№, изъ нихъ значительная часть касается и нашей области.

59. Лисневскій В. И. Горные лѣса Ферганской области (Приложение къ вып. 8 и 9 Лѣсного журнала. Стр. 1—74). Спб. 1885 г.

Весьма цѣнныя указанія на распределеніе деревьевъ и кустарниковъ Фергана. Для нашей области около 75 видовъ. (*Липский*, Фл. Ср. Аз. № 138).

60. Litwinow D. Florae Turkestanicae fragmenta. I. №№ 1—11. (Оттиски изъ „Трудовъ Ботаническаго Музея Императорской Академіи Наукъ въ Спб.“). 1902.

Для нашей области 4 вида. (*Липский*, Фл. Ср. Аз., № 140).

### М.

61. Маевъ Н. Туркестанская выставка 1900 г. Путеводитель по выставкамъ и ся отдѣламъ. Ташкентъ, 1890. Цѣна 30 коп.

Очеркъ природы и сельского хозяйства страны.

62. Маевъ Н. Сельскохозяйственная выставка въ Ташкентѣ 24—26 сентября. Ташкентъ, 1892 г. (Изъ „Туркестанскихъ Вѣдомостей“ за 1892 г.).

63. Масальскій В. И. кн. О саитониной промышленности въ Туркестанѣ („Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества“ 1897 г., стр. 403—410).

Приводятся подробности объ Artemisia Cina Berg.

64. Middendorf A. v., Einblicke in das Ferghana-Thal. („Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg“. VII Sér. T. XXIX № 1). 1881.

Для нашей области приводится около 80 видовъ.

65. Middendorff Max. v., Kurzgefasster Auszug aus Reisebriefen geschrieben während einer Rundreise aus Orenburg (über Taschkent und Tschinas) durch das Ferghana Thal (das fr黨ere Kokand) in Bulletin de la Societ   Imp  riale des Naturalistes de Moscou, 1878 № 3 p. 217—237.

Для нашей области указано около 15 видовъ растений.

66. Meinshausen K. Die Cyperaceen der Flora Russlands („Acta Horti Petropolitani“ XVIII p. 221—415). 1900.

Для нашей области приводится нѣсколько видовъ. (*Липский*, Фл. Ср. Аз., № 145).

## Н.

67. Наливкинъ В. П. Замѣтки по вопросу о лѣсномъ хозяйствѣ въ Туркестанѣ („Туркестанская Вѣдомость“ 1883, № 16—20).

Указания о лѣсопользовании въ Наманганскихъ и Чустскихъ горахъ. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 149).

68. Никитинъ Ф. П. Лѣсное дѣло въ Туркестанскомъ краѣ (изъ отчета по поѣздкѣ Директора Лѣсного Департамента въ Туркестанѣ)—„Извѣстія Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ“, 1901 г., № 18.

Краткая характеристика лѣсовъ Туркестана.

## О.

69. Оттендорфъ Г. Практическія указанія по садоводству въ примѣненіи къ Ферганской долинѣ. Спб. 1900, г. Стр. 1—103.

Указано 5 видовъ изъ Наманганскихъ горъ. Любопытныя данныя о садовыхъ деревьяхъ и кустарникахъ не касаются нашей области.

70. Ошанинъ В. Материалы для фауны полужестокрылыхъ Туркестана („Записки Туркестанского Отдѣла Императорского Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи“, т. I, в. 1). Стр. 99—163. Ташкентъ, 1879. Такоже отдѣльные оттиски.

Въ этой статьѣ для ботаника имѣть значение интересный перечень различныхъ мѣстностей Туркестана съ краткимъ указаніемъ ихъ растительности.

71. Пачоскій И. Флора Пойысся и прилежащихъ странъ („Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Спб. Университетѣ“, т. XXVII, стр. 24.). Спб. 1897.

Случайное указаніе на одинъ видъ изъ окрестностей Ташкента.

72. Петунниковъ А. *Abies Semenowii* Fedcz. („Труды Ботаническаго Сада при Императорскомъ Юрьевскомъ Университетѣ“, т. I, в. 2, стр. 60—63) 12. окт. 1901 г.

Замѣчаніе объ анатомическомъ строеніи Тянь-шаньской пихты и признаніе ея анатомической разновидностью Сибирской.

## Р. (R.).

73. Раунерь С. Ю. Горные лѣса Туркестана. Спб. 1901 г. Съ 5 фотографіями. Цѣна 2 р.

Краткое описание горныхъ лѣсовъ и лѣсокультурныхъ работъ, производящихся въ предгорьяхъ Тянь-шаня.

74. Regel A. Personalnachrichten („Gartenflora“ 1876, p. 319—320).

Первая свѣдѣнія о путешествіяхъ и изслѣдованіяхъ Альберта Регеля въ Туркестанѣ; встречаются иѣкоторыя ботаническія данныя.

75. Регель А. Садоводство въ Ташкентѣ („Туркестанская Вѣдомость“, 1876 г., № 33—34).

Множество цѣнныхъ указаний.

76. Регель А. Ботаническая экспедиція въ горы Карагату („Туркестанская Вѣдомость“ 1876 г., № 31).

Описание растительности горъ Карагату со множествомъ фактическихъ данныхъ; та же статья на иѣменскомъ языке—см. № 77 (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 202).

77. Regel A. Reisebriefe VI—X („Bulletin de la Societé Impériale des Naturalistes de Moscou“ 1877, fasc. 2, p. 350—368).

Описание растительности склоновъ горъ Карагату и пути къ Ташкенту (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 201).

78. Regel A. Aus Turkestan. („Gartenflora“ 1877 p. 6—17).

Описание пути отъ Ташкента въ Вѣрий чрезъ перевалы Карабуру и Кумбель. Для нашей области приводится около 85 видовъ. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 203).

79. Регель А. Ботаническая экспедиція отъ Ташкента до Кульджи („Туркестанская Вѣдомость“ 1878 г., № 10—13).

Множество ботаническихъ данныхъ; та же статья по иѣменски—смотри № 80 (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 207).

80. Regel A. Reisebriefe XI—XVI („Bulletin de la Societé Impériale des Naturalistes de Moscou“, 1878, fasc. 2, p. 165—205).

Описание пути отъ Карагату до Ташкента и оттуда чрезъ пер. Карабуру къ Пиньеку. Множество ботаническихъ данныхъ. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 201).

81. Regel A. Reisebriefe XVII seq. („Bulletin de la Societé Impériale des Naturalistes de Moscou“, 1879, fasc. 1, p. 124—149).

Описание пути вдоль съв. склона Александровского хребта и далѣе къ Вѣрному. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 201).

82. Regel A. Von Kuldsha nach Taschkent und Samarkand und Rückweg über Kokan und den Narin (Im Frühling 1880); „Gartenflora“ 1882, p. 78—81, 113—114.

Для нашей области указано нѣсколько видовъ весеннихъ растеній. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 216 и 217).

83. Regel A. Excursion von Taschkent nach Chodschen, Uratüpe und Samarkand, und von da zurück nach Taschkent. Im Frühjahr 1880 („Gartenflora“ 1882, p. 132—135). Fortsetzung—по заглавіе новое.

Довольно много указаний весеннихъ растеній (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 218).

84. Regel A. Von Taschkent über Kokan durch das Naryngebiet (1880) — „Gartenflora“, p. 355—368, 1882.

Приводится около 150 видовъ растеній для нашей области (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 211).

85. Regel A. Vom Naryngebiet über Wernoe bis Altynimel (1880). — „Gartenflora“ 1883, p. 73—82.

Продолженіе статьи № 84. Для нашей области приводится 6 видовъ. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 212).

86. Regel E. Animadversiones de plantis vivis nonnullis horti botanici Imperialis Petropolitani („Acta Horti Petropolitani“ II, p. 307—326). 1873.

Приводится всего 1 видъ для нашей области. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 165).

87. Regel E. Descriptiones plantarum novarum in regionibus turkestanicis a cl. viris Fedjenko, Korolkow, Kuschakewicz et Krause collectis cum adnotationibus ad plantas vivas in horto Imperiali botanico Petropolitano cultas. Fasc. I. Petropoli 1873. Julio. („Acta Horti Petropol.“ II, 401—457).

Для нашей области приводится 11 видовъ. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 166):

88. Regel E. Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum in regionibus turkestanicis a cl. P.<sup>1)</sup> et O. Fedschenko, Korolkow, Kuschakewicz et Krause collectis (*sic!*). Cum adnotationibus ad plantas vivas in horto Imperiali botanico Petro-

<sup>1)</sup> Т. е. А. П. Федченко.

politano cultas. Fasciculus II. („Acta Horti Petropolitani“ III, p. 97—168). 1874.

Приводится 16 видовъ для нашей области. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 167).

89. Regel E. Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum. Fasciculus III. B. Descriptiones plantarum novarum in regionibus turkestanicis crescentium. („Acta Horti Petropolitani“ III, p. 289—297).

Для нашей области приводится 4 вида. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 168).

90. Regel E. Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum. Fasciculus V. („Acta Horti Petropolitani“ V, p. 217—272). 1877.

A. Plantae regiones turkestanicas incolentes secundum specimina sicca a Regelio et Schmalhausenio determinatae, auctore E. Regel.

B. Plantae regiones turkestanicas et centroasiaticas incolentes, secundum specimina viva in horto botanico Imperiali Petropolitano culta descripta, auctore E. Regel.

Для нашей области указано около 35 видовъ. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 170—1).

91. R(egel) E. Tulipa Kaufmanniana Rgl. („Gartenflora“, 1877, p. 194—6, t. 906, f. 6—10).

Указывается для нашей области. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз. № 194 — общее указание на всѣ замѣтки Э. Регеля въ „Gartenflora“).

92. R(egel) E. Tulipa Alberti Rgl. („Gartenflora“ 1877, p. 257, t. 912).

93. R(egel) E. Lycoris Sewerzowi Rgl. („Gartenflora“ 1877, p. 259, t. 914).

94. R(egel) E. Sedum umbilicoides Rgl. („Gartenflora“ 1877, p. 290—1, t. 917).

95. Regel E. Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum. Fasciculus VI („Acta Horti Petropolitani“ V, 575—616). 1878.

A. Plantae regiones turkestanicas incolentes secundum specimina sicca a Regelio et Schmalhausenio determinatae, auctore E. Regel.

B. Plantae turkestanicae a Regelio et Smirnowio determinatae auctore E. Regel.

C. Plantae turkestanicae a Regelio et Schmalhausenio determinatae auctore E. Regel.

D. Plantae regiones turkestanicas incolentes secundum specimina viva in horto Imperiali botanico culta descripta, auctore E. Regel.

F. Salsolacearum novarum in Turkestania indigenarum descriptiones, auctore A. Bunge.

Въ общемъ указывается для нашей области около 45 видовъ. (Липсий, Фл. Ср. Аз., № 172—175).

96. R(egel) E. Allium karataviense („Gartenflora“ 1878, t. 941, p. 162—3).

97. R(egel) E. Lycoris Sewerzowi („Gartenflora“ 1879, p. 353).

98. R(egel) E. Fritillaria Walujewi („Gartenflora“ 1879, p. 353—4, t. 993).

99. Regel E. Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum. Fasciculus VII. („Acta Horti Petropolitani“ VI. 287—538). 1880.

B. Plantarum centroasiaticarum in horto botanico Imperiali Petropolitano cultarum, descriptiones.

C. Plantarum regiones turkestanicas incolentium, secundum specimina sicca elaboratarum, descriptiones.

Всего приводится для нашей области около 150 видовъ. Нѣкоторыя семейства обработаны Бунге и Максимовичемъ. (Липсий, Фл. Ср. Аз., № 176—7).

100. Regel E. Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum. Fasciculus VIII. („Acta Horti Petropolitani“ VII. 541—690). 1881.

B. Plantarum centrasiaticarum, in horto botanico Imperiali petropolitano cultarum, descriptiones.

C. Juncacearum, Cyperacearum, Graminearum, Balanophorearum et Acotyledonearum vascularum centrasiaticarum adhuc cognitarum enumeratio.

D. Allgemeine Bemerkungen über die Flora Centralasiens und über die Verbreitung der Juncaceen, Cyperaceen und Gramineen Turkestan's im Besonderen.

E. Explicatio tabellarum.

F. Specielle Bemerkungen zu den beiden Tabellen.

Двѣ таблицы и карта; кроме того, перечень мѣстностей (Index locarum natalium).

Для нашей области указано около 150 видовъ. (Липсий, Фл. Ср. Аз., № 179—181).

101. R(egel) E. Colchicum (Synsiphon) crociflorum („Gartenflora“ 1881, p. 33—4, t. 1035, f. 1—2),

(Липсий, Фл. Ср. Аз., № 194—см. выше).

102. R(egel) E. Eremurus Olgae Rgl. („Gartenflora“ 1881, p. 196—7, t. 1048).

103. R(egel) E. Scilla puschkinioides Rgl. („Gartenflora“ 1881, p. 227—8, t. 1050).

104. R(egel) E. Tulipa turkestanica Rgl. („Gartenflora“ 1881, p. 228—9, t. 1051, f. 2—4).

105. R(egel) E. Helicophyllum Lehmanni Rgl. („Gartenflora“ 1881, p. 291—2).

106. R(egel) E. Leontice Alberti Rgl. („Gartenflora“ 1881, p. 293, t. 1057, f. 2 a—c).

107. R(egel) E. Bulbocodium (Merendera) persicum Boiss. et Kotschy β. turkestanicum („Gartenflora“ 1881, p. 294—5, t. 1058, f. 2 e—f).

108. R(egel) E. Aconitum rotundifolium Kar. et Kir. („Gartenflora“ 1881, p. 357—8, t. 1063, f. 2).

109. Regel E. Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum. Fasciculus VIII (ошибочно: должно значиться IX). „Acta Horti Petropolitani“ VIII, fasc. 1, p. 269—279. 1883.

Указывается для нашей области 3 вида. (Липсий, Фл. Ср. Аз., № 182).

110. Regel E. Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum. Fasciculus IX (ошибочно: должно значиться X). „Acta Horti Petropolitani“ VIII, p. 639—762. 1884.

A. Descriptiones plantarum diversarum, in horto Imperiali Petropolitano cultarum.

B. Descriptiones et emendationes plantarum bucharicarum turkestanicarumque.

Для нашей области приводится около 17 видовъ. (Липсий, Фл. Ср. Аз., № 183—4).

111. R(egel) E. Fritillaria (Korolkowia) Sewerzowi β. bicolor Rgl. („Gartenflora“ 1885, p. 35, t. 1181).

**II2. Regel E.** Descriptiones et emendationes plantarum novarum et minus cognitarum. Fasciculus X (по ошибке, должно значиться XI). Auctore E. Regel. Loci natales ab Alberto Regelo elaborati sunt. („Acta Horti Petropolitani“ IX, fasc. 2. Стр. 527—620). 1886.

A. Monographia generis *Eremostachys*.

B. Conspectus specierum generis *Phlomis Imperium* rosicum incolentium.

D. Descriptiones et emendationes plantarum turkestanicarum bucharicarumque.

Всего для нашей области указывается около 15 видовъ. Кроме издания въ „Acta Horti Petropolitani“, статья эта имѣется (въ нашей личной библиотекѣ) и въ видѣ отдельного оттиска съ пагинаціей 1—46, причемъ, почему-то монографіи *Eremostachys* не имѣется и выпускъ начинается A. Conspectus specierum generis *Phlomis* и т. д. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 185—8).

**II3. Regel E.** Allii species Asiae centralis. („Acta Horti Petropolitani“ X, p. 279—362, tab. I—VIII). 1887.

Для нашей области указано около 35 видовъ. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 195).

**II4. Регель Э.** Туркестанская флора, обработанная Э. Регелемъ по материаламъ, собраннымъ О. А. Федченко, Карапиновымъ и Кириловымъ, Каульбареомъ, Корольковымъ, Краузе, Кушакевичемъ, Потанинымъ, Семеновымъ, Сѣверцовымъ, Шаригорстомъ, Шренкомъ и другими. Тетрадь первая. Первоцѣнныя и лилейныя. (Путешествие въ Туркестанъ А. П. Федченко, вып. 12-й. „Извѣстія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи“, т. XXI, вып. 2-й). Сиб. и Москва, 1876 г.

Для нашей области приводится 50 видовъ. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 190).

**II5. Регель Э.** Описание новыхъ и болѣе рѣдкихъ растений по материаламъ, собраннымъ О. А. Федченко въ Туркестанѣ и Кокандѣ. (Путешествие въ Туркестанъ А. П. Федченко, вып. 18-й. „Извѣстія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи“, т. XXXIV, вып. 2-й). Сиб. и Москва, на обложкѣ 1882 г., но издано въ ноябрѣ 1881 г.

(40)

Для нашей области приводится 55 видовъ. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 192).

**II6. Regel E. et Herder F. ab.** Enumeratio plantarum in regionibus cis—et transiliensibus a cl. Semenovio anno 1857 collectarum. Continuatio. Mosquae 1866. (Оттиски изъ „Bulletin de la Societé Impériale des Naturalistes de Moscou“, 1866, fasc. III, p. 1—115).

Въ этомъ выпускѣ приводится всего 1 видъ для нашей области. Въ первомъ выпускѣ (1864 г.) вовсе не было указаний для наст. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 199).

**II7. Regel E. et Herder F. ab.** Enumeratio plantarum etc. . . . . Continuatio III. Mosquae 1868. (Оттиски изъ „Bulletin...“ 1867 г. fasc. 1, p. 1—22, fasc. 3, p. 124—190).

Здѣсь указанъ также 1 видъ. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 199).

**II8. Regel E. et Herder F. ab.** Enumeratio plantarum etc. . . . . (Оттиски изъ „Bulletin...“ 1868 г. fasc. 1, p. 59—113, fasc. 2, p. 378—459, fasc. 4, p. 269—310). Mosquae 1869.

Отдельные указания. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 199).

**II9. Regel E. et Herder F. ab.** Supplementum II. ad enumerationem plantarum in regionibus cis—et transiliensibus a cl. Semenovio anno 1857 collectarum. Fasc. I. Auctore E. Regel. Ranunculaceae—Cruciferae. №№ 1—120 f. („Bulletin de la Societé Impériale des Naturalistes de Moscou“ 1870, fasc. 2, p. 237—283).

Очень много указаний для нашей области, по материаламъ Сѣверцова и Скорнякова. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 199).

## C. (S).

**II0. Симоновъ А.** Очерки горъ Аксай („Туркестанская Вѣдомости“ 1884 г., № 8—9).

Описание природы Чирчика и Чимганскихъ горъ. (Липскій, Фл. Ср. Аз., № 315).

**II1. Sorokine N.** Aperçu systematique des Chytridiaceae recoltées en Russie et dans l'Asie Centrale. („Archives Botaniques du Nord de la France“). Lille. 1883.

(41)

Перечень свыше 50 видовъ грибковъ изъ сем. Chytridiaceae, почти исключительно изъ окр. Ташкента. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 234).

**122. Сорокинъ Н.** Путешествіе по русскому Тянь-шаню въ 1884 году. Предварительный отчетъ. („Извѣстія Императорского Русского Географического Общества“, т. XXI, стр. 113—130). 1885 г.

Указано для нашей области 27 видовъ.

**123. Sorokine N.** Nouveaux matériaux pour la flore cryptogamique de l'Asie Centrale („Revue Mycologique.“ 1889).

Общія замѣчанія о криптогамической флорѣ Средней Азіи и перечисленіе собранныхъ авторомъ грибовъ съ описаніемъ и изображеніемъ новыхъ видовъ. Авторъ первый указалъ на чрезвычайное богатство и интересъ микологической флоры Туркестана. На приложенной карточкѣ изображенъ маршрутъ и по Тянь-Шаню. (*Липсій*, Фл. Ср. Азіи, № 238).

**124. Сѣверцовъ Н. А.** Поѣздка въ западную часть Небеснаго хребта (Тянь-шаня) или Цунь-линь древнихъ китайцевъ, отъ западныхъ предѣловъ заилійскаго края до Ташкента („Записки Императорского Русского Географического Общества“, т. I, стр. 75—164. Спб. 1867, и Дополненіе къ ней, тамъ же, стр. 165—179).

Приводится около 50 видовъ. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 240).

**125. Сѣверцовъ Н.** Путешествія по центральной Азіи и изслѣдованіе горной страны Тянь-шана, совершенныя по порученію Императорского Русского Географического Общества. Спб. 1873. Стр. 1—462.

Здѣсь перепечатана между прочимъ предыдущая статья (№ 124). Приводится около 11 видовъ, не упомянутыхъ въ первомъ изданіи ея. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 241).

**126. Сѣверцовъ Н. А.** Вертикальное и горизонтальное распределеніе туркестанскихъ животныхъ. Москва 1873 г. („Извѣстія Императорского Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи“, т. VIII, вып. 2-й).

Приводятся лишь отрывочныя указанія, но трудъ этотъ имѣть для насъ большое значеніе въ смыслѣ общей характеристики края.

**127. Schedae ad Herbarium Florae Rossicae.** Списокъ растеній гербарія Русской флоры, издаваемаго Ботаническимъ музеемъ Императорской Академіи Наукъ. III. (№№ 601—900). Спб. 1901.

Приводятся два вида для нашей области. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 311).

## Т.

**128. Trautvetter E. R. v.** Catalogus Viciaeарum rossicarum („Acta Horti Petropolitani“ vol. III, fasc. 1, p. 31—83). 1874 г.

Для нашей области приводится лишь одинъ видъ.

**129. Trautvetter E. R. v.** Catalogus Campanulacearum Rossicarum („Acta Horti Petropolitani“ vol. VI, p. 41—104). 1879 г.

Для нашей области 5 видовъ. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 251).

**130. Trautvetter, Regel, Maximowicz et Winkler.** Decas plantarum novarum. Petropoli 1882. 4<sup>o</sup>. 10 р. с. 1 tab. col.

Рѣдкое повидимому отдѣльное изданіе. Для нашей области приводится 2 вида. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 255).

**131. Триполитовъ М.** Отчетъ по командировкѣ въ Туркестанскій край и на Кавказъ для выясненія условій снабженія Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ волокномъ кендыря и рами. Спб. 1894 г.

## Ф. (F.).

**132. Федченко А. П.** Списокъ мѣстностей, посѣщенныхъ Туркестанской Ученой Экспедиціей Императорского Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи. Москва, 1872. 9 стр. folio.

Отдѣльные указанія. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 256).

**133. Федченко Б. А.** Поѣздка въ Таласскій Алатау („Туркестанская Вѣдомости“ 1897 г., № 75 и 84; не окончено).

Приводится около 15 в. растеній. (*Липсій*, Фл. Ср. Аз., № 271).

134. Fedtschenko Boris. *Abies Semenovii m., eine neue Tanne aus Centralasien.* („Botan. Centralbl.“. Bd. LXXIII. № 7. 1898, p. № 210).

Описывается новый видъ пихты.

135. Федченко Б. А. Поездка въ Западный Тянь-шань для изученія ледниковъ Таласскаго Алатау. („Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества“, 1898 г., стр. 403—423).

Приводится 20 видовъ. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 272).

136. Fedtschenko B. Note sur quelques espèces du genre *Prangos*. („Bulletin de l'herbier Boissier“. T. VII. № 3, mars 1899, p. 178—181).

Приводятся 2 вида. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 273).

137. Fedtschenko Boris. Note sur les Conifères du Turkéstan russe. („Bulletin de l'herbier Boissier“. Tome VII, № 3, p. 185—197, mars 1899).

Приводится 6 видовъ. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 274).

138. Федченко Б. А. О тянь-шанской пихтѣ. („Приложение къ протоколамъ Засѣданій Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ“. № 190). 1901.

Указываются подробности о находкеніи пихты въ Тянь-шанѣ.

139. Федченко Б. А. Обзоръ видовъ рода *Hedysarum* („Acta Horti Petropolitani“ vol. XIX, fasc. 3). 1902.

Монографическая обработка всего рода. Приводятся все мѣстонаходкенія и для нашей области. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 278).

140. Федченко Б. А. Краткій отчетъ о командировкѣ въ Туркестанъ въ 1902 г. („Извѣстія Императорскаго Ботаническаго Сада“, II, вып. 6). 1902.

Предварительный отчетъ, въ которомъ названо лишь 3 вида растений.

141. Fedtschenko Olga et Boris. *Potentillae nonnullae e regionibus turkestanicis allatae et a cl. Siegfridio determinatae* (Bulletin de l'herbier Boissier, t. VII. № 3, mars 1899, p. 182—5).

Для нашей области 15 видовъ. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 268).

142. Федченко О. А. и Федченко Б. А. Ranunculaceae Русскаго Туркестана. („Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ“, т. XXXIII, в. 3). Казань, 1899 г.

Приводится около 40 видовъ. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 266).

143. Fedtschenko Olga und Boris. Ranunculaceen des russischen Turkestan. (Engler's Botanische Jahrbücher, XXVII. Bd., p. 390—431). 1899.

Приводятся тѣ же данныя, что и въ предыдущей работе. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 265).

144. Федченко О. А. и Б. А. Высшія тайибрачныя Русскаго Туркестана. („Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ“. Т. XXXVI, в. 3). Казань, 1901.

Приводится для нашей области 15 видовъ. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 269).

145. Федченко О. А. О ботаническихъ изслѣдованіяхъ въ Туркестанѣ. (Годичный отчетъ Императорскаго Общества Испытателей Природы въ Москвѣ за 1896/7 годъ).

Приводится около 40 видовъ.

146. Fedtschenko Olga. Нѣмецкій переводъ предыдущей статьи. („Botanisches Centralblatt“. LXXIII. S. 60—61). 1898.

(Липсій, Фл. Ср. Аз., № 263).

147. Федченко О. А. Возстановленіе пріоритета. („Труды Ботаническаго Сада Императорскаго Юрьевскаго Университета“, т. I, в. 4). 5 февр. 1901 г.

Установленіе точной даты (конецъ ноября 1881 г.) выхода въ свѣтъ статьи Э. Регеля: Описаніе новыхъ и болѣе рѣдкихъ растеній, собранныхъ О. А. Федченко (Путешествіе въ Туркестанъ А. П. Федченко, вып. 18).

148. Федченко О. А. Списокъ растеній, собранныхъ въ Туркестанѣ въ 1869, 1870 и 1871 годахъ. (Путешествіе въ Туркестанъ А. П. Федченко, вып. 24-й; „Извѣстія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, т. CIII). Москва, 1902.

Трудъ, заключающій указаніе свыше 1500 видовъ растеній, изъ коихъ около 275 были собраны въ предѣлахъ нашей области. (Липсій, Фл. Ср. Аз., № 264).

149. Franchet A. Mission Capus. Plantes du Turkestan. („Annales des Sciences naturelles“. Botanique 1883, p. 214—268; 280—336; 1884, p. 207—277). Отдѣльный оттискъ — 1883 г.

Приводится около 200 видовъ для нашей области.  
(Липский, Фл. Ср. Аз., № 292).

### III.

150. Шахназаровъ А. Очеркъ сельского хозяйства Туркестанского края. („Сельское хозяйство и лѣсоводство“ 1898 г. Январь — апрѣль).

Приводится 23 вида культурныхъ растеній для нашего края.

## 1. Ranunculaceae.

### I. Clematis L.

1. Растенія съ лазящими стеблями и больше крупными цветками . . . . .
  - Растеніе не лазящее . . . . .
  2. Лепестки имѣются въ видѣ подлинныхъ усѣченныхъ нектарниковъ . . . . .
  - Лепестковъ нѣтъ . . . . .
2. *C. songorica* Bge.  
*C. alpina* (L.) Mill.  
*C. orientalis* L.

I. *Clematis songorica* Bge. in Ind. Sem. horti Dorpat. 1839.—  
*Ledb.*, Fl. ross. I. 2<sup>1)</sup>) *C. recta*  $\beta$  *songarica*, O. Kuntze  
Monogr. Clemat. № 5.

1870 *Clematis songorica* v. *serratifolia*, E. Regel Suppl.

II. pl. Semen. № 1a.

1878 *Clematis songorica* A. Regel Reisebr. 204.

1899 *Clematis songorica* v. *integrifolia*, v. *serratifolia* и  
v. *intermedia*, Федченко Ranuncul. № 2.

v. *integrifolia* Trautv.

II. При выходѣ р. Карабуры изъ горъ, 2.500', 9. VIII.  
1897 (Б. Федченко!!).

v. *intermedia* Trautv.

I. Пишпекъ 1876 (А. Регель!), Айшмара, при выходѣ изъ горъ, 1876 (А. Регель!).

II. По р. Кумышъ-тагъ. 11. VIII. 1897. (А. Арсеньев! и  
Б. А. Федченко!!).

<sup>1)</sup> Ледебуръ приводить между прочимъ указание Sieversа (in Pallas, Neue Nord. Beytr. VII. 331: *C. songorica*) для береговъ р. Букони, съ сомнѣніемъ относя это показаніе къ *C. songorica* Bge. Мне удалось отыскать въ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада подлинный экземпляр Сиверса съ Букони (ex herb. Pallas), не оставляющій сомнѣнія въ томъ, что растеніе это относится не къ *C. songorica* Bge, а къ *C. orientalis* L. (*C. glauca* Willd.).

IXIX. Кокурленъ, южный склонъ Сусамырского хребта, 8. VIII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. По р. Уюнкуръ-су, 6—7000', каменистые склоны, 15—VIII. 1895 (*С. Коржинский!*).

*v. serratifolia* Trautv.

I. Кольторъ, 9. VII. 1882, 6.000' (*Фетисовъ!*).

II. По р. Карабуръ, VIII. 1876 (*A. Regel!*), по р. Карабуръ, при выходѣ ся изъ горъ, 2.500', 9. VIII. 1897 (*Б. Федченко!!*), по р. Кумышъ-тагъ, въ среднемъ течений, 3—5.000'. 11. VIII. 1897 (*Б. Федченко!!*) и въ ущельи Боркутъя, 7.000', 11. VIII. 1897 (*Б. Федченко!!*).

Въ нашей области встрѣчается иѣсколько формъ, но все они относятся повидимому къ одному и тому же подвиду — *C. Geblariana* Bong. Въ соѣдниихъ странахъ встречаются формы, отличающіяся болѣе значительно и представляющія особые подвиды: *C. asplenifolia* Schrenk, *C. Boissieriana* Korz.

Наше растеніе встречается не рѣдко въ нижней полосѣ горъ, отъ 2.500 до 6.000—7.000'.

Въ Туркестанѣ распространено довольно широко: О: — Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, центральный и восточный Тянь-шань; С: — Зеравшанъ, Фергана.

Виѣ Туркестана — въ Монголіи, Кашгарѣ и Афганістанѣ.

2. *Clematis orientalis* L. Spec. plant. ed. 1a p. 543.—1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 3.—*Boiss.*, Fl. or. I. 3.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 5.—*O. Kuntze*, Monogr. Clemat. № 10.

1877 *Clematis orientalis*, A. Regel Gartenfl. 11, 13.

1878 *Clematis orientalis*, A. Regel Reisebr. 168, 182, 193, 196, 204.

? 1878 *Clematis* A. Regel Reisebr. 205.

1883 *Clematis orientalis* v. *turkestanica*, Franchet Mission Capus, 214.

1885 Ломоносъ съ мелкими бѣлыми цветами, Лисневскій 36.

1899 *Clematis*, Гейеръ Туркестанскія скитанія 191.

1899 *Clematis orientalis* v. *latifolia*, v. *obtusifolia* и v. *acutifolia*, Федченко. Ranunculaceae, № 3.

Туземи. назв.: Гаперикъ (записано В. И. Лисневскимъ).

I. По р. Айшмаръ, при выходѣ ся изъ горъ (*A. Regel!* — п. в.).

II. Въ долинѣ р. Таласа, въ аулѣ Аучи, VIII. 1876 (*A. Regel!*), по р. Карабуръ (*A. Regel!* — п. в.), въ долинѣ р. Кумышъ-тагъ, 2.500—4.000', 11. VIII. 1897 въ цв. (*B. A. Федченко!!* — var. *acutifolia*).

IV. Чаткаль, по р. Бишъ-араль, 4. VII. 1899 (*Литвиноў!* — var. *acutifolia*), у поворота Чаткала, въ его нижнемъ течениі, 5—6.000', VIII. 1876 (*A. Regel!*), по займищу Чаткала близъ Идрисъ-пей-гамбара и выше по течению рѣки, рѣже — виѣ долины на каменистыхъ мѣстахъ 11—29. VIII. 1902 въ пл. (*B. A. Федченко!!*) по р. Пскемъ — Каракызы, 21. VIII. 1881 *Капю!* — форма съ очень широкими дольками листьевъ), по р. Пскемъ, 24. VIII. 1881 (*Капю!* — въ статьѣ Франше (l. c.) ошибочно сказано „24 octobre“), близъ киплака Сидзякъ, 31. VII. 1902 (*B. A. Федченко!!*), близъ киплака Нанай, по правому берегу р. Пскемъ, и въ ущельи Акъ-саръ-сай, въ заросляхъ лиственіаго лѣса, 20. VII. 1897 (*B. A. Федченко!!* и *H. Гейеръ*), р. Чимгаитъ, по рѣчкѣ у стоянки, 4.700—4.800', 6. и 19. VIII. 1897 (*O. A. и B. A. Федченко!!*), тамъ же (*Финкельштейнъ!*), р. Чирчикъ: Аксагаты 1897 (*H. Гейеръ!*), по Салару, VIII. 1876 (*A. Regel!*), по р. Чирчикъ, близъ Ташкента VIII. 1876 (*A. Regel!* — п. в.), Ногай курганъ, 5. IX. 1869 (*O. A. Федченко!*); Кокъ-су: Бричъ-мулла, 2.500', 19. VII. 1897 (*B. A. и O. A. Федченко!!*).

V. Р. Аигренъ: Чарсу (*A. Regel!*).

VII. Въ равнинной части не рѣдко, а также по р. Касанъ-сай и Ходжа-ата (*Лисневскій* — п. в.).

VIII. Долина Узунъ-ахмата: южный склонъ Сусамырского хребта, на западномъ концѣ, 4.000', 27. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. По берегу р. Майли, между кустарниками, 10. VI. (*Krauzel*), склонъ у рѣчки въ Арсланбобъ, 10. VIII. 1895 (*С. Коржинский!*) между Червакомъ и Арсланбобомъ, 9. VIII. 1895 (*С. Коржинский!*), по р. Кугартъ, 5—6.500', 4. VIII. 1895 (*С. Коржинский!*).

Въ предгорьяхъ нашей области, отъ полосы пустынь и вверхъ до 4.—5.000' и даже выше, очень часто встречаются

различные формы лазящего ломоноса, которая вся несомненно относится к циклу форм *C. orientalis* L. Въ предѣлахъ этого цикла можно различать довольно большое разнообразіе несущественныхъ вариаций, которая въ сильной степени представляютъ результатъ прямого приспособленія къ болѣе сухому климату. Обильные гербарные образцы и наблюденія надъ живыми растеніями дали намъ возможность ознакомиться со всѣми переходами въ формѣ долекъ и пластинки листа отъ широкихъ до самыхъ узкихъ.

Въ отношеніи къ длины столбика при плодахъ, надо замѣтить слѣдующее. Встрѣчающаяся въ пустыняхъ форма выдѣлена была въ особый видъ (*C. longecaudata* Led.) на основаніи этого, что у нея, будто бы, гораздо длиннѣе столбикъ у плодовъ, чѣмъ у прочихъ формъ. Однако, это объясняется отчасти и тѣмъ обстоятельствомъ, что внизу, въ пустынѣ, плоды раньше созрѣваютъ, раньше достигаютъ полнаго развитія, а экземпляры изъ горныхъ странъ бываютъ собраны обыкновенно съ незрѣлыми еще плодами.

Въ Туркестанѣ *C. orientalis* распространено чрезвычайно широко, почти повсемѣстно: N: — отъ Уральска до Иртыша, O: — Тарбагатай, Джунгарія, Тянь-шань; S: — Памироалай, W: — Хива, Закаспійская область, Бухара.

Въ Туркестана: Южный Алтай, Минусинскій округъ, сѣверная Монголія, Маньчжурия, Персія, Циклады, Кавказъ.

3. *Clematis alpina* (L.) Mill. Garden. dict. ed. VIII. № 9.—1768.

*Atragene alpina* L. Sp. pl. ed. 1a p. 542.—1753.—*Led.*, Fl. ross. I.

*Subsp. sibirica* Rgl. et Til.

Flor. Ajan. p. 20.—*C. II.* Коржинскій, Флора Востока Европ. Росс. № 1.

1885 *Clematis*, Ломоносъ съ крупными бѣлыми цветами, Лисневскій 36.

1892 *Clematis*, *Capus* Royaume du Tamerlan 298.

I. Сѣверный склонъ Александровскаго хребта, по р. Аксу, 6.000', 30. V. 1880 и ущелье Аламединъ, 5—9.000', 23—25. V. 1880 (Фетисовъ!).

(50)

IV. Бассейнъ Чаткала: Чаткальская волость (*Лисневскій* — п. в.), при подъемѣ къ перевалу Афлатунъ по рѣчкѣ того же имени, на кустарникахъ и арчѣ, въ зонѣ еловыхъ лѣсовъ, 8—9.000', 22. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), сюда же вѣроятно относится и растеніе, замѣченное Капю при подъемѣ къ Афлатунскому перевалу.

VII. Въ долинѣ р. Ходжа-ата по лѣсамъ, 23. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

VIII. Терекъ и Узунъ-ахматъ, 9.000', 22. VII. 1881 (Фетисовъ!!).

XI. Еловый лѣсъ у перевала Кенколъ, 16. VI. 1899 (*Литвиновъ!*), въ еловомъ лѣсу по р. Караунгуръ, 30. V. 1899 (*Литвиновъ!*).

Встрѣчается въ нашей области не часто, въ зонѣ еловыхъ лѣсовъ, на высотѣ отъ 6 до 9.000', по еловымъ и арчевымъ зарослямъ.

Въ Туркестанѣ распространено преимущественно на С.-В. и В., именно: N: горы Каркаралинскаго уѣзда; O: — Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Центральный Тянь-шань; гораздо рѣже въ S: — Алайскій хребѣтъ, на западѣ не идетъ далѣе Шахимардана (О. А. Федченко!).

Въ другихъ странахъ встрѣчается на С.-В. Европейской Россіи, на Уралѣ, въ Сибири, Японіи, а также въ Средней Европѣ (*subsp. violacea*).

*Приимѣчаніе.* Изъ рода *Clematis* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще два вида:

1) *C. integrifolia* L: N. и O., въ степяхъ и предгорьяхъ Семипалатинской области.

2) *C. tangutica* (Max.) Korz.: O: — Центральный Тянь-шань, у перевала Бедель (Красновъ! — *sub nomine C. orientalis*); S: — Памиръ.

Кромѣ того Карелинъ приводить для „сѣверной Туркмении“ *C. Flammea* L. Показаніе это, вѣроятно, ошибочно, какъ и многія другія аналогичныя показанія Карелина для „сѣверной Туркмении“.

*C. tangutica* (Max.) Korz. принадлежитъ къ числу видовъ, связывающихъ флору Тибета съ Памиромъ и Центральнымъ Тянь-шанемъ (сюда относятся еще напр. *Dilophia salsa* Thoms. и др.).

(51)

Въ г. Ташкентѣ разводятся также садовые крупноцвѣтные Clematis.

## 2. Thalictrum L.

1. Цвѣторасположеніе — простая кисть, все растеніе ма-  
ленькое . . . . . Th. alpinum L.
- Цвѣторасположеніе — метелка или сложная кисть.  
Растенія болѣе крупныя . . . . . 2.
2. Дольки листьевъ пушистыя, съмянки сжатыя съ  
боковъ . . . . . Th. foetidum L.
- Дольки листьевъ голыя . . . . . 3.
3. Дольки листьевъ очень маленькия (1—4 мм. длины),  
толстыя, часто цѣльнокрайнія; конечные чере-  
шечки сильно удлиненные; плодиковъ 2—3. . . . . Th. Isopyroides  
C. A. Mey.
- Другіе признаки . . . . . 4.
4. Стебель обыкновенно простой, соцвѣтіе узкое, боко-  
вые дольки листьевъ на короткихъ черешечкахъ;  
рыльце стрѣловидное . . . . . Th. simplex L.
- Стебель на верхушкѣ часто развѣтвленный, соцвѣ-  
тіе раскидистое, пирамидальная метелка; рыльце  
продолговатое . . . . . Th. minus L.

**4. Thalictrum alpinum L.** Spec. plant. ed. 1a p. 545.—1753.—  
*Led.*, Fl. ross. I. 6.—*Boiss.*, Fl. or. I. 6.—*Hook.*, Fl. or. Ind. I.  
12.—*Lecoyer* Mon. Thalict. 193.

1878 *Thalictrum alpinum*, *A. Regel* Reisebr. 204.

1896 *Thalictrum alpinum*, *Комаровъ* Зеравшанъ № 4.

I. Сѣверный склонъ Александровскаго хребта, по  
р. Айшмаръ (*A. Регель*—п. в.), у перевала Кольторъ, 12.000',  
8. VIII. 1882 (*Фетисовъ*).

Въ описаніи своего путешествія (л. с.) *А. Регель* при-  
водить это растеніе для Александровскаго хребта; *В. Л. Комаровъ* (л. с.) также утверждаетъ, что оно собрано тамъ  
*А. Регелемъ*. Я видѣлъ лишь экземпляры *Фетисова*.

У насъ — рѣдкое высокогорное растеніе.

Въ горахъ Туркестана распространено вообще довольно  
широко: О: — Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Восточный  
и Центральный Тянъ-шань; С: — Памиро-алай.

Въ Туркестана распространено по высокогорнымъ  
странамъ Европы и Азіи, въ арктической и высокогорной  
области Сѣверной Америки.

**5. Thalictrum isopyroides C. A. Mey.** in *Led.*, Fl. alt. II.  
346.—1830.—*Led.*, Fl. ross. I. 7.—*Boiss.*, Fl. or. I. 6.—*Lecoyer*,  
Monogr. Thalict. 196.

1876 *Thalictrum foetidum* γ glabrum a obtusifolium,  
*E. Regel* Suppl. II. pl. Semen. № 8 а.

1870 *Thalictrum majus* α genuinum. *E. Regel* ibid. № 8 б.

1877 *Thalictrum isopyroides*, *A. Regel* Reisebr. 364.

1878 *Thalictrum isopyroides*, *A. Regel* Reisebr. 198.

1899 *Thalictrum isopyroides*, *Федченко* Ranunculaceae № 8.

I. Сѣверный склонъ Александровскаго хребта, по  
р. Аксу, 6.000', 30. VI. 1880 (*Фетисовъ*!).

II. По р. Кумышъ-тагъ, въ уроцищѣ Боркутья, на тра-  
вилистыхъ склонахъ, 11. VIII. 1897 (*Б. А. Федченко*!), Малый  
Таласъ, Каракочку, VIII. 1876 (*А. Регель* — п. в.).

III. Въ горахъ выше Бугуни, 18. III. въ цв. (*Сѣверцовъ*!),  
р. Боролдай, 1876 (*А. Регель*!).

IV. Долина Майданала, на сухихъ каменистыхъ скло-  
нахъ въ верхней части ущелья Куургентъ-туръ, 7—8.000',  
2. VIII. 1897 въ пл. (*Б. А. Федченко*!), долина р. Чимганъ,  
21. VII. 1881, 7—8.500' (*А. Регель*!), р. Сыръ-Дарья (?) близъ  
Ташкента, IV. 1880 (*А. Регель*!).

V. Кендыръ-аузъ, 18. V. 1880 (*А. Регель*! — собрано  
*Мусою*).

VI. Моголь-тау, 21. IV. съ пл. (*Сѣверцовъ*!).

VII. Наманганъ, 28. III. 1878 (*Скорняковъ*!).

XI. Анижан. у., верховья р. Кара-унгуръ, скалы, 18.  
VI. 1899 (*Литвиновъ*!).

Встрѣчается не рѣдко въ нижнихъ зонахъ горныхъ  
хребтовъ нашей области, въ полосѣ лиственныхъ лѣсовъ,  
не выше 8.500'. Принадлежитъ къ числу растеній каме-  
нистыхъ склоновъ, рѣже — каменистой степени.

По Туркестану распространено широко: N: — Джунгар-  
ская степь, Карагату: Куланчеку (*А. Регель*!); O: — Джунгарскій  
Алатау, Восточный и Центральный Тянъ-шань; S: — Пами-  
ро-алай: Заравшанъ (*О. А. Федченко*! и др.), Ходжентъ 1880  
(*А. Регель*!), Дарвазъ, Кабадіанъ (*С. Коржинский*!); W: — За-  
каинская область.

Въ Туркестана — въ передней Азіи отъ Сиріи до Ги-  
малаевъ, въ Монголіи, южномъ Алтай.

6. *Thalictrum foetidum* L. Sp. pl. ed. 1a p. 545.—1753.—  
Led., Fl. Ross. I. 7.—Boiss., Fl. or. I. 7.

*Th. minus* v. *foetidum*, Hook., Fl. br. Ind. I. 14.

1878 *Thalictrum foetidum* β *pilosulum*, A. Regel Reisebr. 201.

II. Александровский хребетъ, у перевала Каракія, VIII.

1876 (A. Regel!).

IX. Караколь, притокъ р. Сусамыра, 7.000', 1. VII. 1881  
(Фетисовъ!).

Въ нашей области рѣже другихъ видовъ *Thalictrum*.

Въ Туркестанѣ лишь на сѣверо-востокѣ: N:—Омскъ, Джунгарія; O:—Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Восточный и Центральный Тянь-шань, напр. пер. Бель-теничи—Султанъ-сары, 10.000', 13. VII. 1882 (Фетисовъ!), Ассы, Киндыкты (Фетисовъ!), Заилийскій Алатау (A. Regel!).

Общее распространение этого вида—горы Европы, Ураль, Крымъ, Кавказъ, Малая Азія, Гималаи, Алтай, Даурія, Сѣверный Китай.

7. *Thalictrum minus* L. Spec. plant. ed. 1a p. 546.—1753.—  
Led., Fl. Ross. I. 108.—Boiss., Fl. or. I. 8.—Hook., Fl. br.  
Ind. I. 14.

1883 *Thalictrum majus*, Franchet Mission Capus 215.

1896 *Thalictrum minus*, Коларовъ Зеравшанъ, № 7.

1899 *Thalictrum minus*, Федченко Ranunculaceae, № 10.

I. Аламединъ (Фетисовъ!), Кокмайнакъ IX. 1876 (A. Regel!).

II. Въ долинѣ р. Кумынъ-тагъ, 7.000', 10. VIII. 1897  
(Б. А. Федченко!!), подъ переваломъ Каракія, VIII. 1876  
(A. Regel!), Караколь VIII. 1876 (A. Regel!).

IV. По р. Санта лашъ, VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!),  
по р. Пекемъ, Кизиль-кушъ (Капю—п. в.), близъ кишлака Пекемъ, 5. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), на скалахъ въ Акъ-саръ-саѣ, близъ кишлака Нанай, 31. VII. 1902 (Б. А. Федченко!!), по Майданталу въ его низовьяхъ, въ тополевомъ лѣсу, 7. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), въ долинѣ р. Чимганъ, 1899—1900 (Е. Хомутова!), въ долинѣ р. Чаткаль: Идрисъ пей-гамбаръ, VIII. 1876 (A. Regel!), луга по замищу Чаткала VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), Чаткаль, VIII. 1876, 6.000' (A. Regel!), луга по верхнему течению Чаткала,

(54)

2. VII. 1899 (Литвиновъ!);—форма близкая къ *Th. simplex*, верхние листья совершенно напоминаютъ этотъ видъ.

VII. Въ долинѣ р. Афлатуна при устьи р. Уялмачаты,

22. VIII. 1902 съ пл. (Б. А. Федченко !!)—Это растеніе сильно отличается отъ обычныхъ *Th. minus* болѣе тонкими, крупными, широкими дольками листьевъ и вообще своимъ обликомъ).

XI. Узгентъ, 4.000', 28. V. 1880 (A. Regel!), по среднему течению р. Яссы, 30. V. 1880 (A. Regel!), Арсланбобъ, 3. VI. 1899 (Литвиновъ!—высокая форма, рыльце не очень широкое, кисть раскидистая, листья не похожи на листья *Th. simplex*).

Въ нашей области встречается не особенно часто, но представляется иѣсколько отличныхъ морфологическихъ формъ. Придерживаясь Lecoyer, всѣ ихъ слѣдуетъ относить къ var. *elatum*. Менѣе высокія формы (var. *nanum* Lecoyer) повидимому у насъ не встречаются и вообще видъ этотъ у насъ можно смѣшать лишь со слѣдующимъ. Встрѣчается *Th. minus* въ поименныхъ лѣсахъ и кустарникахъ, по долинамъ рѣкъ нижней и средней зонъ нашей области, не поднимаясь до верхняго предѣла хвойныхъ деревьевъ.

Въ Туркестанѣ распространено очень широко: N:—отъ Южнаго Урала до Омска, Алтая и горъ Карагатау; O:—Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Восточный и Центральный Тянь-шань; S:—Памироалай.

Въ предѣловъ Туркестана встречается отъ Западной Европы до Японіи, Гималаевъ и Западнаго Тибета.

8. *Thalictrum simplex* L. Mantissa p. 78.—1767. Led.,  
Fl. Ross. I. 10.—Boiss., Fl. or. I. 8.—Lecoyer Mon. Thalictr.  
p. 204.

1899. *Thalictrum simplex*, Федченко Ranunculaceae № 11.

Туземн. назв.: „Кікъ-уты“—(записано Невѣскимъ на Карамукѣ).

II. Малый Таласъ, Сюльникоръ, VIII. 1876 (A. Regel!—экземпляры безъ цветовъ и плодовъ, по листьямъ напоминаютъ отчасти *Th. flavum*).

IV. Долина р. Майданталъ, въ урочищѣ Куургентуръ, по скаламъ, 5. VIII. 1897 (Б. А. Федченко !!), долина

(55)

р. Чимганиъ, у истоковъ рѣчки Чимгаики, 5.000', 16. VII. 1897 (Б. А. и О. А. Федченко!!)—форма переходная къ Th. minus).

IX. Бассейнъ р. Сусамыръ: Каракольъ, притокъ р. Сусамыра, 1. VII. 1881 (Фетисовъ!).

Растеніе, встрѣчающееся въ нашей области, настолько близко подходитъ къ Th. minus, что не рѣдко находишься въ затрудненіи, куда правильнѣе отнести тотъ или другой экземпляръ. Обычные отличительные признаки — форма рылецъ, характеръ соцвѣтій и листьевъ — являются у насъ недостаточно постоянными.

Въ Туркестанѣ распространено сравнительно мало: N:—Омскъ, Акмол. обл.; Семипалатинская обл.; O:—Тарбагатай Джунгарскій Алатау, Восточный и Центральный Тяньшань; S:—Памироалай—Большой Карамукъ, 3. IX. 1878. (Невѣсский! — очень типичный экземпляръ).

Въ Туркестана встречается во всей Европѣ, на Кавказѣ, въ Сибири, Монголіи и Сѣверномъ Китаѣ.

*Приимѣчаніе.* Изъ р. Thalictrum въ Туркестанѣ встречаются еще два вида.

Первый, Th. flavum L., встречается въ N:—степи Джунгаріи O:—предгорья Тарбагатая и могъ бы встрѣтиться гдѣ нибудь на сѣверѣ нашей области.

Второй, Th. Trautvetterianum Rgl., схожій съ Th. orientale Boiss. (Греція, Малая Азія) и съ Th. pedunculatum Edgw. (Афганістанъ, Гималаи) встречается не рѣдко въ S:—Заравшанъ (В. Комаровъ!), Дарвазъ, Кулябъ, Балъджуанъ (А. Регель!) и даже до Уратюбе, 4.500', на сѣверныхъ склонахъ Туркестанского хребта (А. Регель!) и окр. Джизака 26. III. 1882. (А. Регель!), а также въ W:—Копетъ-Дагъ (Литвиновъ! и др.).

Надо думать, что Th. Trautvetterianum найдется гдѣ-нибудь и въ предѣлахъ нашей области, напр., къ сѣверу отъ Ходжента.

### 3. Anemone L.

1. Столбки короткіе, у плодовъ не измѣняющіеся (Anemone) . . . . . 2

Столбки у плодовъ сильно удлиняющіеся. Цвѣтки поникающій, одинокій, крупный (Pulsatilla). A. albana Stev.

(56)

2. Съміанки голые; соцвѣтіе—зонтикъ. Вѣнчики блѣдые. A. narcissiflora L. Съміанки пушистые или мохнатые; цвѣтки по 1—2; вѣнчики внутри желтые. . . . . A. biflora DC.

9. Anemone biflora DC. Syst. veget. I. 201.—1818. Boiss., Fl. or. I. 12.—Hook., Fl. br. Ind. I. 7.

A. Gortschakowii Karel. et Kiril., Enumer. pl. Songor. N. 14.—Led., Fl. ross. I. 727.

1870. Anemone biflora E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 11.

1872. " A. Федченко, списокъ мѣстностей № 165.

1878. " biflora, A. Regel Reisebr. 168.

1882. " " A. Regel Gartenfl. 114.

1884. " " E. Regel Descript. pl. nov. fasc. 9 p. 689.

1884. Anemone coronaria β pluriflora et ε. parviflora E. Regel I. c.

1892. Anemones, Capus Royaume du Tamerlan 74.

1899. Anemone coronaria β pluriflora Федченко Ranunculaceae № 17.

1899. Anemone biflora Федченко Ranunculaceae № 18.

1902. " " О. А. Федченко Списокъ № 7.

I. Предгорья Александровскаго хребта, 15. 25. V. 1879. (Фетисовъ!) совершенно такие же экземпляры въ Туркестанскомъ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада лежали подъ именемъ A. eranthoides).

III. Карагату, май (Сѣверцовъ!—№ 11), въ Карагату, IV. 1867. (Скорняковъ!), Боролдай, IV. 1872, 2.500'—6.000' (Н. Короликовъ!).

IV. По арыку Боссу, степь, 16. III., 6. и 11. IV. 1871. (О. А. Федченко!), Манкентъ и бл. Таишента (А. Регель—п. в.), Сайлыкъ, 5000', 1—15. IV. 1882 (А. Регель!).

VI. Моголь-тау, 29. IV. (Сѣверцовъ!).

IX. Переходъ Уру на границѣ Ферганской области, 12. VII. 1881 (Фетисовъ!—очень маленькие, сдва зацвѣтающіе экземпляры, хотя и отличающіеся по своему общему облику и формѣ прикорневыхъ листьевъ, все-таки вѣроятно, относятся сюда же).

XI. Горы надъ Арсланбобомъ, 7. VI. 1899 (Литвиновъ!).

Въ нашей области встречается преимущественно въ предгорьяхъ, хотя показание о нахожденіи A. biflora на пере-

(57)

валъ Уру свидѣтельствуетъ о томъ, что видъ этотъ поднимается и въ горы.

Въ Туркестанѣ распространено чрезвычайно широко: О:—Джуингарскій Алатау, Центральный и Восточный Тяньшань; С:—Заравшанъ, Алай—на сѣверѣ до Ура-тюбе; В:—Кизылъ-Кумы (Аякъ — *Корольковъ и Краузъ!*), сѣверный склонъ Нуратинскихъ горъ: Фарижъ, 19. III. 1873 (*Корольковъ и Краузъ!*), Закаспійская область.

Въ Туркестана—во всей передней Азіи отъ Персии до Кашмира.

**10. *Anemone narcissiflora* L.** Spec. plant. ed. 1-а р. 542.—**1753** (*lapsu calami* — A. *narcissi folia*; ошибка эта, вѣриже ошибки была исправлена Линнеемъ во второмъ изданіи Sp. pl.: ed. 2-а р. 763.—**1762**). — *Led.*, Fl. ross. I. 18.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 10.—*Boiss.*, Fl. or. I. 14.

1882. *Anemone narcissiflora* A. Regel Gartenfl. 361.

1883. " " Franchet Mission Capus 216.

1899. " " Федченко Ranunculaceae № 22

I. Ущелье Аламединъ, 25. 26. V. 80; перевалъ Кольторъ, 8. VII. 82, 12.000'; Арассанъ, 9. 11.000', 4. VI. 1880. (*Фетисовъ!*).

IV. У подножія ледниківъ Д. Л. Иванова и Акъ-Турпакъ, въ верховьяхъ Майданала, по ручью Чотанъ, на травянистыхъ склонахъ, 9. 10.000', 26 и 27. VII. 1897 (Б. А. Федченко!), на горѣ Большой Чимганъ, 8. VIII. 1897 въ цв. 10.000', (Ю. Баженова-Пьянновская въ герб. О. А. Федченко!), у вершины горы Большой Чимганъ (*Финкельштейнъ!*), тамъ же 18. VIII. 1900, 1901 и 1902 (Е. Холмутова!), у перевала Торнакъ-бель, 23 октября (вмѣсто „августа“ — Капю, п. в.); верховья р. Афлатунъ, притокъ Чаткала, 30. VI. 1899 (*Литвиновъ!*).

IX. Сѣверный склонъ Сусамырского хребта, 9.500'—10.000', 6. VII. 1881; Караколь, надъ притокомъ р. Сусамыра, 9—10.000. 1. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. По р. Яссы (A. Regel — п. в.), Кугартъ, травянистые склоны, 7—8.000', 5. VIII. 1895 (С. Коржинский!), Кенколъ, каменистые склоны, 9—10.000', 13. VIII. 1895 (С. Коржинский!), субальпійские луга по р. Уракъ-су, близъ перевала Кенколъ, 7.500', 29. V. 1899 въ цв. (*Литвиновъ!*).

(58)

Встрѣчается въ альпійской и рѣже въ субальпійской области, преимущественно по травянистымъ склонамъ.

Въ Туркестанѣ распространено въ альпійской зонѣ горъ: О:—Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Центральный и Восточный Тянь-шань; С:—Алайскій хребеть, Заравшанъ, Бальджуанъ, Дарвазъ.

Въ Туркестана—альпы Европы, Кавказъ, Уралъ, Персія, Капмиръ, Монголія, Алтай, Сѣверо-западная Америка, арктическая Сибирь.

**II. *Anemone albana* Stev.** Catal. des plantes rares ou nouvelles, observées pendant un voyage autour du Caucase oriental („Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“ III. р. 264). **1812.** — *Boiss.*, Fl. or. I. 10.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 7.

*Pulsatilla albana* Spreng., *Led.*, Fl. ross. I. 22.

1882 *Pulsatilla*, A. Regel Gartenflora 363.

1882 Weisse Pulsatilla, A. Regel Gartenflora 362.

1899 *Anemone albana*, Федченко Ranunculaceae № 26.

I. Иссыгаты, 15. V. 1881, 10.000'; Арассанъ, 9—11.000', 5. VI. 1881; Акъу 9—10.000', 29. VI. 1880; Ала-арча, 13. V. 1879, 6—7.000'; Аламединъ 25. V. 1879\* (*Фетисовъ!*).

II. Въ верховьяхъ р. Гуручикель, въ альпійской степи, 10.000', 8. VIII. 1897 съ пл. (Б. А. Федченко!).

IX. Караколь надъ притокомъ р. Сусамыръ, 9—10.000', 1. VII. 1881 (*Фетисовъ!*), сѣверный склонъ Сусамырского хребта, урочище Сандыкъ, 9—11.500, 3. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

X. По р. Манагильды (A. Regel — п. в.).

XI. По среднему течению р. Яссы, 8—9.000', 31. V. 1880 (A. Regel!; въ описаніи своей поѣздки A. Regel упоминаетъ о „блѣдыхъ“ *Pulsatilla* на р. Яссы); на перевалѣ Кенколъ, 10.000', 16. VI. 1899 (*Литвиновъ!*).

Распространено повидимому довольно широко. Характерное растеніе альпійской степи, встрѣчается также и въ субальпійской области.

Въ горахъ Туркестана распространено чрезвычайно широко: О:—Джуингарскій Алатау, Центральный и Восточный Тянь-шань; С:—Заравшанъ, Алайскій и Заалайскій хребты.

(59)

Внѣ Туркестана встрѣчается на Кавказѣ, въ Армении и въ южной Сибири до Байкала.

*Примѣчаніе.* Извѣстъ рода Апемоне въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды:

*A. dichotoma* L. N:—Омскій уѣздъ.

*A. coerulea* DC. N:—Каркаралы (Шренкъ!).

*A. silvestris* L. N:—Омскъ, Каркаралы; О:—Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Центральный Тянь-шань (озеро Джасылъ-куль — Кушакевичъ!).

*A. coronaria* L. S:—восточная Бухара.

*A. Tschernaevi* Rgl. S:—восточная Бухара (показаніе для Памира ошибочно!).

*A. serawschanica* Komar. S:—Заравшанъ.

*A. eranthoides* Rgl. S:—Бухара.

*A. Falconeri* Thoms: О:—Джунгарскій Алатау—верхнее теченіе р. Хоргось, 5—6.000', р. Боргаты, руч. Талки 3—5.000', ручей Нилки 7.000', Алтынемель у Куянкуза 4—5.000' (*A. Regel!*); Восточный Тянь-шань: Ханахай, 5—7.000' (*A. Regel!*); S:—Алайскій хребетъ: на сѣверномъ склонѣ перевала Арчаты, 15. VII. 1878 (*Кушакевичъ!*).

*A. obtusiloba* Don. О:—Центральный Тянь-шань.

*A. patens* L. N:—Омск. у.; О:—Джунгарскій Алатау.

*A. Kostyuczewi* Korsh. S:—Алай (*C. Коржинскій!*), Конѣт-тюбе 30. VI. 1878 (*Скорняковъ!*); однако, мѣсто не известно съ точностью, гдѣ находится мѣстность, обозначенная на этой этикеткѣ, по видимому на нижнемъ Алай не подалеку отъ Дараутъ-кургана.

*A. Pulsatilla* L. N:—Тургайская и Семипалатинская области.

Въ нашемъ районѣ могли бы найтись иѣкоторые изъ числа этихъ видовъ, напр. *A. Falconeri*.

#### 4. *Adonis* L.

1. Однолѣтнее растеніе обыкновенно съ красными (редко желтыми) вѣнчиками. . . . . *A. aestivalis* L.
- Многолѣтнее растеніе съ крупными желтыми вѣнчиками. . . . . *A. vernalis* L.

(60)

12. *Adonis aestivalis* L. Sp. pl. ed. 2a. p. 771. — 1762 — *Led.*, Fl. ross. I. 23. — *Boiss.*, Fl. or. I. 17. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 15.

Var. *parviflorus* (Fisch.) Led.

1870 *Adonis aestivalis* γ. *parviflora* Led., E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 16.

1899 *Adonis parviflorus* Fisch., Федченко, Ranunculaceae, № 30.

1902 *Adonis parviflorus* O. A. Федченко. Списокъ № 10. I. Ущелье Аламединъ, 3.500'—5.500', 25. V. 1880 (*Ретисовъ!*).

III. Чимкентъ, янв.-февр. въ цвету (*Съверцовъ!*).

IV. Горы Карагату, 1882 (*Масъ!*), сады по арыку Боссу, 11. IV. 1871 (*O. A. Федченко!*).

var. *flava* (DC.) B. Fedtsch.

*A. flava* DC. Prodr. I. 24.

*A. aestivalis* β *pallida* Led., Fl. ross. I. 23.

I. Предгорья Александровскаго хребта, 15—25. IV. 1879 (*Ретисовъ!*).

XI. Узгентъ, 4.000', 28. V. 1880 (*A. Regel!*)—экземпляръ съ незрѣлыми плодами, безъ цветовъ, такъ что я рѣшительно не понимаю, почему *A. Regel* отнесъ его къ формѣ съ желтымъ вѣнчикомъ; Карамкульскія горы (*Krauze!*).

Въ нашей области однолѣтніе *Adonis* представляютъ собою два довольно рѣзко выраженныхъ типа—одинъ съ некрупными красными вѣнчиками, другой—съ болѣе крупными, обыкновенно желтыми вѣнчиками. Имѣющійся въ нашемъ распоряженіи материалъ, однако, слишкомъ незначителенъ для окончательного выясненія взаимныхъ отношеній этихъ двухъ формъ.

По Туркестану *A. aestivalis* распространено чрезвычайно широко: N:—отъ Индерскихъ горъ до Норь-Зайсана; О:—въ предгорьяхъ Тарбагатая, Джунгарскаго Алатау и Тянь-шаня; S:—Заравшанъ, Бухара до Бальджуана, Алайскій хребетъ; W:—Закасп. обл., Кизылъ-кумы, бл. г. Туркестана.

Внѣ Туркестана различныя формы *A. aestivalis* встрѣчаются отъ Средней Европы до Гималаевъ и южнаго Алтая (*Курчумскія горы*).

(61)

13. *Adonis vernalis* L. Spec. plant. ed. 1a p. 547.—1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 24.

IV. Возлѣ Ташкента (*Кушакевичъ?*).

Въ ботанической литературѣ растеніе это нигдѣ для нашей области не показано и мною тамъ не найдено; въ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада миѣ удалось однако найти нѣсколько особей этого вида съ этикеткой „In provincia Turkestan prope Taschkent—Kuschakewicz“. Я сомнѣваюсь, однако, чтобы это растеніе было собрано дѣйствительно возлѣ Ташкента.

*A. vernalis* въ Туркестанѣ встрѣчается лишь на крайнемъ сѣверо-востокѣ: N:—отъ Омска до Семипалатинска, указывается еще для O:—Центральный Тянь-шань.

Виѣ Туркестана *A. vernalis* встрѣчается отъ Средней Европы до Урала и Алтая.

*Приимѣчаніе.* Кроме вышеуказанныхъ, въ Туркестанѣ встрѣчается еще нѣсколько видовъ *Adonis*.

Такъ, въ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада хранится экземпляръ *A. flammans* Jacq. съ этикеткой „Aschabad.—Merw mis. Radde“. Можетъ быть, однако, это растеніе собрано не въ Закаспійской обл., а гдѣ нибудь на Кавказѣ??

Далѣе, на сѣверо-востокѣ встрѣчается *A. wolgensis* Stev.

На юго-востокѣ, въ бассейнѣ Заравшанъ и въ бухарскихъ владѣніяхъ (Кулябъ, Дарвазъ, Гиссарь) встрѣчается не рѣдко форма, которую нѣкоторые называютъ также *A. wolgensis*, а *C. II. Коржинскій* считаетъ особой „расой“ и называетъ *A. arrenina* L. v. *turkestanica* Korsh. Приводлю, что эта форма собрана, между прочимъ, на перевалѣ Лягоримурда въ западной оконечности Гиссарскаго хребта 3. VIII. 1878 *Невѣскимъ*, и называется тамъ туземцами-узбеками „сасыкъ-мотаръ“.

## 5. *Ceratocephalus* Moench.

1. Сѣмянки съ прямымъ носикомъ . . . . . *C. testiculatus* Bess.  
Сѣмянки съ носикомъ, изогнутымъ серповидно . . . *C. falcatus* (L.) Pers.

(62)

14. *Ceratocephalus testiculatus* (Crantz.) Bess. Enumer. pl. Volhyn. p. 70, № 1539.—1822.—*Roth*, Enumer. pl. Germ. I. 1014.—1827.

*C. orthoceras* DC. Syst. Veg. I. 231.—1818.—*Boiss.*, Fl. or. I. 1858.—*Led.*, Fl. ross. I. 1826.

*Ranunculus testiculatus*, Crantz Stirp. Austr. fasc. II. p. 97.—1762.

1870 *Ceratocephalus orthoceras*, E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 19.

1878 *Ceratocephalus orthoceras*, A. Regel Reisebr. 169.

1899 *Ceratocephalus orthoceras*, Федченко Ranunculaceae, № 35:

1902 *Ceratocephalus orthoceras*, О. А. Федченко. Списокъ, № 12.

I. Предгорья Александровскаго хребта, 15—25. IV. 1879, въ цв. (Фетисовъ!).

III. Чимкентъ, янв.-февр., въ цв. (Сѣверцовъ!).

IV. Ташкентъ и его окрестности, 19. III. 1871; между Ташкентомъ и Келесомъ, въ саду, 22. IV. 1871 въ пл. (О. А. Федченко!), Ташкентъ (А. Регель — п. в.), тамъ же въ цв. 20 февр. 1882 (Масъ!), бл. ст. Кауфманской, 18. III. 1901 (Валиневъ!), VI. Моголь-тау, IV (Сѣверцовъ!).

Нѣкоторые изъ имѣющихся экземпляровъ весьма характерны и относятся несомнѣнно къ этому виду; другое же не достаточно полны, напр., собраны въ цвѣту.

У насъ встрѣчается, повидимому, не рѣдко, какъ рднѣе весеннее растеніе. Распространено по всему Туркестану: N, O, S, W.

Виѣ Туркестана встрѣчается отъ Австро-Венгрии до Персіи, Белуджистана и еще въ юго-западной части Алтая.

*Приимѣчаніе.* Растеніе это уже въ 1822 году было Бессеромъ (L. c.) отписано къ роду *Ceratocephalus* подъ именемъ *C. testiculatus*; указаніе это пропущено въ Index Kewensis, гдѣ цитируется лишь книга *Roth'a* (издано въ 1827 году). Пріоритетъ принадлежитъ очевидно Бессеру.

15. *Ceratocephalus falcatus* (L.) Pers. Synops. v. Enchir. 341.—*Led.*, Fl. ross. I. 26. *Boiss.*, Fl. or. I. 58.

*Ranunculus falcatus* L. Spec. pl. ed. 1a p. 556.—1753.

(63)

*Var. incurvus* (Stev.) Boiss. Fl. or. I. 58.

*C. incurvus* Stev. in Bull. de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 1848.

1899 *Ceratocephalus falcatus*, Федченко Ranunculaceae, № 36.

1902 *Ceratocephalus falcatus*, O. A. Федченко Списокъ, № 13.

IV. Ташкентъ, степь на Боссу, 11. IV. 1871, въ ил., 1.400' (O. A. Федченко!); можетъ быть, сюда же относятся и экземпляры, собранные въ апр. 1882 г. А. Регелемъ и Краузе въ Ташкентъ.

V. Арайдованъ 1880 (А. Регелемъ).

Кромъ болѣе частой формы *Ceratocephalus* съ прямымъ носикомъ, у насъ встрѣчается и другая — съ носикомъ, замѣтно искривленнымъ, согнутымъ, въ особенности въ его верхней части. Я считаю возможнымъ отличать эту форму, какъ одну изъ разновидностей другого вида, *C. falcatus*. Однако, можетъ быть, слѣдовало бы всѣ эти формы соединить въ одинъ полиморфный циклъ. Мы имѣли бы тамъ всѣ переходы отъ носика прямого къ носику сильно изогнутому.

Въ Туркестанѣ *C. falcatus* распространено менѣе значительно, чѣмъ предыдущій видъ: О:—Восточный Тянъ-Шань; С:—Ферганская область, Заравшанъ; В:—Бухара, Закасп. область, Мангышлакъ.

Въ Туркестана — отъ Франціи до Белуджистана и Гималаевъ.

## 6. *Ranunculus* L.

1. Чашелистиковъ 3, лепестковъ обыкновенно 8 . . . . . *R. Ficaria* L.  
Чашелистиковъ и лепестковъ по пяти . . . . . 2.
2. Водное растеніе съ бѣлыми вѣничками и интевидными участками листьевъ (рѣже это растеніе встречается по берегамъ, въѣ воды) . . . . . *R. aquatilis* L.  
Вѣнички желтые, растенія сухоцутнныя, рѣже — растущія въѣ водѣ . . . . . 3.  
Растенія многолѣтнія . . . . . 4.  
Растенія однолѣтнія . . . . . 21.
4. Корневые мочки шинковато-утолщенные . . . . . 5.  
Корневые мочки неутолщенные . . . . . 12.
5. Чашелистики внизъ отвороченные . . . . . *R. oxyspermus* M.B.  
Чашелистики горизонтально отстоящіе . . . . . 6.

6. Сѣменки съ обѣихъ сторонъ выпуклые . . . . . 7.  
Сѣменки плоскія, скатыя съ боковъ . . . . . 8.
7. Листья многораздѣльные, дольки ихъ узкія, тонкія. *R. tenuilobus* Rgl.  
Листья на верхушкѣ болѣе или менѣе глубоко пальчато надрѣзанные, толстые . . . . . *R. pulchellus* (C. A. M.) var. *flexicaulis* B. Fedtsch.
8. Листья клиновидные, къ верхушкѣ лопатчатые. *R. paucidentatus* Schrenk.  
Листья болѣе или менѣе разрѣзные . . . . . 9.
9. Носикъ сѣменокъ длинный . . . . . 10.  
Носикъ сѣменокъ короткій . . . . . 11.
10. Головки продолговатыя или округлые . . . . . *R. linearilobus* Rgl.  
Головки продолговато-цилиндрическія . . . . . *R. Sewerzowi* Rgl.
11. Дольки листьевъ цѣльный . . . . . *R. pedatus* W. K.  
Дольки листьевъ лопастныя . . . . . *R. platyspermus* Fisch.
12. Безствѣбельное растеніе съ укореняющимися побѣгами . . . . . *R. Cymbalariae* Pursh.  
Растенія съ прямымъ, восходящимъ или лежачимъ стеблемъ, безъ укореняющихся побѣговъ, иногда вѣсъ стебель въ узлахъ укореняющейся . . . . . 13.
13. Стебли всѣ лежащіе, укореняющіеся, по крайней мѣрѣ, при основаніи . . . . . 14.  
Стебли прямо-стоящіе или восходящіе, но укореняющіеся . . . . . 15.
14. Растеніе не крупное, вѣнички мелкіе, листья всѣ почти трехразрѣзные, при основаніи клиновидные или округленные; доли ихъ яйцевидныя, почти цѣльныя . . . . . *R. hyperboreus* Rottb. subsp. *natans* Rgl.  
Растеніе болѣе крупное, вѣнички большия, листья тройственно и двояко-тройственно разрѣзанные, цвѣтоложе съ волосками . . . . . *R. repens* L.
15. Стебли лежащіе или восходящіе, растеніе большей частью съ немногими цвѣтками . . . . . 16.  
Стебли обыкновенно прямостоячіе, со многими менѣе крупными цвѣтами . . . . . 18.
16. Чашечка обыкновенно спаружи зеленоватая, прижато-пушистая; дольки листьевъ продолговатолинейно-ovalныя, толстоватыя; стебли обыкновенно лежачіе . . . . . *R. gelidus* Kar. et Kir.  
Чашечка большей частью рыжеволосая . . . . . 17.
17. Стебли почти прямостоячіе; вѣнички болѣе крупные; листья на верхушкѣ съ небольшой лопастью, по краю городчатые . . . . . *R. sulphureus* Sol.  
Стебли восходящіе, листья раздѣльные, чашечка спаружи обыкновенно бѣловолосистая . . . . . *R. songaricus* Schrenk.  
Стебли восходящіе, вѣнички менѣе крупные . . . . . *R. rufosepalus* Franchet.
18. Дольки листьевъ на концахъ округлые или тупо-зубчатыя . . . . . *R. polyrhizos* Steph.

- Дольки листьевъ на концахъ заостренныя. . . . . 19.  
 19. Съменки вздутия, безъ замѣтно утолщенной окраины *R. affinis* R. Br.  
 Съменки сжатыя съ боковъ, съ утолщеннымъ краемъ 20.  
 20. Цвѣтоложе волосистое, все растеніе оттопыренное—  
     волосистое, цвѣтоноски бороздчатыя . . . . . *R. polyanthemos* L.  
     Цвѣтоложе голое, все растеніе прижато-пушистое,  
     цвѣтоноски не бороздчатыя . . . . . *R. acer* L. subsp *Steveni* Led.  
 21. Цвѣтоложе удлищенное . . . . . *R. sceleratus* L.  
     Цвѣтоложе укороченное. . . . . 22.  
 22. Съменки по всей поверхности шиповатыя . . . . . *R. arvensis* L.  
     Съменки па выдающемся краѣ гладкія . . . . . *R. muricatus* L.

16. *Ranunculus aquatilis* L. Spec. plant. ed. 1-а 556.—  
 1753.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 16.—*Boiss.*, Fl. or. I. 23.

var. *pantothrix* Led. Fl. ross. I. 27.

1870. *Ranunculus aquatilis*  $\beta$  *pantothrix*, E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 20 с.

II. Акчи въ долинѣ Таласа, безъ цв. и пл., VIII. 1876.  
 (A. Регель!).

III. Чимкентъ, въ цв. (*Съверцовъ!*).

VII. Озеро Кала-куль 23. VIII. 1902 въ цв. и пл. (Б. А. Федченко!!).

var. *succulentus* Koch.

VII. По илистому берегу озера Сары-чилекъ, въ цв. и пл. 23. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

Въ нашей области довольно рѣдкое водяное или прибрежное (var. *succulentus*) растеніе. Имѣя въ своемъ расположениіи крайне недостаточный гербарный материалъ, я оставляю пока безъ разсмотрѣнія детальное изученіе группы водныхъ *Ranunculus* Туркестана.

Встрѣчается въ Туркестанѣ не очень часто: N:—Джуңгарія, O:—Тянь-шань; S:—Заалайскій хреб., истоки Кизылъ-су (*Кушакевичъ!*), Памиръ, озеро Яшель-куль (*Кушакевичъ!*), Заравшанъ (О. А. Федченко и др.), Балыджуанъ (A. Регель!); W:—Закасп. обл. (*Литвиновъ!*).

Внѣ Туркестана встрѣчается въ Европѣ, Сибири, Монголіи и Гималаяхъ.

17. *Ranunculus Ficaria* L. Spec. plant. ed. 1-а р. 550.—  
 1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 30.

1897. *Ficaria intermedia* Schur., Пачоскій Флора Полѣсья, 24.

IV. Ташкентъ (*Кушакевичъ?*).—Въ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада я видѣлъ экземпляры этого растенія съ указаниемъ, что они собраны были въ Ташкентѣ *Кушакевичемъ*. Никакихъ дальнѣйшихъ подтверждений этого одинокаго указанія я не имѣю. Ближайшее мѣстонахожденіе этого растенія на западѣ—Оренбургская губ., на востокѣ—Джуңгарія, откуда мы имѣемъ одинъ, опять-таки, нѣсколько сомнительного происхожденія экземпляръ съ этикеткой „Songoria dedit Ballion“.

Новая указанія на принадлежность *R. Ficaria* къ Туркестанской флорѣ мы нашли въ только что поступившемъ въ Императорскій Ботан. Садъ гербаріи В. Ф. Ладыгина; Въ этомъ гербаріи имѣется нѣсколько экземпляровъ настоящаго *R. Ficaria*, собранныхъ, судя по этикеткѣ, „по садамъ у арыковъ въ г. Вѣриомъ, 3 апрѣля 1896 г.“

Внѣ Туркестана известно лишь въ Европѣ.

18. *Ranunculus oxyspermus* M. B. in Willd. Sp. pl. II. 1328.—*Led.*, Fl. ross. I. 29.—*Boiss.*, Fl. or. I. 29.

1870. *Ranunculus oxyspermus* E. Regel Suppl. II. pl. Semen № 20 d.

1899. *Ranunculus oxyspermus* Федченко Ranunculaceae № 53.

1902. *Ranunculus oxyspermus* О. А. Федченко. Списокъ № 20.

III. Чимкентъ (*Съверцовъ*—п. в.).

IV. Ташкентъ, близъ ключа у Салара, 1.400', I. IV. 1871 въ цв. Саларь, сады, 9. IV. 1871 въ цв. и сады на Боссу, 11. IV. 1871 въ цв. (О. А. Федченко!), Ташкентъ 1881 (*Маевъ!*).

Достаточно хорошо отличается отъ близкихъ видовъ отогнутыми внизъ чашелистиками и характеромъ своихъ плодовъ, а также более широкими дольками листьевъ. Въ нашей области встречается въ степной полосѣ, на юго-западѣ, не часто. Въ Туркестанѣ известно въ S:—Самаркандъ (О. А. Федченко!), горы между Ура-тюбе и Зіаминомъ, 4—5.000', 30. IV. 1880 (A. Регель!), на холмахъ, по лѣвому берегу р. Аксу къ югу отъ Куляба, 1.500'—1.600', 29. III. 1883 (A. Регель!), въ пустынѣ между Кулябомъ и г. Ходжа-

мумынъ, 1.500', 21. III. 1883 (*A. Регель!*), между Яны-курганомъ и Джизакомъ, 3.000', 21. IV. 1880 (*A. Регель!*), и W.—Закаспийская область (*Литвиновъ*).

Виѣ Туркестана встрѣчается въ сѣверной Персіи, на Кавказѣ, въ Крыму, Ассиріи и Фракіи.

19. *Ranunculus pulchellus* C. A. Mey, in *Led.*, Fl. alt. II. 333.—*Led.*, Fl. ross. I. 33—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 17.

Subsp. *flexicaulis* (Komar.) B. Fedtsch.

*R. flexicaulis* Комаровъ, Мат. по фл. Туркест. нагорья I. № 25.

1899. *Ranunculus flexicaulis* Федченко Ranunculaceae № 44.

IV. На сырыхъ альпійскихъ луговинахъ въ верховьяхъ р. Майдантала, въ цв. и съ пл., 9.500'—10.500" 28. VII. 97 и' 5. VIII. 1902 (*Б. А. Федченко!*).

Наше растеніе повидимому совершенно тождественно съ Заравшанскими оригиналными экземплярами г. Комарова. Я не считаю, однако, удобнымъ выдѣлять форму эту въ особый самостоятельный видъ, но въ то же время полагаю необходимымъ отличать ее, какъ особый подвидъ въ циклѣ полиморфного *R. pulchellus*. Отъ прочихъ формъ этого вида наше растеніе отличается характеромъ роста, формою листьевъ, а главное—своими замѣтно утолщеными корневыми мочками (*radix grumosa*). Послѣдний признакъ играетъ вообще говоря, преувеличенно большую роль въ систематикѣ лютиковъ, на основаніи чего устанавливаются даже цѣлые группы „*radice grumosa*“, но надо считаться съ тѣмъ обстоятельствомъ, что иногда мы имѣемъ „*radix grumosa*“ и „*radix non grumosa*“ въ предѣлахъ одного и того же вида, подобно тому, какъ встречается и *R. bulbosus radice non bulbosa*.

Въ Туркестанѣ наша форма встречается еще въ S:—Заравшанъ (открыто *О. А. Федченко!* въ 1870 г., отличена и собрана вновь *В. Комаровымъ* въ 1893—1894 г.г.), Памиръ и Алай.

По Туркестану широко распространены другія формы *R. pulchellus*, именно subsp. *longicaulis* (*Led.*) Trautv., subsp. *pseudohirculus* (*Schrenk*) Trautv.; рѣже встречается типичная форма.

Виѣ Туркестана формы *R. pulchelli* встречаются въ южной Сибири, Монголіи, Тибетѣ, Китаѣ, Афганистанѣ, Гималаяхъ и Сѣверной Америкѣ.

20. *Ranunculus paucidentatus* Schrenk. Diagn. pl. nov. in „Bull. phys. math. de l'Acad. de St. Petersbourg“ III. 309.

IV. Чимкентъ, 6—7.000', 21. VI. 1881 (*A. Регель!*).

Въ нашей области это одинъ изъ очень рѣдкихъ видовъ. По Туркестану распространено мало: О:—Джунарія, Тянъ-шань; S:—Заравшанъ (*О. А. Федченко!* и др.), Ура-тюбе (*A. Регель!*), Дарвазъ (*C. Коржинский!*).

Растеніе въ Туркестанѣ эндемическое.

21. *Ranunculus tenuilobus* Rgl. in Комаровъ Матеріалы по флорѣ Туркестанскаго нагорья. Бассейнъ Зеравшана № 33. „Труды Императорскаго Общества Естествоиспытателей при Спб. Университетѣ“, т. XXVI. 1896 г.

XI. Арсланбобъ, 23. V. въ цв. 1899 (*Литвиновъ!*).

Собранный *Литвиновымъ* растенія не имѣютъ плодовъ, почему опредѣлить ихъ съ точностью невозможно.

Въ Туркестанѣ растеніе это встречается еще въ S:—Заравшанъ (*Комаровъ!*), Бальджуанъ, Кулябъ, Гиссаръ (*A. Регель!*), Дарвазъ (*C. Коржинский!*).

Виѣ Туркестана не известно.

22. *Ranunculus linearilobus* Bge. Reliq. Lehman. № 22 (Arbeit. d. Naturf. Ver. zu Riga.) 1847.—*Boiss.*, Fl. or. I. 33.

f. *carpellis glabris*.

III. Чимкентъ, янв.—февр., въ цв. (*Сѣверцовъ*).

IV. Ташкентъ, апр. 1880, въ цв. (*A. Регель!*).

VI. Джанъ-булакъ, 12. IV. 1880, въ пл. (*A. Регель!*)

Тамъ же, апр., въ пл. (*Сѣверцовъ*).

f. *carpellis marginе pubescentibus*.

VI. Возлѣ Карасу между Ташкентомъ и Ходжентомъ, 9. IV. 1880, въ цв. (*A. Регель!*). Уральская, апр., 1880, въ цв. и въ пл. (*A. Регель!*).

f. *carpellis pubescentibus*.

IV. Ташкентъ, степь на Боссу, 11. IV. 1871 въ пл. (*О. А. Федченко!*). Ташкентъ, 23. IV. 1882 (*A. Регель!*—сѣмянки слабо пушистые).

VI. Джанъ-булакъ, въ пл. (*Съверцовъ!*).

Въ своемъ описаніи R. linearilobus *Буассе* говоритьъ, что съменки у этого растенія голыя. Экземпляры Сиб. гербарія показываютъ, что въ отношеніи опушения съменокъ здѣсь можно встрѣтить постепенный переходъ отъ совершенно голыхъ къ мохнатымъ. Такое явленіе напоминаетъ мною факты, описанные мною для иѣкоторыхъ видовъ *Hedysarum*<sup>1)</sup>. Полагаемъ, что на основаніи одного этого признака не возможно было бы дѣлить весь этотъ циклъ на иѣсколько самостоятельныхъ видовъ.

Въ 1888 г. былъ описанъ и изображенъ близкій видъ, R. leptorhynchus Aitch. et Hemsl. Возможно, что иѣкоторые изъ нашихъ растеній соотвѣтствуютъ именно этому виду.

Въ Туркестанѣ R. linearilobus встрѣчается въ N:—Каратай, S:—Заравшань, Бухара, W:—Кизиль-кумы, Закасп. обл.

Виѣ Туркестана неизвѣстно.

23. *Ranunculus Sewerzowi* Rgl. E. Regel Descr. pl. nov. fasc. 5 („Acta Horti Petr.“ V. 221). 1877.

1877. *Ranunculus Sewerzowi*, E. Regel l. c.

1899. " " Федченко Ranunculaceae № 49.

1902. " " О. А. Федченко Списокъ № 18.

IV. Кумсанъ, 3.000' (*Корольковъ!*), сады на Боссу, близъ Ташкента, 11. IV. 1871 (О. А. Федченко!) степь на Боссу, 6. IV. 1871 (О. А. Федченко!), въ окр. Ташкента, 15. IV. 1871 въ цв. (О. А. Федченко!).

VI. Моголь-тау (*Съверцовъ!*).

XI. Узгентъ, 28. V. 1880, съ цв. и пл. (А. Регель!).

Въ нашей области повидимому довольно широко распространена форма съ длинной цилиндрической головкой плодовъ, которую Э. Регель выдѣлилъ въ особый видъ подъ именемъ R. Sewerzowi. Я не рѣшаюсь однако вопросъ о видовой самостоятельности этой формы считать окончательно выясненнымъ.

Въ Туркестанѣ подобная форма встрѣчается преимущественно въ S:—Заравшань и W:—Закаспійская обл.

<sup>1)</sup> См. Б. А. Федченко, Обзоръ видовъ рода *Hedysarum*, № 11. („Acta Horti Petropol.“ XIX).

Виѣ Туркестана не извѣстно.

24. *Ranunculus platyspermus* Fisch. in DC. Prodrom. I. 37.—  
Led., Fl. ross. I. 29.—Boiss., Fl. or. I. 33.

I. Аламединъ, 26—27. V. 1880 (*Фетисовъ!*), предгорья Александровскаго хребта; 15—25. IV. 1879 (*Фетисовъ!*).

III. Боролдайскія горы, IV. 1872 (*Кушакевичъ!*).

IV. Ташкентъ (*Кушакевичъ!*); сюда же вѣроятно относятся растенія, собранныя въ цвету въ 1889 и 1900 гг. въ г. Ташкентѣ П. И. Хомутовыи.

Всѣ имѣющіеся въ нашихъ гербаріяхъ экземпляры относятся къ формѣ съ болѣе длиннымъ носикомъ плодовъ. Кроме того, есть еще крайне сомнительный и недостаточный экземпляръ съ этикетомъ „Каратай 1882—Маевъ“, отличающейся мохнатыми съменками.

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ N:—Каратай, Джунгарія; O:—Джунгарскій Алатау, Тянъ-шань; S:—Заравшань; W:—до береговъ Каспійскаго моря.

Виѣ Туркестана не встрѣчается.

25. *Ranunculus Meinshauseni* Schrenk. Diagn. pl. nov. in „Bull. phys. math. de l’Acad. de St. Petersb“. III. 309. (Сомнительный видъ).

1896. *Ranunculus Meinshauseni* Кошаровъ Заравшанъ № 28.

1819. " " Федченко Ranunculaceae № 51.

1902. *Ranunculus Meinshauseni* О. А. Федченко Списокъ № 19.

I. Александровскій хребеть (*Фетисовъ по Комарову*—п. в.).

IV. Въ степи между Ташкентомъ и Келесомъ, 1,300'.

22. IV. 1871 въ цв. и пл. (О. А. Федченко).

VI. Моголь-тау (*Съверцовъ по Комарову*—п. в.).

XI. Карамкульскія горы, IV. (*Краузер!*—экземпляръ весьма сомнительный, съмнѣя пущистыя, съ довольно длиннымъ носикомъ. Похоже отчасти на R. oxyspermus, но чашелистики не отвороченные).

Всѣ приведенные показанія не достовѣрны и такимъ образомъ видъ этотъ нельзя считать обитателемъ нашей области. Впрочемъ, далеко еще не выяснено, въ какомъ объемѣ слѣдуетъ принимать этотъ видъ и каково его отношеніе къ ближайшимъ его родичамъ. Оригинальные экзем-

пляры оказываются недостаточными, зрѣлые плоды этого вида—не известны.

Показано для О:—Джунгарскій Алатау, Тянь-шань; С:—долина Заравшана, В:—Нуратинскія горы.

Виѣ Туркестана не известно.

26. *Ranunculus pedatus* Waldst. et Kit. Plant. rar. Hungar. II. 112.—*Led.*, Fl. ross. I. 29.

V. Кендырь-аузъ, 18. V. 1880 (*Mysa!*).

Виѣ Туркестанскомъ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада подъ такимъ названіемъ хранятся два совершенно различныхъ растенія, изъ коихъ одно повидимому дѣйствительно есть *R. pedatus*.

Встрѣчается преимущественно въ Н:—отъ Оренбурга (!) до Иртыша и Балхаша (!), указано также для С:—Саратагъ, въ бассейнѣ Заравшана (*O. A. Федченко!*). Виѣ нашей области являются повидимому пришельцемъ съ сѣвера.

Виѣ Туркестана встрѣчается въ юго-восточной Европѣ и на Кавказѣ, доходитъ также до Томской губ., гдѣ найдено всего лишь въ одномъ пункѣ на юго-западѣ.

27. *Ranunculus Cymbalariae* Pursh. Pursh. Fl. Americ. II. 392.—*Led.*, Fl. ross. I. 34.—*Boiss.*, Fl. or. I. 52.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 17.

IV. Въ долинѣ р. Санталашъ, на сырыхъ мѣстахъ и въ ямахъ съ водой, близъ впаденія ручья Бешмайнакъ, 14. VIII. 1902 (*B. A. Федченко!!*).

У насы—рѣдкое растеніе верхней части зоны хвойныхъ. Виѣ Туркестанѣ встрѣчается въ О:—Джунгарскій Алатау, Тянь-шань; С:—долина Заравшана; Алайскій хребетъ, напр., между Капланъ-кулемъ и Гульпею (*Кушакевичъ!*); Памиръ.

Виѣ Туркестана—въ Сибири, Сѣверной и южной Америкѣ, сѣвер. Китая, Монголіи и Персии (*Hooker Fl. br. Ind.*).

28. *Ranunculus hyperboreus* Rottb. Act. Hafn. X. p. 458. Subsp. *natans* (C. A. Mey.) Rgl.

*E. Regel* Pl. Raddeanae № 59.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 18. *R. natans* C. A. Mey. in *Led.*, Fl. alt. II. 316.—*Led.*, Fl. ross. I. 34.

1878. *Ranunculus hyperboreus*, *A. Regel* Reisebr. 202.  
1896. " " " *a natans*, *Комаровъ* Зеравшанъ № 38.

I. Джиламышъ, 10—11.000', 26. VI. 1880 (*Фетисовъ!*).  
II. Подъ переваломъ Кумбель, 6 или 9.000', IX. 1876 (*A. Regel!*).

IV. Въ протокѣ верхняго Чаткала 2. VII. 1899 (*Литвиновъ!*).  
Въ нашей области встрѣчается не часто, въ лужахъ съ водой и заводяхъ въ субальпійской и альпійской зонѣ.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О:—Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Тянь-шань—напр., въ ручьяхъ, впадающихъ въ озеро Сонъ-куль (открыто еще въ 1867 году барономъ *F. P. Остенъ-Сакеномъ!*, собрано также 26. VII. 1879 *Фетисовъ!мъ!*).

Кромѣ *subsp. natans*, въ Туркестанѣ встрѣчается еще *subsp. radicans* (C. A. Mey.) Hook.: О:—Тарбагатай. Для С:—Памиръ указана еще var. *parvispatulus* Bruhl., но не есть ли это *R. Cymbalariae*?

Виѣ Туркестана встрѣчается въ арктической Сибири и горахъ сѣвернаго полушарія.

29. *Ranunculus repens* L. Sp. pl. ed. 1-а p. 554.—1753. *Led.*, Fl. ross. I. 43.—*Boiss.*, Fl. or. I. 39.

IX. Караколь, притокъ р. Сусамыра, 7.000', 1. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

Единственный экземпляръ, собранный въ предѣлахъ нашей области, не вполнѣ типично: стебель повидимому не былъ такимъ стелющимся и укореняющимся, какъ у настоящаго *R. repens*. Цвѣтоловѣ съ рѣдкими волосками.

Виѣ Туркестанѣ встрѣчается преимущественно въ Н:—Акмолинская обл., также въ О:—Тарбагатай, Джунгарскій Алатау (напр., озеро Сайрамъ 1878 г., *A. Regel!*), Тянь-шань (напр., Джасылъ-куль 17. V. 6. V. 1873—*Кушакевичъ!* Дженишке 2. VI. 1873—*Кушакевичъ!*).

Виѣ Туркестана встрѣчается по всей Европѣ, Сибири, въ Китай и Сѣверной Америкѣ.

30. *Ranunculus gelidus* Kar. et Kir. Enumer. pl. songor. № 27. (Bulletin de la Soci  t   Imp  riele des Naturalistes de Moscou XV.). 1842.—*Led.*, Fl. ross. I. 733.

I. Съверный склонъ Александровскаго хребта, Аламединъ 23—26, V. 1880, 5—9000', Кольторъ 7. VII. 1882, 10.000', Арассанъ 5. VI. 1880, 9—11.000' (*Фетисовъ!*).

Въ нашей области — рѣдкое альпийское растеніе; отъ близкихъ видовъ (*R. rufosepalus*, *R. songoricus*) отличается преимущественно характеромъ опушения чашелистиковъ (прижато-блѣловато-пушистые) и формой долекъ листьевъ (продолговато-эллиптическія, на черешечкахъ).

31. *Ranunculus sulphureus* Soland in Phipps Voyage (ed. gall.) 206.

*R. frigidus* Willd. Крыловъ, Флора Алтая № 38.

Subsp. *altaicus* (Laxm.) Trautv. Enumer. pl. Songor. № 33.

*R. altaicus* Laxm. in Nov. Comm. Acad. Petrop. XVIII p. 533. — 1774. — *Led.*, Fl. ross. I. 37.

I. Карагай булакъ, 9.500'—10.500', 6. VII. 1882. (*Фетисовъ!*).

Subsp. *Alberti* (Rgl. et Schmalh.) Maxim. Flora Mongol. № 34.

*R. Alberti* Regel et Schmalh. in E. Regel Descr. pl. nov. fasc. V. p. 223 (Act. Horti Petrop. V.). 1877.

1877 *Ranunculus Alberti*, E. Regel l. c.

1878 " " A. Regel Reisebriefe 200.

1899 " " Федченко Ranunculaceae № 67.

I. Кольторъ, 10.000', 7. VII. 1882, Аламединъ, 5—9.000', 23—25. V. 1880, Джиламышъ, 9.000', 26. VI. 1880 (*Фетисовъ!*).

II. Караколь (верхний Таласъ), VIII. 1876 (A. Regel!), подъ переваломъ Кумбель, 9.000', IX. 1876 (A. Regel!).

Въ нашей области встрѣчаются двѣ изъ числа разнобразныхъ формъ этого вида. Обѣ онѣ встрѣчаются исключительно въ подъальпийской и альпийской зонѣ съверо-восточной части нашихъ горъ.

Встрѣчается еще въ О: — Центральный и Восточный Тянь-шань; Джунгарскій Алатау.

Кромѣ Туркестана, разныя формы *R. sulphureus* известны въ арктическихъ странахъ и горахъ Сибири.

32. *Ranunculus songoricus* Schrenk in Fischer et Meyer Enumer. (II-a) plant. novar. p. 67.—1842.

(74)

1882 Einige Ranunculus, A. Regel Gartenflora 361, 362.

1890 *Ranunculus rubrocalyx*, Комаровъ Зеравшанъ № 40.

1899 *Ranunculus songoricus*, Федченко Ranunculaceae № 69.

I. Аламединъ, 3—9.000', 23. V., тамъ же 25—27. V. 1880, Арассанъ, 7—9.000', 5 и 7. VI. 1880 (*Фетисовъ!*).

IV. На травянистыхъ склонахъ подъ ледникомъ Акътурпакъ, 10.500', 27. VII. 1897 (Б. А. Федченко!!), на вершинѣ Большого Чимгана, 8. VIII. 1897 (Ю. Пьянковская!).

V. Истоки р. Ангрена, Аршанъ булакъ, 20. VI. 1880 (A. Regel! — собрано Мусою).

VI. Ходжентъ 1880 (A. Regel!?) — мѣстонахожденіе весьма сомнительное.

IX. Вершины Сусамырскаго хребта, 19. VII. 1881, 9—11.000' (*Фетисовъ!*)

XI. Среднее теченіе р. Яссы, 6—9.000' (A. Regel!). У перевала Кугартъ, 7—8.000', травянистые склоны горъ, 5. VIII. 1895 (С. Коржинскій!), альпийскія лужайки по р. Уракъ-су бл. пер. Кенколъ, 9.000', 29. V. 1899 (*Литвиновъ!*).

Въ горахъ Туркестана распространено довольно широко: О: — Джунгарскій Алатау, Восточный и Центральный Тянь-шань; С: — Алайскій хребеть, Горная Бухара.

Виѣ Туркестана извѣстно въ Съверной Монголіи.

33. *Ranunculus rufosepalus* Franchet, Plantes du Turkestan. Mission Capus p. 217 („Annales des Sciences Natur. Botan.“) 1883.

1877 *Ranunculus lasiocarpus*, E. Regel Descr. pl. nov. fasc. 5, p. 223.

1883 *Ranunculus rufosepalus* Franchet l. c.

1896 " " Комаровъ Зеравшанъ № 39.

1899 " " Федченко Ranunculaceae № 75.

II. На сланцахъ у перевала Кумышъ-тачъ, 11.000', 11. VIII. 1897 въ цв. и съ пл. (Б. А. Федченко!!).

IV. Близъ 4-го Чотанскаго ледника (Д. Иванова) 8. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), у перевала Тюсъ-ашу, на щебиѣ, 31. VII. и 6. VIII. 1897 въ цв. и пл., 11—12.500' (Б. А. Федченко!!), на сланцевой горѣ у тающаго снѣга возлѣ ледника одного изъ верхнихъ притоковъ р. Майдантала, 10.500', 1. VIII. 1897, въ пл. (Б. А. Федченко!!), по р. Кокъ-су (Капю! — экземпляры имѣются въ Сиб. гербаріи, хотя въ печатной

(75)

работъ Франше эта мѣстность и не значится), Туриакъ бель, 23 октября (?) 1881 (*Капю* — п. в.), долина Она-Ульгана, 2.500'; 22. VIII. (*Капю* — п. в.), на высокихъ горахъ Алатау, 8—10.000', (*Кушакевичъ*, *Корольковъ*); переваль Афлатунъ, 30. VI. 1899 (*Литвиновъ!* — очень крупная форма), тамъ же 22. VIII. 1902 (*Б. А. Федченко!!*), у перевала Куль-ашу, 10. VIII. 1902 (*Б. А. Федченко!!*), по р. Иша-гульды, въ верховьяхъ Санталаша, VIII. 1902 (*Б. А. Федченко!!*), на г. Большой Чимганъ, 18. VII. 1900 (*Е. Хомутова!*).

V. Верховья Ангрена, Аршанъ-булакъ, 20. VI. 1880 (*A. Регель!* — собрано *Мусою*).

VII. Въ верховьяхъ р. Качкараты, 14. VIII. 1902 (казакъ (*Иванъ Яковлевъ!*)).

VIII. Переваль Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 10—12.000', 30. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

IX. Вершины Сусамырского хребта, 10—12.000', 5. VII 1881 (*Фетисовъ!*).

Широко распространено въ алтайской зонѣ нашихъ горъ по щебниевымъ розсыпямъ и каменистымъ склонамъ.

Въ Туркестанѣ встрѣчается только въ алтайской зонѣ горъ: О: — Центральный Тянь-шань, S: — Заравшанъ (*Комаровъ!*), Дарвазъ: Ванчъ, 9—10.000', 12. VI. 1897 (*C. Коржинский!*), Алайский хреб., пер. Свѣ, осоковая луговина, 11.700', 27. VI. 1895 (*Коржинский!*), переваль Тенгизбай, Джиргеталь (*C. Коржинский!*).

Виѣ Туркестана пока неизвѣстно.

Это растеніе очень близко къ *R. songoricus* Schrenk. и связано съ нимъ переходными формами.

**34. *Ranunculus polyrhizos* Steph. in Willd. Sp. pl. II. 1824. — *Led.*, Fl. ross. I, 39. — *Boiss.*, Fl. or. I. 27.**

1878 *Ranunculus polyrhizos*, A. Regel Reisebr. 169.

I. Кольторъ, 12.000', 8. VII. 1882, въ цв. (*Фетисовъ!* — очень плохой экземпляръ въ цвѣту, который былъ отнесенъ Э. Регелемъ къ *R. polyrhizos* и лежитъ подъ этимъ названіемъ въ Спб. гербаріи, но съ равнымъ правомъ можетъ быть названъ напр. *R. songoricus*).

IV. Ташкентъ (*Кушакевичъ!*), тамъ же (*A. Регель* — п. в.); переваль Кумдаванъ близъ Наркента, 9. IV. 1880 (*Мусса!*).

У настъ довольно рѣдкое, почти сомнительное растеніе. Въ Туркестанѣ встрѣчается преимущественно въ N: отъ Индерскихъ горъ до Норъ-Зайсана; О: — Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Тянь-шань; S: — Аучи-дагана на сѣверномъ склонѣ Туркестанскаго хребта (*O. A. Федченко!*).

Виѣ Туркестана встрѣчается въ южной части Европейской Россіи, на Кавказѣ, въ Армении и Южной Сибири.

**35. *Ranunculus affinis* R. Br. in Parry's I. Voyage Append. p. CCLXV. — *Led.*, Fl. ross. I. 37. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 18.**

1883 *Ranunculus affinis*, Franchet Mission Capus 218.

IV. По р. Она (-Анда) Ульгана, (*Капю* — п. в.).

XI. Среднее теченіе р. Яссы, 30. V. 1880 (*A. Регель!*).

Въ нашей области встрѣчается крайне рѣдко. Гораздо чаще въ О: — въ Центральномъ и Восточномъ Тянь-шанѣ и въ Джунгарскомъ Алатау; S: — указано для Горной Бухарѣ, но въ бассейнѣ Заравшана не найдено.

Виѣ Туркестана распространено очень широко. Новая Земля, Сибирь до Таймырского полуострова и земли Чукчей, сѣверная Монголія, Гималаи.

**36. *Ranunculus polyanthemos* L. Sp. pl. ed. I-a p. 554. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 41. — *Boiss.*, Fl. or. I. 39.**

I. Кольторъ, 6. VII. 1882, 7000' (*Фетисовъ!*).

Въ нашей области крайне рѣдкое растеніе. Гораздо обыкновеннѣе въ N: — отъ Мугоджаръ до Омска и въ О: — Джунгарскій Алатау, Центральный Тянь-шань.

Виѣ Туркестана встрѣчается въ Европѣ и Южной Сибири до Иркутска.

**37. *Ranunculus acris* L. Sp. pl. ed. I-a p. 554. — 1753.**

Subsp. *Steveni* (Andrz.) *Led.*, Fl. ross. I. 41.

*R. Steveni* Andrz. in Bess. Suppl. ad enumer. pl. horti botan. Volhyn. (1814) p. 19.

*R. laetus* Wall., *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 19.

*R. acris* L. var., *Boiss.*, Fl. or. Suppl. 12.

1899 *Ranunculus laetus*, *Федченко* Ranunculaceae № 80.

1902 " " *O. A. Федченко* Списокъ № 80.

Туземн. назв.: „Чинаракъ“ (записано Невѣскимъ въ Гармѣ и Гиссарѣ).

IV. Ногай-курганъ близъ Ташкента, 1.300', 8. IX. 1869 (*O. A. Федченко!*), долина Чимгана, у истоковъ рѣчки, 16. VII. 1897, 5.000', въ цв. и съ пл. (*O. A. и Б. А. Федченко!!*), тамъ же 1899—1900, 7. VII. 1901 (*E. Хомутова!*).

VII. На сырыхъ мѣстахъ у озера Сарычиликъ, 24. VIII. 1902, въ пл. (*Б. А. Федченко!!*).

XI. Андижанскій у., Каво, 22. V. 1899 (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области встрѣчается нерѣдко по сырьмъ мѣстамъ и луговинамъ, въ долинахъ рѣчекъ, въ предгорьяхъ и горахъ, поднимаясь въ зону еловыхъ лѣсовъ. Отъ типическихъ *R. acris* отличается чрезвычайно рѣзко прежде всего характеромъ своихъ длинныхъ, толстыхъ, бѣловатыхъ, ползучихъ корневищъ. Отъ австро-венгерскихъ экземпляровъ *R. Steveni* (*Transsilvania*, *Torda*, leg. *G. et J. Wolff* и *Transsilvania*, com. *Hermanstadt*, leg. *Fuss*) повидимому не отличимо. Очень близкая форма *R. grandifolius* *C. A. Mey.* отличается повидимому болѣе длиннымъносикомъ плодовъ.

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ О: — Джунгарскій Алатау и Тянь-шань; S: — Памироалай.

Виѣ Туркестана различныя формы этого вида извѣстны по всей Европѣ и Сѣверной Азіи до Гималаевъ и Тихаго Океана, а также въ Сѣверной Америкѣ.

**38. *Ranunculus sceleratus* L.** Sp. pl. ed. I-a p. 551. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 45. — *Boiss.*, Fl. or. I. 52. — *Hook.* Fl. br. Ind. I. 19.

Туземн. назв.: („Юнушка-зардъ“, записано *О. А. Федченко* въ *Mariапѣ*).

IV. Ташкентъ, возлѣ арыковъ, VI. 1901 (*O. A. и Б. А. Федченко!!*), въ горахъ Карагату 1882 (*Маевъ!*).

XI. Карамкульскія горы, 10. IV. (*Краузе*), Арсланбобъ, 28. V. 1899 (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ распространено довольно широко, но всюду имѣть сорный характеръ и встрѣчается не часто: N: — въ степяхъ, между Нурай и Актауско-Каркаралинской дорогой (*Мирошниченко!*), Омскъ; O: — Вѣрный (*Кушакевичъ!*), Или, Иссыкъ-куль, Джагастай (*А. Регель!*); S: — Балыкчи, 5. IV. 1878 (*Невѣсскій!*), Самаркандъ, Магіанъ (*O. A. Федченко!*); W: — Закаспійская область.

Виѣ Туркестана распространено всюду въ умѣренномъ поясѣ сѣвернаго полушарія.

**39. *Ranunculus arvensis* L.** Sp. pl. ed. I-a p. 555. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 46. — *Boiss.*, Fl. or. I. 57. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 20.

III. Къ этому виду, какъ показало детальное изслѣдованіе, относятся 5 экземпляровъ, собранные (вѣроятно *Сѣверцовы* иѣ) около Чимкента; рукой Э. Регеля написано на этикетѣ „№ 21a *Ran. pulchellus* *C. A. Mey.* ♂ *trifidus* *Rgl.*“ и приведенъ диагнозъ этой „новой разновидности“; раньше было написано ♂ *brevipedunculatus* *Rgl.*, но зачеркнуто; очевидно, эти экземпляры и были описаны Э. Регелемъ подъ именемъ *R. pulchellus* *C. A. Mey.* ♂ *brevipedunculatus* (*Suppl. II ad Enumer. pl. Semen.* № 21a). Однако, Регель тамъ совершенно не упоминаетъ, гдѣ были собраны эти экземпляры.

IV. Ташкентъ, сады на Боссу, 11. IV. 1871 и сады на Саларѣ, 4. IV. 1871 (*O. A. Федченко!*<sup>1</sup>), Ташкентъ, около арыковъ, 3. V. (*Краузе!*), Ташкентъ, IV. 1882 (*A. Регель!*), Карагату 1882 (*Маевъ!*).

XI. Арсланбобъ 23. V. 1899 (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области представляеть почти сорное растеніе полосы предгорій, немного заходящее и въ горы.

Встрѣчается преимущественно въ южной части Туркестана: N: — только въ предгорьяхъ Карагату по Чаяну, 4. VI. 1876 (*A. Регель!*), S: — Заравшанъ; W: — Бухара.

Виѣ Туркестана встрѣчается въ Западной Европѣ, южной части Европейской Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Западной Азіи, въ Афганистанѣ и Гималаяхъ.

**40. *Ranunculus muricatus* L.** Sp. pl. ed. I-a p. 555. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 47. — *Boiss.*, Fl. or. I. 56. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 20.

IV. Ташкентъ 1882 (*A. Регель!*).

<sup>1</sup>) Отъ этихъ экземпляровъ Э. Регель не возвратилъ образцовъ въ гербарій Московскаго Университета, благодаря чему эти мѣстонахожденія и не вошли въ трудъ *O. A. Федченко: Списокъ растеній, собранныхъ въ Туркестанѣ въ 1869—1871 годахъ*.

Встрѣчается въ нашей области очень рѣдко. Въ Туркестанѣ только на югѣ и юго-западѣ: S: — Заравшанъ (*O. A. Федченко!* и др.), Балыджуанъ, Кулябъ (*A. Регель!*), W: — Бухара, Китабъ, 23. IV. 1897 (*C. Коржинский!*), Закасп. обл. по р. Фирюзѣ, 16. IV. 1897 (*Литвиновъ!*).

Виѣ Туркестана распространено очень широко: отъ южной Европы до сѣверной Африки и Индіи, также въ сѣверной Америкѣ.

Приводимъ теперь нѣсколько неопределенныхъ указаний, которая невозможно отнести къ тому или иному виду.

1877 *Ranunculus*: alpine, mit gelben und weissen Blumen, *A. Regel*, Gartenfl. 13 — II: при подъемѣ къ перевалу Кумбель.

1882 *Ranunculus*: *A. Regel* Gartenfl. 114. Бискентъ.

1885 " съ Сонъ-куля, Сорокинъ 129 — X: Ущелье р. Шаръ-Каратма.

1896 *Ranunculus Majewskianus* Rgl., Конаровъ Зеравшанъ, № 67 — IV: Ташкентскій Карагатай — Маевъ.

1899 *Ranunculus Majewskianus* Федченко Ranunculaceae № 70.

1877 *Ranunculus orientalis* β *villosus* E. Regel Deser. pl. nov. fasc. 5, p. 220. Туркестанъ Сѣверцовъ.

1899 *Ranunculus orientalis* β *villosus* Федченко Ranunculaceae № 47.

*Приимѣніе.* Въ Туркестанѣ встрѣчаются кромѣ перечисленныхъ выше, еще видовъ 20 изъ рода *Ranunculus*. Назовемъ слѣдующіе:

- R. circinnatus Sibth. . . . N — — —
- R. Kochii Led. . . . . — — — W —
- (=R. edulis Boiss. et Hoh. = *Ficaria fascicularis* C. Koch).
- R. turkestanicus Franchet. . . . S — (end.)
- R. Olgae Rgl. et Schmalh. . . . S W —
- (cf. R. affghanicus Aitch et Hemsl. <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> R. affghanicus Aitch. et Hemsl. очень близокъ къ R. Olgae и, вѣроятно, представляетъ одну изъ формъ этого вида. Приоритетъ видового названія принадлежитъ R. Olgae (ноябрь—декабрь, 1881 г.) а не R. affghanicus (апр. 1882 г.).

- R. aureopetalus Komar. . . . — S — (endem.)
- R. pulsatillaefolius Litw. . . . — W (endem.)
- R. kopetdagensis Litw. . . . — W (endem.)
- R. Lingua L. . . . . N — — —
- R. polypyllum W. K. . . . N — — —
- R. plantaginifolius Murr. . ?
- R. Pamiri Korsh. . . . . — S — (endem.)
- R. auricomus L. . . . . N O — —
- R. grandifolius C. A. Mey. . — O S W —
- R. Kotschy Boiss. . . . . — — — W —
- R. ophioglossifolius Vill. . . . — — — W —
- R. lateriflorus DC. . . . . — — — W —
- R. nodiflorus L. . . . . N — — —

Нѣкоторые изъ этихъ видовъ, вѣроятно, найдутся и въ нашей области.

## 7. *Oxygraphis* Bge.

41. *Oxygraphis glacialis* (Fisch.) Bge. Verz. Fl. Altai p. 35. — 1835—1836 г. — *Led.*, Fl. ross. I. 47.

*Ficaria glacialis* Fisch. in litt. icon, DC. Syst. Veget. I. 305. — 1818.

*Ranunculus kamtschaticus*, DC. Syst. Veget. I. 302. — 1818 (inter species non satis notas!).

I. Перевалъ Колтыръ, на сѣверномъ склонѣ Александровскаго хребта, 8. VII. 1882, 12.000' (*Фетисовъ!*).

IX. Вершины Сусамырскаго хребта, перевалъ Кумбель, 5. VII. 1881, 10—12.000' (*Фетисовъ!*).

У насъ — рѣдкое альпийское растеніе, характерное для сырыхъ лужаекъ.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — Джунгарскій Алатау; Центральный Тянъ-шань и S: — Алайскій хребеть: Тенизъ-бай, 26. VI. (*Коржинский!*), перевалъ Кавукъ, выше 13.000', 24. VII. 1871 (*O. A. Федченко!*).

Виѣ Туркестана — Алтай, Даурія, Саяны, страна Тангутовъ; Гималай (*Максимовичъ*).

Э. Регель пытался установить разновидность съ пятью лепестками вѣнчика, var. *pentapetala* (in sched. herb. Petropol.!), но изъ оригиналъныхъ его экземпляровъ одни (перевалъ

Байбиче 29. VII. 1882 — собр. Фетисовъ!) имѣютъ не 5 лепестковъ, а 10—20, а другіе (перевалъ Мура, южный склонъ, 9 — 10.000', 5—14. VI. 1882—собр. А. Регель!) относятся къ *Ranunculus pulchellus v. flexicaulis* (Komar).

*Приимчаніе.* Изъ рода *Oxygraphis* для Туркестана приводится еще O. Schaftoana Aitch. et Hemsl.: S: — Дарвазъ, Карагинъ (Липецкъ — п. в.). — Нѣкоторые авторы (напр. Prantl, см. Engler und Prantl „Die natürlichen Pflanzengesammlungen“) принимаютъ родъ *Oxygraphis* въ болѣе широкомъ объемѣ, относя сюда и *Ranunculus Cymbalariae* Pursh. Подобное расширение я считаю неосновательнымъ.

### 8. *Callianthemum* C. A. Mey.

42. *Callianthemum alataicum* Freyn. Ueber neue und bemerkenswerthe orientalische Pflanzenarten (Bulletin de l'herbier Boissier, p 882). 1898.—I. Witasek, Die Arten der Gattung *Callianthemum* № 9 (Verhandl. d. zool. bot. Gesell. zu Wien 1899).

I. Переваль Карагай-булакъ, 9.500' — 10.500', 6. VII. 1883, Арассанъ, 9 — 11.000', 5. VI. 1880 (Фетисовъ!).

VIII. Переваль Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 10 — 12.000' 30. VII. 1881 (Фетисовъ!).

XI. Переваль Кенколъ, 11.000', 16. VI. 1899 (Литвиновъ!).

Довольно рѣдко въ альпийской области. Встрѣчается также въ О: — Центральный и Восточный Тянь-шань до Юлдуза (Фетисовъ!), S: — Заалайскій хребт., у истоковъ рѣки Кизылсу, VII. 1878 (Кушакевичъ!).

Внѣ Туркестана собрано еще въ горахъ надъ Керіей (Пржевальскій!), но экземпляръ оттуда, по мнѣнию г-жи Витасекъ, сильно отличается отъ туркестанскихъ образцовъ.

Изъ р. *Caltha* въ Туркестанѣ встрѣчается одинъ видъ *C. palustris* L.: N.

### 9. *Trollius* L.

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Листочки околоцвѣтника желтые или оранжевые . . . . .   | 2.                           |
| + Листочки околоцвѣтника свѣтлолилловатые . . . . .  | <i>T. lilacinus</i> Bgl.     |
| 2. Столбки обыкновенно темнопурпуровые, сегменты листьевъ островатые, все растеніе болѣе крупное . . . . .                                 | <i>T. altaicus</i> C. A. Mey |
| + Столбки обыкновенно желтоватые, какъ и завязи; сегменты листьевъ закругленно-туповатые; все растеніе обыкновенно менѣе крупное . . . . . | <i>T. songoricus</i> Rgl.    |

(82)

43. *Trollius altaicus* C. A. Mey. Verzeichn. d. Pflanz. gesam. im Caucasus, № 1728 in adnot. — 1831. — Led., Fl. ross. I, 50.

1878. *Trollius altaicus*, A. Regel Reisebr. 201.

1881. " *Middendorff Ferghana* 305.

1882. " *altaicus*, A. Regel Gartenflora 361.

1882. *Trollius*, A. Regel Gartenflora 361 (это показаніе относится, быть можетъ, къ слѣдующему виду).

1885. *Trollius*, Сорокинъ Тянь-Шань 129.

I. Переваль Каракія, IX. 1876 въ пл. (А. Регель!), Аламединъ, 3 — 5.000', 26 — 7. V. 1880 (Фетисовъ!).

IV. Въ долинѣ р. Санталашъ, у впаденія ручья Бешмайнакъ, 14. VIII. 1902, въ цв., у тающаго снѣга (Б. А. Федченко!!), подъ переваломъ Торпакъ-бель, по ручью, въ субальпийской зонѣ, 3. VIII. 1902 въ цв. (Б. А. Федченко!!).

V. Горы Адрашанъ около р. Тирсу, въ цв. (Краузе!).

VIII. Терекъ, въ верх. Узунъ-ахмата, 9.000', 29. VII 1881 (Фетисовъ!).

IX. Ущелье р. Шарь-каратма (Сорокинъ! — на экземпляре надпись: Кумбель - Карасу - Турдукъ 12. VIII); Кобукъ на южномъ склонѣ Сусамырского хребта, 7.000', 6. VII. 1881 (Фетисовъ!), вершины Сусамырского хребта, 9 — 11.000', 19. VII. 1881 (Фетисовъ!), Караколъ надъ притокомъ р. Сусамыръ, 9 — 10.000', 1. VIII. 1881 (Фетисовъ!).

XI. Верховья р. Яссы (А. Регель!); субальпийские луга по р. Уракъ-су бл. перевала Кенколъ, 29. V. 1899, 8.000' (Литвиновъ!), на перевалѣ Кенколъ, 10 — 11.000', 16. VI. 1899 (Литвиновъ!).

Въ нашей области встрѣчается преимущественно по сырьемъ луговинамъ вдоль ручьевъ въ полосѣ войныхъ, поднимаясь однако и въ настоящую альпийскую область.

Въ Туркестанѣ встрѣчается не рѣдко въ О: — Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Тянь-шань.

Внѣ Туркестана встрѣчается на Алтай; указано еще для окрестностей Нерчинска и Якутска.

44. *Trollius songoricus* Rgl. *T. dschungaricus* E. Regel Suppl. ad fasc. VII. Descri. pl. nov. (Acta Horti Petrop. VII. p. 383). 1880.

(83)

*T. europaeus* ♀ *songoricus*, E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 35a (Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou). 1870.

*T. altaicus* v. *latilobus* Rupr. (ex specim.). Osten-Sacken et Rupr., Sertum tianschan. p. 37, sine descript., nomen solum. — 1869.

I. Арассанъ, 4. VI. 1880, Аламединъ, 5 — 9.000', 23 — 5. V. 1880, Несыгаты, 15. V. 1881, 10.000', (Фетисовъ!).

Извѣстно пока лишь на крайнемъ съверо-востокѣ нашей области, хотя вѣроятно встрѣчается и въ другихъ мѣстностяхъ.

Въ Туркестанѣ извѣстно въ О: — Центральный Тянь-шань и С: — Заалайскій хреб., Бордаба (*Назаровъ!* — ошибочно было мною отнесенено къ *T. patulus* Salisb.).

Въ Туркестана не показано, хотя экземпляры, собранные Г. Н. Потанинымъ въ Съверной Монголіи относятся повидимому также къ *T. songoricus* Rgl. Вообще видъ этотъ повидимому достаточно отличается отъ близкихъ *T. europaeus*, *T. asiaticus* и *T. allaicus*. Въ Гималаяхъ встрѣчается очень сходная по общему габитусу форма *T. acaulis* Lindl., но этотъ видъ сразу отличается уже малымъ числомъ листковъ околоцвѣтника (менѣе 10).

45. *Trollius lilacinus* Rgl. Verz. Pflanz. Altai, p. 33. — 1835—6.

*Hegemone lilacina* Bge. in litt., Led., Fl. ross. I. 51. 1877. *Trollius patulus* ♂ *sibiricus* E. Regel Descr. (Act. H. P. V. 224).

1882. *Hegemone*, A. Regel Gartenfl. 362.  
1883. *Trollius patulus*, Franchet Mission Capus 219.  
1899. „ *europaeus* v. *Songorica* (ex parte) Федченко Ranunculaceae № 94.

1899. *Hegemone lilacina* v. *micrantha*, Федченко Ranunculaceae № 98.

I. Переваль Кумбель, 9.000' (A. Regel!), Арассанъ 9 — 11.000', 4. VI. 1880 (Фетисовъ!).

IV. Торпакъ-бель, 2.500', 23. VIII. (Капю — п. в.), въ верховьяхъ Майдантала, по ручью Чотанъ, 10.400', 27. VII. 1897, зацвѣтаетъ, 6. VIII 1897 уже отцвѣтаетъ (Б. А. Фед-

(84)

ченко!!), Аидаульгашъ, сырье луга, 8 — 9.000', 23. VII. 1897 въ пл. Б. А. Федченко!!).

V. Истоки р. Ангрена, Аршанъ-булакъ, 20. VI. 1880 (A. Regel! — собрано Муссой!).

IX. Вершины Сусамырского хребта, переваль Кумбель 10 — 12.000', 5. VIII. 1881 (Фетисовъ!).

X. Спускъ съ пер. Яссы къ р. Алабутъ (A. Regel — п. в.). Встрѣчается въ альпійской области Туркестанскихъ горъ: О: — Джунгарскій Алатау, Тянь-шань до Юлдуза; С: — Заравшанъ (О. А. Федченко и др.), Алайскій хребеть (О. А. и Б. А. Федченко!!), Дарвазъ, Сахарскія ворота 8 — 10.000' (A. Regel!), Гиссарскій хребеть, пер. Лягоримурда, 3. VIII. 1878. (*Невъскій!* — это самое западное мѣстонахожденіе).

Въ Туркестана извѣстно лишь въ альп. области Алтая. Кроме трехъ названныхъ видовъ, для Туркестана указано еще нѣсколько:

*T. europaeus* L. (f. *typica*) производится для окр. гор. Омска С. И. Коржинскимъ, но по свидѣтельству М. М. Сязова (in litt.) тамъ не встрѣчается.

*T. asiaticus* L. приводится для обоихъ склоновъ Тянь-шаня и для Джунгарскаго Алатау; я не видѣлъ однако типичныхъ экземпляровъ этого вида изъ Туркестана.

*T. patulus* Salisb. приводится лишь по ошибкѣ и въ Туркестанѣ не встрѣчается.

## 10. *Eranthis* Salisb.

46. *Eranthis longistipitata* Rgl. Suppl. II. ad enumer. plant. Semen. № 36 b. (in Bulletin de la Soci  te Imp  riale des Naturalistes de Moscou, vol. XLIII). 1870.

1870. *Eranthis longistipitata*, E. Regel I. c.  
1877. „ „ „ E. Regel Descr. (Act. H. Petr. V. 224).

1878. *Eranthis longistipitata*, A. Regel Reisebr. 168.  
1882. „ „ „ A. Regel Gartenfl. 113.  
1899. „ „ „ Федченко Ranunculaceae № 99

1902. „ „ „ О. А. Федченко Списокъ № 35.  
III. Въ горахъ Карагату (*Krauze*), станція Машатъ, 27. III.

1880 (A. Regel!), истоки р. Бугунъ, 30. III. въ цв. (Съверцовъ!).

(85)

IV. Ташкентъ 1871 г. (О. А. Федченко!), тамъ же (Кушакевичъ! А. Регель! П. Хомутовъ!).

V. Ст. Уральская между Ташкентомъ и Ходжентомъ, 16. IV. 1880 (А. Регель!), правый берегъ р. Сырь-дары близъ Ходжента, 17. IV. 1880 (А. Регель!), Моголь-тау 4. IV. въ пл. (Съверцовъ!).

Въ нашей области встречается нерѣдко въ культурной зонѣ, въ предгорьяхъ. Цвѣтеть въ мартѣ.

Въ Туркестанѣ кромѣ того встречается въ О: — исключительно около перевала Курдай, 20. III. 1879 (Фетисовъ!), въ С: — Уратюбе, 4. 5.000', 17. IV. 1880 (А. Регель!); Джизакъ, 25. III. 1882 (А. Регель!), Балыджуанъ, Кулябъ, Каляихумъ, р. Вахшъ, Гиссаръ, Курганъ-тюбе (А. Регель), Заравшанъ (О. А. Федченко!), В: — Закасп. обл. горы бл. Асхабада (Литвиновъ!), въ Нуратинскихъ горахъ, бл. Темиръ-кабука 22. III. 1873 (Короликовъ и Краузе!).

Внѣ Туркестана не известно.

## II. *Isopyrum* L.

1 Растенія съ толстымъ вѣтвистымъ корневищемъ, цвѣтки крупные. . . . . *I. grandiflorum* Fisch.  
Корневище тонкое, горизонтальное, листочки мелкие. *I. anemonoides* Kar. et Kir.

47. *Isopyrum anemonoides* Kar. et Kir. Enumer. pl. song. № 55. („Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“ XV.) 1842 — *Led.*, Fl. ross. I. 735. — *Boiss.*, Fl. or. Suppl. p. 16.

*I. thalictroides*, *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 23.

І. Аламединъ, 23—25. V. 1880 (Фетисовъ!), Арассанъ, 9—11.000', 5. VI. 1880 (Фетисовъ!).

VII. Перевалъ Афлатунъ, 12.000', 30. VI. 1899 (Литвиновъ!).

IX. Сѣверный склонъ Сусамырского хребта, 7—9.000', 4. V. 1881 (Фетисовъ!), вершины Сусамырского хребта надъ западнымъ концомъ долины Сусамыръ, 12.000', 21. VII. 1881 (Фетисовъ!).

XI. Горы надъ Арсланбобомъ, въ субальпийской области, 7. VI. 1899 (Литвиновъ!), на склонахъ въ тѣни по р. Уракъ-су близъ перевала Кенколъ, 30. V. 99, 7.000' (Литвиновъ!).

(86)

Въ нашей области встречается изрѣдка, преимущественно въ субальпийской зонѣ; указывается и для альпийской зоны, гдѣ поднимается, будто бы, до 12.000'.

Въ Туркестанѣ вообще не рѣдко въ горахъ: О: — Джунгарский Алатау, Тянъ-шань; С: — Алтайский хребетъ, Заравшанъ.

Внѣ Туркестана встречается въ Гималаяхъ и Афганистанѣ.

48. *Isopyrum grandiflorum* Fisch. in DC. Prodrom. I. 48.— 1842. — *Led.*, Fl. ross. I. 53. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 23.

*Aquilegia anemonoides* Willd., Gesellsch. naturforsch. Freunde, Berlin V. t. 9. 1811. — DC. Prodr. I. 51.

1899. *Isopyrum grandiflorum*, Федченко Ranunculaceae № 100.

I. Арассанъ, 9—11.000', 5. VI. 1880 (Фетисовъ!), перевалъ Кольторъ, 12.000', 8. VII. 1882 (Фетисовъ!).

II. На склонахъ у самаго перевала Кумышъ-тагъ, 10.500', VIII. 1897 (Б. А. Федченко!!).

IV. Санташъ на р. Чирчикъ, 28. VI. 1880 (А. Регель!) — собрано Мусою.

VII. Перевалъ Афлатунъ, скалы, 12.000', 30. VI. 1899 (Литвиновъ!).

VIII. Перевалъ Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 10—12.000', 30. VII. 1881 (Фетисовъ!).

IX. Вершины Сусамырского хребта, надъ западнымъ концомъ долины Сусамыръ, 12.000', 21. VII. 1881, 18. VII. 1881, тамъ же на высотѣ 8—10.000' (Фетисовъ!).

У насъ встречается не рѣдко въ альпийской зонѣ большинства хребтовъ, на скалахъ.

Въ Туркестанѣ встречается еще въ О: — Джунгарский Алатау, Центральный Тянъ-шань и С: — Алайский хребетъ (О. А. Федченко!, Кушакевичъ!), Заравшанъ (О. А. Федченко и др.), Горная Бухара: Кулябъ, въ гор. Куфрушъ, 10.000', VI. 1883 (А. Регель!).

Внѣ Туркестана встречается въ Монголіи, Тибетѣ, Гималааяхъ и на Алтаѣ.

(87)

12. *Nigella* L.

- Листовки сросшиеся до верхушки, бугорчатые. Всё листья перистораздельные . . . . . *N. sativa* L.  
 Листовки у верхушки свободные, пушистые, нижние листья цельные, верхние длапевидноразделенные . . . . . *N. integrifolia* Rgl.

49. *Nigella integrifolia* Rgl. Suppl. II. ad enumer. pl. Semen. № 43а (in „Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou,” vol. XLIII p. 246). 1870.—*Brand*, Monographie der Gattung *Nigella* № 3.

*N. diversifolia* Franchet, Plantes du Turkestan, Mission Capus („Annales des Sciences Naturalles,” Botan. XV. p. 220). 1883.

*Komaroffia diversifolia* O. Kuntze, Pl. or. ross (Acta Horti Petrop. X. p. 144). 1887.

1870. *Nigella integrifolia* Regel l. c.

1899. " " Федченко Ranunculaceae № 104.

1902. " " О. А. Федченко Список № 39.

IV. Между Ташкентом и Келесомъ, 22. IV. 1871 въ цв. (О. А. Федченко!) возлъ Ташкента (Кушакевич!).

VI. Моголь-тау, 28. IV. въ пл. (Съверцовъ!), тамъ же 23. V. (Скорняковъ!).

Въ Туркестанѣ встрѣчается очень рѣдко въ N: — степь между р. Чу и горами, урочище Какогатасть, 6. V. 1876 (М. Кушакевич!), гораздо чаще въ S: — Фергана, у кишлака Мады (О. А. и Б. А. Федченко!!), горы Кхарлы-тау къ югу отъ Ходжента (Съверцовъ!), Голодная степь (*Mussel*!), Заравшанъ — до 7.000' (О. А. Федченко!, В. Комаровъ!), въ предгорьяхъ Бухары: Гиссарь, Кабадіанъ (С. Коржинскій!), Курганъ-тюбе (*Mussel*!), между Ширишъ-хаты и Зіусдиномъ, 23 IV. 1884 (А. Регель!), Сарыпуль на р. Аксу, V — VI. 1884 (А. Регель!), Бальджуанъ (А. Регель!), Йомутъ (А. Регель!), Сарай на р. Пяндъжъ V. 1884 (А. Регель!), у истоковъ Курганъ-булака, къ съверу отъ Кабадіана, 4.000', 28. IV. 1883 (А. Регель!), встречается также и въ W: — Закасп. обл.

Въ Туркестана встречается лишь въ пограничныхъ съ Закаспійской областью частяхъ Афганистана.

(88)

50. *Nigella sativa* L. Sp. pl. ed. 1-а 534.—1753.—*Brand*, Monogr. Nigell. № 18.

Туземн. назв.: „Сія-дона“ (въ Самарканѣ).

IV. Возлъ Ташкента (Кушакевич!).

Въ нашей области — рѣдкое сорное растеніе. Такой характеръ имѣть это растеніе и въ другихъ частяхъ Туркестана: О: — Иссыкъ-куль, Музартъ, VIII. 1877 (А. Регель! — обломки, и самое мѣстонахожденіе довольно сомнительное), S: — Самарканѣ, сорное (О. Федченко!).

Встрѣчается также въ Южной Европѣ и передней Азии.

Примѣчаніе. Извѣдь рода *Nigella* для Туркестана указывается еще *N. arvensis* M.B. v. *foeniculacea* DC. (W: — Сѣверная Туркмения, Карелинъ; скорѣе можно было бы ожидать нахожденія этого растенія гдѣ-нибудь въ Закаспійской обл.). Въ Гербаріи Императорскаго Ботан. Сада есть еще экземпляръ *N. Damascena* L. изъ Кульджи, VII. 1877 (А. Регель!).

13. *Aquilegia* L.

1. Шпорцы на концѣ загнутые; оклоцвѣтникъ темно-лиловый . . . . . *A. vulgaris* L. v. *Karelini* Baker.  
 Шпорцы на концѣ почти прямые; оклоцвѣтники блѣдоватые, желтоватые, рѣже свѣтло-голубые . . . . . *A. Moorcroftiana* Wall. v. *lactiflora* Brühl.

51. *Aquilegia Moorcroftiana* Wall. Catal. № 4713.

Var. *lactiflora* (Kar. et Kir.) Brühl, Ranunc. ind. („Journ. As. Soc.“ LXI p. 310).

*A. lactiflora* Kar. et Kir., Enum. pl. alt. № 35.—*Led.*, Fl. ross. I. 737.

1882. Weissblaue Aquilegia, *A. Regel* Gartenfl. 361.

IV. Въ Туркестанскомъ гербаріи Императорскаго Ботан. Сада хранится одинъ экземпляръ, собранный Кушакевичемъ, съ этикеткой „prope Taschkent“. Однако, при этомъ же экземпляре сохранилась и оригиналная этикетка Кушакевича „Андерсай 17. V. 1869“. Вероятно, это растеніе собрано гдѣ-нибудь близъ кишл. Андерсай, къ югу отъ Ходжента, т. е. уже въ предѣловъ нашей области.

(89)

VII. Пер. Афлатунъ, 9.000', 29. VI. 1899 (*Литвиновъ!* — f. *pallescens*), въ долинѣ р. Афлатунъ, близъ впаденія рѣки Уялмы-чаты, посл. цв. и зрѣл. пл., 22. VIII. 1902, на камняхъ среди кустарниковъ (Б. А. Федченко!!).

XI. Верховья р. Яссы (*A. Regel* — n. v.), по р. Карагуртъ, около 6.000', 30. V. 1899 въ цв. (*Литвиновъ!* — f. *coeruleascens*).

Встрѣчается не рѣдко въ О: — Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Тянь-шань; С: — Памироалай.

Внѣ Туркестана — въ Гималаихъ.

**52. *Aquilegia vulgaris* L. Sp. pl. Ed. 1-a p. 533. — 1753. *Led.*, Fl. ross. I. 55.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 24.**

Subsp. *Karelini* Baker. A Synopsis of the known forms of *Aquilegia* (Gard. Chron. 1878. II. p. 76.

*A. Sternbergii* Karel. et Kir. Enumer. pl. Song. № 36.—*Led.*, Fl. ross. I. 736.

I. Александровскій хребетъ, 9—10.500', 4. VI. 1880, Джиламышъ, 9.000', 26. VI. 1880, Аламединъ, 5—9.000', 23.—25. VI. 1880, Арассанъ, 7—9.000', 7. VI. 1880 (*Фетисовъ!*).

VII. Пер. Афлатунъ, 30. VI. 1899 (*Литвиновъ!*).

XI. Пер. Кугартъ, травянистые склоны горъ, 7—8.000', 5. VIII. 1895 (*C. Коржинскій!* — подъ назв. *A. pubiflora* Wall.), Кенколъ, 16. VI. 1899, 10.000' (*Литвиновъ!*)

Встрѣчается не часто въ полосѣ хвойныхъ на востокѣ нашей области. Въ Туркестанѣ встрѣчается въ горахъ: О: — Джунгарскій Алатау, Центральный Тянь-шань, С: — Алайскій хребетъ. Внѣ Туркестана подвидъ этотъ, повидимому, не встрѣчается, а различные другіе подвиды и формы *A. vulgaris* распространены чрезвычайно широко по сѣверному полушарію.

*Приимѣчаніе.* Для Туркестана приводятся еще нѣсколько формъ *Aquilegia*:

*A. Darwasi* Korsh. — — S — (end.) (вѣроятно, относится къ *A. Moorcroftiana* Wall.).

*A. glandulosa* Fisch. — O? — — —

*A. sibirica* Lam. — O — — —

*A. viridiflora* Pall. — — S — —

(90)

Вообще систематика рода *Aquilegia* разработана крайне плохо. Въ Гукеровой *Flora of British India* всѣ встрѣчающіяся въ Гималаихъ формы отнесены къ одному и тому же виду — *A. vulgaris*. Въ первомъ выпускѣ своихъ „*De Ranunculaceis Indicis Disputationes*“ *P. Brühl* (Journ. of. As. Soc. LXI, 1892 г.) также признаетъ всѣ Гималайскія формы принадлежащими къ одному лишь циклу, въ которомъ они отличаются XIV подвидовъ и свыше 40 разновидностей. Въ концѣ своей работы Брюль даетъ діагнозы всѣхъ признаваемыхъ имъ X видовъ р. *Aquilegia*, но изъ этихъ діагнозовъ нельзя не вывести того заключенія, что большинство изъ этихъ десяти „видовъ“ осталось не присоединенными къ тому же циклу *A. vulgaris* лишь по недостатку материала у монографа..

#### 14. *Delphinium* L.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Листовки одиночные. Лепестки сросшіеся . . . . .  | 2.   |
| Листовки по 3—5. Лепестки свободные . . . . .  | 5.   |
| 2. Листовки даже молодыя — голые . . . . .   | <i>D. barbatum</i> Bge.                      |
| Листовки пушистые, внослѣдствіи иногда<br>голые . . . . .  | 3.   |
| 3. Листовки дугообразно согнутыя, цвѣтоножки<br>обыкновенно почти равной длины съ цвѣт-<br>ками или длиниѣ ихъ . . . . . | <i>D. camptocarpum</i> F. et M.              |
| Листовки прямые или почти прямые, цвѣто-<br>ножки короче цвѣтковъ . . . . .  | 4.   |
| 4. Стебель очень сильно развѣтленный, вѣтки<br>растопыренныя . . . . .   | <i>D. persicum</i> Boiss.                    |
| Стебель простой или только при основаніи<br>слабо вѣтвистый . . . . .  | <i>D. rugulosum</i> Boiss.                   |
| 5. Цвѣтки желтые . . . . .   | 6.   |
| Цвѣтки синіе . . . . .   | 7.   |
| 6. Дольки листьевъ болѣе широкія, цвѣтоножки<br>пушистые кругомъ, листовки пушистые .                                    | <i>D. binternatum</i> Huth.                  |
| Дольки листьевъ болѣе узкія, цвѣтоножки съ<br>полоской волосковъ, листовки обыкновенно<br>голые . . . . .                | <i>D. Zalil</i> Aitch. et Hemsl.             |
| 7. Чашелистники голубые, снаружи и совнутри<br>пушистые; лепестки чернофиолетовые . . . . .                              | <i>D. dasyanthum</i> Kar. et Kir.            |
| Чашелистники снаружи и совнутри голые,<br>лепестки голубые, почти одного цвета съ<br>чашелистниками . . . . .            | 8.   |
| 8. Молодые листовки пушистые . . . . .   | <i>D. Batalini</i> Huth.                     |
| Молодые листовки голые, цвѣтоножки гораздо<br>длиннѣе цвѣтковъ . . . . .   | <i>D. longipedunculatum</i> Rgl. et Schmalh. |

(91)

53. *Delphinium camptocarpum* Fisch. et Mey. in *Led.*, Fl. ross. I. 58.—1841<sup>1)</sup>—*Karel. et Kiril.*, Enumer. pl. Songor. № 37 („Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“ XV. p. 136). 1842.

1895. *Delphinium camptocarpum*, *Huth* *Delphinium* № 12.

1899. " v. *dasycarpum*, *Федченко* *Ranunculaceae* № 116.

1902. *Delphinium camptocarpum* v. *dasycarpum*, *O. A. Федченко* Список № 44.

IV. Близь Ташкента 73 (*Корольковъ и Краузе*—по *Huth*'у; я не видѣлъ экземпляровъ); собрано еще между Орскомъ и Ташкентомъ, V. 1870 (*O. A. Федченко!*), но неизвѣстно, гдѣ имѣнно.

Такимъ образомъ, видъ этотъ можетъ считаться сомнительнымъ для флоры нашей области.

Въ Туркестанѣ распространено очень широко: N, O, S, W. Виѣ Туркестана неизвѣстно.

54. *Delphinium persicum* Boiss. in Ann. des Sciences natur., Botan., XVI. p. 362—1841.

1895. *Delphinium persicum*, *Huth* *Delphinium* № 9.

XI. Между г. Андижаномъ и р. Карасу, 25. V. 1880 (*A. Regel!*), Майли-саї 2. VI. 1878 (*Кушакевичъ!*), Испасканъ<sup>2)</sup> 30. V. (*A. Кушакевичъ!*).

Въ нашей области встрѣчается нечасто и только на юго-востокѣ.

Въ Туркестанѣ извѣстно еще въ S:—Фергана, предгорья Алая, уроч. Карауль, 16. VII. 1895 (*C. Коржинский!*), Кулябъ (*A. Regel!*).

Виѣ Туркестана—Закавказье, Месопотамія, Персія, Сѣверный Афганистанъ.

<sup>1)</sup> Въ своей монографіи *Huth* утверждаетъ, что книга Ледебура и статья Карелина и Кирилова появились обѣ въ 1842 г., которая раньше—неизвѣстно. Это не вѣро, такъ какъ *первый выпускъ* первого тома книги *Ledebour'a Flora rossica* появился въ 1841 г.

<sup>2)</sup> Эту мѣстность *Huth* (I. c.) называетъ „Isbeskai, Jul. Dasch“ (Юлдашъ—мужское имя!!) и „kschlan Isdaskan“ (вмѣсто кишлакъ=селеніе). *Huth* впрочемъ неповиненъ въ этихъ ошибкахъ такъ какъ ему были подобныи образомъ въ С.-Петербургѣ переведены съ русскаго языка обозначенія на этикеткахъ.

55. *Delphinium rugulosum* Boiss. in Ann. Sc. natur. Botan. XVI. p. 361.—1841.

1870. *Delphinium camptocarpum* v. *songoricum* E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 44.

1895. *Delphinium rugulosum*, *Huth* *Delphinium* № 10.

1899. " *Федченко* *Ranunculaceae* № 114.

1902. *Delphinium rugulosum*, *O. A. Федченко* Список № 43.

Туземн. назв.: Чита-чубъ (записано *O. A. Федченко*). II. Возлѣ Чулака и Кумбулака къ востоку отъ г. Аулієата, V. 1881 (*Musa!*).

IV. Возлѣ г. Ташкента (*A. Regel*—п. в.), степь между Ташкентомъ и Келесомъ, 1.300, 22. IV. 1871 въ цв., тамъ же, садъ (*O. A. Федченко!*).

VI. Моголь-тау, 25. IV. (*Съверцовъ!*), 23. V (*Скорняковъ!*); Сыръ-Дарья близь Ходжента, 14. IV. 1880 (*A. Regel!*).

XI. Коканъ (т. е. Ферганскія обл.—*Краузе!*), Среднее течение р. Яссы, V. 1880 (*A. Regel!*), степь между Базарь-курганомъ и Кокацомъ, 21. V. 1899 (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области встрѣчается изрѣдка въ полосѣ предгорій.

Въ Туркестанѣ распространено въ О:—Чингильды (*Семеновъ!*), S:—Заравшанъ; Бухарскія владѣнія: Гузарь (*Коржинскій!*), Курганъ-тюбе 1884 (*A. Regel!*), W:—Закаспійская область.

Виѣ Туркестана—Персія и Сѣверный Афганистанъ.

56. *Delphinium barbatum* Bgl. Reliq. Lehman. № 38 (Arbeit. naturf. Ver. zu Riga. I. 124). 1847.

1877. *Delphinium barbatum*, *A. Regel* Reisebr. 367.

1878. " " *A. Regel* Reisebr. 169.

1895. " " *Huth* *Delphinium* № 42.

1899. " " *Федченко* *Ranunculaceae* № 120.

Туземн. назв.: „Ульканъ“—(киргизское название, записанное *Невѣскимъ* на Карамукѣ).

III. Боролдай, 3. VI. 1876 (*A. Regel!*).

IV. Средний Чаткалъ, граниты, 4. VII. 1899 въ цв. и пл. (*Литвиновъ!*). Аксу 18. V. 1880 (*A. Regel!*), Ташкентъ, 2. VIII. 1876 и 1881 (*A. Regel!*), Сайлыкъ 4—6.000' (*A. Regel!*), Паркусъ при выходѣ Чирчика изъ горъ, 18. VI. 1881 (*A. Regel!*),

по р. Чарыкъ, 20. V. 1880 (*A. Regel!* — собрано *Mусою*). Въ нашей области исключительно въ предгорьяхъ на юго-западѣ.

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ N: — горы Карагату-Куланчикъ (*A. Regel!*), а въ особенности въ S: — Самаркандъ (*O. A. и Б. А. Федченко!!* и др.), Гиссаръ (*A. Regel!*), Джинзакъ (*Масъ!, Капю!*), Кулябъ (*A. Regel!*), Нимичи-боло, 26. VIII. 1878 (*Невъскій!*), Большой Карамукъ (*Невъскій!*).

Виѣ Туркестана неизвѣстно.

57. *Delphinium dasyanthum* Karel. et Kir. Enumer. pl. Songor. № 42 („Bulletin de la Soci  te Imp  riale des Naturalistes de Moscou“. 1842. XV. p. 138). — 1842. — *Led.*, Fl. ross. I. 738.

1877. *Delphinium caucasicum*, *A. Regel* Gartenfl. 10.

1878. " " *A. Regel* Reisebriefe 192.

1878. " *elatum* ? *palmatisidum*, *A. Regel* Reisebr. 200.

1883. *Delphinium altissimum* Hook. et Thoms. v. *glaucescens* Rgl., *Franchet Mission Capus* 221.

1895. *Delphinium speciosum*, *Huth Delphinium* № 77.

1895. " *villosum* ? *Winklerianum*, *Huth Delphinium* № 72.

1895. *Delphinium dasyanthum*, *Huth Delphinium* № 49.

1896. " " v. *undulatum* *Коларовъ*

Зеравшанъ № 65.

1896. *Delphinium speciosum*, *Коларовъ* Зеравшанъ № 63.

I. Аксу, 9. 500', — 10.000', 29. VI. 1880 (*Фетисовъ!* — *forma subscaposa!*), Арассанъ, 7 — 8. VI. 1880, 7 — 9.000' (*Фетисовъ!* — типичные высокие экземпляры); Джаламышъ 27. VI. 1880 (*Фетисовъ!*; по Huth'у этотъ экземпляръ относится къ *D. villosum* v. *Winklerianum*, по этому противорѣчить уже характеръ нижнихъ прицѣвѣниковъ: они надрѣзные, а не цѣльные, какъ должно быть у *D. villosum*...).

II. Подошва перевала Кумбель, въ долинѣ Каракола, VIII. 1876, коробочки съ высыпавшимися съменами (*A. Regel!* — очень сомнительный экземпляръ).

IV. Торпакъ-бель, долина Она (Анда) Ульгана, 23. VIII., 2.500' (*Капю.* п. v.), тамъ же, 6 — 7.000' (*Корольковъ!*); при подъемѣ къ перевалу Кумбель отъ Санталаша, 17. VIII. 1902 въ цв. (*Б. А. Федченко!!*), при подъемѣ къ перевалу Ка-

бура, VIII. 1876 (*A. Regel!* — не высокій, но типичный экземпляръ).

VIII. Перевалъ Кетмень-тюбе, Кумбель (*Сорокинъ* — по Huth'y); „traj. fl. super. Usuar Achmasch, ad 4.000'“ (*Фетисовъ* по Huth'у; мѣстонахожденіе удивительно переврано при переводѣ и перепискѣ: очевидно, это должно обозначать перевалъ (Терекъ?) въ верховьяхъ р. Узунъ-ахмата!).

IX. Съверный склонъ Сусамырского хребта, надъ западнымъ концомъ долины Сусамыра, 8 — 10.000', 18. VII. 1881 (*Фетисовъ!* — алтайская форма, листья узкораздѣльные, растеніе сильно мохнатое); долина р. Сусамыръ, 7.000', 12. VII. 1881, (*Фетисовъ!* — типичное высокое растеніе), Конураленъ (у Huth'a „Kokumeren“), южный склонъ Сусамырского хребта, 4.000', 8. VIII. 1881 (*Фетисовъ!*).

Въ Туркестанѣ распространено широко въ горахъ въ 0: — Джунгарскій Алатау и Тянъ-шань, S: — Памироалай.

Виѣ Туркестана съ достовѣрностью не извѣстно, хотя и указано для N.W. Индіи.

58. *Delphinium Zalil* Aitch. et Hemsl. The Botany of Afghan delimit. Commiss. („Transact. Linn. Soc.“ Ser. 2., III. p. 30). 1888.

1895. *Delphinium ochroleucum* *Huth Delphinium* № 108 (ex parte).

1895. *Delphinium Zalil*, *Huth Delphinium* № 131.

1896. " " *Коржинский* Очерки 54.

1899. " " *Федченко* Ranunculaceae № 144.

1902. " " *О. А. Федченко* Списокъ № 48.

Туземн. назв.: Испарякъ (запис. *О. А. Федченко*).

IV. Около Ташкента, 10. V. въ цв. (*Краузе*), возлѣ Ташкента 1871 (*О. А. Федченко* — по Huth'у; вѣроятно, тоже, что и слѣдующее мѣстонахожденіе), въ степи между Сыръ-Дарьей и Ташкентомъ, 700 — 1.400', 19 — 20. V. 1871 въ цв. (*О. А. Федченко!*), Ташкентъ, V. (*A. Regel!*), безъ ближайшаго обозначенія мѣстности (*Финкельштейнъ*).

V. Между Ташкентомъ и Ангреномъ, Ханкурукъ той тюбе, 17. V. 1880 (*A. Regel!*), Ганжулага, 17. V. 1880 (*A. Regel!*), Талдыбулакъ, Ангренъ, V. 1880 (*A. Regel!*).

VI. Бл. Ходжента (*Н. Корольковъ!*), степь между Рабатомъ и Джанбулакомъ, 24. V. 1878 (*A. Кушакевичъ!*).

XI. Среднее течениe р. Яссы (*A. Регель!*), кишлакъ Сивасканть 5. VI. (*Краузе!*), въ Ферганѣ (*Коржинский!*), много по Аджи-саю и Майли-саю 1. VI. 1878 (*А. Кушакевичъ!*).

Въ нашей области встречается преимущественно въ степной зонѣ предгорій, на югѣ. Въ Туркестанѣ встречается еще въ S: — Заравшанъ (*O. A. Федченко!, Комаровъ!*), Голодная степь (*A. Регель!*), Фергана: Шахимарданъ (*Кушакевичъ!*), перевалъ Така 27. VI. 1891 (*Брюсевичъ!*), Гулыша-Лянгаръ; 19. VIII. 1895 (*C. Коржинский!*), Самаркандъ — Келифъ на Аму-дарье (*Маевъ!*), Джалиганъ (*Невъеский!*), Пуль-и-хатумъ (*Коржинский!*), Вахшъ, Сахарскія ворота (*A. Регель!*); W — Закасп. обл. (*Литвиновъ!*).

Виѣ Туркестана извѣстно лишь въ сѣверо-западномъ Афганистанѣ и въ Хорассанѣ.

59. *Delphinium binternatum* Huth. Monogr. d. Gatt. *Delphinium* № 87 (Engler's Botanische Jahrbücher, XX Bd., p. 422. 1895).

1883. *Delphinium hybridum* v. *sulphureum* Rgl., *Franchet Mission Capus* 221.

1899. *Delphinium ochroleucum*, *Федченко Ranunculaceae* № 143.

III. Бородай 1876 (*A. Регель* — п. в.).

IV. Въ долинѣ Чимгана отъ 4.500' до 6.000': Красная гора, 24. VIII. 1897, у Песочного перевала 17. VII. 1897, въ ущельи 24. VII. 1897, на пути къ Юсупъ-хану, нач. авг. 1897 (*O. A. Федченко!*), близъ озера Урунгачъ, 2. VIII. 1902 (*B. A. Федченко!!*), близъ Ташкента (*Финкельштейнъ!*), возлѣ кипил. Пекемъ, 22. VII. 1897, 4.000' (*B. A. Федченко!!*), Бричъ-мулла 2.500' 19. VII. 1897 въ цв. и пл. (*O. A. и B. A. Федченко!!*), около Ходж(ак)ента и Бричъ-муллы, 3.000', VI. 1872 (*Корольковъ!*), въ долинѣ Чимгана, 1899 — 1901 (*E. Хомутова!*), Кизылъ-кушъ бл. Пекема (*Капю* — п. в.), по травянистымъ склонамъ въ Съемессасѣ, 9. VIII. 1902 (*B. A. Федченко!!*).

XI. Лѣсь бл. Арсланбоба, 17. VI. 1899 (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области исключительно въ предгорьяхъ и полосѣ лиственныхъ лѣсовъ. Пока найдено лишь на юго-западѣ, хотя вѣроятно, распространено гораздо шире.

Въ Туркестанѣ: O: — Караколь, Вѣрное; S: — Заравшанъ; Бальджуантъ (*A. Регель!*), Файзабадъ 16. VIII. 1878 (*Невъеский!*), W: — Закасп. обл. (*Литвиновъ!*),

Виѣ Туркестана не извѣстно.

Растеніе это съ успѣхомъ культивируется въ Ольгинскомъ саду (Можайск. уѣзда). Посѣянное въ 1898 г., оно зацвѣло въ 1900 г. и съ тѣхъ поръ продолжаетъ расти, сохранивъ свои признаки, но развиваясь болѣе роскошно, чѣмъ на родинѣ.

60. *Delphinium Batalini* Huth Monogr. d. Gatt. *Delphin.* № 107 (Engler's Botanische Jahrbücher, 1895.).

1895. *Delphinium Batalini*, *Huth* l. c.

IV. Хошъ-равать въ Ташкентскомъ Алатау 1880 (*A. Регель!*) Huth (l. c.) относить эту мѣстность къ „m. Alatau Taschen-tenses“ и говорить ошибочно, будто растеніе собрано *A. Регелемъ* въ 1888 г. — На травянистыхъ склонахъ въ долинѣ р. Карагорумъ, притока р. Чаткаль, въ цв. 6 — 7.000', 10. VIII. 1902 (*B. A. Федченко!!*).

Не часто по травянистымъ склонамъ горъ. Встрѣчается еще въ S: — Памироалай (Шугнанъ!!, Алайскій хребетъ!).

61. *Delphinium longipedunculatum* Rgl. et Schmalh. in E. Regel Descr. pl. nov. fasc. V p. 226 (Acta Horti Petrop. V.), 1877.

1877. *Delphinium longipedunculatum*, *E. Regel* l. c.

1877. " " *A. Regel* Reisebr. 367

1895. " " *Huth Delphinium* № 125.

1899. *Delphinium longipedunculatum*, *Федченко Ranunculaceae* № 148.

1902. *Delphinium longipedunculatum*, *O. A. Федченко* списокъ № 50.

III. Бородай, 3. VI. 1876. (*A. Регель!*).

IV. Степь между Сыръ-Дарьей и Ташкентомъ, 700 — 1.400', 20. V. 1870 въ цв. (*O. A. Федченко!*).

VI. Моголь-тау, 23. V., V. 1878 (*Скорняковъ!*).

Въ нашей области встречается преимущественно въ степной и пустынной полосѣ.

Въ Туркестанѣ извѣстно еще въ N: — по обонь склонамъ хребта Каракату (Куланчеку, Карагузъ — *A. Регель!*).

Виѣ Туркестана неизвѣстно.

*Приимъчаніе 1.* Для нашей области указывается еще:  
1877. *Delphinium hybridum*. A. Regel Reisebriefe  
367, 368.

III. Джалтемесъ и Боролдай (*A. Regel* — п. в.).

Мнѣ не удалось выяснить, что это за растеніе. Настоящій *D. hybridum* въ Туркестанѣ не встрѣчается.

*Приимъчаніе 2.* Въ Туркестанѣ встрѣчается, кромѣ указанныхъ для нашей области, еще не мало видовъ *Delphinium*. Благодаря тому, что эти растенія варіируютъ чрезвычайно сильно, имѣющійся гербарій матеріалъ недостаточенъ, а новѣйшая монографія не вполнѣ надежна,—крайне трудно установить, какіе виды въ дѣйствительности встрѣчаются въ Туркестанѣ. Нижеслѣдующій перечень дасть некоторое представление о количествѣ указанныхъ для Туркестана видовъ:

<i>D. paradoxum</i> Bge. . . . .	—	W	—
<i>D. orientale</i> L. Gay . . . . .	—	—	W
<i>D. divaricatum</i> Led. . . . .	—	—	W?
<i>D. caschemirianum</i> Royle. . . . .	—	S	—
<i>D. corymbosum</i> Rgl. . . . .	—	0	— (Endem.)
<i>D. Poltoratzkii</i> Rupr. . . . .	—	0	— (Endem.)
<i>D. turkestanicum</i> Huth. . . . .	—	0	— (Endem.)
<i>D. crassifolium</i> Schrad. . . . .	—	0	—
<i>D. elatum</i> L. . . . .	N	0	—
<i>D. Duhmbergi</i> Huth. . . . .	—	0	—
<i>D. alpinum</i> W. et K. . . . .	—	0	—
<i>D. iliense</i> Huth. . . . .	—	0	— (Endem.)
<i>D. vestitum</i> Wall. . . . .	—	0	—
<i>D. Englerianum</i> Huth. . . . .	—	0	S
<i>D. oreophilum</i> Huth. . . . .	—	S	— (Endem.)
<i>D. villosum</i> Stev. . . . .	N	0	S
<i>D. Winklerianum</i> Huth. . . . .	—	0	— (Endem.)
<i>D. Lipskyi</i> Korz. . . . .	—	S	— (Endem.)
<i>D. ternatum</i> Huth. . . . .	—	S	— (Endem.)
<i>D. pilosulum</i> (Trautv.) B. Fedtsch. . . . .	—	W	(Endem.)
(= <i>D. turkmenum</i> Lipsky)			
<i>D. semibarbatum</i> Bien. . . . .	—	—	W
<i>D. Szovitsianum</i> Boiss. . . . .	—	0	—

(98)

<i>D. Karategini</i> Korz. . . . .	—	S	— (Endem.)
<i>D. leiocarpum</i> Huth. . . . .	—	—	W (Endem.)
<i>D. puniceum</i> Pall. . . . .	—	—	W? —
<i>D. cheilanthurum</i> Fisch. . . . .	—	O	—

*Приимъчаніе 3.* Критическая обработка туркестанскихъ видовъ *Delphinium*, несомнѣнно приведетъ къ уничтоженію многихъ изъ перечисленныхъ выше видовъ. Привожу здѣсь результатъ произведенного мною изслѣдованія описанаго Huth'омъ *Delph. aratum* n. sp. (Monogr. d. *Delphinium*, I. c. p. 398 № 52). По описанію Huth'a, однимъ изъ характериѣйшихъ признаковъ этого вида, является *полное отсутствие лепестковъ*. Детальное изслѣдованіе единственнаго оригинального экземпляра, хранящагося въ Туркестанскомъ Гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада показало однако, что это растеніе вовсе не *Delphinium*, а *одна изъ формъ Aconiti Lycoctoni!*

## 15. *Aconitum* L.

1. Шлемъ довольно узкий, цилиндрический. . . . . *A. Lycoctonum* L.  
Шлемъ куполовидный. . . . . 2.
2. Стебель высотою до 3 ф., листья разсѣченные, цветки темносиніе или фиолетовые. . . . . *A. Napellus* L. subsp. *turkestanicum* B. Fedtsch.

Стебель не выше 1 фута, листья глубокораздѣльные, цветки бѣловато-синіе . . . . . *A. rotundifolium* Kar. et Kir.

62. *Aconitum Lycoctonum* L. Sp. pl. ed. 1-a p. 532.—1753.  
*Led.*, Fl. ross. I. 66.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 28.

I. Александровскій хребеть, ущелье Арассанъ, 7—9.000', 7—8. VI. 1880 и ущелье Аламединъ, 3.500', 25—26. V. 1880 (Фетисовъ!).

VIII. Терекъ и Узунъ-ахматъ, 9.000', 29. VII. 1881 (Фетисовъ!).

Въ нашей области встрѣчается довольно рѣдко. Имѣющійся въ Туркестанскомъ гербаріи Императорскаго Бот. Сада матеріалъ настолько недостаточенъ, что я затрудняюсь сказать, къ какому подвиду относятся наши растенія. Широкій пектарія загнутъ круго-образно, верхняя часть стебля, преимущественно соцвѣтіе, густо покрыта отстоящими волосками.

(99)

Окраска цветка у Арассанских экземпляровъ повидимому фиолетовая, относительно прочихъ — трудно сказать что-либо.

Въ Туркестанѣ встрѣчаются разнообразныя формы этого вида въ горахъ въ О: — Джунгарскій Алатау, Тянь-шань.

Виѣ Туркестана встрѣчаются въ Европѣ, Сибири, Западныхъ Гималаяхъ, Китаѣ, Монголіи.

63. *Aconitum Napellus* L. Sp. pl. ed. 1-а p. 532. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 69. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 28.

*Subsp. turkestanicum* B. Fedtsch.

Petalorum calcar subrecurvum; foliorum partitiones late-lanceolatae. Flores dilute violacei.

- 1867. *Aconitum*, Сѣверцовъ, Поездка 157.
- 1877. „ sp., A. Regel Gartenfl. 13.
- 1878. *Wolfshutstengel*, A. Regel Reisebr. 200.
- 1878. *Aconitum Napellus*, A. Regel Reisebr. 200.
- ?1878. „ *volubile*, A. Regel Reisebr. 201.
- 1878. „ *Napellus racemosum Lobelianum*, A. Regel Reisebr. 201.
- 1878. *Aconitum* A. Regel Reisebr. 204.
- 1883. „ *variegatum*, Franchet Mission Capus 221.
- 1884. „ A. C., Очерки гор. Аксай („Турк. Вѣд.“ № 9, стр. 34).
- 1885. *Aconitum* съ Толока Сорокинъ Тянь-шань 129.
- 1899. „ *variegatum* Федченко Ranunculaceae № 156.
- 1899. *Aconitum Napellus* v. *racemosum* f. *Lobelianum*, Федченко I. с. № 154.
- 1899. *Aconitum volubile*, Федченко I. с. № 157.
- 1899. „ *rotundifolium*, Гейеръ Туркестанская скитания 213.

I. Долина Айшмары (A. Regel — п. в.), Аламединъ, 6 — 7.000', 30. V. 1880 (Федченко!), Джиламышъ, 6 — 8.000', 27. VI. 1880 (Федченко!).

II. Талды-булакъ, на юномъ склонѣ Александровскаго хребта между Караколомъ и Каракыштакомъ, 8.150' (Сѣверцовъ — п. в.), подъ переваломъ Каракия, IX. 1876 (A. Regel!), по р. Караколь, появляется у подошвы перевала Кумбель (A. Regel!).

IV. По р. Андаульганъ, возлѣ ручьевъ, VII. 97 и VIII. 1902 (B. A. Fedchenko!!), тамъ же (Корольковъ!), Чатыръ-ташъ, по берегамъ ручьевъ, 24. VIII. 2.000' (Капю), Турпакъ-бель, 24. VIII (Капю!), по р. Майданталь — въ уроч. Джанъ-терекъ, въ цв. 25. VII. 1897 (B. A. Fedchenko!!), по р. Афлатунъ, притоку Чаткала, VIII. 1902 (B. A. Fedchenko!!), тамъ же 30. VI. 1899 (Литвиновъ!), на склонахъ горы Большой Чимганъ (A. С(имонова)<sup>1</sup>) — п. в.), Майданталь (П. Гейеръ).

VII. По р. Качкара, по сырьемъ лугамъ и среди ползучей арчи, въ цв. 14. VIII. 1902 (казакъ Иванъ Яковлевъ!), тамъ же 30. VIII. 1902, посл. цв. и позр. пл. (B. Fedchenko!!).

IX. Ущелье р. Шаръ-карата (Сорокинъ — п. в.).

Въ нашей области встречается не рѣдко въ полосѣ хвойныхъ.

Въ Туркестанѣ встречается въ горахъ въ О (нѣкоторыя подробности см. ниже).

Виѣ Туркестана — въ горахъ Европы, Сибири, Гималааяхъ.

*Прилаганіе.* A. *Napellus* subsp. *turkestanicum* — одно изъ важнейшихъ лѣкарственныхъ растеній нашей области. Встрѣчается не рѣдко, туземцы (киргизы) собираютъ его въ значительныхъ количествахъ и продаютъ сартамъ — „аптекаримъ“, которые вывариваютъ изъ клубней черную смоловидную массу, называемую „парни“ или „кара-парни“, въ отличіе отъ „акъ-парни“ (корни неизвѣстного, также лѣкарственного растенія нашей области). Мнѣ пришлоось видѣть вываренные и невываренные корни обоихъ парни въ урошицахъ Идрисъ-пей-гамбаръ у старика сарта-аптекаря.

Въ „Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ“ 1873 г. № 19, помѣщена любопытная статья г. Кушакевича, въ которой онъ подробнѣ описываетъ характеръ распространенія и свойства этого вида *Aconitum*, называя его „Угорь-гасынъ, или Иссыкъ-кульскій корешокъ“ (таково и заглавіе статьи).

<sup>1</sup>) Авторъ сообщаетъ, что „найденные (имъ) экземпляры по отли- чились ростомъ и даже не имѣли древовиднаго стебля“... Въ Семирѣчи, прибавляетъ онъ, встречается ядовитый *Aconitum* f. его х. „Иссыкъ-кульскій корешокъ“. Впрочемъ, быть можетъ указаніе А. С(имонова) относится къ следующему виду.

Г. Кушакевичъ говоритъ, что общий видъ растенія походитъ на *A. Napellus* L. Встрѣчается и другой видъ растенія, съ блѣдио-лиловыми цветами и густо-лиловыми по нимъ прожилками (очевидно, *A. rotundifolium* Kar. et Kir.). Этотъ послѣдній видъ найденъ въ густомъ ихъ тономъ (?) лѣсу за р. Боротала, недалеко отъ впаденія р. Талды-узеня въ р. Уртакъ-сары, а также къ перевалу Кокъ-кія, на южномъ склонѣ.

Что же касается *A. Napellus*, онъ встрѣчается (въ Сергіопольскомъ уѣзда) отъ сѣверного ската г. Карагунуръ (высшее мѣсто части хребта Алатау), до горъ за рѣкою Урта-тентекомъ, также по р. Карагайлы, впадающей въ Тентекъ, на сѣверномъ склонѣ горъ Каракія, по р. Аргалы на выс. 8—9.000', также на вершинахъ горы Джамантасъ и у перев. Юганъ-тасъ (по дорогѣ къ Боротала изъ ст. Лепсинской), по горамъ къ р. Теректы: Сарысакты, Агалакатъ и на перевалахъ Джили-сая, Кокъ-кія, Коке-тау и др. (отъ ст. Лепсинской къ Боротала).

На южномъ склонѣ горъ Алатау Кушакевичъ не замѣтилъ этого растенія, но далѣе, за р. Боротала, вновь нашелъ его по ущельямъ Кайтасъ, Кокъ-таль, Талды-узенъ и др. По разсказамъ туземцевъ, онъ растетъ и по горамъ и альпийскимъ площадямъ (?) Суокъ, Ногайулькунъ, Біе-сіемъ и др.

**64. *Aconitum rotundifolium* Karel. et Kir. Enum. pl. Songor. № 46. („Bulletin de la Soci  te Imp  riale des Naturalistes de Moscou“ XV.) 1842. — Boiss., Fl. or. Suppl. 21.**

1877. Alpines Aconitum, *A. Regel* Gartenfl. 12.

1877. Aconitum rotundifolium, *A. Regel* Gartenfl. 12.

1878. „ „ *A. Regel* Reisebr. 201.

1881. „ „ *E. Regel*, Gartenfl. 357.

1899. „ „ Федченко Ranunculaceae № 155.

II. Въ долинѣ Караколь подъ переваломъ Кумбель (*A. Regel* — п. в.), и подъ переваломъ Каракія, VIII. 1876 (*A. Regel*!).

IV. Въ верховьяхъ Майдантала, подъ ледникомъ Сарбазы, 4. VIII. 1897, на травянистомъ склонѣ, 10.000', въ цв. (Б. А. Федченко!!).

(102)

VIII. Переваль Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 10—12.000', 30. VII. 1881 (*Fetisovъ*).

IX. Надъ западнымъ концомъ долины Сусамыра, южный склонъ Александровскаго хребта, 9—12.000', 17. VII. 1881 и вершины Сусамырскаго хребта, 10—12.000', 8. VII. 1881 (*Fetisovъ*!).

XI. У перевала Кугартъ, травянистые склоны горъ, 7—8.000', 5. VIII. 1895 и переваль Кенколъ, каменистая почва, у вершины, 13. VIII. 1895 (*C. Коржинский*!).

Въ альпийской зонѣ нашей области встрѣчается не рѣдко, преимущественно по травянистымъ склонамъ.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — Джунгарскій Алатау, Восточный и Центральный Тянъ-шань, С: — Алайскій и Заалайскій хребеть, Памиръ (переваль Кааратъ), Заравшанъ.

Въ Туркестана — въ Гиндукушѣ, Гималаяхъ, Афганистанѣ, сѣверо-восточномъ Тибетѣ и Амдо.

## 16. *Paeonia* L.

**65. *Paeonia anomala* L. Mant. II. 247.**

Subsp. *intermedia* (C. A. Mey.) Trautv.

*P. anomala* v. *hybrida* f. *intermedia*, Trautv. Enumer. pl. songor. № 62.

*P. intermedia* C. A. Mey. in Led., Fl. alt. II. 277.—

1830.

1867. Піоны, Сѣверцовъ, Пойзданка 86.

1878. *Paeonia anomala*, *A. Regel* Reisebr. 184.

1899. „ „ v. *hybrida*, Федченко Ranunculaceae № 158.

I. По р. Урянды на сѣв. склонѣ Александровскаго хребта (Сѣверцовъ — п. в.), Кенъ-сай (*A. Regel* — п. в.).

IV. На горѣ Большой Чимганъ, VIII. 1897 (*O. A. Федченко*!), тамъ же, 5—7.000', 21. VI. 1881 въ пл. (*A. Regel*!), по р. Пекемъ, 6—7.000', 1876 г. (*Корольковъ*!), на травянистыхъ склонахъ съ перевала Торнакъ-бель къ Майданталу, 7—8.000', 4. VIII. 1902 (*B. A. Федченко*!!), гора Адраташъ на рѣчкѣ Тиресь 10. V. въ цв. (*Краузе*!).

IX. Караколь, притокъ р. Сусамыръ, 7.000', 1. VII. 1881 (*Fetisovъ*!).

(103)

XI. Среднее течениe р. Яссы, 8—9.000', 31. V. 1880. (*A. Регель!*), Арсланбобъ, на каменистыхъ склонахъ горъ, 7—9.000', 11. VIII. 1895 (*Коржинский!*), перев. Кенколъ, альпийские луга, 11.000', 16. VI. 1899 въ цв. (*Литвиновъ!*), между Базарь-курганомъ и Кавой, 22. V. 1899 въ пл. (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области встречается довольно рѣдко и по-видимому, преимущественно на травянистыхъ склонахъ, имѣющихъ характеръ прерій.

Въ Туркестанѣ встречается также въ О: — Джунгарскій Алатау, Центральный и Восточный Тянь-шань, и S: — Дарвазъ, къ востоку отъ Куляба, гора Алакисракъ, 7.000', VI. 1883 (*A. Регель!*); Кулябъ, въ горахъ близъ Мумынабада, V. 1884 (*A. Регель!*), Кулябъ, въ горахъ Имамъ-Маскара, 9.000', VI. 1883 (*A. Регель!*), между Талбаромъ и Сагриданомъ, 9—10.000', 27. VIII. 1882 (*A. Регель!*).

Виѣ Туркестана подвидъ *intermedia* встречается лишь въ Томской губерніи, а также въ Китаѣ и Монголіи: Амдо, Хангай, Танну-ола, р. Хуань-хе. Типическая форма, съ голыми листовками, встречается на сѣверо-востокѣ Европейской Россіи, преимущественно на Ураль, и въ Сибири до Иркутска.

Въ Ольгинскомъ Саду (Можайского уѣзда) растеніе это съ 1897 г. культивируется съ усилѣемъ; оно хорошо переносить самыя суровыя зимы безъ всякой защиты; ежегодно (въ маѣ) цвѣтетъ и приноситъ плоды.

Синонимика этого растенія представляется довольно затруднительной.

Въ 1788 г., во второмъ томѣ своей *Flora Rossica*, Палласъ описываетъ слѣдующіе виды русскихъ піоновъ:

- 1) *P. albiflora* изъ Восточной Сибири.
- 2) *P. officinalis* (= *P. corallina* Retz.) — Кавказъ.
- 3) *P. laciniata* (= *P. anomala* L.) — Сибирь.
- 4) *P. hybrida* — обѣ этомъ видѣ Палласъ говорить, что область его распространенія — Южный Ураль и по Оби близъ Барнаула; рисунокъ сдѣланъ съ культируаго экземпляра, вырошенаго въ Сиб. изъ сѣмянъ „ut serebatur, *P. tenuifolia* c. in eadem areola cum *P. laciniata* crescentis, non sine suspicione hybridae originis“. Однако, *P. tenuifolia*, имѣеть область распространенія совсѣмъ иную, чѣмъ *P. laciniata*

(104)

(= *P. anomala* L.) и *P. hybrida* Pall. врядъ ли можетъ быть помѣсью этихъ двухъ видовъ. Судя, по рисунку Палласа это повидимому очень роскошный экземпляр *P. tenuifoliae*. Нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что здѣсь замѣтно сказались общи возврѣнія Палласа, придававшаго, какъ известно, гибридизаціи огромное значеніе въ вопросѣ о дифференцированіи формъ.

### 5) *P. tenuifolia* — изъ южной Россіи.

Въ 1830-мъ году *K. A. Мейеръ* (въ *Lebedour's Flora altaica* II. 277) описалъ два вида: *P. hybrida* Pall. и *P. intermedia* n. sp.

Въ 1860 г. Траутфеттеръ присоединилъ оба эти вида къ *P. anomala*, различая въ циклѣ формъ этого вида типическую съ голыми листовками, и *v. hybrida* — съ мохнатыми листовками; какъ подчиненную форму послѣдней разновидности онъ разсматриваетъ *I. intermedia* (*C. A. Mey.*) sp., съ болѣе широкими дольками листьевъ.

Въ 1901 г. *P. H. Крыловъ* (Флора Алтая и Томской губерніи) описываетъ для своей области два вида: *P. anomala* L. и *P. hybrida* Pall.

По моему мнѣнію, *P. anomala* L. sensu lat. представляетъ дѣйствительно два подвида, изъ которыхъ въ нашей области встречается лишь одинъ — съ мохнатыми листовками. Я удерживаю для этого подвида предложенное Мейеромъ название *intermedia*, такъ какъ название *hybrida* примѣнялось къ разнообразнымъ формамъ и является потому неопределеннѣмъ, а что разумѣть подъ этимъ названіемъ Палласъ, является, какъ мы видѣли, сомнительнымъ.

*Прилаганіе.* Въ Туркестанскомъ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада имѣется одинъ, выросший въ саду, въ Сиб., экземпляръ піона съ этикетомъ „*P. triternata* Pall. Turkestania. Mis. A. Regel 1879“. Повидимому, это дѣйствительно *P. triternata* Pall., но я сильно сомнѣваюсь, чтобы А. Регель могъ прислать изъ Туркестана сѣмена или клубни этого растенія, такъ какъ нахожденіе его тамъ является въ высшей степени сомнительнымъ.

Въ Ташкентѣ разводится кромѣ того *Raeonia arborea* Don.

(105)

## II. Berberidaceae.

## I7. Berberis L.

1. Плоды сине-черные; обыкновенно съ блестящимъ налетомъ; листья тонкие, заостренозубчатые. . . . . *B. heteropoda*  
Schrenk.  
Плоды красные или розовые, листья толстоватые,  
кожистые, часто цѣльнокрайние. . . . . *B. integrifolia* Bge.
66. *Berberis heteropoda* Schrenk. in *Fisch. et Mey. Enum. pl. nov. a* Schrenk lect. p. 102.—1841.—*Led.*, Fl. ross. I. 742.—*Karel. et Kiril. Enum. pl. song.* № 48.
- B. sphaerocarpa* *Karel. et Kiril. En. pl. alt.* № 46.  
*B. vulgaris* v. *crataegina* (ex parte?) *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 109.  
1874. Зерикъ, *Киргизскій* 69 (изъ „Турк. Вѣдом.“ 1872 г. № 13).
1877. *Berberis* mit grossen blauen Beeren, *A. Regel* Gartenfl. 8.
1877. *Berberis*, *A. Regel* Gartenfl. 11, 13.
- ?1877. *Berberis heteropoda*, *A. Regel* Gartenfl. 8, 10.
1877. " " γ. *elliptica* и δ. *oblonga*, *E. Regel Deser. pl. nov.* („Acta Horti Petr.“ V. 227).
- ?1878. *Berberis heteropoda*, *A. Regel* Reisebr. 179, 184, 197, 200.
- ?1878. Langfruchtige *Berberis*, *A. Regel* Reisebr. 186.
1878. *Berberis heteropoda* rundfruchtig, *A. Regel* Reisebr. 204.
- ?1878. *Berberis*, *A. Regel* Reisebr. 193.
- ?1881. *Berberitzen*, *Middendorff* 305.
- ?1882. *Berberis heteropoda*, *A. Regel* Gartenfl. 361.
1885. Барбарисъ съ черными ягодами, *Лисневскій* 36.
1892. *Berberis*, *Capus Royaume du Tamélan* 298.
1895. Барбарисъ, *Гейеръ*, отъ Ташкента до Гавы 128, 133.
1896. *Berberis heteropoda*, *Коржинскій* Очерки 40.
1897. " " *O. A. Федченко* въ отчетѣ  
Общ. Исп. Пр. 17.
1899. Барбарисъ, *Гейеръ*, *Туркест. скит.* 154, 211.

Туз. назв.: Карагатъ (на Санталапѣ!!), Бурукарагатъ (на Ходжа-ата); Каражатъ, Зиркъ.

I. Айшиара IX. 1876 (*A. Регель!*), Джильдарыкъ IX. 1876 (*A. Регель!*).

II. Спускъ съ Карабуры (*A. Регель?*—п. в.); въ ущельи Кумышъ-тагъ, 6.000', 10. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!!), Ики-Таласъ-чоты, VIII. 1876 (*A. Регель!*), Караколь VIII. 1876 (*A. Регель!*).

IV. По Чаткалу: 6.000', VIII. 1876 (*A. Регель!*), выше Бакрака (*A. Регель*—п. в.), на югъ Ходжакентомъ, отъ Ходжакента до Бричъ-муллы, Кенсай-Бакракъ (*A. Регель*—п. в.); по Чаткальскому Афлатуну, VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), тамъ же (*Капю*—п. в.), по р. Мазарь, 30. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), на Санталапѣ VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), на р. Пекемъ, каменистые склоны надъ озеромъ Урунгачъ, 2. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), Нанаи, въ ущельи Акъ-саръ-сай, 3.000', 20. VII. 1897 (Б. А. Федченко!!), отъ Нанаи до Пекема (Б. А. Федченко!!), по всей долинѣ р. Чимгани, VII, VIII. 1897 (*O. A. и Б. А. Федченко!*), тамъ же (*И. Гейтеръ*—п. в.), Песочный перевалъ бл. Чимгана (*O. A. и Б. А. Федченко!*); въ низовьяхъ р. Майдантала (*И. Гейтеръ*—п. в.).

VII. Переваль Кендырь-аузъ, 20. V. 1880 (*A. Регель*—собрано *Мусою*); по р. Ходжа-ата, 23. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), Паша-ата (*Миддендорфъ*—п. в.), на горахъ, 3—8.000' (*Лисневскій*—п. в.), спускъ къ Закъ-саю (Б. А. Федченко!!), по ручью близъ перевала Кушартъ, 31. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

XI. Переваль Кумбель, № 29 (*Сорокинъ!*), верховья р. Яссы (*A. Регель!*—п. в.), Карамкульскія горы, 10. IV. 1870 въ цв. (*Краузелъ*!), между Червакомъ и Арсланбобомъ, лиственные лѣса, 2. VIII. (*С. Коржинскій!*), горы надъ Арсланбобомъ, 7. VI. 1899 (*Литвиновъ!*), близъ Гавы и Даиманская дача (*И. Гейтеръ!*—п. в.).

Въ нашей области встрѣчается весьма часто въ полосѣ отъ 2.000' до 8.000'. Ягоды употребляются въ пищу и имѣютъ довольно пріятный вкусъ.

Въ Туркестанѣ распространено широко: О:—Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Тянь-шань; С:—Туркестанскій,

Алайский хребты, горная Бухара; W: — встрѣчено, лишь какъ разводимое растеніе, въ саду въ Ильялы близъ г. Хивы (собрано Королькоевымъ и Крауземъ 24. VI. 1873). На этикеткѣ г. Крауземъ приписанъ: „найдено нѣсколько кустовъ въ саду близъ города, тутъ и г. Базинеръ нашелъ Berberis n. sp., большие нигдѣ въ Ханствѣ не встрѣтился“.

Въ Туркестанѣ извѣстъ лишь съ южнаго Алтая, и встрѣчается, повидимому, въ Кашмирѣ.

Прибавлю въ заключеніе, что въ одной изъ своихъ статей А. Регель утверждаетъ, будто *B. heteropoda* Schrenk есть настоящая „асса-мусса“ палочка Моисея. Это совершенно невѣрно, такъ какъ туземцы этимъ именемъ называютъ кустъ *Abelia corymbosa* Rgl.

67. *Berberis integerrima* Bge. in A. Lehmann's reliquiae botan. № 44 (Arbeit. d. Naturf. Ver. zu Riga). 1847.

*B. Nummularia* Bge. ibid. № 45.

*B. densiflora* Boiss. et Buhse, Aufzähld. p. 9. — *Boiss.*, Fl. or. I. 102.

?1878. *Berberis heteropoda* (korallengleiche halbreife Beeren)

A. Regel Reisebr. 179.

1882. *Berberis integerrima*, A. Regel' Gartenfl. 364, 365.

1885. Барбарисъ съ красными ягодами, Лисневскій 41.

1896. *Berberis densiflora*, Коржинскій Очерки 39, 40.

1902. " " *integerrima*, O. A. Федченко

Списокъ № 54.

Туземн. назв.: Зиркъ (таджик.).

IV. Бричъ-мулла, 2.800', 19. VII. 1897 (O. A. и Б. А. Федченко!!) — форма съ продолговатыми плодами), Бричъ-мулла (A. Regel! — п. в.), спускъ къ кишл. Сидзякъ (Б. А. Федченко!!), Нанаи, правый берегъ р. Пекемъ, 20. VII. 1897 (Б. А. Федченко!! — форма съ почти круглыми плодами), in prov. Turkestan prope Taschikent (A. Кушакевичъ!), Чаткаль, 5 — 6.000', VIII. 1876 и 6 — 9.000' IX. (?)<sup>1)</sup> 1876 (A. Regel!), близъ Нанаи и отъ Нанаи до Пекема (Б. А. Федченко!!), по среднему течению Чаткала, 5. VII. 1899 (Литвиновъ!).

VII. Перевалъ Кендырь-даванъ, 25. VIII. 1871 (O. A. Федченко!) — возможно, однако, что экземпляръ этотъ относится

<sup>1)</sup> Въ сентябрѣ 1876 г. А. Регель уже не былъ на Чаткале.

къ предыдущему виду); по склонамъ горъ, 3 — 5.500' (Лисневскій — п. в.).

X. Между Алабугою и Нарыномъ, 6.000', 6. VI. 1880 (A. Regel!).

XI. Уроч. Каргинъ-мазарь, въ дол. р. Карабу, 15. VIII. 1895 (*C. Коржинскій!* — форма съ круглыми плодами), склоны горъ, 6.500'. 4. VIII 1895 (*C. Коржинскій!*), по склонамъ горъ, 3 — 5.500', (Лисневскій — п. в.).

Въ нашей области одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ кустарниковъ. Въ общемъ, этотъ видъ значительно легче приспособленъ къ сухостью почвы и климата, чѣмъ предыдущий.

Въ Туркестанѣ распространено очень широко: О: — Джунгарскій Алатау, весь Тянъ-шань; С: — Алайскій хребеть, Заравшанъ, Горная Бухара; W: — Конетъ-дагъ.

Въ Туркестанѣ встречается въ Белуджистанѣ, Персии, въ восточной части Кавказа, а также въ Амдо.

Примѣчаніе. Изъ р. *Berberis* въ Туркестанѣ встречаются еще два вида:

*B. kaschgarica* Rupr. . . . . — 0 — — —

*B. sibirica* Pall. . . . . — 0 — — —

Кромѣ того указываются разные другие виды: *B. crataegina*, *B. sinensis*, *B. vulgaris*, *B. turkomanica* — но безъ критической разработки всего среднеазіатскаго материала по р. *Berberis*, нельзя составить себѣ достаточно яснаго представления о всѣхъ этихъ формахъ. Прибавлю, что въ Нook. Fl. br. Ind. подъ именемъ *B. vulgaris* соединены самыя разнородныя формы.

Въ г. Ташкентѣ разводится кромѣ того *Berberis aquifolium* Pursh.

### 18. *Bongardia* C. A. Mey.

68. *Bongardia Chrysogonum* (L.) Boiss. Fl. or. I. 99.—1867.

*Leontice Chrysogonum*, L. Sp. pl. Ed. 1-a p. 312.—

1753.

*Bongardia Rauwolfii* C. A. Mey. Verz. Cauc. p. 174.—  
Led., Fl. Ross. I. 1880.

IV. Ташкентъ, IV. 1882 (A. Regel!), Сайлыкъ, 5.000', 1 — 15. IV. 1882 (A. Regel!).

Въ нашей области встречается рѣдко и надо думать, представляется сравнительно недавниаго пришельца съ югозапада.

Въ Туркестанѣ встрѣчается не рѣдко въ S: — Джизманское ущелье (*O. A. Федченко!*), Джизакъ, 26. III. 1882 (*A. Регель!*), Тамерлановы ворота бл. Джизака (*A. Регель!*), Самаркандинъ; на Чунаната (*O. A. Федченко!*, *Глазуновъ!*), Могіанъ (*B. Комаровъ!*); въ Бухарѣ распространено широко: Балъджуанъ, IV. и VI. (?) 1883 (*A. Регель!*), въ долинѣ Денгере з. III. 1884 (*A. Регель!*), на р. Кизыль-су, VI. 1883 (*A. Регель!*), Дарвазъ: Талбаръ, 30. V. 1897 (*C. Коржинский!*), Тевандара по верхнему течению р. Вахша, 5—6.000', IV. 1883 (*Mуса!*), на г. Тавакчи по верхнему течению р. Вахша, лѣв. бер., выше Курганъ-тюбе, III. 1884 (*A. Регель!*), Шаръ-шаръ въ г. Тошатурь, между р. Кизылсу и Аксу, III. 1884 (*A. Регель!*), въ ущ. Ходжа-Мумынъ къ югу отъ Куляба, 4.500', 29. III. 1883 (*A. Регель!*), горы бл. Лянгара къ востоку отъ Куляба, 6.000', 24. III. 1883 (*A. Регель!*), Кулябъ, по среднему течению р. Аксу, между Сарханомъ и устьемъ р. Мургабъ, 4.000', 19. IV. 1883 (*A. Регель!*), Байсунъ въ ущельи Бузгола, 30. IV. 1897 (*C. Коржинский!*), W:—Закасп. обл. (*Литвиновъ!* и др. коллекторы!), Каахка (анонимъ! въ герб. *Федченко*).

Въ Туркестана встречается въ Закавказье и Персии.

Приводимыя нами данные значительно раздвигаютъ границу распространения этого оригинального растенія къ востоку и съверу, а также и вертикально, до высоты 6.000'.

### 19. *Leontice* L.

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Коробочка подконецъ сильно вздутая, разрывается неправильно . . . . .                            | 2.                        |
| Коробочка подконецъ незначительно увеличенная, раздѣляется на доли . . . . .                        | <i>L. Alberti</i> Rgl.    |
| 2. Цвѣтоножки во много разъ длиннѣе прицвѣтниковъ, соцвѣтіе многоцвѣтковое . . . . .                | <i>L. Eversmanni</i> Bge. |
| Цвѣтоножки не болѣе, чѣмъ въ два раза превышаютъ прицвѣтники, соцвѣтіе немногогоцвѣтковое . . . . . | <i>L. Incerta</i> Pall.   |

69. *Leontice incerta* Pall. Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs, III. Append. p. 726. № 84, t. V. f. 3.—1776.

*L. vesicaria*, Pall. in Act. Acad. Petrop. 1779, II. p. 257. t. 9, f. 4.—*Led. Fl. ross.* I. 80.

Въ Туркестанскомъ гербаріи Императорскаго Ботан. Сада подъ названиемъ *L. vesicaria*, лежать двѣ вѣточки съ этикеткой „Каратай, leg. Krause“. Оба экземпляра въ цвѣту, мало похожи другъ на друга; одинъ напоминаетъ *L. incerta*, другой скорѣе относится къ *L. Eversmanni*.

Въ Туркестанѣ *L. incerta* встречается преимущественно въ полосѣ пустынь, N, O, W, отъ Индерскаго озера и Арака до Балхаша и Кульджи (въ уроч. Хоръ-хушъ записано между прочимъ туземное название „тъе-тавакъ“ — ex reliq. Fischer.).

Въ русскаго Туркестана и Кульджи, это растеніе встречается въ восточной части китайскаго Туркестана.

Правила номенклатуры заставляютъ меня возстановить болѣе древнее наименование — *L. incerta*, хотя самъ Наплашъ черезъ нѣсколько лѣтъ и далъ этому виду другое наименование — *L. vesicaria*.

70. *Leontice Eversmanni* Bge. Reliq. Lehmann. № 47 („Arbeit. d. Naturf. Vereins zu Riga“ I.) 1847, также въ „Mém. pres. à l’Acad. de St.-Pétersb. par div. sav.“ VI. 1854. — *Boiss.*, Fl. or. I, 100.

V. Ареїдованъ, 80 (*A. Регель!*).

VII. Наманганъ, 28. III. 1878 (*Скорняковъ!*).

Туземн. назв. (Торсыльдакъ — запис. *O. A. Федченко* на Келесѣ).

У насъ, встречается рѣдко, на югѣ и юго-западѣ.

Въ Туркестанѣ встречается изрѣдка въ N: — переваль Курдай, 20—21. III. 1879 (*Фетисовъ!*) и въ O: — р. Чу (*Кушакевичъ!*), чаще въ S: — въ окрестностяхъ Джизака, 26. III. 1882 (*A. Регель!*), между Уратюбе и Зіаминомъ, 4—5.000', 30. IV. 1880 (*A. Регель!*), Самаркандинъ (*A. Регель!*, *Глазуновъ!*), Катты-Курганъ (*O. A. Федченко!*); въ особенности часто въ бухарскихъ владѣніяхъ: Дарвазъ возлѣ Шихая по правому берегу Пянджа, 4—5.000', средина марта 1883 (*Муса!*), Карадаинъ на вершинѣ горы Ходжа-Кадиантъ, къ В. отъ г. Кабадианъ, 5—6.000', 21. IV. 1883 (*A. Регель!*), на горѣ Ташатурь между р. Кизыль-су и Аксу, IV. 1884 (*A. Регель!*), между Денгере и Сангтуда, III. 1884 (*A. Регель!*); Кулъбъ восточный склонъ

г. Карагау близь Диланкура на р. Пянджъ ниже устья Кизыль-су и Аксу, 3—4.000', 8—29. V. 1883 (*A. Regel!*), между Гиссаромъ и Бальджуаномъ, бл. моста Пулсангингъ, по среднему течению р. Вахшъ, IV. 1883, 2.500' (*A. Regel!*); W: — Закасп. обл. (*Радде!*, *Литвиновъ!*, *Антоновъ!*, *Эйландъ!*), Тедженъ (аонимъ! въ герб. *Федченко*), Кизыль-кумы (*Эверсманнъ!*), Аякъ въ Кизыль-кумахъ (*Корольковъ* и *Краузъ!*), между Келесомъ и Косараломъ 24. IV. 1871 (*O. A. Федченко!*).

Въ Туркестана известно лишь въ Персии и Афганистанъ; кромѣ того, отъ южной Италии и до Палестины встречается близкая, почти тождественная форма — *L. Leontopetalum* L.

71. *Leontice Alberti* Rgl. in *Gartenflora XXX.* p. 223 et 293, tab. 1057.—1881.

- 1870. *Leontice altaica*, *E. Regel Suppl. II. pl. Semen.* № 54b.
- 1881. " *Alberti E. Regel Gartenfl. I. c.*
- 1882. " " *A. Regel Gartenfl. 132.*
- 1884. " " *E. Regel Deser. pl. nov. ("Acta Horti Petr." VIII, 693) fasc. 9.*

III. Бородайскія горы, 2.500'—6.000', IV. 72 (*Корольковъ!*), истоки р. Бугуни, 11. III. (*Съверцовъ!*), около Чимкента, Карагавскія горы, 19. III (*Краузъ!*).

IV. Вырощено въ СПБ. изъ сѣмянъ или клубней, привезенныхъ изъ Ташкента *A. Regel* (!); горы Карагау, 1882 (*Маевъ!*), по склонамъ горъ въ долинѣ Чимгана, VII—VIII, 1897 (*O. A. и Б. А. Федченко!!*), тамъ же въ 1900 г. (*E. Холмутова!*).

V. Горы бл. ст. Уральской (*A. Regel* — п. в.).

Въ нашей области встречается нерѣдко въ полосѣ предгорий, не поднимаясь выше 6.000'. Въ Туркестанѣ встречается еще въ S: — Заравшанъ (*B. Комаровъ!* sub nom. *L. altaica*). Въ Туркестана неизвестно.

Растеніе это очень близко къ *L. altaica* и можетъ быть, представлять лишь одну изъ подчиненныхъ формъ этого цикла, хотя отличительные признаки оказываются вполнѣ постоянными и въ культурѣ: растеніе это съ 1897 г. съ большими успѣхомъ культивируется въ Ольгинскомъ Саду (Можайск. уѣзда) на открытомъ воздухѣ, безъ всякой защиты и представляетъ одно изъ самыхъ раннихъ, красивоцвѣтущихъ весеннихъ растеній.

*Приимѣчаніе.* Изъ Дарваза *Э. Регелемъ* описанъ еще одинъ видъ *Leontice* — *L. darwasica* Rgl. Оригинальные экземпляры *Э. Регеля* не вполнѣ соответствуютъ его же рисунку и вообще видъ этотъ требуетъ дальнѣйшаго изслѣдованія.

### Nymphaeaceae.

Въ нашей области представители этого семейства не найдены.

Въ предѣлахъ Туркестанскаго края, въ заводяхъ по нижнему течению рѣкъ Сыра и Аму, встречается одинъ видъ *Nymphaea (candida* Presl); показаніе о находкѣ на Аракѣ *Nelumbium speciosum* Willd. является недостовѣрнымъ.

Въ сѣверномъ Туркестанѣ встречается *Nuphar luteum* (L.) Sm.

### Magnoliaceae.

Въ садахъ г. Ташкента изъ представителей этого семейства на открытомъ воздухѣ выносить зиму лишь тюльпанное дерево, *Liriodendron tulipifera* L.

## III. Papaveraceae.

### 20. Papaver L.

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Многолѣтнее растеніе безъ стебля, цветки одиночные на стрѣлкахъ, желтые или оранжевые . . . . . | <i>P. alpinum</i> L.         |
| Однолѣтня растенія съ олиственнымъ стеблемъ . . . . .  | 2.                           |
| 2. Коробочка щетинистая. . . . .   | <i>P. pavoninum</i> F. et M. |
| Коробочка голая. . . . .   | 3.                           |
| 3. Нити тычинокъ кверху булавовидно расширенныя, вѣнчики блѣдоватые или лиловатые . . . . .        | <i>P. somniferum</i> L.      |
| Нити тычинокъ интевидныя, вѣнчики красные . . . . .  | <i>P. dubium</i> L.          |

72. *Papaver alpinum* L. Sp. pl. ed. 1a p. 507. — 1753.—*Led. Fl. ross. I. 87.*

*P. nudicaule* L.. *Boiss.*, Fl. or. I. 107. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 117.

1867. Горный макъ, *Съверцовъ*. Поездка 86.

1877. Papaver nudicaule A. Regel. Gartenfl. 13.  
 1878. " alpinum & xanthocephalum A. Regel Reisebr. 192.  
 1878. Papaver nudicaule, A. Regel Reisebr. 201, 202, 203.  
 1883 " alpinum v. hispidissimum, Franchet Mission Capus 222.

Туземн. назв.: Сарыкъ кикиаръ.

I. По р. Урзиды (*Съверцовъ* — п. в.), долина р. Айнимары (A. Regel — п. в.), пер. Кизыль-бель (A. Regel — п. в.), Карагай-булакъ 9.500' (*Фетисовъ!*), Аламединъ 25. V. (*Фетисовъ!*), Александровскій хребеть, 9—10.500', 4. VI. 1880 (*Фетисовъ!*), Джиламинъ 7—8.000', 27. VI. 1880 (*Фетисовъ!*), Арассанъ 7—9.000', 7. VI. 1880, (*Фетисовъ!*), Аксу 9—10.000, 29. VI. 80 (*Фетисовъ!*).

II. Подъ пер. Каракія и Кумбель (A. Regel!).

III. Въ окр. Чимгана 1901 (E. Хомутова!), по горамъ Чаткала, 26. VII. 1871 (*Краузе* — п. в., въ гербаріи Имп. Бот. Сада только этикетка!), у перевала Карабура, 8—10.000' (A. Regel!), въ долинѣ р. Пскемъ, по р. Кыначъ, подъ самымъ переваломъ Куль-ашу, 9—10.000', 10. VIII. 1902 въ цв. (Б. А. Федченко!!), по р. Оша (Анда)-Ульгани, 2.000 м., 23. VIII. (*Капю*), Коксу 2.700 м. (*Капю* — эта мѣстность соотвѣтствуетъ тому, что я называю „по р. Кыначъ“), Майданиталь, въ ущельи Куургентуръ, 8. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!!), по р. Сайталашъ, VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), Тинь-шиань, 8—12.00(0)' — *Кушакевичъ!*; Акъ-тагъ-тай 8—11.000 (*Корольковъ!*).

V. Истоки р. Ангренъ, Аршанъ-булакъ, 20. VI. 1880 (A. Regel! — собрано Мусою). Экземпляры эти отличаются нѣсколько по своему вицѣнному виду, но несомнѣнно относятся сюда же. Вообще растенія, собранныя на Аршанъ-булакъ носятъ какой-то особый характеръ — вызвано ли это мѣстными условіями или же лишь ранимъ временемъ сбора — для меня осталось невыясненнымъ.

VIII. Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 10—12.000', 30. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

IX. Сѣверный склонъ Сусамырскаго хребта, 7—9.000', 4. VI. 1881. тамъ же у р. Сандыкъ, 9—11.500', 3. VII. 1881 и Ка-

раколь, надъ притокомъ р. Сусамыръ, 9—11.000', 1. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. Кугартъ, каменистые склоны, 10.000', 6. VIII. 1895 (*С. Коржинскій!*); Баубашъ-ата, 10—10.400', 11. VIII. 1895 (*С. Коржинскій!*); у перевала Кенколъ, 9.000', 17. VI. 1899. (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области обычное растеніе каменистыхъ склоновъ и розыней высокогорной зоны; спускается однако и ниже, даже до 6.000'. Преобладаетъ форма съ оранжевыми цветами, болѣе голая (v. *eroseum*) или мохнатая (v. *hispidissimum*).

Въ Туркестанѣ широко распространено въ горахъ — О и С.

Въ Туркестана — въ арктической области, въ горахъ Европы, Сибири, Гималаихъ, Афганистанѣ, Сѣверной Америкѣ, сѣверномъ Китаѣ и Монголіи.

**73. Papaver pavoninum Schrenk in Fisch. et Meyer, Ind. IX. seminum horti Petropol. № 2298 p. 82. — 1842. — Boiss., Fl. or. I. 116.**

P. cornigerum Stocks, London Journ. Bot. IV. 142.

1870. Papaver pavoninum, E. Regel. Suppl. II. pl. Semen. № 55 c.

1878. Mohn, A. Regel Reisebr. 177.

1902. Papaver pavoninum, O. A. Федченко. Списокъ № 61.

Туземн. назв.: Гули-ляля (сарт.), кызъ-галдакъ (киргиз.).

I. Аламединъ, 3—5.000', 25—26. V. 80 (*Фетисовъ!*).

III. Чаянъ, 5. V. (*Съверцовъ!*).

IV. Передъ Ходжакентомъ (A. Regel — п. в.), Ташкентъ, 1.400', 4. и 7. IV. 1871 (O. A. Федченко!), между Ташкентомъ и Келесомъ, садъ, 22. IV. 1871 (O. A. Федченко!), Ташкентъ (*Хомутовы!*).

VI. Моголь-тау, III. (*Съверцовъ!*), Сарамсакъ-дуанъ близъ Ходжента (ex herb. Trautvetter).

XI. Узгентъ, 28. V. 1880 (A. Regel!).

Въ Туркестанѣ всюду въ пустынной и степной полосѣ — N, O, S, W; въ горахъ поднимается до 4.000' и даже выше.

Въ Туркестана — въ Афганистанѣ и Белуджистанѣ.

**74. Papaver dubium L. Sp. pl. ed. 1a p. 1196. — 1753. — Led., Fl. ross. I. 89. — Boiss., Fl. or. I. 115. — Hook., Fl. or. Ind. I. 117.**

1870. *Papaver dubium*, *E. Regel Suppl.* II. pl. Semen. № 55b.  
 II. Каракочку, по Малому Таласу, 1876 (*A. Регель!*).  
 III. Близъ Чимкента (*Съверцовъ!*).  
 VI. Моголь-тау (*Съверцовъ!*).  
 VII. Гава, 22. V. 1878 (*Скорняковъ!*).

У насъ встречается лишь изрѣдка и вообще въ Туркестанѣ мало распространено: О: — Тянь-шань, С: — Заравшанъ. Внѣ Туркестана — почти вся Европа (кромѣ с.-в.), Кавказъ, Афганистанъ, Западные Гималаи.

**75. *Papaver somniferum* L.** Sp. pl. ed. 1a p. 508.—**1753.**—  
*Boiss.*, Fl. or. I. 116.—*Hook.*, Fl. or. Ind. I. 117.

1872. *Papaver somniferum*, *Krauze* Замѣтки 266.  
 1878. *Bunte Mohnsorten*, *A. Regel Reisebr.* 167.

1881. *Mohn*, *Middendorff Ferghana* 240.

1890. *Papaver somniferum*, *Бродовский*, С.-Х. отд. выставки, № 37.

1892. Маковая плантаций, *Масъ*, Турк. выст. 12—13.

Туземн. назв.: Кукнаръ, кугнаръ; якъ.

IV. Разводится въ садахъ въ Ташкентѣ, пестроцвѣтныя формы, какъ красиво цвѣтущее растеніе (*A. Регель*), въ садахъ (*Краuze*); разводится, какъ масляничное растеніе (*Бродовский*), разводится близъ Идрисъ-ней-гамбара на Чаткалѣ, VIII. 1902 (*Б. А. Федченко!!*).

VII и XI. Разводится въ Ферганѣ (*Миддендорфъ*).

Внѣ Туркестана культивируется въ Н (Чулакъ, на сѣв. скл. горъ Карагату!), О и С.

Внѣ Туркестана — культурное и одичалое въ южной половинѣ Европы, Азии и Сѣверной Америкѣ.

Культура мака вообще мало распространена въ Туркестанскомъ краѣ, хотя климатическая условия вполнѣ благоприятствуютъ тому.

Сѣмена мака идутъ на приготовление масла, какъ и изъ другихъ масляничныхъ растеній. Хорошимъ урожаемъ считается до 10 пудовъ съ тарапа (60 пуд. съ десятины). Изъ оставшихся послѣ отѣленія сѣмянъ маковыхъ головокъ, туземцы приготовляютъ наркотический напитокъ „кукнаръ“, настаивая и вываривая въ кипяткѣ толченые головки. Потребление кукнара, впрочемъ, не особенно распространено между туземцами; по своему вредному дѣйствию на орга-

низмъ, оно вполнѣ соответствуетъ дѣйствію опiumа. Опiumъ въ Туркестанѣ приготавлять не умѣютъ; *I. H. Krauze* въ Ташкентѣ дѣлали опыты получения опiumа и результаты его трудовъ были демонстрированы на сельско-хозяйственной выставкѣ 1892 года въ Ташкентѣ.

## 2. *Roemeria* Medik.

1. Стручки щетинистые, къ верхушкѣ не утолщающіеся . . . . . *R. hybrida* (L.) DC.  
 Стручки обыкновенно голые, къ верхушкѣ утолщающіеся . . . . . *R. rhoeadiflora* Boiss.

**76. *Roemeria hybrida* (L.) DC.** Syst. veget. II. 82.—**1821.**—  
*Boiss.*, Fl. or. I. 118.—*Led.*, Fl. ross. I. 92.

*Chelidonium hybridum*, L. Sp. pl. Ed. 1a p. 506.—  
**1753.**

1870. *Roemeria hybrida*, *E. Regel Suppl.* II. pl. Semen. № 57a.

1870. " *refracta*, *E. Regel* l. c. № 57b.  
 1870. " *bicolor* n. sp., *E. Regel* l. c. № 57c.  
 1902. " *hybrida* f. *typica*, *O. A. Федченко*, Списокъ № 62.

III. Карагату, IV. 67 (*Скорняковъ*), Чаянъ (*Съверцовъ!*), близъ Чимкента (*Съверцовъ!*).

IV. По садамъ между посѣвами, 10. V. (*Krauze!*), Ташкентъ (*Финкельштейнъ!*), Сыръ-Дарья (?) близъ Ташкента (*A. Регель!*).

VII. Моголь-тау 20. IV. (*Съверцовъ!*), Сыръ-Дарья бл. Ходжента, 14. IV. 1880 (*A. Регель!*), Арабитъ, 19. IV. (*Съверцовъ!*).

У насъ не рѣдкое весенне растеніе, по преимуществу на юго-западѣ области.

Внѣ Туркестана распространено широко.

Внѣ Туркестана — южная Европа, сѣверная Африка, Сирія, Кавказъ, Персія.

**77. *Roemeria rhoeadiflora* Boiss.** Diagnos. pl. orient. Sér. I. fasc. 6, p. 7.—**1845.**—*Boiss.*, Fl. or. I. 119.

1877. *Roemeria hybrida* *rhoeadiflora*, *A. Regel Reisebr.* 365.  
 Туземн. назв.: Ляля-кизгалдакъ.

I. Аламединъ, 3—5.000', 25—26. V. 1880 (*Фетисовъ!*).  
 III. Карагату, Иштюбе, VI. 1876 (*A. Регель!*).

IV. Ташкентъ, 1882 (*Маевъ!*) — обломокъ растенія, лежаъ въ гербаріи Императорскаго Бот. Сада подъ именемъ *Rapaver Rhoeas*, горы Карагату 1882 (*Маевъ!*), Ташкентъ V. 1872 (*Короликовъ!*), по садамъ и полямъ въ изобилії I. V. 1871 (*Краузелъ!*), въ долинѣ р. Чимгана, 4.700', 30. VI. 1900 и 1901 (*E. Холумтова!*).

VI. Сыръ-Дарья близъ Ходжента, 14. IV. 80 (*A. Регель!*), Моголь-тау 23. V. (*Скорняковъ!*).

XI. Сары-біе-сай и Майли-сай, 2. VI. 1878 (*Кушакевичъ!*).

Въ нашей области весьма не рѣдко въ предгорьяхъ, повидимому, не выше 5.000'.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — Тянь-шань; S: — Заравшань; W — Закаспійская область.

Внѣ Туркестана встрѣчается въ Белуджистанѣ, Персіи и Закавказіи.

## 22. *Glaucium* Adans.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Стручки совершенно голые . . . . .   | <i>G. vitellinum</i> Boiss. et Buhse.            |
| Стручки болѣе или менѣе густо покрыты щетинками или чешуйками . . . . .   | 2.   |
| 2. Стручки длинные, прямые, густо покрыты чешуйками, лепестки не крупные . . . . .                                    | <i>G. squamigerum</i> Kar. et Kir.               |
| Стручки съ тонкими щетинками, не длинные, на концѣ согнутые, лепестки не крупные . . . . .                            | <i>G. elegans</i> Fisch. et Mey.                 |
| Все растеніе болѣе крупное, стручки съ рѣдкими длинными щетинками, прямые, вѣнички оранжево-желтые, крупные . . . . . | <i>G. fimbriiflorum</i> (Trautv.)<br>B. Fedtsch. |

78. *Glaucium fimbriiflorum* (Trautv.) B. Fedtsch. *G. luteum* var. *fimbriifera*, Trautvetter, Enumer. pl. Songor. № 72 („Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“). 1860.

*G. fimbriiflorum*, Boiss., Fl. or. I. 120.  
II. Въ долинѣ р. Кумышъ-тагъ, ущелье Боркутья, 11. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!!).

XI. Майли и Майльвия, рѣдко, 20. VIII. (*Краузелъ!*).  
Въ нашей области довольно рѣдко. Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — Джунгарскій Алатау.  
Внѣ Туркестана — указывается для Афганістана.

79. *Glaucium elegans* Fisch. et Mey. in Ind. I. Semin. horti Petrop. p. 27.—1835.—*Led.*, Fl. ross. I. 93.—*Boiss.*, Fl. or. I. 120.

1870. *Glaucium elegans*, E. Regel Suppl. II. pl. Semen, № 58a.

IV. Долина р. Чаткаль, 5—6.000', 1876 г. (*A. Регель!*), Сыръ-дарья (?) близъ Ташкента (*A. Регель!*).

VI. Моголь-тау (*Съверцовъ!*).

VII. Гава, 22. V. 1878 (*Скорняковъ!*).

Изрѣдка встрѣчается въ нашей области въ предгорьяхъ и нижней полосѣ горъ.

Отъ близкихъ видовъ отличается, повидимому, достаточно хорошо.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О, S и W.

Внѣ Туркестана — Армения, Персія, Афганістанъ.

80. *Glaucium squamigerum* Kar. et Kir. Enumer. pl. Song. № 53. („Bulletin de Société Impériale des Naturalistes de Moscou“ vol. XV.) 1842.—*Led.*, Fl. ross. I. 744.

XI. Андижанъ у Кара-унгуръ, 30. V. 99 (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области собраны лишь однажды экземпляры въ цвѣту; которые я считаю возможнымъ отнести къ этому виду. Въ другихъ частяхъ Туркестана встрѣчается не рѣдко: О: — Джунгарскій Алатау, Тянь-шань; S: — Алайскій хребеть (О. А. и Б. А. Федченко!!).

Встрѣчается также въ Китайскомъ Туркестанѣ, по обоимъ склонамъ Восточного Тянь-шаня.

81. *Glaucium vitellinum* Boiss. et Buhse. Aufzähling der auf einer Reise durch Transcaucasien und Persien gesammelten Pflanzen, p. 12 t. 14 (Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, XII.). 1860.—*Boiss.*, Fl. or. I. 123.

*G. leiosarpum*, Boiss. Fl. or. I. 122.

IV. Паркусъ, 19. VI. 81, 2—3.000' (*A. Регель!*), Сайлыкъ, 3—5.000', 1876 (*A. Регель!*), Чимганская гора, 19. VIII. 1897 (О. А. Федченко!), долина р. Чимгансъ, 1899—1900 (*E. Холумтова!*).

Въ нашей области встрѣчается довольно рѣдко. Въ Туркестанѣ найдено еще въ S: — Алайскій хребеть (О. А. и Б. А. Федченко!!). Вообще говоря, представляетъ форму очень близкую къ *G. luteum*.

Встрѣчается также въ Персіи и Азіатской Турції.

*Приимѣчаніе:* Изъ сем. Papaveraceae, въ Туркестанѣ встрѣчается еще *Chelidonium majus* L.

#### IV. Fumariaceae.

##### 23. *Hypecoum* L.

82. *Hypecoum pendulum* L. Sp. pl. ed. 1a p. 124.—1753.—  
Boiss., Fl. or. I. 125.

*H. caucasicum*, C. Koch., Led., Fl. ross. I. 94.

1870. *Hypecoum pendulum*, E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 59.

1902. *Hypecoum pendulum*, O. A. Федченко, Списокъ № 68.

I. Предгорья Александровскаго хребта, 15—25. IV. 1879  
(Фетисовъ!).

IV. Ташкентъ, степь на Боссу, 1.400', IV. 1871 (O. A. Федченко!), Ташкентъ III. 1872 (Корольковъ!), близъ Ташкента (Кушиакевичъ!), Ташкентъ IV. 1882 (Масевъ!, A. Regel!), Карагату (Маевъ!), Сыръ-Дарья (?) близъ Ташкента, IV. 1880 (A. Regel!), Минъ-Урюкъ, 8. V. (Краузэ!), Ташкентъ (Холмутовы!).

V. Мурзарабатъ 9. V. 1880 (A. Regel!), Карасу 9. IV. 1880 (A. Regel!).

VI. Моголь-тау, 14. IV. 80 (A. Regel!), тамъ же IV. (Сверцовъ!), тамъ же V. 1878 (Скорняковъ!).

Въ нашей области одно изъ самыхъ обычныхъ растений нижней зоны, но выше 2.500', повидимому, въ горы не идетъ. Встрѣчается очень часто по всему Туркестану, кроме горъ: N, O, S, W.

Извѣстно также въ южной Европѣ, Малой Азіи, Сиріи, Аравіи, на Кавказѣ, въ Персіи, Афганистанѣ, Белуджистанѣ и с.-з. Монголіи.

##### 24. *Corydalis* Vent.

Choix des plantes cult. jard. Cels. p. 19. (1803) ex Dalla Torre et Harms Gen. Siphon. № 2858.

Оставляемъ по примѣру многихъ авторовъ наименование *Corydalis*, такъ какъ болѣе старыя имена (*Capnoides*, *Neckeria*) являются неудобными; первое — отвергнуто еще Pfeifferомъ (Botan. Zeit. 1857, 643) второе относится не только

(120)

къ *Corydalis* Vent., но и къ *Fumaria* (auct. recent.), къ тому же въ бріологіи утвердилось наименование *Neckera* Hedw.

1. Растенія съ клубнемъ; при основаніи стеблей не имѣется остатковъ старыхъ листьевъ . . . . .
  2. Растенія съ болѣе или менѣе толстымъ корневищемъ безъ клубней, рѣже растенія съ тонкими корнями . . . . .
  3. Стеблевые листья супротивные . . . . .
  4. Стеблевые листья очередные . . . . .
  5. Конецъ шпорца, отогнутый внизъ . . . . .
  6. Конецъ шпорца обращенный вверхъ, не отогнутый . . . . .
  7. Прицвѣтки цѣльнокрайние . . . . .
  8. Прицвѣтки зубчатоадрѣзные . . . . .
  9. Плоды очень крупные, вздутые пузыревидно. Плодъ — продолговатая или линейная коробочка . . . . .
  10. Растеніе съ тонкимъ, двулѣтнимъ корнемъ, стебли слабые, сильно вѣтвистые . . . . .
  11. Растеніе съ болѣе толстымъ корневищемъ . . . . .
  12. Шпорецъ нижнаго лепестка безъ мѣшковиднаго расширения; прицвѣтки надрѣзанные . . . . .
  13. Шпорецъ нижнаго лепестка мѣшковидно-расширенный, прицвѣтки маленькие, почти кожистые, гораздо короче цвѣтопожекъ . . . . .
- C. *Capnoides* Pers.  
C. *Gortschakowii* Schrenk.  
C. *paniculigera* Rgl. et Schmalh.

83. *Corydalis Sewerzowi* Rgl. in Suppl. II. ad enumer. plant. a cl. Semenov. lect. № 60 b (Bulletin de la Soci  te Imp  riale des Naturalistes de Moscou, 1870, fasc. 2 p. 252).

1870. *Corydalis Sewerzowi*, E. Regel l. c.
  1872. " A. Федченко, Списокъ мѣстностей, № 163.
  1878. " *Sewerzowi*, A. Regel Reisebr. 168.
  1882. " *E. Regel Gartenfl.* 97, t. 1077.
  1882. " *A. Regel Gartenfl.* 114.
  1882. " *Semenowi* (lapsu!), A. Regel Gartenfl. 114.
  1902. " *Sewerzowi*, O. A. Федченко, Списокъ № 70.
- I. Предгорья Александровскаго хребта, 15—25. IV. 1879 (Фетисовъ!).

III. Карагату, IV. 76 (Скорняковъ!), Карагату близъ ручья Бабата (Сверцовъ!), Карагату, близъ Туслана, 3.000' (Сверцовъ!), Машатъ, 27. III. 80 (A. Regel!), январь—февр., бл. Чимкента (Сверцовъ!), Чимкентъ (Краузэ!).

(121)

IV. Ташкентъ, весной (*A. Regel!*); на ближайшихъ къ Ташкенту горахъ, Каплашибекъ, 6. IV (*Krauze* — экземпляръ отосланъ въ Москву); отъ Ташкента до Каракъ-аты, 13. III. 1873 (*Короликовъ* и *Krauze!*), Саларь, 8 и 11. IV. 1871 (*O. A. Федченко!*), окрестности Ташкента, 19. IV. 1871 (*O. A. Федченко!*), Ташкентъ, бывшая гренажная станція, 8. III. 1901 въ цв. (*E. Вальневъ!*).

V. Отурбель; на съверномъ склонѣ горъ, между Аингреною и Коканомъ, V. 80 (*A. Regel!*), станція Уральская, 16. IV. 1880 (*A. Regel!*).

Въ нашей области преимущественно въ глинистыхъ стенахъ на юго-западѣ; въ горы совсѣмъ почти не заходитъ.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ S: — Заравшанъ (*O. A. Федченко!* и др.), Яны-курганъ 25. III. 1882 (*A. Regel!*), Тамерлановы ворота бл. Джизака, 25. III. 1882 (*A. Regel!*), Уратюбе, 4—5.000', 17. IV. 1880 (*A. Regel!*), къ съверу отъ Самарканда, 19. IV. 1880 (*A. Regel!*), въ горной Бухарѣ: Дарвазъ (*Musa!*), также W: — Закасп. обл. (*Литвиновъ*, *Антоновъ!* — очень крупныя формы).

Виѣ Туркестана встрѣчается лишь въ пограничныхъ съ Закасп. обл. частяхъ Афганистана.

**84. *Corydalis Ledebouriana* Kar. et Kir. Enumer. pl. alt. № 54 („Bulletin de la Soci  t   Imp  riale des Naturalistes de Moscou“, XIV.) 1841.—*Led.*, Fl. ross. I. 745.**

1870. *Corydalis Ledebouriana*, *E. Regel Suppl.* II. pl. Se-  
men. № 60a.

1882. *Corydalis* (saltem ex parte!), *A. Regel* Gartenfl. 113.

I. Предгорья Александровскаго хребта, 5. IV. 1879 (*Фетисовъ!*), Аламединъ, 3—9.000' 23. V. (*Фетисовъ!*).

III. Ст. Машатъ, 27. III. 1880 (*A. Regel!*), Бугунъ, 15. III (*Съверцовъ!* — эти экземпляры, по мнѣнию *D. Prain'a* (in schedul. herb. Petrop., 29 III. 1896) относятся къ *C. Griffithi Boiss.*, но въ своей печатной работе<sup>1)</sup> *Prain* не приводитъ этого вида для Туркестана. По моему мнѣнию, врядъ ли возможно отличать Бугунскіе экземпляры отъ обычныхъ Туркестанскихъ *C. Ledebouriana*.

<sup>1)</sup> *D. Prain*, An account of *Corydalis persica* („Bulletin de l'herbier Boissier, 1899 mars“).

IV. Санташъ на р. Чирчикъ, 28. V. 1880 (*A. Regel!*, собрано *Мусою*), Сайлыкъ, 5.000', 1—15. IV. 1882 (*A. Regel!*) — у этихъ экземпляровъ *Prain* написалъ название „*C. persica* Cham. et Schl. (C. Griffithi Boiss.) 29. 3. 96“, но въ своей послѣдней работе<sup>1)</sup>, онъ ни слова не говоритъ объ этихъ экземплярахъ и настоящаго *C. persica* для Туркестана не указываетъ.

VII. Переваль Кендырь-аузъ, 20. V. 1880 (*A. Regel!* — собрано *Мусою*).

XI. Альпійскіе луга по р. Уракъ-су, близъ перевала Кенколъ, 9.000', 29. V. 1899 (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ О: — Джунгарія; Центральный Тянъ-шань и S: — Заравшанъ.

Виѣ Туркестана неизвѣстно.

**85. *Corydalis solidia* (L.) O. Swartz. O. Swartz in I. G. Billberg, Svensk Botanik, VIII. 531.—1819.—*Led.*, Fl. ross. I. 100. *Fumaria bulbosa* γ *solida* L. Sp. pl. Ed. I p. 699.—**

**1753.**

*F. Halleri*, Willd. Sp. pl. III. 2 p. 863, № 14.

*C. digitata* Pers. Synops. II. 269.

*C. bulbosa* DC. Syst. 2. 119.

? IV. Въ Туркестанѣ близъ Ташкента (*Кушакевичъ!*).

Въ Туркестанскомъ гербаріи Императорскаго Ботан. Сада хранится съ вышеупомянутымъ обозначеніемъ мѣсто-нахожденія несомнѣнная *C. solidia*, но я позволяю себѣ сильно сомнѣваться въ томъ, чтобы этотъ экземпляръ быть собранъ дѣйствительно „близъ Ташкента“. Подобное же сомнительное указание имѣемъ мы и для *Ranunculus Ficaria*.

Въ ироичихъ частяхъ Туркестана неизвѣстно, встрѣчается въ Европѣ и Съверной Азіи.

**86. *Corydalis capnoides* (L.) Pers. Synops. plant. vel en-  
chir. II. 270.—1807.—*Led.*, Fl. ross. I. 103.**

*Fumaria capnoides* L. Sp. pl. ed. 1a p. 700.—**1753.**  
I. Аламединъ, 28. V., 5.500—9.000' (*Фетисовъ!*).

Въ нашей области встрѣчается исключительно на крайнемъ съверо-востокѣ. Въ Туркестанѣ встрѣчается въ горахъ: О, С.

Виѣ Туркестана — въ Европѣ и Съверной Азіи.

87. *Corydalis Kolpakowskiana* Rgl. *E. Regel Descript. pl. nov. et minus cogn. fasc. 5.* („Acta Horti Petrop.“ V. 2. p. 638). **1878.**

? 1882. *Niedrige weisse Corydalis*, *A. Regel Gartenfl.* 361.

I. Предгорья Александровского хребта, 15—25. IV. 1879 (*Фетисовъ!*).

XI. Среднее течение р. Ясы, 8—9.000', 31. V. 1880 (*A. Regel!* — форма съ больше широкими долеками листьевъ); Айдикан. у., верховья р. Уракъ-су, бл. пер. Кенколъ, алы. луга, 9.000' (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области встречается рѣдко. Въ Туркестанѣ известно въ О: — Джигарскій Алатау: Пилучи, Борборогуссунъ, Талки (*A. Regel!*), Центральный Тянь-шань, также въ С: — Заравшанъ (?).

Въ Туркестана не указано.

88. *Corydalis Schangini* (Pall.) B. Fedtsch. *Fumaria Schangini* Pall. (Acta Acad. Petropol. VI. 267). — **1779.**

*Corydalis longiflora* Pers. *Synops.* II. 269. — **1807.** *Led. Fl. Ross.* I. 98.

*Capnoides Schangini*, O. Kuntze Revis. Gen. 1870: *Corydalis longiflora*, *E. Regel Suppl.* II. pl. Semen. № 61.

1902. *Corydalis longiflora*. O. A. Федченко, Списокъ № 71.

III. Карагатай IV. 1867 въ цв. (*Скорняковъ* — п. в.), въ Туркестанѣ (*Съверцовъ* — п. в.).

Въ гербарии Императорскаго Ботан. Сада, образцовъ этого вида изъ нашей области не имѣется, хотя, конечно, видъ этотъ можетъ встречаться въ степной зонѣ.

Въ Туркестанѣ известенъ въ N: — стени, въ W: — побережье Каспія.

Въ Туркестана — Алтай.

89. *Corydalis Gortschakowii* Schrenk in Fischer et Meyer Enumer. (1a) pl. novar. a cl. Schrenk lectar. p. 100. — **1841.** — *Led. Fl. Ross.* I. 746, non C. Gortschakowii Hook., *Fl. br. Ind.* I. 125 quae ad C. thyrsifloram Prain refertur.

1883. *Corydalis Gortschakowii*, *Franchet Mission Capus* 224. I. Джаламынъ, 10.000', 22. VI. 1880 (*Фетисовъ!*), перевалъ Карагай-булакъ, 9.500'—10.500', 6. VII. 1882 (*Фетисовъ!*).

IV. Долина Она (Аида). Ульгана, 7.000', 1876 (*Корольковъ!*), Турпакъ-бель, долина Она (Аида)—Ульгана, на склонахъ, 2—3000м., 23. VIII (*Капю!*), въ Тянь-шанѣ, 8—1.200' — очевидно, вместо 12.000' (*Кушакевичъ!*), Санташъ на р. Чирчикъ, 28. V. 1880 (*A. Regel!* — собрано *Мусою*), Акъ-тагъ-тай, 8—11.000', VI. 1872 (*Корольковъ!*), „pr. Tschatkala 27. VII“ (вѣроятно, близъ Чаткала, вольный переводъ на латинскій языкъ; собр. *Краузе!*), по Санталашу, на сланцахъ въ верховьяхъ Чаракъ-сая, 15. VIII. 1902 (*B. A. Федченко!*), у перевала Кульашу, на склонѣ къ Искему, 10. VIII. 1902 въ цв., и на перевалѣ Мазарь, 30. VIII. 1902 въ цв. (*B. A. Федченко!*), у перевала Афлатунъ, 12.000' 30. VI. 1899 (*Литвиновъ!*), тамъ же 26. VIII. 1902 въ цв. (*B. A. Федченко!*).

V. Истоки р. Ангренъ, Аршанъ-булакъ, 20. VI. 1880 (*A. Regel!* — собрано *Мусою*).

VIII. Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 10—12.000', 30. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

IX. Вершины Сусамырскаго хребта, 9—11.000', 19. VII. 1881 и 10—12.000', 8. VII. 1881 (*Фетисовъ!*), съверный склонъ Сусамырскаго хребта, у р. Сандыкъ, 9—11.500', 3. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

Въ Туркестанѣ встречается въ горахъ въ О и С.

Въ Туркестана съ достовѣрностью неизвестно, хотя повидимому сюда относится растеніе изъ Афганистана, отнесенное *Буассе* къ *C. Moorcroftiana* Wall.

89. *Corydalis paniculigera* Rgl. et Schmalh. in E. Regel, описание новыхъ и болѣе рѣдкихъ растеній, по материаламъ, собраннымъ О. А. Федченко въ Туркестанѣ и Коканѣ, № 7 (*A. A. Федченко*, Путешествіе въ Туркестанѣ, вып. 18, стр. 3). **1881.**

XI. Майли, Сары-біе, 2. VI. 1878 (*Кушакевичъ!*).

Въ нашей области растеніе это известно лишь изъ одной только мѣстности. Въ Туркестанѣ встречается еще въ С: — Алайскій хребетъ (*O. A. Федченко!*; *Кушакевичъ!* — собрано вѣроятно *Скорняковымъ*).

Въ Туркестана не встречается.

90. *Corydalis Fedtschenkoana* Rgl. E. Regel, описание новыхъ и болѣе рѣдкихъ растеній по материаламъ, собраннымъ

О. А. Федченко въ Туркестанѣ и Коканѣ, № 6 (А. Н. Федченко, Путешествие въ Туркестанѣ, вып. 18, стр. 3). 1881.

1902. *Corydalis Fedtschenkoana*, Б. А. Федченко краткий отчетъ (Извѣст. Импер. Бот. Сада II. № 6 стр. 186).

I. Переваль Кольторъ, 8. VII. 1882, 12.000' (Фетисовъ!).

IV. Въ верховьяхъ Санталаша, на сланцахъ у истоковъ Чаракъ-сая, 11.000', въ цв. 15. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!).

VIII. Переваль Терекъ у истоковъ Узунъ-ахмата, 12.000', 30. VII. 1881 (Фетисовъ!).

Въ нашей области встрѣчается изрѣдка въ верхней части альпийской зоны.

Растеніе это было открыто въ 1871 г. О. А. Федченко въ Алайскомъ хребтѣ. До настоящаго времени оно собрано въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ О:—Центральный Тянь-Шань: Бедель, Куйлю, Алматы (Красновъ!), Күнгей Алатау, съверная Аксу, 31. VII. 1899 (Я. Н. Корольковъ!), надъ пер. Коюсъ VIII. 1896 (Бромтерусъ!), пер. Байбиче 28. VII. 1882, 12.000' (Фетисовъ!); въ С:—Заравшанъ не западнѣе р. Фонъ (Комаровъ!), Алайскій хребтъ: Караказукъ, ледникъ Шуровскаго, Джиптыкъ (О. А. Федченко!), Заалайскій хребтъ: на сланцахъ по р. Кизылъ-артъ, 12. VII. 1895 (*C. Korzhinskii*!), тамъ же въ 1901 г. (О. А. и Б. А. Федченко!), Дарвазъ на р. Хазретъ-шахъ у истоковъ Аксу, на западномъ склонѣ горъ, VII. 1884 въ цв. (А. Регель!).

Въ Туркестанѣ неизвѣстно, но въ Гималаяхъ встрѣчается чрезвычайно близкая форма: *C. crassifolia* Royle.

Вѣнчики *C. Fedtschenkoana* Rgl. блѣдоватые, съ фиолетовымъ зѣвомъ.

*Прилиѣніе.* Изъ рода *Corydalis* указываются для Туркестана еще нѣсколько видовъ. Назовемъ:

<i>C. adunca</i> Max.	—	S	—
<i>C. darwasica</i> Prain.	—	S	(Endem.)
<i>C. imbrilligera</i> Korsh.	—	S	(Endem.)
<i>C. glaucescens</i> Rgl. <sup>1)</sup>	—	O	(Endem.)
<i>C. macrocalyx</i> Litw.	—	W	(Endem.)

<sup>1)</sup> Этотъ видъ описанъ по нѣсколькимъ обломкамъ, принадлежащимъ, повидимому, двумъ различнымъ видамъ, вѣроятно, *C. Kojakowskiana* Rgl. и *C. paniculigera* Rgl. et Schmalh. (?).

<i>C. macrocentra</i> Rgl.	—	S	— (Endem.)
<i>C. nudicaulis</i> Rgl.	—	S	— (Endem.)
<i>C. Semenowi</i> Rgl.	—	O	— (Endem.)
<i>C. Shelesnowiana</i> Rgl. et Schmalh.	S	—	—
<i>C. stricta</i> Steph.	—	O	S —

## 25. *Fumaria* L.

91. *Fumaria Vaillantii* Lois. *Loiseleur Deslongchamps*, Notice sur les plantes à ajouter à la Flore de France, p. 102. Paris 1810.—Led., Fl. ross. I. 105.—Boiss., Fl. or. I. 135.

*F. parviflora* Lamark, subsp. *Vaillanti*, Hook., Fl. br. Ind. I. 128.

1870. *Fumaria Vaillanti* Lois., E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 65.

1872. *Fumaria officinalis* Краузе Замѣтки 269.

1902. " Vaillanti O. Федченко Списокъ № 76.

I. Предгорья Александровскаго хребта, 15—25. IV. 1879 (Фетисовъ!), Арасанъ, 5. VI. 1880, 7—9.000', Аламединъ, 25. V. 1880, Кольторъ, 7.000', 6. VII. 1882, г. Пишпекъ, 2.000', 10. V. (Фетисовъ!).

II. Чулакъ и Кумбулакъ, къ востоку отъ г. Ауліе-ата, V. 1881 (Муса!).

III. Чимкентъ, янв.—февр., въ цвету (Съверцовъ!).

IV. Близъ Ташкента, сады и степь на Боссу 11. VI. 1871 (О. А. Федченко!), Саларь, 28. III. 1871 (О. А. Федченко!), въ садахъ, между посѣвами, часто, Краузе! — въ гербаріи, однако, безъ обозначенія мѣстонахожденія), Ташкентъ 1882 (Маевъ!).

V. Карасу, 9. IV. 1880 (А. Регель!).

IX. Съверные склоны Сусамырскаго хребта, 5. VII. 1881, 7—10.000' (Фетисовъ!), Кобукъ, южный склонъ Сусамырскаго хребта, 6. VII. 1881 (Фетисовъ!).

Встрѣчается по всему Туркестану и поднимается въ горахъ почти до начала альпийской зоны.

Въ Туркестанѣ — почти вся Европа, съверная Африка, Азія до Индіи и съв. зап. Монголіи.

*Прилиѣніе.* Изъ р. *Fumaria* для Туркестана указаны еще близкіе виды: *F. parviflora* Lam. и *F. asepala* Boiss.

Изъ сем. Fumariaceae въ Туркестанѣ встрѣчается еще эндемическая *Fumariola turkestanica* Korsh. (S:—Алайский хреб., бл. Ляцгара Исфаїрамскаго). Видъ этотъ былъ описанъ С. И. Коржинскимъ изъ указаннаго мѣстонахождения въ 1898 г., но впервые былъ онъ собранъ еще въ 1878 г. С. М. Смирновымъ: экземпляръ съ этикеткой (Фергана) "между Вуадилемъ и Шагимарданомъ, на скалахъ, 22. XI" съ помѣткой Э. Л. Регеля „Isorugum“ хранился въ Импер. Ботан. Саду, въ составѣ гербарія Смирнова, теперь же вложенъ въ Туркестанскій гербарій.

## V. Cruciferae.

### 26. Matthiola R. Br.

92. *Matthiola flava* Boiss. Diagnos. pl. nov. or. I. fasc. 6, p. 9.—1845.—*Boiss.*, Fl. or. I. 151.

VII. Тюря-курганъ, 18. V. 1878 въ цв. и пл. (*Скорняковъ!*).

Въ нашей области — очень рѣдко, на югѣ. Въ Туркестанѣ не рѣдко на склонахъ и осипахъ въ S: — Памироалай.

Въ Туркестана встрѣчается въ Персии.

*Приимѣчаніе.* Изъ рода *Matthiola* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды:

<i>M. albicaulis</i> Boiss. . . . .	—	—	S	W	—
<i>M. chenopodiifolia</i> F. et M. . . . .	—	—	—	W	—
<i>M. incana</i> (L.) R. Br. . . . .	—	—	O (cult.)	—	—
<i>M. integrifolia</i> Komar. . . . .	—	—	S	—	(Endem.)
<i>M. odoratissima</i> (MB) R. Br. . . . .	—	—	S	W	—
<i>M. robusta</i> Bge. . . . .	—	—	—	W	(Endem.)
<i>M. runcinata</i> Rgl. . . . .	—	—	S	—	(Endem.)
<i>M. Stoddarti</i> Bge. . . . .	—	—	—	W	(Endem.)
<i>M. tatarica</i> (Pall.) DC. . . . .	N	—	—	W	—

### 27. *Diptychocarpus* Trautv.

I. Все растеніе голое или отчасти покрытое пропыльми, не железнистыми волосками; стручки обыкновенно голые . . . . . *D. strictus* Trautv.

Все растеніе покрыто железнистыми и болѣе длинными не железнистыми волосками; стручки мохнатые . . . . . *D. hispidus* Rgl.

93. *Diptychocarpus strictus* (Fisch.) Trautv. Enumer. pl. Schrenk. songor. in Bull. de la Soc. Imp  iale des Naturalistes de Moscou 1860, p. 108 — *Boiss.*, Fl. or. I. 145 — *Lipsky*, De generibus novis Bcketowia, Orthorrhiza et Schumannia. (Acta Horti Petrop. XIII. p. 367).

*Raphanus strictus*, Fisch. in *M. B. Fl. taur. caucas.* III. p. 452 in nota. — 1819.

*Chorispora stricta* DC. Syst. Veg. II. 436.

*Alloceratum strictum* Hook. et Tayl. Journ. Linn. Soc. V. 129, 135.

*Matthiola Fischeri*, Bernh. h. erfurt. p. a. 1835. — *Led.*, Fl. ross. I. 110.

*Orthorrhiza persica* Stapf, Die botan. Ergebn. der Polakschen Expedit. nach Persien in 1882. II. Theil, 38. — 186.

1877. *Chorispora stenopetala* Rgl. et Schmalh. in E. Regel Descr. pl. nov. fasc. V in „Acta Horti Petrop.“ V. 239.

1902. *Diptychocarpus strictus* Trautv., О. А. Федченко, Списокъ № 118.

IV. Сады на Саларѣ, 9. IV; Саларъ, 14. IV. 1871, Ташкентъ, сады на Боссу, 11. IV. 1871 (О. А. Федченко!), Ташкентъ, 20. III. (Масъ!), Ташкентъ (Кушакевичъ!), Ташкентъ 23. IV. 1882 (А. Регель!), на возвышеніи мѣстѣ въ садахъ близъ Ташкента 3. V. въ цв. (Краузэ!).

VI. Сыръ-Дарья бл. Ходжента 14. IV. 1880 (А. Регель!).

Въ нашей области не рѣдко весной, какъ сорное или степное растеніе. Въ Туркестанѣ распространено весьма широко въ полосѣ степей, въ горы заходить до 4—5.000': N — Аягузъ; O — Джунгарія, Кульджа — Или (Красновъ!), Баяндай 5. V. 1878 (А. Регель!); предгорья Тянъ-Шаня; Алматинское ущелье, 1. V. 1878 (А. Регель!), Ханахай 15. VI. 1878 (А. Регель!), Вѣрное (Спиворово! — было первоначально названо Э. Регелемъ *Ch. hispida*, но вноскѣствѣ опредѣленіе исправлено имъ самимъ) S: — Бухара: Байсунское бекство (*C. Коржинскій!*), Кулибъ 1883 (А. Регель!), перевалъ Кизылькубель въ горахъ Карагату, между Дилацкоемъ и Сараемъ, 4—5.000', 9. IV. 1883 (А. Регель!), Самарканѣдъ (О. Федченко! и др.), Пенджакентъ (*B. Комаровъ!*); W — Усть-Уртъ (Борщовъ!); Закасп. обл. Красноводскъ (*Литвиновъ!*), Фирюза,

Теджентъ (*Литвиновъ!*), Ново-Александровскъ (*Карелинъ!*),  
Аякъ 2. IV. 1873 (*Корольковъ и Краузе!*).

Виѣ Туркестана встрѣчается въ Персіи, Афганистанъ  
и Закавказы.

**94. *Diptychocarpus hispidus* Rgl.** in Descr. pl. nov. fasc. V  
in Act. Horti Petropol. V. p. 230. — **1877.**

*Chorispora hispida* Rgl. in Rgl. et Herder Suppl.  
II. pl. Semen. № 93b — **1870.**

1870. *Chorispora hispida* E. Regel l. c. № 93b.

1877. *Diptychocarpus hispidus* E. Regel l. c. p. 230.

III. Бородай (*Корольковъ*); Чимкентъ (*Съверцовъ!*).

Я не видѣлъ экземпляровъ этого растенія. Для Туркестана указывается еще въ W — Закасп. обл.

*Примѣчаніе 1.* Изъ рода *Diptychocarpus* въ Туркестанѣ встречаются еще слѣдующіе виды:

*D. Olgae* Rgl. . . . . — — S — (Endem.)

*D. seravschanicus* Rgl. et Schm. — — S — (Endem.)

*Примѣчаніе 2.* Совершенно не ясно для меня, что за растеніе лежитъ подъ именемъ *Diptychocarpus* sp. въ СПБ. гербаріи (собрано въ Сайлыкѣ 4—6.000', 1876 г. A. Регель!) — очень недостаточный экземпляръ.

## 28. *Nasturtium* R. Br.

1. Вѣчики бѣлые . . . . . *N. officinale* R. Br.

Вѣчики желтые . . . . . *N. palustre* DC.

**95. *Nasturtium officinale* R. Br.** in Ait. Hort. Kew. ed. 2-а  
IV. p. 110. — **1812.** — *Led.*, Fl. ross. I. 111. — *Boiss.*, Fl. or. I.  
178. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 133. — *B. Липсій* Матер. Фл. Ср.  
Аз. № 5 („Acta Horti Petrop.“ XVIII. p. 7).

*Dictyosperma Olgae* Rgl. in *Э. Регель*. Описан.  
нов. вид. № 12 въ А. П. Федченко Путеш. въ Туркест.  
т. III. в. 18).

*Pirea Olgae* Durand in Index generum phanerogammarum p. IX. — *Комаровъ*, Мат. фл. Туркест. нагорья № 116  
p. 87 („Труды Спб. Общ. Естеств.“ т. XXVI).

*Sisymbrium Nasturtium aquaticum* L. Sp. pl.  
ed. 1-а p. 657. — **1753.**

1881. *Dictyosperma Olgae* Rgl., l. c.  
IV. По сырьемъ мѣстамъ у ручья въ долинѣ р. Пскемъ,  
21. VII. 1897, цв. и пл. (Б. А. Федченко!).

XI. Въ Майлиискомъ лѣсу VI (*Краузе!*).

Въ нашей области встречается довольно рѣдко по сырьемъ лѣсамъ и у ручьевъ. Въ Туркестанѣ известно еще въ S: — Заравшанъ (*О. А. Федченко!*, *В. Комаровъ!*) и W: — Закасп. обл.

Виѣ Туркестана — Европа, Афганистанъ, Персія, Сирія,  
Малая Азія, Индія, Съверная Америка, Сибирь.

**96. *Nasturtium palustre* (Leyss.) DC.** Syst. veg. II. 191.—  
1821. — *Boiss.*, Fl. or. I. 179. — *Led.*, Fl. ross. I. 112. — *Hook.*  
Fl. br. Ind. I. 133.

*Sisymbrium palustre* Leysser, Flora Halensis. Halae saxicae. 1783. p. 166 № 679 (у Boiss. невѣро цитировано „Leyss. Bad.“).

IV. Ташикентъ, V. 1882, съ цв. и незр. пл. (*Маевъ!*).

Въ нашей области рѣдко, какъ почти сорное растеніе.  
Въ Туркестанѣ вообще распространено широко: N — Кокбекты; O: — Тарбагатай. подошва Джунгарского Алатау, Балхашъ; S: — Самаркандъ; W: — Катты-курганъ (*О. А. Федченко!*), Бухара, Тахта-баде, 12. VI. 1884 (*А. Регель!*), берегъ озера Кось-аралъ (*О. А. Федченко!*) — записано и туземное название „Биргунъ“; Ильялы 24. VI. 1873 (*Корольковъ и Краузе!*).

Виѣ Туркестана — Европа, Сибирь, Востокъ до Индіи,  
Ассамъ, Китай, Монголія, Съверная и Южная Америка,  
Новая Зеландія.

Въ Туркестанѣ встречается еще:

*N. amphibium* (L.) DC. . N — — —

Изъ р. *Alyssopsis* въ Туркестанѣ встречается одинъ видъ: *A. Kotschyii* Boiss: W — Закасп. обл.

## 29. *Barbarea* R. Br.

**97. *Barbarea vulgaris* R. Br.** in Ait. Hort. Kew. ed. 2-а  
IV p. 109. — **1812.** — *Led.*, Fl. ross. I. 114. — *Boiss.*, Fl. or. I.  
183. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 134.

- Erysimum Barbarea* L. Sp. pl. ed. 1 p. 660. 1753.  
var. *arcuata* (Rehb.) Fries.  
*B. arcuata* Rehb. in Bot. Zeit. 1820. — *Led.*, Fl. ross. I. 115. — *Boiss.*, Fl. or. I. 183.  
1870. *Barbarea vulgaris* ♂ stricta, *E. Regel Suppl.* II ad. pl. Semen. № 66.  
I. Аламединъ, 3 — 5000', 23 — 27. V. 1880, съ цв. и пл. (Фетисовъ!).  
III. Чимкентъ (*Съверцовъ* — н. в.).  
IV. Въ ущельи Куургенъ-туръ, 7 — 8.000', 5. VIII. 1897, отцв. (Б. А. Федченко!!).  
V. Берегъ р. Ангрена, 13. V. (*Krauze!*).  
XI. Арсланбобъ, сырой лугъ, 26. V. 1899, въ пл. (*Литвиновъ!*).  
var. *minor* (C. Koch.).  
*B. minor* C. Koch., Linnaea XIX p. 55. — *Boiss.*, Fl. or. I. 184.  
IV. Спускъ съ перевала Куль-ашу къ р. Карагорумъ, въ нижней части альпийской области, въ полномъ цвету 10. VIII, 9 — 10.000' (Б. А. Федченко!!).  
IX. Кобукъ, южный склонъ Сусамырского хребта, 7.000', 6. VII. 1881, въ пл. (Фетисовъ!).  
XI. Влажные склоны у перевала Кенколъ, 9 — 11.000', 13. VIII. 1895, въ пл. (С. Коржинский!).  
Въ нижней зонѣ горъ встречается исключительно первая форма (v. *arcuata*), вообще довольно широко распространенная въ Туркестанѣ: О: — Ленса, С: — Заравшанъ, Алай, Заалайский хребетъ; В: — Закаспийская область. Невысокая многолѣтняя форма [v. *minor*. (C. Koch.)] повидимому встречается лишь въ высокогорной области и представляетъ иѣкоторая морфологическая отличія отъ предыдущей формы. Кромѣ Тянъ-Шаня, эта форма известна еще въ С: — Заравшанъ. Общее распространение *B. vulgaris* весьма широко: Европа, Сѣверная Азія, Сѣв. и Южная Африка, Австралия.

### 30. *Turritis* L.

98. *Turritis glabra* L. Sp. pl. ed. 1-a p. 669. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 116.

(132)

- Arabis perfoliata* Lam., *Boiss.*, Fl. or. I. 167.  
*Arabis glabra*, *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 135.  
IV. Около Ходжакента и Бричъ-муллы, 3.000', 1872 (*Корольковъ!*); Чимганъ, близъ истоковъ рѣчки, 16. VII. 1897 въ пл. (О. А. и Б. А. Федченко!!).

XI. Арсланбобъ 24. V. 1899 въ цв. и незр. пл. (*Литвиновъ!*)  
Въ нашей области не часто. Въ Туркестанѣ встречается въ О: — Джунгарскій Алатау: по р. Тентекъ (А. Кушакевичъ!), Борборогусунъ (А. Регель!); Тянъ-Шань: Джасылькуль (А. Кушакевичъ!) и др. мѣста; С: — Заравшанъ.

Въ Туркестана встречается въ Европѣ, Азіи, Сѣверной Америкѣ, Австралии.

### 31. *Arabis* L.

1. Однолѣтнее растеніе, покрытое не густымъ пушкомъ. . . . . *A. auriculata* Lam.  
Многолѣтнее растеніе съ беспилотными открытыми, густостврово-блочное . . . . . *A. albida* Stev.  
99. *Arabis auriculata* Lam. Encycl. I. 219 1789 — *Led.*, Fl. ross. I. 118. — *Boiss.*, Fl. or. I. 169. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 135.  
*Turritis patula* Ehrh. Beitr. VII. 159. — 1792.  
*Arabis patula* Wallr. Sched. 354.  
XI. Арсланбобъ, каменистые склоны, 26. V. 1899, посл. цв. и пл. (*Литвиновъ!*).  
Въ Туркестанѣ встречается еще въ Н: — Карагузъ въ горахъ Каракату (А. Регель!) и В: — Закаспийская область.  
Въ Туркестана известно въ южной Европѣ, Западной Азіи, Афганистанѣ, Кашмирѣ, сѣверной Африкѣ.  
100. *Arabis albida* Stev. in Cat. Hort. Gorenk. p. 51. — 1812. — *Led.*, Fl. ross. I. 117. — *Boiss.*, Fl. or. I. 174.  
*A. alpina* (ex parte) *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 135.  
IV. Чаткалъ, 4 — 6000', 1876 г., послѣдніе цветы и пл. (А. Регель!); въ кустарнике при спускѣ съ перевала на Угамъ къ кишлаку Сидзякъ, съ раскрывшимися стручками, 31. VII. 1902 (Б. А. Федченко!!); на склонахъ въ ур. Съемессасъ, 9. VIII, съ пл. (Б. А. Федченко!!).

Въ нашей области — рѣдкое горное растеніе. Собранные экземпляры однако неполны и потому недостаточны для точного опредѣленія.

(133)

Въ Туркестанѣ указано еще въ W: Катты-курганъ (*O. A. Федченко!* — также неполный экземпляръ), и Закаспійская область.

Въ Туркестана различныя формы этого полиморфного вида встречаются въ Греціи, Македоніи, Крыму, на Кавказѣ, въ Персіи, Малой Азії, Сиріи, Гималахъ.

*Примѣчаніе.* Изъ рода *Arabis* для Туркестана приводятся еще слѣдующіе виды:

<i>A. erysimoides</i> Kar. et Kir.	...	N	—	—	(Endem.)
<i>A. fruticulosa</i> C. A. Mey.	...	N	0	—	—
<i>A. hirsuta</i> Scop.	...	N	—	—	—
<i>A. incarnata</i> Pall.	...	—	0	—	—
<i>A. ionocalyx</i> Boiss.	...	—	—	W	—
<i>A. karateginia</i> Lipsky.	...	—	—	S	— (Endem.)
<i>A. kockanica</i> Rgl. et Schmalh.	...	—	—	S	— (Endem.)
<i>A. Montbretiana</i> Boiss.	...	—	—	S	W
<i>A. pachyrhiza</i> Kar. et Kir.	...	—	0	—	(Endem.)
<i>A. pendula</i> L.	...	—	0	—	—
<i>A. tibetica</i> Hook. et Th.	...	—	—	S	—

### 32. Cardamine L.

101. *Cardamine impatiens* L. Sp. pl. ed. I-a p. 655. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 128. — *Boiss.*, Fl. or. I. 161. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 138.

VII. Еловый лѣсъ по р. Ходжа-ата, 27. VI. 1899, въ пл. (*Д. Литвиновъ!*).

XI. По р. Карагурь, 30. V. 1899 цв. и пл. (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области преимущественно въ еловоихъ выхъ лѣсахъ. Въ Туркестанѣ вообще мало распространено: О. Джунгарскій Алатай, напр. Герасимовка 1. VI. 1873 (*Кушакевичъ!*), Дженишке-тентекъ, 2. VI. 1873 (*Чемякинъ!*); С: Могіаинъ (*В. Коларовъ!*).

Въ Туркестана встречается въ Европѣ, Малой Азіи, на Алтаѣ, въ Западныхъ Гималахъ, Китаѣ, Японіи, на Сахалинѣ, въ Сѣверной Америкѣ, Афганістанѣ, Персіи (напр. въ ущельи бл. Астрabadы, собр. консулъ *Бапулинъ!* въ 1874 г.).

*Примѣчаніе.* Въ Туркестанѣ встречается еще одинъ видъ изъ этого рода:

*C. hirsuta* L. . . . — — — W —

### 33. Parrya R. Br.

1. Цвѣтки прикорневые, рѣже стрѣлка немножко развитая . . . . . *P. exscapa* C. A. Mey.  
Цвѣтки на болѣе или менѣе длиной стрѣлѣ въ видѣ кисти . . . . . 2.
2. Полукустарники; одеревенѣлый вѣтви стелющіяся, довольно длинныя, иногда скрытыя подъ камнями; железистыхъ волосковъ нѣть; стручки длиной до 10 см. . . . *P. fruticulosa* Rgl. et Schmalh.  
Одеревенѣлыхъ вѣтвей почти нѣть; растеніе покрыто многочисленными железистыми волосками; стручки шире и длиннѣе, чѣмъ у предыдущаго вида. . . . . *P. stenocarpa* Kar. et Kir.  
Одеревенѣлый вѣтви короткія; растеніе безъ железистыхъ волосковъ или же все покрыто ими; стручки шире (6—7 мм.) и короче (4—5 см.), чѣмъ у предыдущихъ видовъ . . . . . *P. nudicaulis* (L.) Boiss.  
Отличается отъ предыдущихъ преимущественно характерно перистонадрѣзными листьями и не длиннымъ стручкомъ (3 мм. ширины, 4—5 см. длины) . . . . . *P. pinnatifida* Kar. et Kir.

102. *Parrya exscapa* C. A. Mey, in *Led.*, Ic. pl. fl. alt. t. 86. — 1829. — *Led.*, Fl. alt. III. p. 28. — 1831. — *Led.*, Fl. ross. I. 132. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 131.

IV. Близъ лѣнича Акъ-турпакъ въ верховьяхъ Майдантала, 27. VII. 1897 (В. А. Федченко!!); въ окр. Чимгана: 1901 (*Е. Холмутова!*).

VIII. Переваль Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 30. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

Изрѣдка въ альпійской области. Въ Туркестанѣ встречается еще въ О: Тянъ-шань до Юлдуза (*Фетисовъ!*) и S: Алайскій и Заалайскій хребты, Памиръ (!!).

103. *Parrya nudicaulis* (L.) Boiss. *Boiss.*, Flor. I. 159. — 1867. (У *Буссе* ошибочно цитировано *P. nudicaulis* L. sub *Arabide*, тогда какъ у *Линнея* видъ этотъ отнесенъ къ роду *Cardamine*).

*Cardamine nudicaulis* L. Sp. pl. ed. 1-я р.  
654. — 1753.

*Parrya macrocarpa* R. Br. in *Parry Voyage, bot.*  
app. I. 270. — 1824. (seorsum 1823.) — *Led., Fl. ross.* I. 131.

Var. *asperrima* B. Fedtsch (var. *nova*):

Tota planta strigoso glanduloso hispida. Siliquae latiores, glanduloso hispidae.

II. На скалахъ въ долинѣ р. Ашу-туръ, въ пл. 7. VIII.  
1897 (Б. А. Федченко!!).

Въ Туркестанѣ распространена преимущественно другая форма этого же вида, *v. turkestanica* Korz. — въ О, С.

Въ Туркестана встречается въ арктической Америкѣ, сѣв.-зап. Гималаяхъ, Афганистанѣ и горахъ Сибири.

104. *Parrya stenocarpa* Kar. et Kir. Enumer. pl. songor.  
№ 70 („Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de  
Moscou“ 1842.) — *Led., Fl. ross.* I. 751.

1896. *Parrya stenocarpa*, Комаровъ Зеравш. № 113.

I. Колтторъ, 6—12.000', 8. и 9. VII. 1882 въ цв. (Фетисовъ!); Аламединъ, 23. V. 1880 (Фетисовъ!); Арассанъ, 7—8.000', 8. VI. 1880 (Фетисовъ!).

VII. Горы бл. озера Сары-чилекъ, 8.000', 27. VI. 1899  
въ цв. и мол. пл. (Литвиновъ!); перевалъ Афлатунъ, 12.000',  
30. VI. 1899 (Литвиновъ!).

Въ Туркестанѣ встречается въ О: Тянь-Шань, Джунгарскій Алатау. Въ Туркестана не известно.

105. *Parrya pinnatifida* Kar. et Kir. Enumer. pl. Songor.  
№ 69 („Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de  
Moscou“ 1842.) — *Led., Fl. ross.* I. 751. — *Boiss., Fl. or.* I. 159.

IV. Между Керинуромъ и Джувань-арыкомъ, 6—7.000',  
16. VI. 1880, безъ цв. (А. Регель! — собрано Мусою); на  
сланицевыхъ розсыпяхъ около перевала Тюсть-ашу, безъ цв.  
и пл., 12—13.000', 31. VII. 1897 (Б. А. Федченко!!).

XI. У перевала Кугартъ, на утесахъ и каменистыхъ  
осыпяхъ, 7—8.500', 5. VIII. 1895 (С. Коржинский!).

Въ Туркестанѣ встречается еще въ О и С.

Указано кромѣ того для Афганистана.

106. *Parrya fruticulosa* Rgl. et Schmalh. in *Regel, Descr.*  
pl. turkest. fasc. V № 32 (Acta Horti Petropol. V. p. 237) 1877.

(136)

1898. *Parrya fruticulosa*, Korsh. Fragmenta № 17.

IV. Гора Большой Чимганъ, 21. VI. 1881 въ цв. (А. Регель!); по ручью Аидаульгантъ 23. VII. 1897 (Б. А. Федченко!!), у перевала Акъ-турпакъ, 27. VII. 1897 въ цв. (Б. А. Федченко!!); у перевала Торпакъ-бель, въ цв. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!); у перевала Кумбель на Санталаингъ, 17. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!! — форма съ узкими щельникрайними листьями); въ верховьяхъ Майдантала, у ледника Иванова,  
VIII. 1902 въ цв. (Б. А. Федченко!! — форма съ широкими зубчатыми листьями).

VIII. У озера Сары-чилекъ, 8.000', 28. VI. 1899 въ цв.  
и съ незр. пл. (Литвиновъ!).

IX. Съверный склонъ Сусамырского хребта, уроцище  
Сандыкъ, 9—11.500', 6. VII. 1881 (Фетисовъ!).

XI. Перевалъ Кугартъ, на скалахъ и каменистыхъ  
склонахъ, 7.500—8.500', 5. VIII. 1895 (С. Коржинский!); аль-  
пийские луга по р. Уракъ-су бл. перевала Кенколь, 8.500'  
въ цв. и съ незр. пл. 29. V. 1899 (Литвиновъ!).

Въ нашей области нерѣдко въ альпийской полосѣ.  
Встречается еще въ О и С. — Въ Туркестана не известно.

Примѣчаніе. Изъ рода *Parrya* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды:

*P. Beketovi* Krassn. . . . — 0 — — (Endem.)

*P. eriocalyx* Rgl. et Schm. — 0 S — (Endem.)

*P. flabellata* Rgl. . . . — 0 S — (Endem.)

(О: Тянь-шань: Байбиче (Фетисовъ!), Джаманъ-даванъ  
(Съверцовъ!), Куйлю (Красновъ!); С: Алайскій хреб. (О. А.  
Федченко!), Заалайскій хреб. (Скорниковъ!). Памиръ (О. А. и  
Б. А. Федченко!! и др.).

*P. siliquosa* Krassn. . . . — 0 — — (Endem.)

Изъ рода *Berteroa* DC. въ Туркестанѣ встречаются  
два вида:

*B. incana* (L.) DC. . . . . N 0 — —

*B. spathulata* (DC.) C. A. Mey. . N — — —

Первый видъ вѣроятно найдется и въ нашей области.

Изъ рода *Farsetia* Turg. въ Туркестанѣ встречается  
одинъ видъ:

(137)

*F. spathulata* Kar. et Kir. . — O — — (Endem).

Изъ рода *Fibigia* въ Туркестанѣ встрѣчается также одинъ видъ:

*F. suffruticosa* (Vent.) Boiss. . — — — W —

### 34. *Alyssum* L.

- |  |   |
|--|---|
| 1 Гиѣза стручечковъ 2-сѣмения . . . . .  | 2.  |
| Гиѣза стручечковъ 4—6 сѣмения . . . . .  | <i>A. linifolium</i> Steph.                         |
| 2. Нити тычинокъ зубчатыя . . . . .  | 3.  |
| Нити тычинокъ безъ зубцовъ. . . . .  | <i>A. dasycarpum</i> Steph.                         |
| 3. Стручечки голые . . . . .   | <i>A. minimum</i> Willd.                            |
| Стручечки болѣе или менѣе густо покрыты звѣздчатыми волосками или пушистые . . . . .   | 4.  |
| 4. Стручечки болѣе или менѣе длиннопушистые, цвѣтоножки болѣе длинныя . . . . .  | <i>A. campestre</i> L.                              |
| Стручечки чешуйчатопушистые; соцѣвѣе очень скатое . . . . .  | <i>A. Szovitsianum</i> Fisch. et Mey.               |
| Стручечекъ мало пушистый . . . . .   | <i>A. minimum</i> Willd. v. <i>turkestanicum</i> m. |
| <b>107. <i>Alyssum Szovitsianum</i> Fisch. et Mey. in Ind. IV. semin. horti Petrop. 1839. p. 31. — <i>Led.</i>, Fl. ross. I. 139. — <i>Boiss.</i>, Fl. or. I. 283.</b> |   |
| 1870. <i>Alyssum Szovitsianum</i> , E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 75а.  |   |

V. Емурткаѣ, оть Ангrena до Кокана, V. 1880 (*A. Regel!*).  
VI. Моголь-тау, въ пл. (*Сѣверцовъ!*).

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ S. и W. Кромѣ того извѣстно въ Азіатской Турціи, въ Закавказье и Персіи.

**108. *Alyssum minimum* Willd. Sp. pl. III. 464. — 1800. — *Led.*, Fl. ross. I. 140. — *Boiss.*, Fl. or. I. 281. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 141.**

1870. *Alyssum minimum*, E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 76.  
1902. *Alyssum minimum* O. A. Федченко, Списокъ № 90.

Туземн. назв.: „Читыръ“ (киргизк., записано Күшакевичемъ на р. Чу; считается вредной для скота, въ особенности при дождяхъ и ранней весной).

I. Предгорья Александровскаго хребта, 15.—25. IV. 1879 (*Фетисовъ!*).

IV. Окрестности Ташкента, 19. III. 1871 (*O. A. Федченко!*); степь на Боссу въ окр. Ташкента, 6. IV. 1871 (*O. A. Федченко!*); Саларь, 21. II. 1871 (*O. A. Федченко!*); оть Ташкента до Каракъ-аты (*Корольковъ* и *Краузъ!*).

(138)

- V. Уральская, 16. IV. 1880 (*A. Regel!*).  
X. Манагильды до Алабуги, 7.000', 4. VI. 1880 (*A. Regel!*).  
XI. Р. Яссы, 5—6.000', 30. V. 1880 (*A. Regel!*).  
*Var. turkestanicum* (Rgl. et Schmalh.) B. Fedtsch.

Отличается отъ типической формы прижатопушистыми стручечками.

*A. turkestanicum* Rgl. et Schmalh. in Э. Регель Опис. нов. вид. in A. П. Федченко Путеш. въ Турк., вып. 15, № 15 (ex parte).

*A. desertorum* Stapf 3 *Aralocaspium* Lipsky, Mat. Фл. Среди. Аз. II. („Acta Hort. Petrop. XXIII. I. 80).

1881. *Alyssum turkestanicum*, *Regel* l. c.

1902. *Alyssum turkestanicum*, O. A. Федченко, Списокъ № 92 (ex parte).

III. Чимкентъ (*Сѣверцовъ!*).

IV. Ташкентъ, въ садахъ, 30. IV. 1870 (*Краузъ!*); горы Карагатау, 1882 (*Маевъ!*); Боссу, 21. II. 1871 (*O. A. Федченко!*); Саларь (*O. A. Федченко!*); Ташкентъ, 5. IV. 1880 (*A. Regel!*).

V. Каракитай, долина Ангrena V. 1880 (*A. Regel!*).

VI. Моголь-тау (*Сѣверцовъ!*); правый берегъ Сыръ-Дары у Ходжента 14. IV. 1880 (*A. Regel!*); ст. Уральская IV. 1880 (*A. Regel!*).

Видъ этотъ весьма широко распространенъ по всему Туркестану, кромѣ высокогорныхъ областей. Въ Туркестана — въ Южной Европѣ, Европ. Россіи, Южн. Сибири, Монголіи, Кашмирѣ, Афганістанѣ, Белуджистанѣ, Сиріи, Малой Азіи, Персіи, на Кавказѣ.

**109. *Alyssum campestre* L. Syst. Nat. ed. X. 1130. — 1759. — *Led.*, Fl. ross. I. 141. — *Boiss.*, Fl. or. I. 283.**

1902. *Alyssum campestre*, O. A. Федченко Списокъ № 93.

IV. Ташкентъ 1871 (*O. A. Федченко* — n. v.); Паркусъ, 19. VI. 1881, 2—3.000' (*A. Regel!*); гора Чимганъ, 6—7.000', 21. VI. 1881 (*A. Regel!*).

XI. Арсланбобъ, каменистый склонъ, 25. V. 1899, пл. и посл. цв. (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области встрѣчается довольно рѣдко, хотя и поднимается въ горахъ до 7.000'. Въ Туркестанѣ распространено широко: N: горы Карагатау (*A. Regel!*); O: Джун-

(139)

гарский Алатау, Тянь-шань; С: Бухара: Карагинъ (*A. Regel!*), въ степяхъ Бухары (*A. Regel!*); Фергана: Чичкты (*O. A. Fedchenko!*); Ошъ (*A. Regel!*); Заравшанъ (*B. Komarov!*); В: Закасп. обл.

Виѣ Туркестана — Армения, Сирія, Крымъ, Кавказъ, средняя и южная Европа.

II0. *Alyssum dasycarpum* Steph. in Willd. Spec. plant. III. p. 469. — 1800. — *Boiss.*, Fl. or. I. 285.

*Psilonema dasycarpum*, Led. Fl. ross. I. 137.

I. Предгорья Александровского хребта, 15.—25. IV. 1879 (*Фетисовъ!*).

VII. Каракурганъ, 21. V. 1878 (*Скорняковъ!*).

X. Манагильды до Алабуги, 7.000', 4. VI. 1880 (*A. Regel!*).

Въ нашей области встречается рѣдко. Въ Туркестанѣ распространено широко: N, O, S, W. Виѣ Туркестана — Южная Россія, Малая Азія, Кавказъ, Персія, Афганистанъ, Белуджистанъ.

III. *Alyssum linifolium* Steph. in Willd. Sp. pl. III. 467. — 1800. — *Boiss.*, Fl. or. I. 286.

*Meniocus linifolius* DC., Syst. veg. II. 325. *Led.*, Fl. ross. I. 134.

1870. *Meniocus linifolius*, *Regel Suppl.* II. pl. Semen. № 72.

III. Балакпата 1876 (*A. Regel!*); Учъ-тюбе VI. 1876 (*Сверцковъ!*).

IV. Ташкентъ (*Кушакевичъ!*); Сырь-дарья (?) бл. Ташкента IV. 1880 (*A. Regel!*).

V. Берегъ р. Ангрина, 13. V. (*Krause!*).

VI. Южная подошва Моголь-тау, 20. IV. въ пл. (*Сверцковъ!*); Сырь-Дарья бл. Ходжента, 14. IV. 1880 въ пл. (*A. Regel!*).

Въ нашей области обычное весеннеое растеніе.

Въ Турк. распространено весьма широко: N, O, S, W.

Виѣ Туркестана — Испания, Сѣверная Африка, Азіатская Турція, Крымъ, Кавказъ, Афганистанъ, Белуджистанъ, Персія.

*Приимѣніе.* Кроме перечисленныхъ видовъ *Alyssum*, въ Туркестанѣ встречаются еще слѣдующіе:

<i>A. alpestre</i> L. . . . .	N 0 — — —
<i>A. lenense</i> Adams . . . . .	N — — —
<i>A. argenteum</i> Wittm. . . . .	— 0 — — —
<i>A. persicum</i> Boiss. . . . .	— — — W —
<i>A. marginatum</i> Steud. в супротер- талум (Bge.) Boiss. . . . .	— — — — — W —

### 35. *Clypeola* L.

II2. *Clypeola Jonthlaspi* L. Sp. pl. ed. 1-я p. 652. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 144. — *Boiss.*, Fl. or. I. 308.

IV. Сырь-дарья (?) у Ташкента IV. 1880 (*A. Regel!*).

VI. Сырь-дарья у Ходжента, 14. IV. 1880 въ пл. (*A. Regel!*).

Въ нашей области встречается изрѣдка на крайнемъ югѣ, какъ весеннеое растеніе.

Въ Туркестанѣ встречается въ С: Заравшанъ (*O. A. Федченко!*, *Komarov!*) и В: Закасп. обл.

Виѣ Туркестана встречаются въ сѣверной Африкѣ, южной Европѣ, Сиріи, на Кавказѣ, въ Персіи и Афганистанѣ — типичное растеніе средиземно-морской области въ широкомъ смыслѣ слова.

*Приимѣніе.* Изъ рода *Clypeola* въ Туркестанѣ встречается еще одинъ видъ:

*C. echinata* DC. С: Бухара: Ширабадъ, сухія степи, 3. V. 1897 въ пл. (*C. Korjakinii!*).

Изъ р. *Graelsia* въ Туркестанѣ встречается *G. saxifragaefolia* Boiss.: W — Закасп. обл.

Изъ р. *Peltaria* встречается въ Туркестанѣ одинъ видъ — *P. turkmena* Lipsky: W — Закасп. обл.

### 36. *Draba* L.

1. Лепестки двузарадѣльные. Маленькое растеніе съ прикорневой розеткой листьевъ и безлистной стрѣлкой. . . . . *D. verna* L.
- Лепестки цѣльные или едва выемчатые . . . . . 2.

2. Однолѣтнія или двулѣтнія растенія съ не-  
многочисленными простыми или вѣтви-  
стыми волосками. . . . . 3.  
Многолѣтнія растенія, обыкновенно густо по-  
крыты ощупицемъ . . . . . 6.  
3. Листья всѣ прикорневые . . . . .  
Листья прикорневые и стеблевые . . . . . 4.  
4. Стручки продолговато-ланцетные . . . . .  
Стручки узко-линейные . . . . . 5.  
5. Вѣнички болѣе крупные, стручки короче  
цвѣтоноскъ . . . . .  
Вѣнички менѣе крупные, стручечки одинако-  
вой длины съ цвѣтоносками . . . . . 3.  
6. Вѣнички бѣлые . . . . .  
Вѣнички желтые (по краинѣ мѣрѣ въ началѣ  
цвѣтенія) . . . . . 7.  
7. Растенія болѣе крупные. Стебель съ 2—6  
листьями, какъ и листья обыкновенно  
густо-коротко-пушистые . . . . .  
Растенія менѣе крупные, голыя или съ не-  
многими волосками. Стебель безлистный  
или съ 1—2 листьями . . . . . 8.  
8. Стручечки эллиптическіе или ланцетные,  
гнѣзда ихъ 2—4 сѣменные . . . . .  
Стручечки продолговатые или линейные,  
ихъ гнѣзда 6—10 сѣменные . . . . . 10.  
9. Стручечки сильно сжаты съ боковъ, прижато  
пушистые . . . . .  
Стручечки выпуклые съ боковъ, жестко-  
волосые . . . . .  
10. Вѣнички въ началѣ цвѣтенія блѣдно-желтые,  
подъ конецъ бѣловатые; цвѣтоноски равны  
стручечкамъ или длиннѣе ихъ . . . . . D. turkestanica Rgl. et Schm.  
Вѣнички болѣе крупные, желтые; цвѣтоноски  
короче стручечковъ или равны имъ . . . . . D. Transschelii Litw.  
**II3. Draba alpina L. Sp. pl. ed. 1-a p. 642.—1753.—Led.**  
Fl., ross. I. 146.—Boiss., Fl. or. I. 297.—Hook., Fl. br. Ind. I. 142.  
1883. Draba alpina, Franchet Mission Capus 228.  
I. Джиламынъ, 9.000', въ пл., 26. VI. 1880 (Фетисовъ!);  
Кольторъ 9—10. VII. 1882, 6—7.000', въ цв. (Фетисовъ!).  
IV. У перевала Тюсть-ашу, 12.000', 29. VII. 1897 въ цв.  
(Б. А. Федченко!).  
Var. Arseniewi B. Fedtsch. (var. nova).  
Tota planta dense pubescens. Silicula oblongo-lanceolata,  
stylo subaequilongo.

IV. Около ледника Акъ-турнай; 10—13.000', съ незр.  
пл. 27. VII. 1897 (Б. А. Федченко!!); на склонахъ въ ур.  
Съемесасъ, 9. VIII. 1902, съ осипавшимися уже сѣменами  
(Б. А. Федченко!!).

Въ Туркестанѣ D. alpina встрѣчается въ различныхъ  
формахъ не рѣдко въ горахъ въ О и С.

Внѣ Туркестана — въ арктической Европѣ, Сибири,  
сѣверной Америкѣ, Гималаяхъ.

**II4. Draba Alberti Rgl. et Schmalh. in E. Regel Descript.**  
pl. nov. fasc. V („Acta Horti Petropol.“ V. p. 237). 1877.

1877. Draba Alberti, E. Regel l. c. V. 237.

1878. " " A. Regel Reisebr. 192.

II. Переялъ Карабура, VIII. 1876, безъ цв. и пл. (А. Регель!);  
пер. Кумынъ-тагъ, 10.500', 11. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!!).

IV. Чаткаль V. 1880 (А. Регель! — собрано Мусою) въ  
верховьяхъ Санталаша VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

V. Истоки р. Ангрент; Аришанъ-булакъ, 20. VI. 1880,  
въ цв. и пл. (А. Регель!).

Въ нашей области только въ высокогорной зонѣ. Больше  
нигдѣ не встрѣчается.

**II5. Draba turkestanica Rgl. et Schmalh. in Э. Регель, Опис.**  
нов. вид. in А. П. Федченко, Путешествие въ Туркестанъ т. III.  
вып. 18, № 17.—1881.

IV. Идрисъ-пей-гамбаръ, VI. 1880 въ пл. (А. Регель! —  
собрано Мусою — f. leiocarpa).

IX. Сѣверный склонъ Сусамырского хребта, ур. Сан-  
дыкъ, 9—11.500', 3. VII. 1882 въ цв. и пл. (Фетисовъ!).

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ С и болѣе ни откуда  
не известна.

**II6. Draba Transschelii Litw. Fragmenta florae Turkestanicae**  
№ 2. („Труды Ботаническаго Музея Императорской Академіи  
Наукъ“ т. I). 1902.

1902. Draba Transschelii, Litwin. l. c. № 2.

IV. Низовья р. Афлатунъ (притокъ р. Чаткаль), I. VII.  
въ пл. (Литвиновъ!).

XI. У перевала Кенколъ, ок. 10.000', 17. VII 1899 съ цв.  
и незр. пл. (Литвиновъ!).

Отличия этого вида от предыдущего кажутся мицесома незначительными и неостоянными. Не имъя однако достаточного материала, оставляемъ пока вопросъ открытымъ.— Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ S:— Алайскій (Шартъ) и Заалайскій (Иркештамъ) хребты, Карагинъ. Указывается еще *Litvinovъ* для „Prov. Semireczje in montibus Alexander ad traj. Kumbel 9—10.000', 31. V. 1879 fl. et fr. (A. Regel)“, но это показаніе основано на явномъ недоразумѣніи, т. к. 31. V. 1879 г. A. Regel былъ на перевалѣ Кумбель въ горахъ Кульджинскаго района, а не Александровскаго хребта.

**II7. *Draba nemorosa* L. Sp. pl. ed. 1-а р. 643.—1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 154.**

*D. nemoralis*, Boiss. Fl. or. I. 302.

1878. *Draba nemoralis* β hebecarpa, A. Regel Reisebr. 200.

1878. " " A. Regel Reisebr. 202.

?1882. " A. Regel Gartenfl. 362.

I. Аламединъ 5—9.000', 23—25. V. 1880 (*Фетисовъ*!).

II. Кумбель 9.000' (A. Regel!); Каракія (A. Regel!), Караколь (A. Regel!—п. v.).

X. Манагильды 7.000', 4. VI. 1880 (A. Regel!—var. abbreviata).

XI. Яссы, 9—11.000'. 1. VI. 1880 въ пл. (A. Regel!—v. abbreviata).

Встрѣчается по всему Туркестану.

Виѣ Туркестана — Европа, Кавказъ, Сибирь, Сѣверная Америка, Малая Азія, Китай, Монголія, Тибеть.

**II8. *Draba media* Litw. Fragmenta florae turkestanicae № 1. („Труды Ботаническаго Музея Императорской Академіи Наукъ“ т. I.) 1902.**

1902. *Draba media*, *Litwinow* I. c. № 1.

I. Аламединъ, 3—9.000', 23. V. въ цв. и пл. (*Фетисовъ*!).

IV. Куургенъ-турь, 2. VIII. 1897 въ пл. (Б. А. Федченко!).

XI. Перевалъ между р. Каракуль и Майли-су, каменистая почва, 18. VIII. 1895, въ цв. и съ пл. (С. Коржинский!), перевалъ Кенколъ, 10.000', 16 и 17. VI. 1899, въ пл. (Д. Литвиновъ!); верховья р. Уракъ-су 8.000', 29—30. V. 1899 въ цв. и пл. (*Литвиновъ*!).

(144)

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О:— Джунгарскій Алатау, Тянъ-шань, S:— Алайскій хребеть, Памиръ, Заравшанъ, Дарвазъ, и W:— Закасп. обл.

Виѣ Туркестана — въ Сѣверной Монголіи (*Потанинъ*!).

**II9. *Draba alticola* Komar. Комаровъ, Матер. по фл. Туркест. нагорья № 181 („Труды Сиб. Общ. Естеств.“ т. XXVI). 1896.**

XI. Альп. луга по р. Уракъ-су, бл. пер. Кенколъ, 29. V. 1899, въ цв. и съ пл., 9.000' (*Литвиновъ*!).

Встрѣчается еще въ S:— Заравшанъ.

**II0. *Draba linearis* Boiss. in „Ann. Sc. natur.“ 1842. р. 167.—Boiss., Fl. or. I. 303.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 144.**

IV. Тянъ-Шань (*Күшакевичъ*!); Акъ-турпакъ, склоны и луга, 11—12.000' 27. VII. 1897, въ пл. (Б. А. Федченко!!); Андаульгансъ, 23. VII. 1897, въ субальпійской обл., 9.000', въ цв. и пл. (Б. А. Федченко!!), въ верховьяхъ Майдантала, у ледника Иванова, въ цв. и пл. VIII. 1902 (Б. А. Федченко !!).

Въ Туркестанѣ найдено еще въ S.

Виѣ Туркестана — Персія и Зап. Тибеть.

**II1. *Draba fladnicensis* Wulf. in Jacq. Misc. I. 147. t. 17 f. 1.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 183.**

D. Wahlenbergii Hartm., *Led.*, Fl. ross. I. 150.

I. Арассанъ, 9—11.000', въ цв. и пл., 5. VI. 1880 (*Фетисовъ*!).

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О и S.

Извѣстно еще въ арктической области Европы, Азіи и Америки, Монголіи, Гималаїяхъ, Сибири, въ горахъ Европы.

**II2. *Draba incana* L. Sp. pl. ed. 1-а р. 643—1753. *Led.*, Fl. ross. I. 152.—Boiss., Fl. or. Suppl. 56.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 143.**

I. Ущелье Арассанъ, 9—11.000', 4—5. 7. VI. 1880, въ цв. и пл. (*Фетисовъ*!); Аламединъ, 5—9.000', 23—25. V. 1880, въ цв. (*Фетисовъ*!), Кольторъ, 7. VII. 1882, 10.000', въ цв. и пл. (*Фетисовъ*!).

II. Пер. Кумышъ-тагъ 11.500', 11. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!).

IV. Пер. Афлатунъ въ пл. 30. VI. 1899 (*Литвиновъ*!); тамъ же, на выс. 12.000', собрана въ цвету менѣе крупная

(145)

\*

форма съ 1—2 стеблевыми листьями, которая вѣроятно относится также къ *D. incana* (*Литвиновъ!*).

IX. Сѣверный склонъ Сусамырскаго хребта, 8—10.000', 8. VII. 1881, въ пл. (*Фетисовъ!*), тамъ же, 7—9.000', 4 VI. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. Ясы, 9—11.000', 1. VI. 1880 (*A. Регель!*); по р. Уракъ-су на скалахъ бл. перев. Кенколъ въ цв. 7.000', 30. V. 1899 (*Литвиновъ!*), въ цв. и пл. 16. VI, тамъ же, 11.000' (*Литвиновъ!*).

Встрѣчается еще въ О и С.

Въ Туркестана — горы и сѣвер. Европы, Сибирь, Гималаи, Монголія, Тибетъ, Америка до Огненной Земли.

**123. *Draba verna* L. Sp. pl. ed. 1-я р. 642. — 1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 155.**

*Erophila vulgaris*, Hook., Fl. br. Ind. I. 145.—*Boiss.*, Fl. or. I. 304.

1902. *Erophila vulgaris*, O. A. Федченко, Список № 105.

I. Предгорья Александровскаго хребта, 15—25. IV. 1879 (*Фетисовъ!*), Горы Карагату 1882 (*Маевъ!*); Саларь, ключи, 21. II., 11. III и 1. IV. 1871 (*O. A. Федченко!*); Куйлюкъ, 1. VI. 1880 въ пл. (*A. Регель*—собрано *Мусою!*).

Встрѣчается еще въ С.

Въ Туркестана — Европа, Сирія, Персія, Малая Азія, Арmenія, Афганістанъ, Кашмиръ.

*Причииніе*. Въ Туркестанѣ встрѣчается еще цѣлый рядъ видовъ *Draba*:

<i>D. frigida</i> Saut.	—	0	—	—
<i>D. hirta</i> L.	—	0	—	—
<i>D. melanopus</i> Komar.	—	0	S	(Endem.)
<i>D. ochroleuca</i> Bge.	—	0	—	—
<i>D. Olgae</i> Rgl.	—	—	S	(Endem.)
<i>D. pamirica</i> Korsh.	—	—	S	(Endem.)
<i>D. physocarpa</i> Komar.	—	—	S	(Endem.)
<i>D. repens</i> M.B.	—	0	—	—

*Buchingera axillaris* Boiss., въ Туркестанѣ найдена въ С: — Гиссаръ, Байссунское бекство (*A. Регель!*), Заравшанъ (*Комаровъ!*); W: — Закасп. обл. (*Литвиновъ!*).

*Cochlearia Armoracia* L. собрано близъ г. Вѣриаго Красновыши (!—одичалое?).

### 37. *Didymophysa* Boiss.

**124. *Didymophysa Fedtschenkoana* Rgl. Э. Регель.** Опис. нов. вид. № 19, in *A. П. Федченко* Путешест. въ Туркест. т. III. в. 18. — 1881.

IV. На моренахъ ледника Карабулакъ, въ верховьяхъ Майдантала, 3. VIII. 1897, въ пл., 11—12.000' (*Б. А. Федченко!*!).

Для Тянъ-Шаня мною приводится впервые.

Въ Туркестанѣ известно лишь въ С — Алайскій хребетъ: Джиптыкъ, Караказукъ (*O. A. Федченко!*); Заравшанъ (*B. Комаровъ!*), Памиръ (*Назаровъ!*).

Въ Туркестана не известно.

Изъ р. *Heldreichia* въ Туркестанѣ встрѣчается *H. longifolia* Boiss., въ W: — Закасп. обл.

Изъ р. *Physalidium* въ Туркестанѣ встречается *Ph. gracilisefolium* Lipsky — С: Гиссаръ, Дарвазъ.

### 38. *Thlaspi* L.

1. Многолѣтнее растеніе. Столбикъ довольно длинный . . . . . *T. cochleariforme* DC.

Однолѣтники. Столбикъ незамѣтный или весьма короткій . . . . . 2.

2. Сѣмена съ полосками. Стручечки кругомъ крылатые, на верхушкѣ обрубленные.

Листья при основаніи суженные, цѣльно-крайніе или зубчатые . . . . .

Сѣмена гладкія. Стручечки при основаніи узко-, къ верхушкѣ широко-крылатые.

Листья сердцевидные, сидячіе, цѣльно-крайніе . . . . . 3.

3. Стручечки продолговато-круглые, съ узкой вырѣзкой на верхушкѣ; крыло съ сѣтчатымъ жилкованіемъ . . . . . *T. Kotschyani* Boiss. et Hoh.

Стручечки съ широкой вырѣзкой на верхушкѣ; крыло безъ жилокъ . . . . . *T. perfoliatum* L.

**125. *Thlaspi cochleariforme* DC.** Syst. reg. II. p. 381. — 1821. — *Led.*, Fl. ross. I. 164.

*T. alpestre*, Hook., Fl. br. Ind. I. 162.

I. Ала-арча, 6—7.000', 13. V. въ цв. (*Фетисовъ!*), Аламединъ, 3—9.000', 23. V. въ цв. (*Фетисовъ!*).

IX. Вершины Сусамырского хребта, 9—11.000', въ цв. и съ незр. пл. 19. VII. 1881 (*Фетисовъ!*); Караколь, притокъ Сусамыра, 7.000', VII. 1881 (*Фетисовъ!*—уродливый экземпляръ).

XI. Среднее течение р. Яссы, 8—9.000', 31. V. 1880, въ цв. и пл. (*A. Regel!*); субальпийские луга по р. Уракъ-су (бл. пер. Кенколъ), 8.000', въ цв. и пл. 29. V. 1890 (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ собрано еще въ О:—Джунгарский Алатау (*Кушакевичъ!*), Тарбагатай (*Шренкъ!*); сюда же вѣроятно относятся и показания о нахождении *T. montanum* L. въ Джунгарскомъ Алатау и *T. alpinum* Jacq. v. Poncinsii на Талдыкѣ (въ Алайскомъ хребтѣ).

Въ Туркестана—въ южной Сибири, Монголіи и Гималаихъ. Въ Европейскихъ и Американскихъ горахъ—близкія формы.

**126. *Thlaspi arvense* L.** Sp. pl. ed. 1-a p. 646—**1753.**—*Led.*, Fl. ross. I. 162.—*Boiss.*, Fl. or. I. 323.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 162.

1877. *Thlaspi arvense*, A. Regel Gartenfl. 13.

1878. " " A. Regel Reisebr. 200, 202.

I. Аламединъ, 3—5.000', 26. 7. V. 1880, въ цв. и пл. (*Фетисовъ!*).

II. Караколь (*A. Regel!*—п. в.); подъемъ къ пер. Кумбель (*A. Regel*—п. в.), Каракія VIII. 1876 въ пл. (*A. Regel!*)

IV. Ташкентъ, 22. 11. 1882, въ цв. и съ незр. пл. (*Масовъ!*).

XI. Арсламбобъ, 4. IV. 1899, въ цв. и пл. (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области изрѣдка, какъ сорное растеніе. Въ Туркестанѣ распространено сравнительно мало: О:—Джунгарский Алатау, Тянь-Шань; S:—Алайский хребетъ (Талдыкъ—*Кушакевичъ!*), Заравшанъ (*O. A. Федченко!* и др.).

Въ Туркестана—Европа, Сибирь, Китай, Персія, Афганистанъ, Сѣверная Америка и сѣверная Африка.

**127. *Thlaspi perfoliatum* L.** Sp. pl. ed. 1-a p. 646—**1753.**—*Led.*, Fl. ross. I. 163.—*Boiss.*, Fl. or. I. 325.

1870. *Thlaspi perfoliatum*, A. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 89a.

1902. *Thlaspi perfoliatum*, O. A. Федченко Списокъ № 107. III. Чимкентъ, въ цв. янв.—февр. (*Сѣверцовъ!*).

IV. Окр. Ташкента, 19. III. 1871, Саларъ 21. II, 11. III, Ташкентъ, сады на Боссу, 16. III. 1871 (*O. A. Федченко!*), Ташкентъ, въ цв. янв.—февр. (*Сѣверцовъ!*), Ташкентъ IV. 1882 въ цв. (*A. Regel!*).

V. Карасу 9. IV. 1800, въ цв. (*A. Regel!*).

Въ нашей области встрѣчается не часто. Въ Туркестанѣ распространено въ S:—Заравшанъ (*O. A. Федченко!* и др.), W:—Закасп. обл.; сѣв. скл. Нуратинскихъ горъ: Клы (*Корольковъ и Краузэ!*).

Въ Туркестана—Европа, Кавказъ, Алтай, Малая Азія, Персія, Афганистанъ, сѣверная Африка.

**128. *Thlaspi Kotschyanum* Boiss. et Hoh. in Boiss., Diagn. pl. nov. or. Ser. I. fasc. 8 p. 39.—1849.—Boiss., Fl. or. I. 324.**

XI. Андиж. у. на склонахъ по р. Уракъ-су (притокъ Карагунгур), 6.000', послѣд. цв. и въ пл. 30. V. 1889 (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ S:—Дарвазъ (*C. Коржинскій!*).

Въ Туркестана—въ Персіи.

*Примѣчаніе.* Изъ рода *Thlaspi* въ Туркестанѣ встрѣчается еще одинъ видъ, который найдется, вѣроятно, и въ нашей области: *T. cerasocarpum* Murr. (= *Carpoceras sibiricum* Boiss.): О:—Джунгарія, S:—Заравшанъ, W:—Тургайская обл.

### 39. *Megacarpaea* D. C.

**129. *Megacarpaea gigantea* Rgl. in Suppl. II. ad enumer. pl. a cl. Semenow lect., № 90a („Bulletin de la Société Impéiale des Naturalistes de Moscou“ 1870. fasc. 2, p. 263).**

1882. *Megacarpaea?* A. Regel Gartenfl. 132.

Туземн. назв.: Сокклиды (записано Б. А. Федченко на Санталашѣ); Карайдысь (записано Краузэ).

IV. Окр. Бричъ-муллы, V. 1872, 3.000', въ пл. (*Корольковъ!*); по р. Санталашъ, въ верховьяхъ, близъ устья р. Ишагульды, VIII. 1902, въ пл. (Б. А. Федченко!!).

V. Горы бл. ст. Уральской и Мурзарабатъ (*A. Регель*—п. в.).  
XI. Горы Карамъ-куль, 23. V. въ пл. (*Краузе!*). Горы Актау, мазаръ Бабай-тогдаръ 12. VII. 1880, въ пл. (*Мусе!*).

Толстый корень этого растения употребляется киргизами въ пищу.— Это оригинальное растение было впервые собрано *Скорняковым* въ S:— къ югу отъ Ходжента, въ горахъ Кхарлытау, и больше пока нигдѣ не известно. Впрочемъ, вѣроятно сюда же относится и указание В. И. Липского на нахожденіе высокой *Megacarpa* въ Горной Бухарѣ, у ледника Петра Великаго (*В. И. Липский*, Хребетъ Петра Великаго и его ледники, стр. 23, отд. отт.; то же показаніе повторено и „Горной Бухарѣ“, т. II, стр. 493).

*Примѣчаніе.* Изъ рода *Megacarpa* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще два вида:

*M. gracilis* Lipsky: S:— Караганъ (*Липский!*), Дарвазъ (*Липский*).

*M. lacinia* DC. N:— Нидерскія горы; O:— Ашибулакъ 21. IV. 1873 (*Кушакевичъ!*), сѣв. бер. оз. Балхашъ, 5. V. 1884 (*А. Никольский!*)—туз. назв. „чочимулдукъ“);

*Chartoloma platycarpum* Bge.— пустынная форма и въ нашей области не встрѣчается. Въ Туркестанѣ известна въ W:— Агатме (*Леманъ!*) Аристанъ-бель-кудукъ 9. IV (сѣв. подошва Нуратинскихъ горъ — *Корольковъ и Краузе!*), Джингильды 19. IV, на орошенному полю, между Каракъ-ата и Адамъ-кырульганъ (*Корольковъ и Краузе!*), между Репетекомъ и Ишакъ-рабатомъ, 22—23. V. 1884 въ пл. (*А. Регель!*).

#### 40. *Euclidium* R. Br.

1. Плодоносная вѣтви слегка согнутыя, не длинныя, крѣпкия. Стручечки шероховатые, съ косымъ носикомъ; столбикъ остающійся. . . . . *E. syriacum* R. Br.

Плодоносная вѣтви длинныя, пряммыя, тонкия. Стручечки голые, столбикъ опадающій . . . *E. tenuissimum* m.

**130. *Euclidium syriacum* (L.) R. Br. in Aiton, Hort. Kew., ed. 2-а. IV. 74.— 1812.— *Led.*, Fl. ross. I. 167.— *Boiss.*, Fl. or. I. 368.— *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 165.**

*Anastatica syriaca* L. Sp. pl. ed. 2-а р. 895. 1763.  
*Soria syriaca*, Desr. Journ. Bot. 1813. III. 168 t. 25 f. 3.  
1902. *Euclidium syriacum*, A. O. Федченко, Списокъ № 110.  
IV. Ташкентъ, степь на Боссу, 11. IV. 1871, Саларъ 28. III. 1871 (*О. А. Федченко!*); Ташкентъ, сред. мая 1882, въ пл. (*А. Регель!*), Ташкентъ, IV. 1880, въ пл. (*А. Регель!*), Ташкентъ, 1882 (*Маевъ!*), Ташкентъ, по садамъ, 6. V. (*Краузе!*).  
VII. Базаръ-курганъ, въ пл. 22. V. 1899 (*Д. Литвиновъ!*).

Въ нашей области не часто. Въ Туркестанѣ распространено широко въ полосѣ степей: О:—Чингильды, Иллійскъ, S:— Уратюбе (*С. Коржинский!*), Самарканѣдъ (*О. А. Федченко!*); Ягиобъ (*В. Коларовъ!*), Кхарлы-тау (*Съверцовъ!*); Фергана: отъ Андижана до Карасу 25. V. 1880 (*А. Регель!*); Алай: Дараутъ курганъ (*С. Коржинский!*); устье ущелья Хатынь-артъ (*А. Кушакевичъ!*); Бухара: между Кермине и Богистаномъ 11.000', 26. IV. 1884, въ пл. (*А. Регель!*); Бальджуангъ; Кулябъ (*А. Регель!*); W:— Ахабадъ (*Коржинский!*); Кизыльарватъ (*Беккеръ!*).

Встрѣчается кромѣ того въ юго-восточной Европѣ, Малой Азіи, Сиріи, Персіи, Белуджистанѣ, Афганистанѣ и съверо-западной Индіи.

**131. *Euclidium tenuissimum* (Pall.) B. Fedtsch. Vella tenuissima, Pallas Reise durch verschied. Prov. des russ. Reichs. III. append. p. 780 № 103. t. U. f. 2.— 1776.**

*Bunias tatarica*, Willd. Sp. pl. III. 413. 1800.  
*Euclidium tataricum* DC. Syst. veget. II. 422.— *Led.*, Fl. ross. I. 167.— *Boiss.*, Fl. or. I. 369.  
1780. *Euclidium tataricum*, E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 92.

1902. *Euclidium tataricum*, О. А. Федченко Списокъ № 111.  
III. Чимкентъ, въ цв. (*Съверцовъ!*).

IV. Саларъ 27. III, 1. IV. въ цв. 9. IV. въ цв. и пл. (*О. А. Федченко!*), Ташкентъ, 20. III. въ цв. (*Маевъ!*); Ташкентъ, 15. IV. 1882, въ цв. и пл. (*А. Регель!*); Сыръ-дарья бл. Ташкента (?) IV. 1880, въ цв. (*А. Регель!*); окр. Ташкента, 19. III. 1871 (*О. А. Федченко!*).

V. Карасу, между Ташкентомъ и Ходжентомъ 9. IV. 1880 въ цв. (*А. Регель!*).

Форма листьев чрезвычайно изменичива и установленные вариации (*v. pinnatifidum* и др.) не имеют систематического значения.

Въ нашей области нерѣдкое весенне сорное растение въ полосѣ степей и предгорій. По Туркестану распространено очень широко: N: — Атассу, Терсаканъ (*Шренкъ!*), O: — Кульджа, Хоргосъ, Каракоку, Вѣрный (*A. Regel!*) S: — Самарканда, Джизакъ, Чиназъ, Бальджуанъ, Курганъ-тюбе; W: — Закасп. обл.; Каракумы (*Борщовъ!*).

Кромѣ Туркестана известно на ю.-в. Европейской Россіи.

#### 41. *Chorispora* DC.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Вѣнички желтые . . . . .   | 2.                            |
| Вѣнички лиловые . . . . .   | 3.                            |
| 2. Однолѣтнее растеніе съ олиственнымъ стеблемъ   | <i>Ch. sibirica</i> DC.       |
| Многолѣтнее растеніе съ безлистой стрѣлкой<br>или же прикорневыми цветками . . . . .                                  | <i>Ch. songorica</i> Schrenk. |
| 3. Однолѣтнее растеніе съ олиственнымъ стеб-<br>лемъ и неглубоконадрѣзными листьями . . . . .                         | <i>Ch. tenella</i> DC.        |
| Многолѣтнія растенія . . . . .  | 4.                            |
| 4. Вѣнички болѣе крупные, стрѣлки обыкновенно<br>не бывающіе, цветки прикорневые . . . . .                            | <i>Ch. exscapa</i> Bge.       |
| Вѣнички менѣе крупные, стрѣлка обыкновенно<br>длиннѣе листьевъ, цветки и верхушка<br>стрѣлки железнотонущіе . . . . . | <i>Ch. elegans</i> Camb.      |

#### 132. *Chorispora tenella* (Pall.) DC. Syst. Veg. II. 435.

1821 — *Led.*, Fl. Ross. I. 169. — *Boiss.*, Fl. or. I. 143. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 166.

*Raphanus tenellus* Pall. Reise durch verschied. Prov. russ. Reichs, III. append. № 105 t. L. f. 3. — 1776.

1902. *Chorispora tenella*, O. A. Федченко Список № 112.

IV. Ташкентъ, въ садахъ, 6 V. (*Краузъ!*). Саларь, 28. III.

1871 (O. A. Федченко!).

V. Карасу 9. IV. 1880 (*A. Regel!*).

Въ нашей области не часто. Въ Туркестанѣ распространено очень широко: N: — отъ Илецкой зализы до Аягуза; O: — всюду въ степяхъ и предгорьяхъ; S: — Самарканда (*O. A. Федченко!*), Ходжентъ (*Сильверцовъ!*), Балыкчи 2. IV. 1878 (*Скорняковъ!*); W: — Закасп. обл., Казалинскъ!, Аякъ на сѣв. скл. Нуратинскихъ горъ 6. IV. 1873 (*Короликовъ и Краузъ!*).

(152)

Виѣ Туркестана — Западные Гималаи, Солнечный хребетъ, Малая Азія, Персія, Афганистанъ, Белуджистанъ, Кавказъ, Крымъ, Югъ Европ. Россіи.

133. *Chorispora exscapa* Bge in *Led.*, Fl. Ross. I. 169. — 1841.  
*Ch. Bungeana* Fisch. et Mey., Pl. nov. Schrenk. I. p. 96. — 1841.

1882. *Chorispora Bungeana*, A. Regel Gartenfl. 362.  
I. Уц. Джиламышъ, 10.000' — 11.000, 22 — 26. VI. 1880 (*Фетисовъ!*); Арассанъ, 9 — 11.000', 4 — 5. VI. 1880 (*Фетисовъ!*); Аламединъ, 5 — 9.000', 23 — 25. V. 1880 (*Фетисовъ!*); Кольторъ, 10.000', 7. VII. 1882 (*Фетисовъ!*); пер. Карагай-булакъ 9.500 — 10.500', 6. VII. 1882 (*Фетисовъ!*).

IV. Чаткалъ, VI. 1880 (*A. Regel!* — собрано *Мусою*). Кумдаванъ бл. Паркента, 9. VI. 1880 (*Муса!*); бл. перевала Куль-ашу, 10. VIII. 1902 въ цв. (B. A. Федченко!!); на склонѣ у самаго перевала Тюсь-апу, 12 — 13.000', во множествѣ отдельными экземплярами, въ цв. 27 и 31. VII. 1897 (B. A. Федченко!!); у ледника Карабулакъ, 3. VIII., 10.500', на моренѣ (B. A. Федченко!!), въ долинѣ Санталаша, у истоковъ Чаракъ-сая, 10 — 11.000', въ цв. 15. VIII. 1902 (B. A. Федченко!!).

VIII. Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата 10. — 12.000', 30. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

IX. Сусамырский хреб. пер. Кумбель, 10 — 12.000', 5. VII. 1881 и сѣв. склонъ хребта, 8 — 10.000', 9. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. На перевалѣ Яссы, 11.000' (*A. Regel* — п. в.); горы надъ Арсланбобомъ, у тающаго снѣга, 7 — 9. VI. 1899 въ цв. (*Литвиновъ!*).

var. *hispidissima* B. F. var. n.  
*Tota planta pilis longis hispidissima*.

VII. Перевалъ между р. Каракуль и Майли, каменистая почва, 9.500', 18. VIII. 1895 (*C. Коржинскій!*).

Въ нашей области встрѣчается очень часто въ предѣлахъ альпийской зоны, на щебнистыхъ осыпяхъ и каменистыхъ склонахъ. Иногда спускается и ниже. Въ Туркестанѣ широко распространено въ высокихъ горахъ: O: — Джунгарскій Алатау, Тянь-шань и S: — Памироалай, но виѣ Туркестана пока неизвестно.

(153)

134. *Chorispora elegans* Cambess. in *Jacquem.* Voyage dans l'Inde IV. Descr. des Collections. Botanique par M. Cambessèdes p. 15.—1844.

*Ch. sabulosa*, Hook. Fl. br. Ind. I. 167 (ex parte).—*Комаровъ*, Матер. по фл. Турк. нагорья № 102 („Труды Спб. Общ. Естеств. т. XXVI“).

IV. Чаткаль, близъ Идрисъ-пей-гамбара, 25. VI. 1880 въ цв. (A. Регель—собрано Мусою!).

V. Истоки р. Ангрема, Аршань-булакъ, 20. VI. (A. Регель—собрано Мусою!).

Въ нашей области встречается изрѣдка и въ небольшомъ линь районѣ по Чаткалу и верховьямъ Ангрема. Отъ близкой *C. exscapa* повидимому отличается достаточно хорошо выше указанными признаками. Я полагаю, что наше растение вполнѣ тождественно съ собраннымъ *Комаровыи*<sup>1)</sup> на Заравшанѣ и названнымъ имъ *C. sabulosa*. Изъ гималайскихъ формъ растеніе наше, полагаю, вполнѣ тождественно съ Камбеседовой *C. elegans*, рисунокъ которой имѣется въ Путешествіи *Jacquemont'a*, а гербарные образцы въ общемъ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада смышаны съ желтоцвѣтной *C. sabulosa*.

135. *Chorispora sibirica* (L.) DC. Syst. veg. II. 437.—1821.—*Leb.*, Fl. ross. I. 169.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I 167.

*Raphanus sibiricus*, L. Spec. pl. ed. 1-a p. 669.—1753.  
I. Ущелье Аламединъ, 5—9.000', 23—25. V. 1880 въ цв. и пл. (Фетисовъ!).

Видъ этотъ очень близокъ къ слѣдующему и отличается преимущественно однолѣтнимъ корнемъ. Экземпляръ изъ ущ. Аламединъ относится повидимому именно сюда.

Въ Туркестанѣ распространено довольно широко въ степяхъ и предгорьяхъ: О; — Семипалатинскъ, Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань; С: — Алайскій хреб. (р. Белеули—*Кушакевичъ*; р. Талдыкъ, до 10.000' — *C. Коржинскій*!).

Въ Туркестана — въ Монголіи и Западномъ Тибетѣ.

136. *Chorispora songorica* Schrenk in Fisch. et Mey., Enum. (II) pl. nov. Schrenk. p. 57. 1842.

<sup>1)</sup> В. Комаровъ (l. c.) говорить объ этомъ видѣ: „differt foliis integrerrimis vel grosse dentatis, vel pinnatifidis. Siliquis plus minusve glandulosis vel maturis glabris“. Для меня не ясно, что это должно значить.

*Ch. sibirica* var., Kar. et Kir. Enum. pl. Song. № 96.  
*Leb.*, Fl. ross. I. 758.

1882. *Chorispora* (gelbe), A. Regel Gartenfl. 362.

1883. „ *songorica*, Franchet Mission Capus 229.  
I. Кольторъ, 10.000', 7. VII. 1882 (Фетисовъ!). Пер. Карагай-булакъ, 9.500—10.000', 6. VII. 1881 (Фетисовъ!).

IV. Тянь-Шань, 8—1.200(0)' (*Кушакевичъ*!); близъ перевала Тюсть-ашу, VII. 1897, около ледника Акъ-турпакъ, 27. VII. 1897 и около перевала Торпакъ-бель, 24. VII. 1897 (Б. А. Федченко!), Чимганъ, 1901 (Е. Хомутова!), въ верховьяхъ Санталаша, у истоковъ Чаракъ-сая, 10—11.000', 15. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!).

V. Отурбель, на сѣв. скл. горъ отъ Ангрема до Кокана, V. 1880 (A. Регель—собрано Мусою!).

VIII. Перевалъ Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 10—12.000', 30. VII. 1881 (Фетисовъ!).

IX. Сѣверный склонъ Сусамырского хребта надъ западнымъ концомъ долины Сусамыра, 8—10.000', 18. VII. 1881 (Фетисовъ!) и вершины Сусамырского хребта, 9.500—12.000', 5—8. VII. 1881 (Фетисовъ!).

X. Манагильды до Алабуги, 7.000', 4. VI. 1880, въ цв. (A. Регель!).

XI. Перевалъ Яссы, 9—11.000', 1. VI. 1880 (A. Регель!); пер. Кугартъ, на каменистыхъ склонахъ, 10.000', 6. VIII. 1895, въ пл. (*C. Коржинскій*!), пер. Кенколъ, 13. VIII. 1895, 10.200', въ пл. (*C. Коржинскій*!).

*Trichochiton inconspicuum* Komar. въ Туркестанѣ известенъ лишь въ немногихъ мѣстахъ: S: — Заравшанъ (В. Комаровъ!); Шахрисеъбъзъ, Денау, Яккабатъ (Липскій), W: — Закасп. обл. (Литвиновъ!). Внѣ Туркестана неизвестенъ.

## 42. *Malcolmia* R. Br.

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Лепестки въ 1½—2½ раза длиннѣе чашелистиковъ . . . . . | 2.                         |
| Лепестки въ 3 раза длиннѣе чашелистиковъ . . . . .        | <i>M. Bungei</i> Boiss.    |
| 2. Листья цѣльнокрайнѣе или зубчатые . . . . .            | <i>M. africana</i> R. Br.  |
| Нижнѣе листья глубоко надрѣзаны . . . . .                 | 3.                         |
| 3. Цвѣтоножки слинникомъ вдвое короче чашечки . . . . .   | <i>M. runcinata</i> C.A.M. |
| Цвѣтоножки длиннѣе чашечки . . . . .                      | <i>M. Ledebouri</i> Boiss. |

137. *Malcolmia africana* (L.) R. Br. in *Ait. Hort. Kew.* ed. 2-a. IV. p. 121.—1812.—*Led.*, Fl. ross. I. 170.—*Boiss. Fl. or.* I. 223.—*Hook. Fl. br. Ind.* I. 146.

*Hesperis africana* L. Sp. pl. ed. 1-a p. 663.—1753.

1870. *Malcolmia africana*  $\alpha$  *typica*, E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 95.

1870. *Malcolmia africana*  $\beta$  *trichocarpa* ibid. № 95a.

1870. " "  $\gamma$  *intermedia* " № 95b.

1870. " "  $\varepsilon$  *stenopetala* " № 95c.

1902. " " f. *typica* и v. *intermedia*, O. A.

Федченко, Список № 119.

III. Арысь и Бугунь 24. V. (*Съверцовъ!*).

IV. Ташкентъ, сады на Боссу, 11. IV. 1871 (O. A. Федченко!), Ташкентъ, 5. IV. 1882, въ цв. и пл. (A. Regel! — f. *typica* и f. *laxa*); по горамъ и возвышеніямъ мѣстамъ, 6. IV. въ цв. и въ садахъ 3. V. въ цв. (*Краузъ!* — f. *typica*) сады на Саларъ 9. IV. 1871 въ цв. и пл. (O. A. Федченко! — промежуточная форма между f. *typica* и f. *laxa*); Ташкентъ (*Маевъ!* — f. *laxa*); Ташкентъ 20. III. (f. *typica* — *Маевъ!*); горы Карагату, 1882 (*Маевъ!*); Ташкентъ (*Кушакевичъ!* — f. *typica*).

VI. Моголь-тау 25. IV. (*Съверцовъ!* — f. *trichocarpa*); Моголь-тау IV. и 30. III. (f. *typica* — *Съверцовъ!*); Сыръ Дарья у Ходжента, 14. IV. 1880, въ цв. и пл. (A. Regel! — f. *trichocarpa*).

XI. Узгентъ, 30. V. 1880, въ цв. и пл. (A. Regel! — f. *typica*).

Въ нашей области встрѣчается нерѣдко, но въ горы высоко не поднимается. Можно отличать три формы:

f. *typica* — Плоды густо и коротко опущенные.

f. *laxa* (Lam.) Boiss. — Плоды совершенно голые.

f. *trichocarpa* Boiss. — Кромѣ короткихъ волосковъ, на плодахъ имѣются еще особые, длинные стекловидные волоски.

Въ Туркестанѣ распространено довольно широко: О: — Борборогуссунъ, Сигашу (A. Regel!); S: — Заравшанъ; Алай: Тенгизбай, до 10.500', на сухихъ альпійскихъ луговинахъ (*C. Коржинскій!*); на Алай же, какъ сорное растеніе (*C. Коржинскій!*). W: — Усть-уртъ (*Базинеръ!*); Закасп. обл.; Катты-курганъ; отъ Каракъ-ата до Адамъ-кирульгана (*Корольковъ* и *Краузъ!*).

Внѣ Туркестана встрѣчается въ южной Европѣ, съверной Африкѣ, Персіи, Афганистанѣ, Малой Азіи, Сиріи, Аравіи, Месопотаміи, на Кавказѣ и въ сѣв.-зап. Индіи.

138. *Malcolmia Bungei* Boiss. Fl. or. I. 226. — 1867.

*Dontostemon grandiflorum* Bunge Reliq. Lehm. № 98.

*Fedtschenkoa turkestanica* Rgl. et Schm., E. Regel, Опис. нов. вид. № 20 въ А. П. Федченко Путеш. въ Турк. т. III. в. 18. — 1881.

1870. *Malcolmia Bungei*  $\beta$  *lasiocarpa* и  $\gamma$  *macrantha*, Regel Suppl. II. pl. Sem. № 95f.

1900. *Malcolmia Bungei* Липсій Матеріалы фл. Среди. Азіи № 7.

1902. *Malcolmia Bungei* O. A. Федченко Список № 121. Туземн. назв.: Шитыръ (запис. *Краузъ!*).

IV. Ташкентъ, степь на Боссу, 11. IV. 1871 (O. A. Федченко!), Ташкентъ, III. 1872, въ цв. и пл. (*Корольковъ!*); 3. V. 1871, въ цв. (*Краузъ!*), Ташкентъ, 1882 (*Маевъ!*); Ташкентъ, 14. 1880 въ цв. (A. Regel!); Акыръ-тюбе V. (*Musa!*).

V. Отъ Ханкупрюка къ Той-тюбе 17. V. 1880 въ цв. и пл. (A. Regel!), Арейдованъ 1880, въ цв. и пл. (A. Regel!), Джанбулакъ, 20. IV. въ цв. (*Съверцовъ!*), ст. Уральская 16. IV. 1880 (A. Regel!).

VI. Моголь-тау (*Съверцовъ!*).

XI. По горамъ Май-булакъ, з. VI. въ цв. (*Краузъ!*).

Большей частію наше растеніе имѣеть плоды покрытые волосками (f. *lasiocarpa*), иногда же голые; встрѣчаются экземпляры съ плодами отчасти голыми, отчасти волосистыми. Не есть ли это помѣсть между двумя формами?

Въ Туркестанѣ распространено весьма широко: О: — отъ Кутентаса до Илійска (A. Regel!); S: — Чинаръ, лѣвый берегъ Сыръ-дары 18. V. 1882 (A. Regel!); Фергана: Андижанъ (*Скорняковъ!*, A. Regel!), Гульша (*Кушакевичъ!*); Заравшанъ; Бухара: Бальджуанъ; Кулябъ (A. Regel!, *Невъскій!*), Байсанъ, Гиссаръ. (Липсій!); W: — Кизилькумы (O. A. Федченко!); Закасп. обл.

Внѣ Туркестана встрѣчается въ Афганистанѣ и Белуджистанѣ.

139. *Malcolmia Ledebouri* Boiss. Fl. orient. I. 224. — 1867.  
*Sisymbrium contortuplicatum* β rectisiliquum  
*Fisch.* in litt., *Poir. Suppl. Enc. Syst.* 3. p. 195.  
*Sisymbrium Meyeri* Led., Fl. ross. I. 184.  
 1870. *Malcolmia Ledebouri*, *E. Regel Suppl.* II. pl.  
 Semen. № 95e.

VI. Моголь-тау, IV. въ цв. и пл. (*Съверцовъ!*).

Определить съ достовѣрностью это растеніе миѣ не удалось и можетъ быть, это *M. contortuplicata* или *M. scorpioides*. Извѣстно еще въ Закавказіи.

140. *Malcolmia runcinata* C. A. Mey. Enumer. pl. Caucas. p. 186. — 1831. — *Boiss.*, Fl. or. I. 223. — *Led.*, Fl. ross. I. 171.  
 1870. *Malcolmia runcinata*, *E. Regel Suppl.* II. pl.  
 Semen. № 95d.

VI. Моголь-тау IV., въ пл. (*Съверцовъ!*).

Имѣющійся въ Спб. гербаріи экземпляръ не достаточно полонъ.

Извѣстно еще въ Персіи, Месопотаміи и на Кавказѣ.

*Приимѣчаніе.* Перечисляемъ еще иѣсколько Туркестанскихъ видовъ *Malcolmia*:

<i>M. circinnata</i> (Bge.) Boiss. . . . .	—	W	—
<i>M. contortuplicata</i> (Steph.) Boiss. . . . .	—	W	—
<i>M. hispida</i> Litw. . . . .	—	W (Endem.)	
<i>M. brevipes</i> (Bge.) Boiss. . . . .	—	W	—
<i>M. scorpioides</i> Boiss. . . . .	—	O	W
<i>M. torulosa</i> (Desf.) Boiss. . . . .	—	—	W

Изъ рода *Cithareloma* Bge. въ Туркестанѣ встрѣчаются два вида, *C. Lehmanni* Bge. и *C. vernum* Bge., оба въ W: — Кизылъ-кумы, и въ другихъ странахъ неизвѣстны.

### 43. *Hesperis* L.

141. *Hesperis matronalis* L. Sp. pl. ed. 1-a p. 663. 1753.—  
*Led.*, Fl. ross. I. 171. — *Boiss.*, Fl. or. I. 233.  
 1882. *Hesperis*, *A. Regel Gartenfl.* 361.  
 I. Ала-арча, 6 — 7.000', 13. V. въ цв., Джиламынъ,  
 6 — 8.000', 27. VI. 1880 въ цв.; Арассанъ, 7 — 9.000', 7 — 8.  
 VI. 1880 въ цв. (*Фетисовъ!*).

- IV. „Междуд посѣвами (?), юнь“, въ цв. и пл. (*Краузел!*).  
 XI. Верховья р. Яссы, 31. V. 1880 въ цв. и пл. (*A. Regel!*), у перевала Кугартъ, на травянистыхъ склонахъ горъ, 7 — 8.000', 5. VIII. 1895, въ цв. (*C. Коржинскій!*).

Въ Туркестанѣ встрѣчаются въ N: — Семипалатинскъ; O: — Вѣрный (*Кушакевичъ!*), средняя зона Большой Алматинской щели, верстахъ въ 6 отъ Кордона, 28. V. 1877, въ цв. (*Фетисовъ!*), р. Тентекъ, 27. VI. 1872 (*Кушакевичъ!*), вершина Кара-конуза, 18 — 26. V. 1875, въ цв. (*M. Кушакевичъ!*), Тарбагатай (*Карелинъ и Кириловъ!*).

Въ Туркестана — юж. и средняя Европа, Сибирь, Персія.

*Приимѣчаніе 1.* Изъ рода *Hesperis* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще одинъ видъ: *H. argica* Poir. N: до Иртыша.

*Приимѣчаніе 2.* Для Туркестана были указаны еще два вида *Hesperis*: *H. Hookeri*, оказавшійся ии чѣмъ инымъ, какъ *Erysimum purpureum* (см. этотъ видъ) и *H. kipawarenensis* Royle, оказавшійся ии чѣмъ инымъ, какъ *Parrya* (вѣроятно, *P. nudicaulis*).

Изъ рода *Streptoloma* въ Туркестанѣ встрѣчаются *S. desertorum* Bge: O и W.

Изъ рода *Atelanthera* въ Туркестанѣ найденъ *A. regurgitilla* Hook. et Thoms: S: — Алай.

### 44. *Sisymbrium* L.

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Лепестки бѣлые . . . . .   | 2.                             |
| Лепестки желтые . . . . .   | 5.                             |
| 2. Листья всѣ въ прикорневой розеткѣ. Все растеніе маленькое, однолѣтнєе . . . . .                    | <i>S. nudum</i> Bel.           |
| Листья стеблевые, растенія иногда бывають довольно крупными . . . . .                                 | 3.                             |
| 3. Стеблевые листья сидячіе, со стрѣловиднымъ или сердцевиднымъ основаніемъ . . . . .                 | 4.                             |
| Стеблевые листья при основаніи суженные, все растеніе войлочно-мохнато . . . . .                      | 5.                             |
| Стеблевые листья на длинныхъ черешкахъ . . . . .  | <i>S. Alliaria</i> (L.) Scop.  |
| 4. Стеблевые листья съ сердцевиднымъ основаниемъ, зубчатые, стручкі согнуты . . . . .                 | <i>S. pumilum</i> Steph.       |
| Стеблевые листья со стрѣловиднымъ основаниемъ, почти цѣльноокрайніе; стручки вверхъ стоячіе . . . . . | <i>S. toxophyllum</i> C. A. M. |

5. Листья дважды перистораздельные . . . . . *S. Sophia* L.  
Листья перистонадрѣзанные или выемчато-  
зубчатые . . . . .  
6. Цвѣтоноски почти столь же толстые какъ и  
стручки . . . . .  
Цвѣтоноски тоньше стручковъ . . . . .  
7. Верхніе листья узколинейные, цѣльнокрайние,  
стручки вверхъ стоячіе или отогнутые . . . . .  
Листья чаще перистораздельные, если же  
листья цѣльные, то стручки отклоненные,  
повислые . . . . .  
8. Стручки длиной 3—4 см., вверхъ стоячіе или  
отклоненные . . . . .  
Стручки очень длинные (до 8—10 см.), по-  
вислые . . . . .  
9. Листья перистораздельные . . . . .  
Всѣ листья цѣльнокрайние, нити длинныхъ  
тычинокъ при самомъ основаніи попарно  
сросшіяся . . . . . *S. ferganense* Korsh.

**142. *Sisymbrium juncinum* MB.** Fl. taur. cauc. II. 114.—  
**1808.** — *Led.*, Fl. ross. I. 177. — *Boiss.*, Fl. or. I. 219.  
1878. *Sisymbrium juncinum*, *A. Regel* Reisebr. 200.  
1881. „ *angustifolium*, *Э. Регель* Опис. нов. вид.  
въ *А. А. Федченко* Путеш. въ Турк. № 23.  
1902. *Sisymbrium angustifolium*, *O. A. Федченко* Списокъ  
№ 132.  
II. Караколъ (*A. Regel* — п. в.); Каракия IX. 1876  
(*A. Regel*!).  
IV. (?) Между Орскомъ и Ташкентомъ, V. 1870 въ цв.  
(*O. A. Федченко*!).

Въ нашей области изрѣдка встрѣчается въ степяхъ и  
предгорьяхъ. По Туркестану распространено очень широко:  
N, O, S, W. Встрѣчается также на юго-востокѣ Европы, въ  
Сибири, Сѣв. Монголіи и на Кавказѣ.

**143. *Sisymbrium Loeselii* L.** Cent. pl. 1-a p. 18 № 49.—**1755.**  
(idem in Amoen. acad. IV. p. 279. **1759.**) — *Led.*, Fl. or. I. 178.—  
*Boiss.*, Fl. or. I. 218. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 151.  
1902. *Sisymbrium Loeselii* v. *glabrum*, *O. A. Федченко*.  
Списокъ № 126.  
Туз. наз. в.: Калла-зардакъ (тадж., запис. *O. A. Федченко*).  
I. Арассанъ, 7—8. VI. 1880. въ цв. (*A. Фетисовъ*!).

III. Бородай 1876 (*A. Regel*!); Чимкентъ (*Сѣверцовъ*!).  
IV. Ногай-курганъ, 1.300', 5. IX. 1869 (*O. A. Федченко*! —  
var. *glabrum*); Сайллыкъ, 4—6.000' (*A. Regel*!); горы Карагату  
1882, въ цв. и пл. (*Маевъ*!); Ташкентъ, VIII. 1876 (*A. Regel*!);  
Чимганъ, Красный Оврагъ, 18. VII. 1897 (*A. O. Федченко*!);  
Ташкентъ, садъ Хомутова, 12. VII. 1897 (*O. и Б. Федченко*!).

Преобладаетъ въ нашей области форма *glabrum*. Встрѣ-  
чается по всему Туркестану, а также въ средней и восточ-  
ной Европѣ, на Кавказѣ, въ южной Сибири, Персіи, Малой  
Азіи, Афганистанѣ, западныхъ Гималаахъ и сѣверной  
Монголіи.

**144. *Sisymbrium brassicaeforme* C. A. Mey. in *Led.*, Fl. alt.  
III. 129. — 1831. — *Led.*, Fl. ross. I. 178.**

1870. *Sisymbrium brassicaeforme*, *E. Regel* Suppl. II. pl.  
Semen. № 99.

1878. *Sisymbrium brassicaeforme*, *A. Regel* Reisebr. 185.  
II. Ущелье Кумышъ-тагъ, 10. VIII. 1897 въ пл. (*Б. А.  
Федченко*!).

III. Бородай, 1876 (*A. Regel*!).  
IV. Бакракъ на Чаткалѣ, 8—9.000', (*A. Regel*!); Ка-  
бура, VIII. 1876 (*A. Regel*!).

VI. Моголь-тау, IV, съ цв. и незр. пл. (*A. Regel*!).  
По Туркестану распространено очень широко: N, O,  
S, W, а кромѣ того, встрѣчается въ южномъ Алтаѣ.

**145. *Sisymbrium ferganense* Korsh.** Fragmenta florae Tur-  
kestaniae I. № 22. („Bulletin de l'Acad. Imp  iale des Sciences  
de St. Petersbourg“ 1898. D  c. T. IX. № 5).

1898. *Sisymbrium ferganense*, *Korshinsky* l. c.  
XI. Близъ Арсланбоба, 7—9.000', 11. VIII. 1895, на  
камен. скл., въ цв. и пл. (*C. Коржинскій*!); Каракунгуръ, выше  
Чарвака 17. VI. въ цв. и пл. и 30. V. 1899 въ цв. на кам-  
няхъ (*Литвиновъ*!).

До сихъ поръ найдено лишь въ указанныхъ мѣстно-  
стяхъ. По моему мнѣнію, *S. brassicaeforme* C. A. M., *S. ferga-  
nense* Korsh., *S. heteromallum* C. A. M., *S. decipiens* Bge.,  
*S. iskandericum* Komar. относятся къ одному и тому же поли-  
морфному циклу.

- 146. *Sisymbrium Sinapistrum* Crantz. Stirp. austr. ed. 2-а I.  
2. p. 52. — 1769.**  
*S. pannonicum* Jacq. Collect. I. 70. — *Led.*, Fl. ross. I.  
 179. — *Boiss.*, Fl. or. I. 217. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 150.  
 I. Пишикъ, 2.000', 28. V. 1880, отцв. (*Фетисовъ!*).  
 II. Станія Куюкъ, 19. V. 1878 (*Кушакевичъ*).  
 IV. Ташкентъ, въ садахъ (*Краузелъ*).  
 V. Джанбулакъ, 29. V. 1880, въ цв. (*A. Регель!*) — собрано  
*Мусою*; правый берегъ Сырь-дары бл. Ходжента 14. IV.  
 1880, зацвѣтъ (*A. Регель!*).  
 Въ Туркестанѣ распространено широко: N, O, S, W.  
 Внѣ Туркестана: средняя и восточная Европа, Кавказъ,  
 Малая Азія, Персія, Аравія, Месопотамія, Сирія, Западный  
 Тибетъ.
- 147. *Sisymbrium Sophia* L. Sp. pl. ed. 1-а р. 659. — 1753. —**  
*Led.*, Fl. ross. I. 180 — *Boiss.*, Fl. or. I. 256. — *Hook.*, Fl. br.  
 Ind. I. 150.  
 1870. *Sisymbrium Sophia*, *E. Regel Suppl.* II. pl. Semen.  
 № 101а.  
 1878. *Sisymbrium Sophia*, *A. Regel Reisebr.* 200.  
 1902. " " *O. A. Федченко Списокъ № 128.*  
 I. Пишикъ, 2.000', 28. V. 1880, въ цв. и пл. (*Фетисовъ*);  
 Аламединъ, 5 — 9.000', 23 — 25. V. 1880 (*Фетисовъ!*).  
 II. Караколъ, VIII. 1876 (*A. Регель!*); Боркутья 6 — 7.000'  
 10. VIII. 1897 (*Б. А. Федченко!!*).  
 III. Бугунъ, 19. IV. (*Съверцовъ!*).  
 IV. Ташкентъ, 23. III. 1871 (*O. A. Федченко!*), сады на  
 Саларъ, 9. IV. 1871 (*O. A. Федченко!*), по дворамъ и садамъ,  
 з. V. въ пл. (*Краузелъ*), Ташкентъ 1882 и горы Карагату 1882  
 (*Масевъ!*), Ташкентъ 1899 (*P. Холмутовъ!*), Сырь-Дарья (?) бл.  
 Ташкента (*A. Регель!*).  
 V. На берегу Ангрена, 13. V. въ пл. (*Краузелъ*).  
 VI. Моголь-тау 30. III (*Съверцовъ!*); правый берегъ р.  
 Сырь-дары у Ходжента, 14. IV. 1880 и правый берегъ Сырь-  
 дары у Чиназа, 31. V. 1882 (*A. Регель!*).  
 Въ Туркестанѣ распространено чрезвычайно широко:  
 N, O, S, W.

Внѣ Туркестана: Европа, Сибирь, Съверная Америка,  
 Китай, Монголія, Сирія, Персія, Арменія, Афганістанъ,  
 Белуджистанъ, Гималаи, Съверная Африка.

- 148. *Sisymbrium pumilum* Steph. in Willd. Spec. pl. III.  
507. — 1880. — *Led.*, Fl. ross. I. 181. — *Boiss.*, Fl. or. I. 213.  
 1902. *Sisymbrium hirtulum* Rgl. et Schmalh., *O. A. Федченко Списокъ № 131.***

IV. Саларъ, 28. III. 1871, 1.400' (*O. A. Федченко!*).  
 Въ нашей области очень рѣдко. Въ Туркестанѣ распро-  
 странено очень широко: N, O, S, W.

Внѣ Туркестана: на ю.-в. Евр. Россіи, въ Сиріи, Аравіи,  
 Закавказъ, Персія, Белуджистанъ и Афганістанъ.

- 149. *Sisymbrium Alliaria* (L.) Scop. Scop. Fl. carniol. ed.  
2-а vol. II. p. 26. — 1772. — *Led.*, Fl. ross. I. 182. *Hook.*, Fl.  
 br. Ind. I. 151.**

*Erysimum Alliaria* L. Sp. pl. Ed. 1-а р. 660.—1753.  
 XI. Арсланбобъ, 26. V. 1899, въ пл. (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области очень рѣдкое растеніе. Въ Турке-  
 станѣ встрѣчается еще въ S: — Дарвазъ (*C. Коржинскій!*),  
 Заравшанъ (*B. Комаровъ!*).

Внѣ Туркестана известно въ Западной Европѣ, европ.  
 Россіи, а также на Кавказѣ и въ Гималаяхъ. Указывается  
 еще для Усть-Каменогорска на Иртышѣ (*Селиновъ* in Rgl.  
 Pl. Semen.).

- 150. *Sisymbrium nudum* Bel. B  langer, Voyage aux Indes  
 orient. Ic. (sine № vel. descr.!) — *Boiss.* Fl. or. I. 214.**

*Arabis nuda* Boiss. Ann. Sc. nat. 1862. p. 54.—*Hook.*,  
 Fl. br. Ind. I. 137.

1902. *Sisymbrium nudum*, *O. A. Федченко Списокъ № 129.*  
 IV. Ташкентъ, 1.400', 1871 (*O. A. Федченко!*).

V. Ст. Уральская, 16. IV. 1880, цв. и пл. (*A. Регель!*).  
 Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — Джунгарія  
 (*Карелинъ и Кириловъ* sub nom. *S. brevip. ex parte!*), Андра-  
 кай (*Красновъ!*); S: — Сюлюкты-тау (*Съверцовъ!*), Уратюбе,  
 Бальджуанъ (*A. Регель!*), Калаихумъ (*Муса!*), Заравшанъ  
 (*O. A. Федченко!* и др.); W: — Закасп. обл.

Кромѣ того встрѣчается въ Арmenіи, Сиріи, Персіи,  
 Афганістанѣ, Малой Азіи и Западныхъ Гималааяхъ.

151. *Sisymbrium humile* C. A. Mey. in *Led. Icon. fl. ross.* t. 147—1830.—*Led. Fl. alt.* III. 187.—1831.—*Led. Fl. ross.* I. 184.—*Hook. Fl. br. Ind.* I. 148.

Х. Манағильды до Алабуги, 7.000', 4. VI. 1880, въ пл. (A. Регель!).

Въ нашей области очень рѣдкое субальпийское растение. Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ S: Памиръ и O: алып. обл. центр. Тянь-Шаня.

Извѣстно, кромѣ того, въ степяхъ южнаго Алтая, по Енисею (?), въ Иркутск. губ., въ западномъ Тибетѣ и арктич. Америкѣ (?).

152. *Sisymbrium toxophyllum* (M. B.) C. A. Mey. in *Led. Fl. alt.* III. 142.—1831.—*Led. Fl. ross.* 185.—*Boiss. Fl. or.* I. 213.

*Arabis toxophylla* M. B. *Fl. taur. cauc.* III. 448—1819.

1902. *Sisymbrium toxophyllum*, O. A. Федченко, Списокъ № 134.

IV. Саларъ, 28. III. 1871 (O. A. Федченко!); Ташкентъ, IV. 1882 въ цв. и пл. (A. Регель!); въ горахъ Карагату IV. 1882 въ цв. (Маевъ!).

Въ Туркестанѣ распространено весьма широко: N, O, S, W. Виѣ Туркестана: южная Россія, Крымъ, южный Алтай (бл. Локтевска).

*Приимѣчаніе.* Изъ рода *Sisymbrium* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды:

- S. adpressum Trautv. . . . — — — W (Endem.)
- S. brevipes Kar. et Kir. . . . N O — — (Endem.)
- S. decipiens Bge. . . . — O — — (Endem.)
- S. glandulosum Max. . . . — O S —
- S. halophilum C. A. M. . . . N — — —
- S. heteromallum C. A. M. . . . — O S —
- S. Irio L. . . . . — — — W —
- S. iskandericum Kom. . . . — — S — (Endem.)
- S. Korolkowi Rgl. et Schm. . . . — S —
- S. mollipilum Max. . . . — — S —
- S. mollissimum C. A. M. . . . N — S —
- S. mongolicum Max. . . . — O S —
- S. pilosissimum Trautv. . . . — — — W (Endem.)

(164)

- S. polyceratum L. . . . — — — W —
- S. salsuginosum Pall. . . . — O — —
- S. subspinoscens (F. M.) Bge. . . — O — — (Endem.)
- S. sulphureum Korsh. . . . — — S — (Endem.)
- S. thalianum (L.) Gay et Monn. . . N O S —

#### 45. *Leptaleum* D. C.

153. *Leptaleum filifolium* (Willd.) DC. *Syst. veg.* II. 511.—1821.—*Led. Fl. ross.* I. 176.

*Sisymbrium filifolium* Willd. *Sp. pl.* III. 495.—1800.

IV. Ташкентъ, IV. 1882, въ цв. (A. Регель!).

V. Бл. Карасу, 9. IV. 1880, въ цв. (A. Регель!).

VI. Правый берегъ Сыръ-Дары у Ходжента, 14. IV. 1880, въ цв. и пл. (A. Регель!).

Въ нашей области встречается лишь на крайнемъ ю.-з. Въ Туркестанѣ распространено довольно широко: O: Кульджа, предгорья Тянь-Шаня; S: Заравшанъ (O. A. Федченко! и др.), Байсунъ (С. Корзинскій!), Ходжентъ (Съверцовъ!); W: Закасп. обл.; Кизылъ-кумы (Корольковъ и Краузел!); Голодная степь (A. Регель!), между Келесомъ и Сухимъ Келесомъ (O. A. Федченко!), Каракумы (Борщовъ!).

Виѣ Туркестана неизвѣстно.

#### 46. *Erysimum* L.

- 1. Волоски на листьяхъ и стручкахъ двураздѣльные. . . . . 2.
- Волоски по краинѣ мѣрѣ на листьяхъ трехраздѣльные . . . . . 4.
- 2. Стручки сжатые съ боковъ; растеніе многолѣтнее, съ ярко-желтыми вѣничками . . . . . E. altaicum CAM.
- Стручки четырехгранные. . . . . 3.
- 3. Растеніе многолѣтнее, вѣнички обыкновенно лилово-розовые . . . . . E. purpureum Auch.
- Растеніе двулѣтнее, вѣнички блѣдо-желтые. . . . . E. canescens Roth.
- 4. Стручки обыкновенно округло-цилиндрические Стручки четырехгранные . . . . . E. leucanthemum m.
- E. hieracifolium L.

154. *Erysimum leucanthemum* (Steph.) B. Fedtsch. *Cheiranthus leucanthemus* Steph. in *Willd. Sp. pl.* III. 521.—1800.

E. versicolor Andr. in DC. *Prodr.* 198.—1824.—*Led. Fl. ross.* I. 186.—*Boiss. Fl. or.* I. 197.

(165)

*Cheiranthus versicolor*, M. B. Fl. taur. cauc. II.

119.—1808.

? 1883. *Erysimum versicolor*, Franchet Mission Capus p. 231.

IV. Она-Ульгань 22 окт. (sic! — вмѣсто „авг.“; — Капю—  
п. в.). Весьма сомнительное указание, вѣроятно, растеніе это  
относится къ одному изъ слѣдующихъ видовъ. Ташкентъ,  
IV. 1882. (A. Регель!).

Въ Туркестанѣ распространено довольно широко: N. O.  
Виѣ Туркестана — южная Россія, Кавказъ, южный Алтай,  
Сѣверная Персія.

155. *Erysimum altaicum* C. A. Mey, in Led. Fl. alt. III.  
p. 153.—1831. — *Led. Fl. ross.* I. 188.—*Boiss. Fl. or.* I. 206.—  
*Hook. Fl. br.* Ind. I. 154.

I. Джиламышъ, 22. IV. 1880, въ цв. (Фетисовъ!); Арас-  
санъ, 4. VI. 1880, въ цв. (Фетисовъ!); Карагай-булакъ,  
9.500—10.500', 6. VII. 1882, въ цв. (Фетисовъ!).

II. Переваль Кумышъ-тагъ, 10.500', 11. VIII 1897, въ  
пл. (Б. А. Федченко!!).

IV. Чимганъ, 6—7.000', 21. VI. 1881, въ цв. (A. Регель!);  
переваль Тюзъ-апш., 12—13.000', 31. VII. 1897, въ цв. и пл.  
(Б. А. Федченко!!).

IX. Вершины Сусамырскаго хребта, 9—12.000', 5 и 19.  
VII. 1881, въ цв. (Фетисовъ!).

X. Манагильды до Алабуги, 7.000', 4. VI. 1880, въ цв.  
(A. Регель!).

Въ нашей области очень часто встрѣчается въ высокогорной полосѣ, иногда спускается и ниже. Въ Туркестанѣ распространено въ горахъ: O, S. Виѣ Туркестана: Западные Гималай, Алтай, Кавказъ.

156. *Erysimum hieraciifolium* L.—Cent. pl. 1a p. 18. № 50.—

1755. (idem in Amoen. acad. IV. 279.—1759.) — *Hook. Fl. br.*  
Ind. I. 153.

E. strictum Gaertn., *Led. Fl. ross.* I. 189.—*Boiss.*,  
*Fl. or.* I. 196.

E. *Marschallianum* Andrz., *Led. Fl. ross.* I. 190.

1883. *Erysimum cheiriflorum*, Franchet Mission Capus.  
p. 231.

1902. *Erysimum Marschallianum*, O. A. Федченко, Син-  
сокъ № 138.

I. Иссыгаты бл. Арассана, 15. V. 1881; Арассанъ  
7—9.000', 7—8. VI. 1880; Аламединъ, 6—7.000', 30. V.; 3—5.000',  
26—27. V. 1880 (A. Фетисовъ!).

II. Каракольъ, VIII. 1876, въ цв. (A. Регель!); пер. Кум-  
бель, 9.000', 1876 г., въ цв. и пл. (A. Регель!); Каракія VIII.  
1876 (A. Регель!).

IV. Чимганъ 1901 (E. Хомутова!); Куургенъ-туръ, VIII.  
1897 (Б. А. Федченко!!), Санталашъ, верховья, 7—9.000', VIII.  
1902 (Б. А. Федченко!!), Санташъ на Чирчикъ, 28. VI. 1880  
(A. Регель! — собрано Мусою); Она-Ульгань, 22. VIII. 1881.  
(Капю!); Саларъ, 14. IV. 1871 (O. A. Федченко—п. в.).

VII. Верховья р. Афлатуна, 30. VI. 1899, въ цв. и пл.  
(Литвиновъ!).

VIII. Переяль Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата,  
10—12.000', 30. VII. 1881, въ цв. и съ незр. пл. (Фетисовъ!).

IX. Сѣверный склонъ Сусамырскаго хребта надъ за-  
паднымъ концомъ долины Сусамыра, 8—10.000', 18. VII. 1881,  
въ цв. (Фетисовъ!), вершины Сусамырскаго хребта, 10—12.000',  
5. VII. 1881 въ цв. (Фетисовъ!).

Въ нашей области не рѣдко въ степной и хвойной зонѣ,  
но поднимается и въ альпийскую.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ O и S.  
Виѣ Туркестана — Кавказъ, Европа, Сибирь, Гималаи.

157. *Erysimum canescens* Roth. Catal. I. 76.—*Boiss.*, *Fl.*  
*or.* I. 193.

E. *Andrzeiowskianum* Bess., *Led. Fl. ross.* I. 190.  
? 1870. *Erysimum versicolor* ? *dentatum* Rgl. in Suppl.  
II. pl. Semen. № 104a.

? 1870 *Erysimum versicolor* γ *integerrimum*. ibid.  
№ 104b.

IV. Чимганъ, 13. VIII. 1897, въ пл., 5.000', въ Красномъ  
оврагѣ (O. A. Федченко!); истоки р. Чимганки и выше къ  
горѣ Большой Чимганъ, 5—6.000', 16. VII. 1897, въ пл. (O. A.  
и Б. А. Федченко!!); Пекемъ, 22. VII. 1897, 3.000', въ цв. (Б. А.  
Федченко!!); Карагату, 1882 (Маевъ!), Ташкентъ III. 1872 (Ку-  
шакевичъ!).

V. Отурбель бл. Ангрина, 1. VI. 1880 (*A. Регель!*).

VI. Моголь-тау (*Съверцовъ!*).

XI. Арсланбобъ, 24. V. 1899, цв. и мол. пл. (*Литвиновъ!*)— на одномъ экземпляре на листьяхъ къ двураздѣльнымъ волоскамъ примѣшаны и трехраздѣльные; верховья р. Уракъ-су, бл. перев. Кенколь, субальп. склоны, 8.000', 29. V. 1899, въ цв. (*D. Литвиновъ!*).

У насъ не часто. Въ Туркестанѣ известно еще въ О: Вѣрный, Джунгарія; С: Фергана, Караганіи.

Виѣ Туркестана — южная Европа и Россія, Алтай, Даурія, Кавказъ.

158. *Erysimum purpureum* Auch. in Boiss., Pl. Aucher. in Ann. Sc. natur. 1842. p. 82. — Boiss., Fl. or. I. 207.

IV. Чаткаль, 4—6.000', 1876 г., въ цв. и пл. (*A. Регель!*); Акъ-тагъ-тау, 8—11.000', VI. 1872 (*H. И. Корольковъ!* — было опредѣлено Э. Регелемъ, какъ *Hesperis Hookeri*); Чимганъ, 15. VII. 1901 и въ 1902 г. (*E. Л. Хомутова!*); г. Чимганъ, 6—7.000', 21. VI. 1881 (*A. Регель!*); между Ходжакентомъ и Чимганомъ, 20. VI. 1881, 4.000' (*A. Регель!*), лазареть у поднізни Чимгана, 20. VI. 1881 (*A. Регель!*).

VI. Моголь-тау, 21. V. (*Съверцовъ!*).

У насъ распространено не широко. Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ С: Заравшанъ.

Виѣ Туркестана: Армения, Ливанъ и Антиливаинъ.

*Примѣчаніе.* Изъ рода *Erysimum* L. въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды:

E. Babataghi Korsh. . . . .	—	S	—	(Endem.)
E. collinum M.B. . . . .	—	S	—	
E. crassipes F. et M. . . . .	—	S	—	
E. gandanense Litw. . . . .	—	—	W	(Endem.)
E. leptophyllum Andr. . . . .	—	—	W	
E. sisymbrioides C. A. M. . .	N	O	S	W
E. verrucosum Boiss. et Gaill. . .	—	—	W	—

#### 47. *Syrenia* Andr.

159. *Syrenia sessiliflora* (DC.) Led. Led. Fl. ross. I. 193.— 1841. — Boiss., Fl. or. I. 209.

(168)

*Erysimum sessiliflorum* DC. Prodr. I. 196.—1821. 1902. *Syrenia sessiliflora*, O. A. Федченко, Списокъ № 142. ?IV. Между Орскомъ и Ташкентомъ, Киргизская степь, V. 1870 (O. A. Федченко!).

Надо думать, что это растеніе собрано гдѣ-нибудь въ предѣлахъ Тургайск. обл., а не въ нашемъ районѣ.

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ N.

Виѣ Туркестана — Крымъ, Кавказъ, южная Россія.

*Примѣчаніе.* Изъ рода *Syrenia* въ Туркестанѣ встрѣчается еще 1 видъ — *S. siliculosa* (DC) Andr.

Изъ рода *Christolea* въ Туркестанѣ встрѣчаются оба вида: *C. crassifolia* Camb. и *C. pamirica* Korsh., оба въ С: Памиръ (!!).

#### 48. *Conringia* Rchb.

160. *Conringia planisiliqua* Fisch. et Mey. in Ind. sem. III. Horti Petropol. (1837.) p. 32. — Hook., Fl. br. Ind. I. 152.— Boiss., Fl. or. I. 211.

*Erysimum planisiliquum* Led., Fl. ross. I. 192.

Туз. назв.: „Минду“ (запис. у киргизъ въ Алтынъ-мазарѣ на Алаѣ Невѣсскииъ).

IV. Ташкентъ, 22. III, зацвѣаетъ (*Маевъ!*).

Въ нашей области очень рѣдкое растеніе.

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ О: Лепса, Чулакъ, Сарханъ (*Карелинъ* и *Кириловъ!*) и W: Закасп. обл. (*Литвиновъ!*), но особенно часто въ С: Заравшанъ (*A. Регель!*, *B. Комаровъ!*), Фергана: ур. Лянгаръ, Дараутъ-курганъ, Бахміръ (*C. Коржинскій!*), Алтынъ-мазаръ (*Невѣсскій!*), Шуганъ (*O. A. и B. A. Федченко!!*, *C. Коржинскій!*).

Виѣ Туркестана — Кавказъ, турецкая Армения, Перея, западный Тибетъ.

*Примѣчаніе.* Изъ рода *Conringia* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще два вида:

*C. clavata* Boiss. . . . . — — S W —

*C. orientalis* (L.) Dum. — — — W —

(169)

### 49. Tetracme Bge.

161. *Tetracme quadricornis* (Steph.) Bge. in Ind. Sem. horti. Dorpat. 1836. — *Led.*, Fl. ross. I. 194. — *Boiss.*, Fl. or. I. 316.

*Erysimum quadricorne* Steph. in Willd. Sp. pl. III. 514. — 1800.

1870. *Tetracme quadricornis* β *longicornis* Rgl., *E. Regel Suppl.* II. pl. Semen. № 107c.

? IV. Сырь-Дарья (?) у Ташкента, IV. 1880 (*A. Регель!*).

VI. Сырь-Дарья у Ходжента, 14. IV. 1880, въ цв. (*A. Регель!*). Моголь-тау, 25. IV. (*Съверцовъ!* — форма съ болѣе длинными рожками стручковъ).

X. Манагильды, 7—8.000', 4. VI. 1880, въ пл. (*A. Регель!*).

Въ нашей области изрѣдка на юго-западѣ. По Туркестану распространено очень широко: N: отъ Индерскихъ горъ до Улутау (*Шренкъ!*); O: Соготы (*Красновъ!*), Джунгарія (*Карелинъ* и *Кирилловъ!*), S: Алай (*O. Федченко!*, *Коржинский!*); горная Бухара (*O. A. и B. A. Федченко!!* и др.), Зарафшанъ (*O. Федченко!* и др.) W: Закасп. обл.

Въ Туркестана извѣстно лишь въ Астрахан. губ. между Кумой и Волгой и на горахъ Арсагаръ.

*Примѣчаніе.* Въ Туркестанѣ встрѣчается еще близкій видъ: *T. recurvata* Bge: W: Закасп. обл.; Алты-кудукъ 10. V. 1873 (*Корольковъ* и *Краузеръ!*); между Туркестаномъ и Казалами (*Садовскій!* — экземпляръ слишкомъ малъ и, можетъ быть, относится къ предыдущему виду).

### 50. Taphrospermum C. A. Mey.

162. *Taphrospermum altaicum* C. A. Mey. in *Led.*, Fl. alt. III. 173. — 1831. — *Led.*, Fl. ross. I. 194.

I. Кольторъ, 10.000', 7. VII. 1882, въ цв. и съ пл. (*Фетисовъ!*), Арасанъ, 7—9.000', 5. VI. 1880, въ цв. и съ пл. (*Фетисовъ!*); ур. Аламединъ, 5—9.000', 20—24—25. V. 1880, въ цв. (*Фетисовъ!*).

IX. Съверный склонъ Сусамырского хребта, у р. Сандачъ, 9—11.500', 3. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

Въ нашей области — преимущественно въ высокогорной полосѣ. Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ O: Джун-

(170)

гарскій Алатау, Тянъ-Шань; S: Алайскій (!) и Заалайскій хребты (Бордаба — *C. Коржинскій!*).

Въ Туркестана извѣстно лишь въ Восточномъ Алтайдѣ.

*Примѣчаніе.* Для Туркестана указывается еще близкій *T. platypetalum* Schrenk: O: Джунгарскій Алатау.

### 51. Braya Sternb. et Hopp.

163. *Braya* sp. (?)

1882. *Braya*, *A. Regel* Gartenfl. 302.

Въ описаніи своего путешествія, говоря о высокогорной флорѣ Ферганскаго хребта, у перевала Яссы, *A. Регель* упоминаетъ между прочимъ и *Braya*, не обозначая вида. Въ гербаріи однако образцовъ не имѣется, такъ что это показаніе относится къ числу сомнительныхъ.

*Примѣчаніе.* Въ Туркестанѣ встрѣчаются слѣдующіе виды *Braya*:

? *B. glacialis* Korsh. . . . — O S —

*B. ramirica* (Korsh.) O. Fedtsch. — — S (Endem.)

*B. rosea* Bge. (*B. aenea* Bge) . — O S —

(O: Джунгарскій Алатау: Чунгуръ-даванъ (*A. Регель!*), по р. Борборогуссунъ, 9.000', 15. VII. 1879 (*A. Регель!*); Тянъ-Шань: Уртень-музартъ (*Красновъ!* sub nom. *Draba rupestris*), перевалы Теректы и дол. Аксая, VI. 1872 (бар. *Каульбарсъ!*); S: Фергана: Кавукъ (*O. A. Федченко!*), Памиръ (*O. A. и B. A. Федченко!!*).

*B. Scharnhorstii* Rgl. et Schm. . — O — (Endem.)

### 52. Camelina Crantz.

164. *Camelina microcarpa* Andrz. in DC. Syst. Veg. II.

517. — 1821. — *Led.*, Fl. ross. I. 196.

*C. silvestris* Wallr. Sched. 347. — 1823. — *Boiss.*, Fl. or. I. 311.

*C. sativa* v. *pilosa* DC. Syst. Veg. II. 516.

1870. *Camelina microcarpa*, *E. Regel* Suppl. II. pl. Sem. № 109.

1870. *Draba* sp., *E. Regel* l. c. № 87a.

1902. *Camelina microcarpa*, *O. A. Федченко*, Списокъ № 147.

(171)

IV. Ташкентъ, степь на Боссу, 6 и 11. IV. 1871 (*O. A. Федченко!*), въ садахъ въ Ташкентѣ (*Краузе!*), бл. Ташкента (*Кушакевичъ!*), Ташкентъ, 1899 г. (*Хомутовы!*).

V. Карасу 16. VI. въ цв. (*A. Регель!*).

VI. Моголь-тау, 15. III. (*Съверцовы!*).

Въ нашей области не особенно рѣдко, какъ сорное растеніе. Въ Туркестанѣ распространено очень широко: N, O, S, W.

Виѣ Туркестана — Европа, Кавказъ, Малая Азія, Персія, Южная Сибирь.

### 53. *Eutrema R. Br.*

Стебель высокий; соцветіе — метелка, вѣнчики болѣе крупные; стручечекъ короче цветоножки. . . . .

*E. alpestre* Led.

Растеніе менѣе крупное, лепестки лишь въ  $1\frac{1}{2}$  раза длиннѣе чашелистиковъ; стручечекъ длиннѣе цветоножки. . . . .

*E. Edwardsii* R. Br.

165. *Eutrema alpestre* Led. Fl. ross. I. 198. — 1841.

*Cochlearia integrifolia* DC., Syst. Veg. II.

369.—1821.

1853. *Goldbachia laevigata*  $\beta$  adscendens, *Franchet Mission Capus.* p. 234.

IV. На вершинѣ Большого Чимгана, 8. VIII. 1897 въ цв. (*Ю. Баженова-Пьянковская!*); по ручью Андаулъганъ, на сырыхъ луговинахъ въ субальпійской области, 23. VII. 1897 въ цв. (*Б. А. Федченко!*), Турнакъ-бель, 23. VIII. (*Каню!*), Тяньшань, 8—1.200(0)' (*Кушакевичъ!* sub nom. „*Erysimum austriacum*“); Большой Чимганъ, 1901 (*Е. Хомутова!*); по ручью Афлатунъ, въ верхней части области еловаго лѣса, на луговинахъ по ручью, 26. VIII. 1902, въ цв. и съ незр. пл. (*Б. А. Федченко!!*).

VII. Горы бл. озера Сары-чилекъ, 7.000', 27. VI. 1899, цв. и пл. (*Д. Литвиновъ!*).

XI. Субальпійские луга по р. Уракъ-су (бл. пер. Кенколъ), 8.000', 29. V. въ цв. и съ незр. пл. (*Литвиновъ!*).

У насъ не рѣдко по сырьимъ лугамъ въ субальпійской полосѣ. Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: Джунгарскій Алатау, центральный Тянь-Шань; S: Заравшанъ (*В. Комаровъ!*).

Виѣ Туркестана — южный Алтай.

166. *Eutrema Edwardsii* R. Br. in *Parry's J. Voyage Botan.* app. p. CCLXVII t. A. — 1824 (*Scors. 1823.*) — *Led.*, Fl. ross. I. 197.

I. Переялъ Кольторъ, 10—12.000', 7—8. VII. 1882, въ цв. и съ незр. пл. (*Фетисовъ!*).

Рѣдкое высокогорное растеніе. Въ другихъ частяхъ Туркестана встрѣчается чаще: О — Тянь-Шань: къ югу отъ перевала Кетмень, 8—9.000', 20. VI. 1878 (*A. Регель!*), ущелье Елъ-игла на южномъ склонѣ хребта надъ малымъ Нарыномъ, 10.000', 16. VII. 1882 (*Фетисовъ!*); Иссыкъ-куль, средний истокъ Джилькаркары, близъ области вѣчного снѣга, 9—10.000', 26. VIII. 1877, въ пл. (*A. Регель!*); Джунгарскій Алатау: у оз. Сайрамъ, 18. VIII. 1878 (*Фетисовъ!*), пер. Борборогусунъ, 9.000', 15. VI. 1879 (*A. Регель!*), Арыслынъ, 15. VII. 1879 (*A. Регель!*), Кумбелъ, 9—10.000', 31. V. 1879 (*A. Регель!*), верхнее течение Талды, 9.000', 18. V. 1879 (*A. Регель!*); рѣже въ S: Алайскій хреб.: г. Бокбашъ, 12.500', 1. VII. 1895, въ цв. (*С. Коржинский!*).

Встрѣчается кромѣ того въ арктической области Европы, Азіи и Америки, а также въ горахъ Дауріи, южного Алтая, съвернаго Китая, Тангутіи.

*Примѣчаніе.* Въ Туркестанѣ встрѣчается еще и описанная изъ Тибета *E. Przevalskii* Max. S: (Памиръ!!).

### 54. *Capsella Moench.*

167. *Capsella bursa pastoris* (L.) Moench. Meth. 271. — *Led.*, Fl. ross. I. 199. — *Boiss.*, Fl. or. I. 340. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 159. *Thlaspi bursa pastoris* L. Sp. pl. ed. 1a p. 647. —

1753.

1870. *Capsella bursa pastoris*. *E. Regel* suppl. II. Semen. № 113.

1902. *Capsella bursa pastoris* *O. A. Федченко*, Списокъ № 149.

Туз. назв.: Кукъ-чачакъ.

II. По р. Гуручикель, 8. VIII. 1897, въ пл., 8—9.000', (*Б. А. Федченко!!*).

III. Чимкентъ, въ нач. февр., въ цв. и съ пл. (*Съверцовъ!*).

IV. Ташкентъ, 1899—1900 (*Хомутовы!*); окр. Чимгана 1899 (*Е. Хомутова!*); близъ кишл. Пскемъ, сорное, 22. VII. 1897,

бл. Идрисъ-пейгамбара, сорное, VIII, 1902 (Б. А. Федченко!!), при подъемѣ къ пер. Карабура, 8—10.000' (А. Регель!), арыкъ Боссу, 11. VI. 1871 (О. А. Федченко!), отъ Ташкента до Келеса, 22. IV. 1871 (О. А. Федченко!), Ташкентъ, 19. III. и 23. III. (О. А. Федченко!), горы Карагату, 1882 г. (Маевъ!), Ташкентъ, 5. IV. 1882, въ цв. (А. Регель!).

VI. Моголь-тау, 14. V. (Скорняковъ!).

VII. Захъ-сай, сорное 30 VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

X. Арсланбобъ, 24. V. 1899 (Л. Литвиновъ!).

У насть нерѣдко, какъ сорное растеніе. Заходитъ, какъ таковое, даже въ альпийскую область. — Распространено по всему Туркестану.

Внѣ Туркестана — вся Европа, Сибирь, Малая Азія, Персія, Индія, Монголія, Сѣверная Америка, Австралія.

*Приимѣчаніе.* Изъ рода *Capsella* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще три вида:

*C. draboides* Korz. . . . . — — S — (Endem.)

*C. procumbens* (L.) Fries. . . . — — S W —

*C. Thomsoni* Hook. . . . . — — S — —

Къ *C. procumbens* (L.) Fries относится между прочимъ и растеніе, указанное для Заравшана В. Л. Комаровыи подъ именемъ *Teesdalia nudicaulis* (!). Послѣдняя болѣе никакъ для Туркестанскаго края не указывается, и потому подлежитъ исключению изъ Туркестанской флоры.

## 55. *Smelovskia* C. A. Mey.

1. Стручечки яйцевидно-ланцетные или ланцетные; растеніе многолѣтнее, съ толстымъ корневищемъ. Листья перисто-разсѣченные.

*S. calycina* CAM.

Стручечки продолговатые или линейные; растеніе двулѣтнее или многолѣтнее, съ тонкимъ корнемъ; листья дважды перисторазсѣченные . . . . .

*S. alba* m.

168. *Smelovskia calycina* (Steph.) C. A. Mey. in *Led.*, Fl. alt. III. 170.—1831.

*Lepidium calycinum* Steph. in *Willd.* Sp. pl. III. 433—1800.

*Hutchinsia calycina* Desv. Journ. bot. III. 168.—  
*Led.*, Fl. ross. I. 200.

1882. *Hutchinsia*, A. Regel Gartenfl. 362, 363.

1883. " A. Regel Gartenfl. 76.

I. Арассанъ, 9—11.000', 4. VI. 1880; Кольторъ, 10—12.000', 7—8. VII. 1882, въ цв. и пл.; вершины Александровскаго хребта, 12—12.500', 17. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

II. Переяраль Кумышъ-тагъ, 11. VIII. 1897, въ цв., 10—11.000' (Б. А. Федченко!!).

IV. Тянъ-Шань, 8—1200(0)' (*Кушакевичъ!*); Ториакъ-бель, 10—11.000', 24. VII. въ цв. (Б. А. Федченко!!), Майданталь, VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), Чимганъ, 1901 (Е. Холмутова!).

VII. Переяраль Афлатунъ, 12.000', 30. VI. 1899, въ цв. и съ незр. пл. (*Литвиновъ!*).

X. Переяраль Терекъ на Узунъ-ахматъ, 9.000', 29. VII. 1881, въ цв. (*Фетисовъ!*).

IX. Сѣверный склонъ Сусамырскаго хребта, 7—9.000', 4. VI. 1880, въ цв.; вершины Сусамырскаго хребта, 10—12.000', 5. VII. 1881, въ цв. и пл. (*Фетисовъ!*).

X. Манагильды до Алабуги, 7.000', 4. VI. 1880, въ цв. и переваль Яссы, 9—11.000', 1. VI. 1880, въ цв. (А. Регель!).

XI. Переяраль Кугартъ, 10.000', каменистые склоны, 6. VIII. 1895, въ пл. (*C. Коржинский!*).

Въ нашей области одно изъ обычайшихъ альпийскихъ растеній. Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О.

Внѣ Туркестана — Сибирь, сѣверная Монголія, Сѣверная Америка.

169. *Smelovskia alba* (Pall.) B. Fedtsch. *Hutchinsia alba* Bge. Ind. Sem. L. Dorp. an. 1839 p. IV et VIII.—*Sisymbrium album* Pall. Reise nach verschied. Prov. russ. Reichs, III. Appendix № 102, t. U. f. 1.—1776.

*Smelovskia cinerea* C. A. Mey. in *Led.*, Fl. alt. III. 171.—1831.

*Hutchinsia alba* Bge, Ind. Sem. h. Dorpat., ann. 1839 p. IV et VIII.—*Led.*, Fl. ross. I. 201.

IV. Идрисъ-пей-гамбаръ, 25. VI. 1880, въ цв. (А. Регель — собрано *Мусою*); подъ переваломъ Кумбелъ въ долинѣ Санталаша, 17. VIII. 1902 въ цв. и пл. (Б. А. Федченко!!).

IX. Вершины Сусамырского хребта, надъ западнымъ концомъ долины р. Сусамыръ, въ цв. и пл. 21. VII. 1881, 12.000' (*Фетисовъ!*).

X. По р. Алабугъ, 7.000', 4. VI. 1880, въ цв. и пл. (*A. Регель!*).

XI. По шифернымъ осьпямъ по р. Уракъ-су, близъ перевала Кенколъ, 29. V. 1899, въ цв. и пл. (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ — въ О — Тянь-Шань и S — Памироалай.

Виѣ Туркестана — Сибирь (восточный Алтай, Байкалъ и Забайкалье).

*Примѣчаніе.* Въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды этого рода:

- S. annua Rupr. . . . . — 0 S — (Endem.)
- S. flavissima Kar. et Kir. . . . . — 0 S — (Endem.)
- S. sisymbrioides Rgl. . . . . — 0 — (Endem.)

## 56. *Lepidium* L.

- 1. Растеніе въ видѣ густаго куста. Прикорневые листья перистораздѣльные, стеблевые обыкновенно цѣльные. . . . . *L. karataviense* Rgl. et Schmalh.
- Растеніе иного вида . . . . . 2.
- 2. Стеблевые листья сидячіе, стеблеохватывающіе. 3.
- Стеблевые листья къ основанию суженные . . . . . 4.
- 3. Листья (стеблевые) цѣльнокрайніе, прикорневые — двоякоперистораздѣльные . . . . . *L. perfoliatum* L.
- Листья зубчатые . . . . . *L. repens* Boiss.

### 170. *Lepidium repens* (Schrenk) Boiss. Fl. or. I. p. 356.—1867.

*Physolepidium repens* Schrenk. in *Fischer et Meyer* Enumer. pl. nov. Schrenk. p. 97.—1841.—*Led.*, Fl. ross. I. 766.

1870. *Physolepidium repens*, *Regel Suppl.* II. pl. Semen. № 118g.

Туз. назв.: („Чиртыльдакъ“—запис. О. А. Федченко на Косаралѣ).

I. Пишпекъ, 28. V. 1880, 2.000', въ цв. и пл. (*Фетисовъ!*). III. Чимкентъ (*Съверцовъ!*).

IV. По садамъ, около заборовъ, очень много, 6. V. въ цв. и пл. (*Краузел!*); Ташкентъ (*Маевъ!*), Ташкентъ 1899 (*Хомутово!*).

VI. Моголь-тау, 1. V. въ цв. и пл. (*Скорняковъ!*), Каракурганъ, 20. IV. цв. и незр. пл. (*Съверцовъ!* — лежало въ гербаріи Императ. Бот. Сада подъ названиемъ *L. Draba*, но въ завязи несомнѣнно болѣе 2-хъ сѣменопочекъ!).

XI. Майли-сай, 2. VI. 1878 (*Кушакевичъ!*), Арсланбобъ, 23. V. 1899, цв. и мол. пл. (*Литвиновъ!*).

Видъ этотъ весьма близокъ къ *L. Draba* L. и вѣроятно, представляетъ лишь одну изъ его формъ. Наиболѣе рѣзкимъ признакомъ отличія служитъ количество сѣменопочекъ (по 2 въ каждомъ гибѣдѣ), но мнѣ пришлось встрѣтить (въ Спб. гербаріи) экземпляры *L. Draba* L. изъ Южной Россіи также съ 2 сѣменопочками въ каждомъ гибѣдѣ.

Въ Туркестанѣ распространено широко. Виѣ Туркестана — Афганистанъ, Белуджистанъ.

171. *Lepidium latifolium* L. Sp. pl. ed. 1-a p. 644.—1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 206.—*Boiss.*, Fl. or. I. 359.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 160.

1878. *Lepidium latifolium*, A. Regel Reisebr. 194, 200. 1881. " " " pubescens, Э. Регель Опис. нов. вид. въ А. П. Федченко Пут. въ Турк. вып. 18, № 25.

1883. *Lepidium latifolium*, Franchet Mission Capus 232. Туз. назв.: Сассыкъ-дена (кирг. въ Джанлаганѣ), Саянъ-сабака (перс.) въ Гиссарѣ, Торонъ (узб.) въ Бахчѣ, записано Невѣсими.

II. Карабура, Таласъ, VIII. 1876 (A. Регель!); Караколь. IX. 1876 (A. Регель!).

III. Бородай, 1876 (A. Регель!).

IV. Ташкентъ, въ степныхъ мѣстахъ 8. V. (Маевъ!), въ губернаторскомъ саду, 6. V. 1870 (*Краузел!*), Чаткаль, по полямъ близъ Идрисъ-ней-гамбара, VIII. 1902, въ пл. (Б. А. Федченко!!).

VII. Намангансъ, 17. V. 1878 (*Скорняковъ!*), Намангансъ, солонцеватая степь, 10. IX. (Капю — п. в.).

XI. Чарвакъ, 5. VI. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области не рѣдкое растеніе, хотя выше 6—7.000' въ горы не идетъ. По Туркестану распространено широко, а кромѣ того встрѣчается въ Европѣ, сѣверной Африкѣ, Сибири, Западномъ Тибете.

172. *Lepidium ferganense* Korsh. *Fragmenta Florae Turkestaniae*. I. № 32 (Bulletin de l'Académie Impériale de St. Pétersbourg 1898 Déc. IX. № 5).

1870. *Lepidium coronopifolium* β lacerum elatum, *E. Regel Suppl.* II. pl. Semen. № 115b.

1878. *Lepidium coronopifolium*, *A. Regel Reisebr.* 185.

1899. " *ferganense* Korsh. I. c.

IV. Близъ Ташкента (*Кушакевичъ!*); Бакракъ на Чаткалъ, 8 — 9.000', 1876 (*A. Regel!*).

VI. Моголь-тау 4. V. (*Славерцовъ!*).

VII. Въ долинѣ р. Закъ-сая (притока р. Касанъ-сая), среди кустарниковъ, 30. VIII. 1902, въ цв. и съ пл. (Б. А. Федченко!). Каракурганъ 20. V. 1878 (*Скорняковъ!*).

XI. Майли-сай 2. VI. 1878 (*Кушакевичъ!*). Майли-сай, къ ю. отъ Ибаскана, 1. VI. 1878 (*Кушакевичъ!*). Бл. Джелалабада 2. VIII. 1895 и бл. Каргишъ-мазара по р. Карасу, 15. VIII. 1895 (*C. Коржинский!*); бл. с. Чарвахъ 5. VI. 1899, въ цв. и съ пл. (*Литвиновъ!*), предгорья бл. Базаръ-кургана, 22. V. 1899 (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — Кульджа (*A. Regel!*) и С: — Тахти-сулейманъ, 25. VI. 1878 (*Кушакевичъ!*), сел. Моды, на лессѣ въ пл. 26. VI. 1901 (О. А. и Б. А. Федченко!).

Болѣе нигдѣ не встрѣчается.

173. *Lepidium karataviense* Rgl. et Schmalh. in Regel Descr. pl. nov. fasc. V. № 45 („Acta Horti Petropol.“ V. 242). 1877.

IV. Въ горахъ Карагатау 1882, въ пл. (*Масевъ!*).

Впервые видъ этотъ былъ собранъ А. Регелемъ въ хребтѣ Карагатау, бл. Балакината, въ 1876 г. (внѣ предѣловъ нашей области). Растеніе, собранное *Масевымъ*, было найдено вѣроятно въ горахъ къ С.-В. отъ Ташкента. Отъ близкаго *L. coronopifolium* наше растеніе отличается очень мало и можетъ быть, представлять лишь одну изъ формъ этого полиморфнаго вида.

174. *Lepidium perfoliatum* L. Sp. pl. ed. 1-a p. 643. —

1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 206. — *Boiss.*, Fl. or. I. 362.

I. Предгорья Александровскаго хребта, 15 — 25. IV. 1879. въ цв. (*Фетисовъ!*).

IV. Сырь-Дарья (?) близъ Ташкента, IV. 1880 (*A. Regel!*).

VI. Сырь-Дарья бл. Ходжента, 14. IV. 1880 (*A. Regel!*).

Въ нашей области изрѣдка, какъ сорное растеніе. Встрѣчается по всему Туркестану, не поднимаясь высоко въ горы:

N: — Атассу (*Шренкъ!*); О: — Балхашъ (*Никольский!*), Курдай, Басканъ, Ачи-булакъ (*Кушакевичъ!*), Кульджа (*A. Regel!*), Или, Лепса (*Семеновъ!*); С: — Балыкчи (*Скорняковъ!*), Сарманъ (*O. A. Федченко!*); В: — Закасп. обл., Мангышлакъ (*Беккеръ!*), Каракская степь (*O. A. Федченко!*), Вухара (*A. Regel!*).

Внѣ Туркестана встрѣчается въ Испаніи, по Дунаю, въ ю.-в. Европѣ, на Кавказѣ въ южной Россіи, Персіи, Афганистанѣ и Белуджистанѣ.

*Примѣчаніе.* Изъ рода *Lepidium* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды:

*L. Aucheri* Boiss. . . . . — — W —

*L. cordatum* Willd. . . . . — O S —

*L. coronopifolium* Fisch. . N O — —

*L. crassifolium* W. K. . . . — O S W —

(Закасп. обл.; Кульджа; дол. Сырь-дары — туз. назв.: „Джашма-кулакъ“ по герб. *Ф. Б. Фишера*).

*L. Draba* L. . . . . N O S W —

*L. lacerum* C. A. Mey. . N O — —

*L. obtusum* Basin. . . . . — — W (Endem.)

(Хива — Базинъ!; Чарджуй — *Литвиновъ!*; Каракуль, Ханова — *A. Regel!*).

*L. persicum* Boiss.

*L. ruderale* L. . . . — O S W —

Всюду какъ сорное растеніе, и въ нашей области не собрано, очевидно, лишь по недосмотру. Въ горахъ поднимается до 10.000', начиная альпийской зонѣ. Туземн. назв.: „теке-сакаль“ и „пашикъ-чубъ“ (запис. О. А. Федченко!).

*L. subalpinum* Komar. . . . — S — (Endem.).

### 57. *Hymenophysa* C. A. Mey.

175. *Hymenophysa pubescens* C. A. Mey. in *Led.*, Ic. fl. ross. I. 165. — 1831. — *Led.*, Fl. alt. III. p. 181. — 1831. — *Led.*, Fl. ross. I. 208.

Туз. назв.: („Андау“ — на низовьяхъ Сырь-Дарьи). IV. По верхнему Чаткалу, 2. VII. 1899, посл. цв. и пл. (*Литвиновъ!*). Экземпляры очень плохие, повидимому, первые стебли были объедены скотомъ и развились только вторичные стебли отъ корней.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — Тянь-шань, W: — пустыни по Сырь-Дарье.

Въ Туркестана — Локтевскъ въ Южномъ Алтай.

Изъ рода *Winklera* въ Туркестанѣ встрѣчаются два вида:

- 1) *W. patrinoides* Rgl. S: Кулабъ, Мумынавадъ VI. 1884, въ цв. (*A. Регель!*), Дарвазъ IV. 1884, Хазреть-Султанъ V., VI. (*A. Регель!*), Чорабдара, Кзыль-су V. 1884 (*A. Регель!*), Чильдара на р. Вахшъ (*A. Регель!*).

- 2) *W. silaifolia* (Hook. et Thoms.) Korsh. — S: Дарвазъ (*Алексеенко!*, *Коржинский!*); Рошанъ (*Коржинский!*) Шугнанъ (*O. A. и Б. А. Федченко!*, *Коржинский!*). — Также въ Афганистанѣ на Гиндукушѣ.

### 58. *Aethionema* R. Br.

Многолѣтнее полукустарное растеніе. Стручекъ безкрылый . . . . . *A. trinervium* Boiss.  
Однолѣтнее растеніе. Стручекъ крылатый. *A. carneum* m.

176. *Aethionema carneum* (Soland.) B. Fedtsch. *Thlaspi carneum*, Soland in Russel, The natural history of Aleppo II. p. 257. t. 11 (я видѣлъ 2-ое изданіе 1794 г.; 1-ое изданіе было 1756 г.).

*Thlaspi peregrinum* Poir. Dict. II. 541.  
*Aethionema cristatum*, DC. Syst. Veg. II. 560. — *Led.*, Fl. ross. I. 207. — *Boiss.*, Fl. or. I. 352.

1896. *Aethionema cristatum*, Комаровъ Заравшанъ № 192. V. Емуртканъ, между Ангреномъ и Коканомъ V. 1880 (*A. Регель!*).

XI. Бл. Узгента, 4.000', 28. V. 1880 (*A. Регель!*).  
(180)

Въ нашей области изрѣдка встрѣчается въ полосѣ предгорий.

Въ Туркестанѣ известно въ S: — Заравшанъ (*B. Комаровъ!*) и W: — Бухара (*Капю*), Закаспійская обл. (*Литвиновъ!*, *Коржинский!*, *Радде!*).

Въ Туркестана — Закавказье, Арmenія, Персія, Афганистанъ, Белуджистанъ.

177. *Aethionema trinervium* (DC.) Boiss. Fl. or. I. 342.—1867.

*Hutchinsia trinervia*, DC. Syst. Veg. II. 387.—1821. 1870. *Aethionema sagittatum*, E. Regel Suppl. II. pl. Semen. № 118h.

III. Карагату, 11. V. 3.000', въ цв. (*Съверцовъ!*).

Въ Туркестанѣ встречается еще въ N: — Карагузъ въ горахъ Карагату и W: — Закаспійская область (*Вальтеръ!*, *Литвиновъ!*).

Въ Туркестана: Эрзерумъ, Перея, Карабахъ (Закавказье).

Собранные *Съверцовыми* (или скорѣе *Скорняковыми*) растеніе было отнесено Э. Регелемъ къ *A. sagittatum* Boiss. Отличія этихъ двухъ видовъ очень незначительны и можетъ быть они представляютъ лишь формы одного и того же вида. Въ общемъ гербаріи Императорскаго Сиб. Ботаническаго Сада лежать экземпляры *A. trinervium* изъ Арmenіи (*Aucher!*) и Карабаха (*Buhse!*), которые отнесены *Buassey* къ его разновидности *ovalifolium* и повидимому, тождественны съ растеніемъ Съверцова. Въ типической формѣ *A. trinervium* имѣть менѣе широкіе листья, но съ этой формой тождественно растеніе, собранное въ Карагату же (Карагузъ, V. 1876) Альб. Регелемъ, уже виѣ предѣловъ нашей области.

Что касается числа жилокъ въ пластинкѣ листа, то у нашей формы, какъ и у некоторыхъ экземпляровъ изъ Арmenіи, обыкновенно въ листѣ три жилки проходятъ до конца листа, а при основаніи его есть еще двѣ боковыхъ (по одной справа и слѣва), идущихъ до  $\frac{1}{3}$  или до  $\frac{1}{2}$  длины листа. У *A. trinervium* Общаго Сиб. гербарія мы видѣли листья и съ 5 жилками. Экземпляръ же въ обложкѣ *A. trinervium* съ этикеткой „m. Bachtiar. Воде“ повидимому, вовсе сюда не относится.

Изъ рода *Dilophia* въ Туркестанѣ встрѣчается лишь *D. salsa* Thoms. (= *D. kaschgarica* Rupr.): О — альп. обл. Тянь-Шаня (*Brotherus!*, *Останъ-Сакенъ!*); С — Памиръ (*O. A. и Б. А. Федченко!!* и др.).

### 59. *Stubendorffia* Schrenk.

**178. *Stubendorffia orientalis* Schrenk. Fisch. et Mey.**  
Diagn. pl. nov. in „Bull. phys. math. Acad. de St. Petérsb“. III.  
p. 309. — 1845.

1878. *Stubendorffia orientalis*. A. Regel Reisebr.  
185, 189.

II. Айгириакъ на верхнемъ Таласѣ, VIII. 1876, безъ пл. (*A. Регель!*).

IV. Чаткаль, VIII. 1876, въ пл. (*A. Регель*), низовья Майдантала, 4. VIII. 1902, въ пл. (*Б. А. Федченко!*), Кенсай-Бакракъ и въ дол. Чаткала по р. Суашу у посёлдніхъ ауловъ (*A. Регель* — п. в.), по р. Андаульганау, 7. VIII. 1902 (*Б. А. Федченко!!*).

VII. Емурткаакъ, на южномъ склонѣ перевала съ Ангрена въ Коканѣ, 5. VI. 1880 (*A. Регель!* — собрано *Мусою*).

X. Алабуга, 4. VI. 1880 (*A. Регель!* — въ Общемъ гербарии); уроч. Каракуль, на склонахъ горъ, 13. VIII. 1895, въ пл. (*С. Коржинский!*).

Въ нашей области довольно рѣдкое растеніе травянистыхъ луговъ и склоновъ. Въ Туркестанѣ известно еще въ О: — предгорья Джунгарскаго Алатау (*Шренкъ!*), пер. Курдай 23. VI. 1880 (*A. Регель!*) и С: — пер. Кулиартъ-бель (*O. Федченко!*). Алай и Каратегинъ (*Коржинский!*).

Внѣ Туркестана неизвѣстно.

*Примѣчаніе.* Другой видъ, *Stubendorffia aptera* Lipsky, встрѣчается въ С: — Гиссаръ (*Липский*).

### 60. *Isatis* L.

**179. *Isatis tinctoria* L. Sp. pl. ed. 1-a p. 670. — 1753. —**  
*Led.*, Fl. ross. I. 212. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 163. — *Boiss.*, Fl. or. I. 380.

#### *Var. tianschanica* B. Fedtsch.

*Silicula puberula, imprimis area longitudinalis intermedia.*  
1877. *Isatis latisiliqua*, A. Regel Gartenfl. 9.

IV. На Чаткаль, Айгралякъ (*A. Регель!* — п. в.); Санталашъ, на глинисто-каменныхъ склонахъ въ низовьяхъ Чаракъ-сая, 15. VIII. 1902, въ пл. (*Б. А. Федченко!!*).

XI. Узгентъ, 4.000', въ цв. и съ изэр. пл. V. 1880 (*A. Регель!*); по р. Карагунгуръ, каменистая осыпь, 30. V. 1899, цв. и мол. пл. (*Литвиновъ!*).

Встрѣчающееся изрѣдка въ нашей области растеніе не вполнѣ схоже съ обычной *I. tinctoria* L. Къ этой формѣ (var. *tianschanica* B. F.) относятся еще растенія, собранныя въ О: — *Кушакеевичъ!* по р. Дженишке-тентекъ 2. VI. 1873, въ цв. и пл. и на Джасылъ-кулѣ, 27. V. 1873, въ цв. и съ изэр. пл., а также на Талгарѣ (*Семеновъ!*) и на Аксу (*Красновъ!*).

Въ различныхъ видоизмѣненіяхъ *I. tinctoria* распространено вообще чрезвычайно широко: Европа, Сибирь, Малая Азія, Персія.

*Примѣчаніе.* Въ Туркестанѣ встрѣчается еще не мало видовъ *Isatis*:

*I. Aitchisoni* Korsh. . . . . — — — W (Endem.)

*I. aleppica* Scop. . . . . — — — W —

*I. Boissieriana* Rehb. f. . . . . — — S — (Endem.)

(= *I. heterocarpa* Rgl. et Schmalh.; встрѣчается преимущественно на Заравшанѣ (Самаркандъ!! и др. мѣста), но найдено также и бл. Чиназа, по правому берегу р. Сырь-Дары (*A. Регель!*), очень недалеко отъ границъ нашей области. Нѣсколько лѣтъ культивируется у меня въ Ольгинскомъ саду (Можайск. у.); сохраняетъ свои отличительные признаки, но въ климатѣ Средней Россіи не развивается роскошно, къ тому же сильно страдаетъ отъ вредныхъ жуковъ *Haltica*).

*I. bullata* Aitch. et Hemsl. . . . . — — — W —

*I. costata* C. A. Mey. . . . . — O — — —

*I. emarginata* C. A. M. . . . N O — W —

(incl. *I. violascens* Bge.)

(Широко распространено по песчанымъ степямъ Туркестана: N: — Клы (*Карелинъ* и *Кириловъ!*); O: — Кульджа:

Суйдунъ, Или (*A. Регель!*), W: — Закасп. обл.; между г. Туркестаномъ и Казалинскомъ (*Садовский!*); Кизылъ-кумы (туземн. назв. „теке-сакаль“, запис. *O. A. Федченко!*), Хола-аты, 26. IV. 1873 (*Корольковъ и Краузе!*); пустыня бл. Аральского моря, берегъ Сыръ-дары (*Борщевъ!*).

*I. frutescens* Kar. et Kir. . N — — — (Endem.)  
*I. minima* Bge. . . . . N O S W —

(= *I. songorica* Schrenk.; широко распространено по песчанымъ степямъ и пустынямъ: N: — Балхашъ; O: — Суйдунъ (*A. Регель!*), Хоргостъ (*Красновъ!*); S: — Кабадіанъ, устье Вахша (*A. Регель!*); W: — Кизылъ-кумы (*O. A. Федченко!* и др.). Закасп. обл. Джингильды, между Каракаты и Адамъ-кирульганомъ, на орошенному полѣ (*Корольковъ и Краузе!*), къ югу отъ Чарджуя.

*I. trachycarpa* Trautv. . . — — — W —  
*I. turcomanica* Korz. . . — — — W (Endem.)

Изъ рода *Sameraria* въ Туркестанѣ встрѣчается одинъ видъ: *S. armena* (L.) Boiss.: W.

### 61. *Tauscheria* Fisch.

180. *Tauscheria lasiocarpa* Fisch. in DC. Syst. Veg. II. 563. — 1821. *Led.*, Fl. ross. I. 213. — *Boiss.*, Fl. or. I. 371. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 164.

1881. *Isatis lasiocarpa*  $\alpha$  *typica*, *Э. Регель* Опис. нов. вид. № 26 in *A. П. Федченко* Пут. въ Туркест. вып. 18.

IV. Горы Карагатау 1882 (*Маевъ!*), Ташкентъ, 1.400', 1871 (*O. A. Федченко!*).

Въ нашей области встрѣчается не часто, но въ Туркестанѣ широко распространено: N: — Балхашъ (*Никольский!*), Кокбекты (*Потанинъ!*), O: — Борборогусунъ и Сиганшу (*A. Регель!*) S: — Терсагартъ (*Невъский!*) Тараща въ Заалайскомъ хребтѣ (*C. Коржинский!*), Новый Маргеланъ (*A. Регель!*), Заравшанъ (*B. Комаровъ!*); Памиръ: Яшель-куль (*Наульсенъ!*); W: — Нура-тау (*Глазуновъ!*).

Var. *gymnocarpa* (*Fisch.*) *Boiss.* *Boiss.* Fl. or. I. 372.

*Tauscheria gymnocarpa* *Fisch.* in DC. Syst. Veg. II. 564.—*Led.*, Fl. ross. I. 213.

(184)

1881. *Isatis lasiocarpa*  $\beta$  *gymnocarpa*, *Э. Регель* I. с. IV. Ташкентъ, по садамъ, 6. V. 1870, въ цв. и съ изр. пл. (*Краузе!*).

VI. Моголь-тау (*Сверцовъ!*).

Рѣже предыдущей формы. Въ Туркестанѣ распространено также широко: N: — Индерскія горы (*Смирновъ!*). O: — Чугучакъ (*Куртцъ!*), Чу (*Кушакевичъ!*), Баяндай (*A. Регель!*); S: — Новый Маргеланъ (*A. Регель!*), Балыкчи (*Скорняковъ!*), Ходжентъ (*Сверцовъ!*); W: — Каракская степь (*O. A. Федченко!*), Сыръ-дарья (*Голике!*).

Виѣ Туркестана видъ этотъ встрѣчается въ Персіи, Гималаяхъ, Западномъ Тибетѣ, южной части Томск. губ. и на ю.-в. Европѣ. Россіи.

### 62. *Lachnoloma* Bge.

181. *Lachnoloma Lehmanni* Bge. in Del. sem. horti Dorpat. 1843. p. VIII. — *Boiss.*, Fl. or. I. 369.

1870. *Lachnoloma Lehmanni*, *E. Regel Suppl.* II. pl. Semen. № 120bb.

IV. Ташкентъ (*Кушакевичъ!*), Сыръ-дарья (?) близъ Ташкента, IV. 1880, въ цв. (*A. Регель!*).

VI. Правый берегъ Сыръ-дары у Ходжента, 14. IV. 1880, въ цв. (*A. Регель!*); Моголь-тау IV. (*Сверцовъ!*).

Въ нашей области встрѣчается рѣдко, заходить къ намъ изъ полосы пустынь, гдѣ представляется одно изъ характерныхъ растеній. Такой характеръ распространія сохраняется по всему Туркестану: O: — Заходить въ Тянь-шань: Буамское ущелье 17. VI. 1880 (*A. Регель!*), также Баяндай 5. V. 1878, въ цв. и пл., и западнѣе Борохудзира, 2.500', 2. VI. 1878, въ пл. (*A. Регель!*); S: — Фергана: Балыкчи, 24. IV. 1878, въ цв. (*Скорняковъ!*), Кабодіанъ до 3.000', (*A. Регель!*); W: — Катты-кургантъ (*O. A. Федченко!*), Джигыльды между Каракъ-ата и Адамъ-кирульганомъ, 18. IV. 1873 (*Корольковъ и Краузе!*), Кизылъ-кумы (*O. A. Федченко!*).

Кромѣ Туркестана, нигдѣ не показано.

*Octoceras Lehmannianum* Bge. встрѣчается въ W: — глинистая пустыня — Агатме, Бакали, бл. Сыръ-дары (*Леманъ!*).

(185)

*Spirorhynchus sabulosus* Kar. et Kir., „Кизыль-чубъ“, встречается въ пустыняхъ: О: — Саготы (*Красновъ!*), W: — Закасп. обл.; Кизыль-кумы. — Указывается также для Персии.

### 63. *Neslia* Desv.

182. *Neslia paniculata* (L.) Desv. Desv. Journ. Bot. III.  
162. — 1813. *Led.*, Fl. ross. I. 214. — *Boiss.*, Fl. or. I. 371. —  
Fl. br. Ind. I. 164.

*Myagrum paniculatum*, L. Sp. pl. ed. 1-a p. 641 — 1753.  
1902. *Neslia paniculata*, O. A. Федченко Списокъ № 164.  
Туз. назв.: „Кукъ-чачакъ“ (киргиз.).  
IV. Между Ташкентомъ и Келесомъ, 1.300', сады, 22.  
IV. 1871 (*O. A. Федченко!*), Чимганъ, Красная гора, 18. VIII.  
1897 (*O. A. Федченко!*), Ташкентъ, 1882 (*A. Регель!*).  
XI. Арсланбобъ, 25. V. 1899, въ цв. и съ пл. (*Литвиновъ!*).  
Въ Туркестанѣ: О: — Иссыкъ-куль (*A. Регель!*), S: — Заравшанъ (*B. Комаровъ!*), W: Закасп. обл. (*Литвиновъ!*).  
Кромъ того, во всей Европѣ, Сибири, Сиріи, Малой Азіи, Персии, Афганистанѣ, въ Гималахъ.

### 64. *Pachypterygium* Bge.

- Стручечки съ узкимъ краемъ, не вытянутымъ  
впередъ . . . . . P. multicaule Boiss.  
Окрайна стручечка не широкая, но вытянутая  
далеко впередъ . . . . . P. brevipes Bge.

183. *Pachypterygium multicaule* (Kar. et Kir.) Boiss. Fl.  
or. I. 374. in adnot. ad *P. lamprocarpum* Bge. — 1867.

*Pachypterus multicaulis* Kar. et Kir. Enum. pl.  
song. № 127. („Bull. de la Soc. Impér. des Natur. de Moscou“).  
1842. p. 159. — *Led.*, Fl. ross. I. 767.

1870. *Pachypterus multicaulis* Kar. et Kir. β dasycarpa  
*E. Regel* Suppl. II. pl. Semen. № 119c.

1881. *Pachypterygium multicaule* β dasycarpum, Э. Регель  
Опис. нов. вид. № 24 in A. П. Федченко Путеш. въ  
Туркест. вып. 18.

VI. Моголь-тау (*Съверцовъ!*).

(186)

Въ нашей области встречается рѣдко, лишь на крайнемъ югѣ, но въ Туркестанѣ распространено вообще довольно широко:

N: — Карагатай: Учтюбе (*A. Регель!*), О: — Джунгарія;  
S: — Заравшанъ.

Въ Туркестана известно.

184. *Pachypterygium brevipes* Bge. Delect. Sem. h. Dorpat.  
1843. p. VIII. — *Boiss.*, Fl. or. I. 374.

Var. *hirtulum*, Rgl. in A. П. Федченко Путеш. въ Турк. вып. 18.

XI. По р. Каракуртъ, 30. V. 1899, цв. и пл. (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ встречается еще въ S и W.

Въ Туркестана известно еще въ Персии.

Приимѣчаніе. Изъ рода *Pachypterygium* въ Туркестанѣ встречается еще слѣдующіе виды:

- P. densiflorum* Bge. . . . — S — —  
(Дарвазъ, *C. Коржинскій!*)  
*P. lamprocarpum* Bge. . . — O — —  
*P. stelligerum* Franchet . . — — — W (Endem.)

### 65. *Goldbachia* DC.

185. *Goldbachia laevigata* (M. B.) DC. Syst. Veg. II. 577.—  
1821. — *Led.*, Fl. ross. I. 215. — *Boiss.*, Fl. or. I. 243. — *Hook.*,  
Fl. br. Ind. I. 166.

*Raphanus laevigatus*, M. B. Fl. taur. cauc. II.  
129. — 1808.

1870. *Goldbachia laevigata* β adscendens, E. Regel  
Suppl. II. pl. Semen. № 120.

1877. *Arabis Korolkowi* Rgl. et Schmalh. E. Regel Deser.  
pl. nov. V. 232.

1902. *Goldbachia laevigata* v. adscendens, O. A. Федченко  
Списокъ № 165.

III. Чимкентъ (*Съверцовъ!*).

IV. Ташкентъ, сады на Боссу, 6. IV. 1871, степь на  
Боссу, 11. IV. 1871 (*O. A. Федченко!*); Ташкентъ, 1899 (*Хо-  
мутово!*); между Ташкентомъ и Каракъ-ата, на пескахъ  
(*Короликова* и *Краузел!*).

V. Карасу, 9. IV. 1880, въ цв. (*A. Регель!*).

(187)

Въ нашей области встрѣчается нерѣдко въ нижней зонѣ. Въ Туркестанѣ распространены въ S: — Ходжентъ 1880 (A. Regel!), Фергана: Балыкчи, 25. IV. 1878 (*Скорняковъ!*), Заравшань (O. A. Федченко! и др.); экземпляры съ этикеткой „Памиръ, Акъ-байталъ, Кушакевичъ“ врядъ ли собраны на Памирѣ; W: — Закасп. обл.; Хива (Хазараспъ, 28. V. 1873, *Королковъ и Краузе!*).

Виѣ Туркестана — Кашмиръ, Пенджабъ, Афганистанъ, Белуджистанъ, Персія, Турція, Малая Азія.

*Примѣчаніе.* Въ Туркестанѣ встрѣчается еще близкій видъ: *G. verrucosa* Komar., открытъ онъ былъ въ S: — въ Могіанѣ (*В. Комаровъ!*), а затѣмъ найденъ въ Кабадаинскомъ бекствѣ, на Бабатагѣ, 14. V. 1897 (*Коржинскій!*).

Изъ р. *Anchonium* въ Туркестанѣ встрѣчается 1 видъ: *A. elichrysifolium* Boiss. v. *violaceum* Kom.: S: — Заравшань.

## 66. *Cryptospora* Kar. et Kir.

186. *Cryptospora falcata* Kar. et Kir. in Enumer. pl. Songor. № 131. („Bulletin de la Soc. Impéiale des Naturalistes de Moscou“, XV). 1842.—*Led.*, Fl. ross. I. 768.

1902. *Cryptospora falcata*, O. A. Федченко, Списокъ № 166. Туземн. назв.: Чатыръ (кирг.—записано О. А. Федченко).

IV. Ташкентъ, степь на Боссу, 11. IV., сады на Саларѣ, 9. IV., окр. Ташкента, 15. IV., между Ташкентомъ и Келесомъ, садъ, 22. IV. 1871, 1.300' (O. A. Федченко!), Ташкентъ 1882 (*Масевъ!*), въ садахъ (въ Ташкентѣ — *Краузе!*), горы Карагатау, 1882 (*Масевъ!*), Ташкентъ, 1899 (*Холмутовъ!*). .

V. Арайдованъ, 1880 (A. Regel!).

Въ нашей области не рѣдко, какъ сорное растеніе, на юго-западѣ, въ полосѣ степей и предгорий.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: Джунгарія и S: Заравшань; Фергана: Ошъ, 25. VI. 1878 (*Кушакевичъ!*); W: Асхабадъ (*Литвиновъ!*).

## 67. *Brassica* L.

1. Стеблевые листья сидячіе, или съ стеблехва-  
тывающимъ основаніемъ. Створки стручка  
съ 1 жилкой . . . . . 2.

(188)

Стеблевые листья при основаніи суженные  
или черешковые. Створки стручка обыкно-  
венно съ 3 жилками . . . . .

*B. juncea* (L.) Czern.

2. Во время цветенія верхние цветы превышаютъ  
цветочные почки. Чашелистики въ концахъ  
цветенія горизонтальные . . . . .

*B. rapa* L.

Верхние цветы не превышаютъ цветочныхъ  
почекъ; кисть рѣдкая; чашелистики косо  
вверхъ стоячіе . . . . .

*B. Napus* L.

187. *Brassica rapa* L. Sp. pl. ed. 1a, p. 666.—1753.—*Led.*,  
Fl. ross. I. 216.—*Boiss.*, Fl. or. I. 391.

*B. campestris* subsp. 1 и subsp. 3, *Hook.*, Fl. br.  
Ind. I, 156.

1896. *Brassica rapa*, *Коржинскій*, Очерки 51.

1902. „ „ „ O. A. Федченко, Списокъ № 168.

IV. По Салару (O. A. Федченко!).

VII—XI. Разводится въ Ферганѣ (*C. Коржинскій!*).

Изрѣдка разводится въ нашей области. Въ Туркестанѣ вообще культивируется не часто: О, С.

Виѣ Туркестана — Европа, Западная Азія, Индія, Китай, Египетъ.

188. *Brassica Napus* L. Sp. pl. ed. 1a, p. 666.—1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 217.—*Boiss.*, Fl. or. I. 392.

*B. campestris* subsp. 2 *Napus*, *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 156.

IV. Ташкентъ, въ садахъ (*Краузе!*).

XI. Арсланбобъ, 26. V. 1899, въ пл. (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области рѣдкое сорное растеніе. Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: Джунгарія, предгорья Тянъ-шаня; указывается также для S: Заравшань.

Кромѣ того — Европа, Западная Азія до Индіи.

189. *Brassica juncea* (L.) Czern. Conspl. pl. Charcov. p. 8.—  
1859.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 157.

*Sinapis juncea*, L. Sp. pl. ed. 1a, p. 668.—1753.—*Boiss.*, Fl. or. I. 394.

*Brassica Besseriana* Andrz. in Ind. VII. Sem. Horti  
Petropol. anni 1841. p. 57.

1878. *Brassica Besseriana*, A. Regel., Reisebr. 200.

II. Караколь, въ пл., IX. 1876 (A. Regel!).

(189)

Въ нашей области очень рѣдко, какъ сорное растеніе, Въ Туркестанѣ встрѣчается въ О: Лепсискъ!, С: Заравшанъ! и W: Хива!

Въ Туркестана — разводится и какъ сорное въ южной Россіи, Сибири, Японіи и Остѣ-Индіи.

*Приимѣніе.* Изъ рода *Brassica* въ Туркестанѣ встрѣчается еще *B. elongata* Ehrh. v. *integrifolia* и *B. argensis* (L.) Bent. Hook.: О и W.

Изъ рода *Moricandia* DC. въ Туркестанѣ встрѣчаются два вида:

*M. Winkleri* Rgl.: С: Гиссаръ, Сараї на р. Пяндже въ Кулябѣ, Балъджуанъ и Кабадіанъ (*A. Регель!*) и *M. tiverosa* Komar. С: Могіаинъ (*B. Комаровъ!*) — одно изъ самыхъ замѣчательныхъ растеній Заравшанской флоры.

### 68. *Eruca* DC.

190. *Eruca sativa* Lam. Fl. fran . II. 496. — *Led.*, Fl. ross. I. 221. — *Boiss.*, Fl. or. I. 396. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 158.

*Brassica Eruca*, L. Sp. pl. ed. 1a p. 1753.

1870. *Eruca sativa*, *E. Regel Suppl.* II. pl. Semen. № 120e.

1878. " *A. Regel Reisebr.* 167.

1878. " *A. Regel Reisebr.* 177.

1881. Indau, *Middendorff*, Ferghana 259.

1896. *Eruca sativa*, *Коржинский*, Очерки 51.

1898. " " *Шахназаровъ*, 352.

1902. " " *O. A. Федченко*, Списокъ № 170.

Туземн. назв.: Индау.

III. Между Арысомъ и Бугунью, 24. V., въ цв. (*Съверцовъ!*), Чимкентъ, въ цв. въ янв. — февр. (*Съверцовъ!*).

IV. Между Орскомъ и Ташкентомъ, V. 1870 (*O. A. Федченко!*); Ташкентъ 3. V. въ цв. (*Краузел!*); Ташкентъ, разводимое, VIII. 1876, въ пл. (*A. Регель!*); Ташкентъ, 1882 (*Маевъ!*), передъ Ходжакентомъ (*A. Регель* — п. в.).

Развод. въ Туркестанѣ вообще и въ Ферганѣ (*Шахназаровъ!*, *Коржинский!*), сорная трава въ Ферганѣ (*Миддендорфъ!*).

(190)

XI. Чарвакъ, сорное, цв. и пл. 5. VI. 1899 (*Литвиновъ!*). Разводится не рѣдко, какъ масличное растеніе. Встрѣчается и какъ одичалое и сорное.

Въ Туркестанѣ распространено очень широко: О: — Вѣриое, Илійскъ, Джергалаинъ; С: — Заравшанъ, Фергана: до Андижана и Гульчи (?); W: — Хива.

Въ Туркестана — Южная Европа, Канарскіе острова, Сѣверная Африка, Индія, Афганистанъ, Арменія, Кавказъ, Сирія.

### 69. *Stroganovia* Kar. et Kir.

191. *Stroganovia paniculata* Rgl. et Schmalh. in *E. Regel*, Descr. pl. novar. fasc. V („Acta Horti Petropol.“ V. 242) 1877.

1877. *Stroganovia paniculata*. *E. Rgl.* l. c.

1878. " " *A. Regel Reisebr.* 185.

IV. Бакракъ на Чирчикѣ, 8—9.000', VIII. 1876, уже безъ плодовъ (*A. Регель!*), Чаткаль, близъ Бишъ-арала, 4. VII. 1899 цв. и мол. пл. (*Литвиновъ!*), долина Чимгана, 1899—1900 (*E. Холмутова!*); Малый Чимгантъ, VII. 1901, въ цв. (*E. Холмутова!*).

VII. Гава, 22. V. 1878, въ цв. (*Скорняковъ!*).

Въ Туркестанѣ встречается еще въ С: Зеравшанъ (*O. Федченко!* и др.).

Въ Туркестана неизвѣстно.

*Приимѣніе.* Изъ рода *Stroganovia* для Туркестана приводятся еще слѣдующіе виды:

*S. brachyota* Kar. et Kir. . . . N — — (Endem.).

*S. intermedia* Kar. et Kir. . . . — O — W? (Endem.).

(= *Lepidium Kirilowi Trautv.*)

*S. sagittata* Kar. et Kir. . . . — O — — (Endem.).

### 70. *Crambe* L.

192. *Crambe Kotschyana* Boiss. in Diagn. pl. nov. or. Ser. I fasc. 6 p. 19. — 1845. — *Boiss.*, Fl. or. 406 — *Липскій*, Мат. для фл. Средн. Азіи II („Acta H. P.“ XXIII. 83).

*C. cordifolia* (ex parte) *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 165.

1877. *Crambe Severzowi*, *Rgl.* Descr. pl. nov. in „Acta Horti Petr.“ V. 243.

(191)

1877. *Crambe palmatifida* Rgl. et Schmalh. in *Rgl.* l. c. V. 243.  
 1896. „ *Severzowi* Rgl., *Конаровъ*, Зеравшанъ № 220.  
 1902. „ *Severzowi*, *O. A. Федченко*, Списокъ № 172.  
 Туз. назв.: („дадранъ“ — въ Закасп. обл.).

IV. Гора Адринанъ на рѣчкѣ Тирсъ, 10. V., въ цв. (*Краузе!* — оригиналъный экземпляръ *C. palmatifida* Rgl. et Schmalh., отличается болѣе обильнымъ опушениемъ соцвѣтія, хотя и типичные *C. Kotschyana* опущены въ соцвѣтіи); степь между Сыръ-дарьеи и Ташкентомъ, 20. V. 1871 (*O. A. Федченко!*).

Въ нашей области — изрѣдка въ степяхъ и предгорьяхъ, пока найдено лишь на ю.-з.

Въ Туркестанѣ встрѣчается: О — горы Кендыкъ-ташъ (*Красновъ!*), S — Фергана: Алайскій хребетъ (*O. A. Федченко!*), Заравшанъ (*O. A. Федченко!* и др.), Кхарлы-тау (*Съверцовъ!*) W — Закасп. обл. (*Литвиновъ!*, *Вальтеръ!* — собрано къ востоку отъ Мургаба, тамъ же записано и туземное название — см. выше; туземцы употребляютъ корень, какъ кормъ для верблюдовъ).

Встрѣчается также въ Персіи, Афганистанѣ и Белуджистанѣ.

*Приимѣніе.* Изъ рода *Crambe* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды:

- C. darvasica* Korsh. . . . — — S — (Endem.).  
*C. orientalis* L. . . . — — S — —  
*C. schugnana* Korsh. . . . — — S — (Endem.).

Изъ рода *Raphanus* въ Туркестанѣ разводится одинъ видъ: *R. sativus* L.

Изъ рода *Rapistrum* въ Туркестанѣ встрѣчается1 видъ: *R. rugosum* (L.) All.: W — Закасп. обл.

*Приимѣніе.* Нижеслѣдующія литературныя указания остаются для меня совершенно невыясненными:

- 1) *Cruciferen*: 1882 *A. Regel* *Gartenfl.* 362: *Tujuk-su*.  
 2) *Cruciferen*: 1878 *A. Regel* *Reisebr.* 181: выше  
 Бричъ-муллы.  
 3) *Dontostemon*: 1882 *A. Regel* *Gartenfl.* 362: верх-  
 нее течение р. Яссы.

## VI. Capparidaceae.

### 71. *Capparis* L.

193. *Capparis spinosa* L. Sp. pl. (ed. 1a) p. 503. 1753. — *Boiss.*, Fl. or. I. 420. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 173.

*C. herbacea* Willd.; *Led.*, Fl. ross. I. 234.

1877. *Capparis spinosa*, *A. Regel* *Reisebr.* 368.

1878. „ *herbacea*, *A. Regel* *Reisebr.* 169.

1878. „ *A. Regel* *Reisebr.* 172.

1883. „ *spinosa* v. *aegyptiaca*, *Franchet Mission Capus* 236.

1896. *Capparis spinosa* *Коржинскій*, Очерки 51.

Туземн. назв.: Кауль.

III. Чимкентъ (*A. Regel!*), Боролдай, 1876 г. (*A. Regel!*).

IV. Ташкентъ, VII. 1876, въ пл. (*A. Regel!*); тамъ же (*Краузе!*, *Кушакевичъ!*, *Горольковъ!*); Каратау, 1882 (*Масевъ!*); с. Каврай (*A. Regel!*); близъ кипп. Акъ-кавакъ въ долинѣ Чирчика, VII. 1902 (*B. A. Федченко!*); въ стени бл. Ташкента, VII. (*Капю!*).

V. Ганжулага, 17. V. 1880 (*A. Regel!*).

VI. Моголь-тау, 4. V. (*Скорняковъ!*); тамъ же, 2000'.  
 15. IV. 1903 (*Невескій!*)<sup>1)</sup>.

VII. Дико (*Коржинскій*).

VIII. Толокъ — Кетмень-тюбе (*Сорокинъ!*). Кокукеренъ, южный склонъ Сусамырского хребта, 4.000', 8. VIII. 1881, въ пл. (*Фетисовъ!*).

XI. Дико (*Коржинскій*).

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ О: по Или, Талды (*A. Regel!*), S: — Гиссарь, Кабадіанъ, Джизакъ, Уратюбе (*A. Regel!*), Андижанъ (*Скорняковъ!*); W: Закасп. обл. (*Литвиновъ!*), Хива (*Горольковъ* и *Краузе!*).

Въ Туркестана встрѣчается въ Крыму, на Кавказѣ, въ южной Европѣ, Сѣверной Африкѣ, Сиріи, Месопотаміи, Персіи, Афганистанѣ, Индіи; Австралія и Сандвичевы острова; Китайскій Туркестанъ, Гоби, Тибетъ, Индія.

<sup>1)</sup> Во время печатанія нашей работы въ Императорской Ботанической Садѣ поступилъ гербарій, собранный на Моголь-тау лѣтомъ 1903 г. Михаиломъ Ивановичемъ *Невескимъ*.

Изъ рода *Capparis* въ Туркестанѣ встрѣчается еще одинъ видъ — *C. Rosanowiana* B. Fedtsch. (S: въ горной Бухарѣ).

Изъ сем. *Capparidaceae* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще представители р. *Cleome* — *C1. Noeana v. hispida* Rgl, *C1. Raddeana* Trautv. и затѣмъ — *Buhsea trinervia* (DC.) B. Fedtsch.

## VII. Resedaceae.

### 72. Reseda L.

**194. *Reseda luteola* L.** Sp. pl. (ed. 1a) p. 448.—**1753.** — *Led.*, Fl. ross. I. 235. — *Boiss.*, Fl. or. I. 434.

IV. Ташкентъ, VI. 1881, въ пл. (А. Регель!), близъ Ташкента (*Кушакевичъ!*), Ташкентъ, VII. 1882, въ цв. (*Масовъ!*).

Въ Туркестанѣ встречается еще въ S: Самарканда (О. А. и Б. А. Федченко!!); Каратегинъ, Кулябъ (А. Регель!), Файзабадъ (*Невъскій!*) и въ W: Красноводскъ (О. А. и Б. А. Федченко!!).

Виѣ Туркестана — въ западной и южной Россіи, въ средней и южной Европѣ, сѣверной Африкѣ, Персіи, Ассиріи, Малой Азіи, Сѣв. Америкѣ (введено).

*Приимѣніе.* Въ Туркестанѣ встречаются еще:

*R. lutea* L.

*R. Aucheri* Boiss.

*R. bucharica* Litw.

## VIII. Daticaceae.

### 73. *Datisca* L.

**195. *Datisca cannabina* L.** Sp. pl. (ed. 1a) p. 1037.—**1753.** — *Led.*, Fl. ross. I. 238. — *Boiss.*, Fl. or. II. 763. — *Hook.*, Fl. br. Ind. II. 656.

Туземн. назв.: Канапъ.

VI. Близъ кишлака Искандеръ въ долинѣ Чирчика 15. VII. 1897 и VII. 1902, сѣ зрѣл. пл. (Б. А. и О. А. Федченко!!); между Ташкентомъ и Той-тюбе, 7. VII. 1881 (А. Регель!).

(194)

гель!); Песочный переваль, 18. VII. 1897 (О. А. и Б. А. Федченко!!); Паркусъ, 18. VI. 1881, 2—3.000', въ цв. (А. Регель!); лѣтний лазаретъ въ Чимганѣ, 20. VI. 1881, въ цв. (А. Регель!); гора Чимгань, 21. VI. 1881, въ цв. (А. Регель!); горы Карагату, 1882 (*Масовъ!*), Ташкентъ, III. 1872, въ цв. (*Корольковъ!*); Тянь-Шань 2.500—8.000', въ цв. (*Кушакевичъ!*); долина Чимгана, 1899—1900 (*E. Хонутова!*)

Въ Туркестанѣ встречается еще въ S: — въ бассейнѣ Зеравшана: Оалыкское ущелье 18. V. 1869 (О. А. Федченко!) — растеніе это не было Э. Регелемъ возвращено въ Москву, а осталось среди неразобранныхъ материаловъ, почему и не вошло въ книгу О. А. Федченко<sup>1)</sup>; Дарвазъ (А. Регель).

Виѣ Туркестана встречаются на Кавказѣ, на Критѣ, въ Малой Азіи, на Ливанѣ, въ Персіи и въ Гималахъ.

## IX. Cistaceae.

### 74. *Helianthemum*.

**196. *Helianthemum songaricum* Schrenk.** in *Fisch. et Mey.* Enumer. plant. p. 94.—**1841.** — *Led.*, Fl. ross. I. 241.

1882. *Helianthemum*, A. Regel Gartenfl. 364.

VII. Каракурганъ, 21. V. 1878 (*Скорняковъ!*).

VIII. Кобукъ, южный склонъ Сусамырского хребта, 6. VII. 1881, 7.000', въ пл. (*Фестисовъ!*).

X. Алабуга, 6—7.000', 4. VI. 1880, въ цв. (А. Регель!).

Полукустарникъ съ крупными желтыми вѣнчиками. Въ нашей области встречается лишь на юго-востокѣ, не переходя въ бассейнъ Чирчика и Таласа. Въ Туркестанѣ распространень довольно широко: О: — Джунгарскій Алатау, Центральный Тянь-Шань; S: Зеравшанъ (О. А. Федченко! и др.), Алайскій хребетъ (О. А. и Б. А. Федченко!!).

Виѣ Туркестана не встречаются.

*Приимѣніе.* Для Туркестана указываются еще иѣсколько видовъ *Helianthemum*:

*H. villosum* Thib. . . . . — — — W —

*H. niloticum* (L.) Pers. . . . . — — — W —

<sup>1)</sup> О. А. Федченко, Списокъ растеній, собранныхъ въ Туркестанѣ въ 1869, 1870 и 1871 годахъ. Москва, 1902.

(195)

- H. salicifolium* (L.) Pers. . . . . W —  
*H. vulgare* Gaertn. . . . . O — —  
*H. procumbens* Dun. . . . . W —

Впрочемъ, иѣкоторыя изъ этихъ указаний еще требуютъ подтверждений.

## X. Violarieae.

### 75. *Viola* L.

1. Однолѣтняя травка съ желтоватыми вѣнчиками. . . . . *V. occulta* Lehm.  
 Многолѣтнія растенія . . . . . 2.  
 2. Безстебельныя . . . . . 3.  
 Со стеблемъ . . . . . 5.  
 3. Листья глубокоразсѣченные. . . . *V. pinnata* L. v. *dissecta* Turcz.  
 Листья не раздѣльные, но краю болѣе или менѣе зубчатые . . . . . 4.  
 4. Корневище съ ползучими побѣгами. Вѣнички темнолиловые, очень душистые. . . . . *V. odorata* L.  
 Корневище безъ ползучихъ побѣговъ. Вѣнички блѣднолиловые. . . . . *V. tianschanica* Maxim.  
 5. Корень толстый, мясистый, стебли укороченные, многочисленные, каждый съ однимъ крупнымъ цвѣткомъ . . . . . *V. grandiflora* L.  
 Корень тонкий, стебли не многочисленные. . . . . 6.  
 6. Вѣнички желтые . . . . . 7.  
 Вѣнички лиловатые . . . . . 8.  
 7. Листья почковидные, вѣнички небахромчатые. . . . *V. biflora* L.  
 Листья сердцевидные или продолговато-сердцевидные, вѣнички бахромчатые. . . . *V. uniflora* L.  
 8. При основаніи стебля иѣть прикорневыхъ листьевъ, стебель прямой, высокій . . . . *V. elatior* Fr.  
 При основаніи стебля имѣется пучекъ прикорневыхъ листьевъ; стебель не высокій, восходящій . . . . . *V. silvestris* Lam.

**197. *Viola pinnata* L.** Sp. pl. (ed. 1-a) p. 934. — **1763.** — *Led.* Fl., ross. I. 243.

*Var. sibirica* DC. Prodr. I. 293. — **1824.**

*V. dissecta* *Led.*, Fl. alt. I. 255. — **1828.** — *Led.*, Fl. ross. I. 244.  
 I. Арассанъ, 9 — 11.000', 4. VI. 1880 (*Фетисовъ!*).

Въ нашей области очень рѣдко, только въ Александровскомъ хребтѣ. Въ Туркестанѣ вообще не часто: въ горахъ

O: — Тарбагатай; Джунгарскій Алатау: верхн. Талды, 9 — 10.000', 20. V. 1879 Алтынэмель; Талки (А. Регель!), Борохудаиръ; къ западу отъ озера Сайрамъ (*Фетисовъ!*).

Встрѣчается также въ Сибири, на Альпахъ (у. europaea DC.), въ Монголіи, сѣверномъ Китаѣ и Манжурии.

**198. *Viola tianschanica* Max.** Diagn. pl. nov. asiat. III. in Mél. biol. X. 576. — **1830.** — *Maxim.* Fl. mongol. № 198.

*V. Gmeliniana*  $\beta$  *glabra* *Rupr.* Sert. tianschan. p. 40. *Rgl. et Herd.* Pl. Semen. № 122. nec *Led.*

I. Арассанъ, 9 — 11.000', 4. VI. 1880, въ цв. (*Фетисовъ!*).

Въ нашей области такъ же мало распространено; какъ и предыдущій видъ. Въ Туркестанѣ встрѣчается не рѣдко въ О: — Джунгарскій Алатау: 28. Чункурдаванъ 10.000', 13. VI. 1879 (А. Регель!); Пилучи IX. въ пл. (*Фетисовъ!*), Сайрамъ, р. Талки, 22. VII. 1877 (А. Регель!); Тянъ-Шань: Кумбелъ 10.000', 3. VI. 1879 (А. Регель!); перев. Кетмень 8 — 9.000', VI. 1878 (А. Регель!), Малая Алматинка, VI. 1877 (*Фетисовъ!*), Коктюбе 23. VI. 1878 (А. Регель!), проходить Музартъ, 10 — 11.500', 18. VIII. 1877 (А. Регель!), Чарданты, верхов. Султанъ-сары, 10.000', 18. VIII. 1882 (*Фетисовъ!*); Юлдузъ; Наратъ (*Пржевальскій*), Чатыръ-куль (*Останъ-Сакенъ!*), Джунгарскій Алатау: южн. притокъ Карагола у перевала Нилки, 9.000', 16. VI. 1879 (А. Регель!). Въ Туркестана — Восточный Тибетъ.

**199. *Viola odorata* L.** Sp. pl. (ed. 1-a) p. 934. — **1753.** — *Led.*, Fl. ross. I. 249. — *Boiss.*, Fl. or. I. 458. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 184.

1871. *Viola suavis*, А. Федченко Списокъ мѣстн. 5.

1881. *Veilchen*, *Middendorff* 305.

1902. *Viola odorata*, О. А. Федченко Списокъ № 176.

Туземн. назв.: Булавша.

I. Аламединъ, 25. IV. 1880, 4.500', въ цв. (*Фетисовъ!*). III. Бугунъ, з. III. въ цв. (*Сѣверцовъ!*).

IV. Таишентъ, сады на Боссу, 16. III. 1871 (О. А. Федченко!), близъ кипчака Нанай, въ орѣховомъ лѣсу VIII 1902 (Б. А. Федченко!!), близъ кипчака Пекемъ, 22. VII. 1897, въ пл. (Б. А. Федченко!!), бл. кипч. Нанай, на правомъ берегу р. Пекемъ, 20. VII. 1897 (Б. А. Федченко!!), Саймыкъ,

4. 6.000', въ пл., VIII. 1876 (*A. Регель!*); Бричъ-мулла, 19. VII. 1897 (*O. A. Федченко!*).

VII. Почата = р. Паша-апча (*Миддендорфъ!*).

XI. По р. Кугартъ, лѣсистые склоны горъ, 4. VIII. 1895 (*C. Коржинский!*!).

Въ нашей области не рѣдко въ предгорьяхъ и зонѣ лиственныхъ лѣсовъ.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — Джунгарскій Алатау, Тянъ-Шань, С: — Зеравшанъ, Горная Бухара (напр., Мумынавадъ — *A. Регель!*).

Виѣ Туркестана — большая часть Европы, Канарскіе острова, сѣверная Африка, Сирія, Кавказъ, Персія, Малая Азія, Кашмиръ, Алтай.

**200. *Viola elatior* Fr. Novit. ed. 2-а (1828) p. 277 — *Led.* Fl. ross. I. 251. — *Boiss.*, Fl. or. I. 460.**

I. Пиштекъ 15. V. 1882, въ цв. (*Фетисовъ!*).

IV. Безъ обозначенія мѣстности (*Краузѣ!*).

XI. Арсланбобъ, 27. V. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*); изъ числа четырехъ образцовъ собранныхъ Литвиновымъ, одинъ имѣть чрезвычайно короткіе прилистники, гораздо болѣе зубчатые, чѣмъ у остальныхъ экземпляровъ. Для меня не ясно, есть ли это лишь случайное уклоненіе (*lusus*), или же мы встрѣчаемся здѣсь съ явленіями гибридизации.

Въ нашей области — изрѣдка въ предгорьяхъ.

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ О: — къ югу отъ Кульджи, лѣвый берегъ р. Или (*A. Регель!*); Джунгарскій Алатау, Сайрамъ; руч. Саттели (*A. Регель!*); Тянъ-Шань: Джасылъ-куль 1873 г.; по р. Чу, ур. Джарчанка 17. IV. 1876 (*A. Кушакевичъ!*), С: — Мориантъ (*B. Комаровъ!*). Нѣкоторые экземпляры не вполнѣ типичны.

Виѣ Туркестана — Сѣверная и Средняя Европа, Крымъ, Кавказъ, Сибирь.

**201. *Viola silvestris* Lam. Fl. Franc. II. (1778) p. 680 (ex parte? sec. Beck Fl. v. Niederöster. p. 521) — *Led.*, Fl. ross. I. 253.**

*V. silvatica* Fries. Mant. IV. p. 121. — *Boiss.*, Fl. or. I. 459.

*V. canina* var. *sylvatica*, Hook., Fl. br. Ind. I. 185.

I. Аламеддинъ, 3 — 9.000', 23 — 25. V. 1880, въ цв. (*Фетисовъ!*).

XI. У перевала Кугартъ, на утесахъ и каменистыхъ осыпяхъ, 5. VIII. 1895, въ пл. (*C. Коржинский!*); Арсланбобъ, по каменистымъ склонамъ горъ, 7 — 9.000', 11. VIII. 1895, въ цв. (*C. Коржинский!*); Арсланбобъ, лѣсъ, 28. V. 1899 въ цв. (*Литвиновъ!*); Таранъ-базаръ, каменистые склоны горъ, 7. VIII. 1895, безъ цв. и пл. (*C. Коржинский!* — исполнанская форма, *forma monstrosa fere gigantea!*).

Въ нашей области встрѣчается по лѣсамъ и каменистымъ склонамъ. Несомнѣнно, найдена будетъ и во многихъ другихъ районахъ. Въ Туркестанѣ еще: О: — Джунгарскій Алатау; Тянъ-шань; С: — Кулябъ, на р. Акъ-су.

Виѣ Туркестана — вся Европа, Сѣверная Азія, Персія, Сѣверная Монголія, Кашмиръ, Крымъ, Кавказъ.

**202. *Viola biflora* L. Sp. pl. (ed. 1-а) p. 936 — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 254. — *Boiss.*, Fl. or. I. 460. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 182.**

I. Кольторъ, 12.000', 8. VIII. 1882; Арассанъ, 9 — 11.000', 5. VI. 1880, въ цв.; 7. VI. 1880; переваль Карагай-булакъ, 6. VII. 1882, въ цв., 9.500 — 10.500' (*Фетисовъ!*).

IV. Санташъ 23. VI. 1880, въ цв. (*A. Регель!* — собрано *Мусею*).

Въ нашей области — высокогорное растеніе.

Въ Туркестанѣ встрѣчается исключительно въ высокогорной области: О: — Джунгарскій Алатау (*A. Регель!*), Тянъ-Шань до Юлдуза включительно (*A. Регель!*, *Фетисовъ!*), С: — Заравшанъ (*B. Комаровъ!*).

Виѣ Туркестана — въ горахъ сѣверной и средней Европы, на Кавказѣ, въ горахъ Сибири и Сѣверной Америки, Гималаи; сѣверная Монголія, Японія, Манджурія, сѣверный Китай.

**203. *Viola uniflora* L. Sp. pl. (ed. 1-а) p. 936 — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 255.**

*Var. acutifolia* Kar. et Kir.

*V. biflora* ? *acutifolia* Karel. et Kir. Enum. pl. Song. № 137. — 1842. — *Led.*, Fl. ross. I. 772.

*V. uniflora* v. *Kareliniana* Maxim. Fl. mongol. p. 81 № 203 — 1889.

1882. *Viola*, A. Regel Gartenflora 361.

I. Арасань, 7 — 8. VI. 1880, 7 — 9.000', въ цв.; Аламединь, 3 — 5.000', 26 — 27. V. 1880; 5 — 9.000', 23 — 5. V. 1880; Алаарча 25. IV. 6.000', въ цв. (*Фетисовъ*).

XI. Верхнее течеие р. Яссы, 31. V. 1880, 8 — 9.000', въ цв. (A. Регель!).

Въ нашей области встречается въ верхней части полосы хвойныхъ, не часто. Въ Туркестанѣ собрано еще въ О: — Джунгарскій Алатау: Караголь у перевала на Нилки; Караконузъ (A. Регель!); Тянь-шань: Шамси (*Бромерусъ*!), Алматинка (*Кушакевичъ*!, *Фетисовъ*!, A. Регель!); S: — Балджуанъ: Сарыпулъ на р. Аксу, 1884 (A. Регель!); Алайский хребетъ (O. A. и Б. А. Федченко!!).

Виѣ Туркестана — южная Сибирь и сѣверная Монголія (типическая форма); кромѣ того, *orientalis* въ Манджуруї и Японіи.

Если считать наше растеніе за самостоятельный видъ, то по законамъ пріоритета оно должно быть наименовано *V. acutifolia* (Kar. et Kir.) B. Fedtsch.

**204. *Viola grandiflora* L. Mantissa p. 120 — 1767.** (saltem in herb., teste Steudel, Nomencl. bot. II. p. 771, edit. 2-а).

*V. altaica* Pall. herb. ex Schult. Syst. Veget. V. 383.— Led., Fl. ross. I. 255. — Boiss., Fl. or. I. 462.

IX. Вершины Сусамырского хребта, переваль Кумбель, 10 — 12.000', 5. VII. 1881, въ цв. (*Фетисовъ*!).

Въ нашей области — рѣдкое высокогорное растеніе. Въ Туркестанѣ встречается исключительно въ высокогорной области: О: — Джунгарскій Алатау и Тянь-Шань (A. Регель!, Сорокинъ!, *Бромерусъ*!).

Виѣ Туркестана — на Алтай, въ Прибайкальи, на Кавказѣ, въ Арmenіи, Крыму, на Альпахъ Средней Европы и въ сѣверной Монголіи.

**205. *Viola occulta* Lehm. Ind. sem. h.. Hamburg. p. a. 1829. — Led., Fl. ross. I. 257. — Boiss., Fl. or. I. 467.**

1881. *Viola occulta*, Э. Регель Опис. нов. вид. № 32 in A. П. Федченко Путеш. въ Туркест., вып. 18.

1881. *Viola occulta* v. *minor* Э. Регель ibid.

1902. " " O. A. Федченко Списокъ № 179.

1902. " " v. *minor* Rgl. O. A. Федченко ibid.  
(200)

IV. Таишентъ, сады на Боссу, 11. IV. 1871 Таишентъ, 3. III. и окрестности его 10. III. 1871 (O. A. Федченко!); растенія, собранныя въ мартѣ, едва зацвѣтаютъ, меньшее ростомъ, но едва ли отличаются достаточно для выдѣленія въ особую разновидность (v. *minor* Rgl.); Карагату 1882 (*Масовъ*!); Таишентъ 20. III. 1882 (*Масовъ*!); тамъ же IV. 1882 (A. Регель!).

XI. Арсланбобъ, 25. V. 1899 (*Литвиновъ*!).

Въ нашей области изрѣдка въ предгорьяхъ и культурной полосѣ. Въ Туркестанѣ не рѣдко въ О: — Кульджа (A. Регель!), Тянь-Шань: Джасыль-куль, на линіи нижней пихты <sup>1</sup>), *Populus tremulae* (по киргиз. дуланъ-точчи), 23. IV. 1873 (*M. Кушакевичъ*!); S: — Гиссаръ (A. Регель!), Самаркандъ (O. Федченко!, B. Комаровъ!); W: — Закаспійская область (*Литвиновъ*!).

Виѣ Туркестана — Малая Азія, Персія, Кавказъ.

*Приимѣніе.* Изъ р. *Viola* въ Туркестанѣ встречаются еще слѣдующіе виды:

<i>V. hirta</i> L. . . . .	N	—	—
<i>V. pumila</i> Chaix. . . . .	N	0	—
<i>V. stagnina</i> Kit. . . . .	N	—	—
<i>V. canina</i> L. . . . .	N	—	—
<i>V. arenaria</i> DC. . . . .	N	—	—
<i>V. macroceras</i> Bge. . . . .	—	0	—
<i>V. turkestanica</i> Rgl. et Schm. . . . .	—	S	(Endem.)
<i>V. tricolor</i> L. . . . .	N	0	—

Изъ сем. *Frankeniaceae* въ Туркестанѣ встречаются два вида рода *Frankenia*, не найденные пока въ предѣлахъ нашей области:

*F. hirsuta* L.: (*F. hispida* DC) 0 — (*Карелинъ и Кириловъ*!, *Шренкъ*!); W: — Красноводскъ (*Беккеръ*!), Закасп. обл. (*Литвиновъ*!), заливъ Перовскаго 22. VII. 1849 (*Бутаковъ*!), пустыня за Ураломъ (*Борщовъ*!).

<sup>1</sup>) Т. е. ели; *Кушакевичъ* на этикетахъ постоянно называетъ ель пихтой.

*F. pulverulenta* L. N: Терсакканъ (Шренкъ!); О: — (Карелинъ и Кирилловъ!); Тянь-Шанъ, ущ. Дувара 13. IX. 1879 (А. Регель!); С: — Джизакъ (Капю!); окр. Катты-кургана, озеро Чарикъ-куль, 6. V. 1869 (О. Федченко<sup>1</sup>!); В: — Закасп. обл. (Литвиновъ!), Бухара (аиномъ въ герб. Федченко!).

## XI. Polygaleae.

### 76. Polygala.

206. *Polygala comosa* Schkuhr. Handb. II. 324. — *Led.*, Fl. ross. I. 271. — *Boiss.*, Fl. or. I. 475.

Туземи, назв.: (Кокъ-пуль, записано О. А. Федченко).

I. Карагай булакъ, 9.500' — 10.500', 6. VII. 1882; Исынгаты, 10.000', 15. V. 1881, въ цв.; Аксу 29. VI. 1880, 9.500' — 10.000', въ цв.; 30. V. 1880, 6.500 — 7.000', въ цв.; Аламединъ, 24. IV. 1880, 25. V., 20. V. 6 — 9.000'; Алаарча 13. V. 6000' — 7.000', Арассанъ 7 — 9.000', 7. VI. 1880 (Фетисовъ!).

IV. Горы Карагату 1882 (Масевъ!).

Р. Чирчинъ VIII. 1876 (А. Регель!).

VII. Въ долинѣ р. Афлатунъ, устье ручья Уялма-чаты, въ цв. и съ пл. 22. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

IX. Съверный склонъ Сусамырского хребта, 7 — 9.000', 4. VII. 1881. (Фетисовъ!).

XI. Майлинский лѣсь (Краузъ!); Арсланбобъ, на утесѣ у ключа, 10. VIII. 1895, въ цв. (С. Коржинский!).

Въ Туркестанѣ не рѣдко въ горахъ: О: — Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань; С: — Памироалай; Заравшанъ (В. Комаровъ!), Алайскій хр. (О. А. и Б. А. Федченко!!).

Въ Туркестана — съверная и средняя Европа, Малая Азія, Кавказъ, Сибирь, съверная Монголія.

## XII. Droseraceae.

### 77. Parnassia.

207. *Parnassia palustris* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 263. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 262 — *Boiss.*, Fl. or. II, 814.

<sup>1</sup>) Не вошло въ книгу О. А. Федченко по той же причинѣ, что и *Datisca cannabina* L. — см. выше (стр. 443).

1878. *Parnassia palustris*, A. Regel Reisebr. 200.

1883. " " Franchet Mission Capus 289.

II. Караколь, VIII. 1876, въ цв. (А. Регель!).

IV. Она (= Аида) — Ульганъ, 22. VIII. 1881. (Капю!).

Въ нашей области встречается очень рѣдко. Вообще въ Туркестанѣ найдено въ Н: — между Нурай и Актавско-Каркаралийской дорогой (Мирошинченко!), О: — Джунгарскій Алатау: Каши, Монгетѣ, Джиргаланъ 26. VII. 1878 (А. Регель!), Комурги бл. р. Кегенъ (Фетисовъ!). Тянь-Шань: Музартъ, Текесь (А. Регель!), ур. Тюменбай Вѣриен. у., Джасыльтъ-куль и др. мѣстн. (Кушакевичъ!).

С: — Нимичи-боло (Невъскій!), Алай (О. А. Федченко!).

Въ Туркестана — Европа, Сибирь, Китай, Тибеть, Монголія, Съверная Америка.

208. *Parnassia ovata* Led. in „Mém. de l'Acad. de St. Petersbourg.“ V. 528. — 1812. *Led.*, Fl. ross. I. 263.

1878. *Parnassia Laxmanni*, A. Regel Reisebr. 202.

1883. " " *ovata*, Franchet Mission Capus 289.

I. Аламединъ, 25. IV. 1880, въ цв. и Аксу 6 — 7.000', 30. VI. 1880, въ цв. (А. Фетисовъ!).

II. Кумбелъ, 9.000', IX. 1876 (А. Регель!).

IV. Куургенъ-туръ, 25. VII. 1897; Бричъ-мулла 19. VII. (О. А. и Б. А. Федченко!!); около Ходж(ак)ента и Бричъ-муллы, VI. 1872, въ цв. (Корольковъ!); Она (= Аида) — Ульганъ въ цв. 1876 (Корольковъ!) — особая форма съ мелкими цвѣтками и круглыми листьями.

IX. Караколь, притокъ Сусамыра, 7.000', 1. VII. 1881 въ цв. (Фетисовъ!).

Въ Туркестанѣ — О: Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань; С: — Памироалай.

Въ Туркестана — Сибирь.

## XIII. Sileneae.

### 78. Dianthus L.

1. Листья широколинейные. Въчики больше

крупные . . . . . D. superbus L.

Листья узколинейные или шиловидные . . . . . 2.

2. Лепестки слегка надрѣзные . . . . . D. ramosissimus Pall.

- Лепестки глубо-бахромчато-разрѣзаные . . . . . 3.  
 3. Трубка чашечки болѣе длинная. Вѣнички  
болѣе крупные, глубже разрѣзанные . . . *D. crinitus Sm.*  
 Трубка чашечки менѣе длинная. Вѣнички  
менѣе крупные, мельче разрѣзанные . . . *D. tabriscianus Bienert.*

**209. *Dianthus superbus* L. Amoen. Acad. IV. 272. — *L. Sp.*  
pl. (ed. II.) p. 589. — *Led.*, Fl. ross. I. 285. — *Boiss.*, Fl.  
or. I. 493.**

1878. *Dianthus superbus* A. Regel Reisebr. 201.

I. Джиламышъ, 5 — 9.000', 27. VI. 1880, въ цв.; Суку-  
лукъ (сѣверный склонъ Александровскаго хребта), 27. VI.  
1880, 5.000', въ цв.; Аксу 30. VI. 1880 въ цв., Аламединъ,  
6 — 7.000', 30. IV. 1880 въ цв. (*Фетисовъ!*).

II. Кумынть-тагъ, въ заросляхъ арчи ниже перевала,  
11. VIII. 1897, въ цв., 9 — 10.000' (*Б. А. Федченко!!*). Каракія  
VIII. 1876 (*A. Регель!*).

IV. Чимганъ: г. Большой Чимганъ. 8. VIII. 1897  
(*Пьянковская - Баженова!*), 18. VII. 1900, 1901 и 1902 (*E. Хомутова!*).

V. Отурбель V. 1880 въ цв. (*Musa!*).

VIII. Кетмень-тюбе — пер. Мартъ Кумбель 2-ой, 11. VIII.  
№ 145. (*Сорокинъ!*). Узунъ-ахматъ, на зап. концѣ южнаго  
склона Сусамырскаго хребта, 6.500', 28. VII. 1881 въ цв.  
(*Фетисовъ!*).

IX. Кокукеренъ, 4.000', южный склонъ Сусамырскаго  
хребта, 8. VIII. 1881, въ цв. (*Фетисовъ!*), Кобукъ 7.000', 6. VII.  
1881 въ цв. (*Фетисовъ!*); сѣверный склонъ Сусамырскаго  
хребта надъ западнымъ концомъ долины Сусамыръ, 8 —  
10.000', 18. VII. 1881 (*Фетисовъ!*) и тамъ же, 7 — 10.000',  
5. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. По р. Карагунгуръ, 7.000', 17. VI. 1899 (*Литвиновъ!*).  
Одно изъ обычныхъ растений лѣсной и субальпий-  
ской зоны.

Въ Туркестанѣ: О: — Джунгарскій Алатау, Тянъ-Шань!  
S: — Алайскій хребеть (*O. А. и Б. А. Федченко!*).

Въ Туркестана — Европа, Кавказъ, Сибирь, Монголія,  
Японія, Китай.

Въ нашей области, повидимому, не встрѣчается уста-  
новленная Э. Регелемъ форма (*D. Hoeltzeri Rgl.* = *D. superbus*

v. *Hoeltzeri Rgl.* et *Winkl.* in hb. *Petrop.*) съ двумя лишь  
прицѣвѣниками.

**210. *Dianthus crinitus Sm.* Act. Soc. Linn. II. p. 300. —  
*Led.*, Fl. ross. I. 283. — *Boiss.*, Fl. or. I. 496. — *Hook.*, Fl.  
br. Ind. I. 215.**

1878. *Dianthus crinitus*, A. Regel Reisebr. 180, 201.

1883. " *Franchet Mission Capus* 236.

?1883. " *Kuschakewiczi, Franchet Mission Capus* 236.

Туземн. назв.: Кизылъ-куль — въ Бухарѣ; заргу-  
лакъ, бугунъ-чубъ — записано О. А. Федченко.

I. Ущ. Арассанъ, 7 — 11.000', 8. VI. въ цв. (*Фетисовъ!*),  
южный склонъ пер. Курдай, 23. VI. 1880 въ цв. (*A. Регель!*).

II. Каракія, VIII. 1876, посл. цв. (*A. Регель!*).

IV. Выше Бричъ-муллы по Чирчику (*A. Регель!*) (*Капю* —?  
сюда); Афлатунъ 3. IX. (*Капю*); Кизылъ-кушъ, 1.200', 22.  
VIII; гора Чимганъ, 6 — 7.000', 21. VI. 1881 (*A. Регель!*),  
Чимганъ, около и выше истоковъ, 5.000' — 6.000', 16. VII.  
1897, отцв. (*O. А. Федченко!*); Чимганъ, Красная гора, 21 —  
24. VII. 1897, въ цв. 5.000' (*O. А. Федченко!*); г. Большой  
Чимганъ, 19. VIII. 1897 (*Филипповъ!*); Ташкентъ (*Кушакевичъ!*),  
Ташкентъ, V. 1880 (*A. Регель!*), Чаткаль, 4 — 6.000', VIII. 1876  
безъ цв. и пл. (*A. Регель!*) долина р. Майданталь, выше  
Куургентура, 8.000', VIII. 1902 (*Б. А. Федченко!!*); Паркусъ,  
19. VI. 1881, 4 — 3.000', въ цв.; дол. р. Ишакъ-купрюкъ, 4.000'  
(левый берегъ Чирчика, выше Ходжакента), 22. VI. 1881,  
въ цв. (*A. Регель!*), долина Чимгана 1899 — 1900 (*E. Хомутова!*).

VI. Моголь-тау (*Сѣверцовъ!*); Аксу, 18. V. 1880 (*A. Регель!*).

VIII. Узунъ-ахматъ, западная сторона, 28. VII. 1881,  
7.000', въ цв. (*Фетисовъ!*).

IX. Каракольъ, надъ притокомъ р. Сусамыръ, 9 — 10.000',  
1. VII. 1881; южный склонъ Александровскаго хребта надъ  
западнымъ концомъ долины Сусамыръ, 9 — 12.000', 17. VII.  
1881 въ цв.; сѣв. склонъ Сусамырскаго хребта, 7 — 9.000',  
4. VII. 1881, въ цв. и 8 — 10.000', 18. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

X. Манагильды, 6 — 7.000', 4. VI. 1880, въ цв. (*A. Регель!*).  
Въ Туркестанѣ — О: — Джунгарскій Алатау, Тянъ-  
Шань; S: — Зеравшанъ, Алайскій хребеть.

По указанію Э. Регеля (*Acta Horti Petrop.* V. p. 244)  
(205)

*D. crinitus* есть обыкновеннейший видъ туркестанской гвоздики. Встрѣчающаяся въ лѣсной и отчасти альпийской полосѣ гвоздика дѣйствительно очень схожа съ распространенной широко по востоку *D. crinitus* Sm., но въ тоже время попадаются экземпляры, почти неотличимые отъ сѣдущаго вида. Кромѣ того, описанный Регелемъ *D. Kischakewiczi*, надо думать, также относится къ числу формъ *D. crinitus*, такъ какъ отличія въ формѣ прицѣпниковъ не важны и не постоянны.

Виѣ Туркестана — Малая Азія, Закавказье, Персія, Белуджистанъ, Пенджабъ, Западный Тибетъ, Сѣверо-западная Монголія.

211. *Dianthus Tabrisianus* Bienert in Bunge Pl. exsic. Pers. 1859. — *Boiss.*, Fl. or. I. 496. — 1867.

1877. *Dianthus*, A. Regel Reisebr. 367.

1877. " *Tabrisianus*, E. Regel Deser. pl. nov. fasc. V. p. 244.

1878. *Dianthus Tabrisianus*, A. Regel Reisebr. 180.

Туземн. назв.: Заргулакъ—(записано О. А. Федченко).

I. Аксу 6.000', 30. VI. 1880, въ цв. (Фетисовъ!).

II. Долина р. Таласъ (А. Регель!, Сѣверцовъ!).

III. Боролдай (А. Регель!).

IV. Выше Бричъ-муллы по Чирчику 4—6.000', (А. Регель!) по р. Чирчику 9. VII (Сѣверцовъ!); Чимганъ, 7. VII. 1901, 1899—1900 (Е. Хомутова!), Пскемъ 22. VII. 1897, въ цв., 8. VIII. 1892; въ цв. (Б. А. Федченко!!); Тянь-Шань (Кушакевичъ!) — виѣннѣмъ видомъ эти экземпляры сильно отличаются отъ обычныхъ, а по своимъ рѣзко обрубленнымъ прицѣпникамъ, съ короткими остроконечіями, они напоминаютъ *D. scoparius* Fenzl.; верховья Чаткальского Афлатуна, 1. VII. 1899, въ цв. (Литвиновъ!).

XI. Р. Яссы, 4.000', 28. V. 1880, въ цв. (А. Регель!).

Виѣ Туркестанѣ распространено довольно широко—N.O, S. Виѣ Туркестана — Персія, Афганистанъ.

212. *Dianthus ramosissimus* Pall. ex Poir. Encycl. méth. Suppl. IV. 130. — *Led.*, Fl. ross. I. 279.

*D. campestris* M.B. Fl. taur.-саус. I. 326, 427. — *Led.*, Fl. ross. I. 278. — *Boiss.*, Fl. or. I. 504.

*D. pallidiflorus* Ser. in DC. Prodr. I. 358. — *Boiss.*, Fl. or. I. 504.

XI. Верховья Кара-унгура, 18.VI.1899, въ цв. (Литвиновъ!).

Въ нашей области встречается очень рѣдко. Въ Туркестанѣ встречается преимущественно въ N.

Виѣ Туркестана — южная Россія, Кавказъ, Крымъ.

Причиине. Невыясненнымъ остается указаніе:

1878. *Dianthus Arten*, A. Regel Reisebr. 184 (Кенъ-сай).

## 79. Tunica Scop.

213. *Tunica stricta* (Bge.) Fisch. et Mey. in Ind. Sem. horti Petrop. IV. (1837) p. 50. — *Boiss.*, Fl. or. I. 521. — *Hook.* Fl. br. Ind. I. 216.

*Gypsophila stricta* Bge. in *Led.*, Fl. alt. II., 129.— 1830. — *Led.* Ic. Fl. ross. t. 5. — 1829.

*Dianthus recticaulis* Led., Fl. ross. I. 287.

1878. *Dianthus recticaulis* L. Regel Reisebr. 180.

1883. *Tunica stricta*, Franchet Mission Capus 237.

IV. Въ долинѣ р. Чирчика выше Бричъ-муллы (А. Регель!), по Чаткалу: въ окрестностяхъ Идрисъ-нейгамбара, VI. 1880' въ цв. (А. Регель! — собрано Мусою); Чимганъ: 20. VII. 1881 въ пл. (А. Регель!), Красная гора 21. VII. 1897, въ пл., истоки ручья 16. VII. 1897 въ пл., Песочный перевалъ 17. VII. въ пл. (О. А. Федченко!!); долина р. Пскемъ близъ кишлака того же имени, 3.000', VII. 1897 (Б. А. Федченко!!), въ долинѣ ручья Оби-галва 2. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), долина р. Андаульгансъ, 2—2.300', Турпакъ-бель 24. VIII. (Капю — п. в.), по ручью, 8.000', 23. VII. 1897 (Б. А. Федченко!!); въ долинѣ Майданата на спускѣ съ перевала Турпакъ-бель, въ преріи, VIII. 1902. (Б. А. Федченко!!).

XI. Арсланбобъ, на каменистыхъ склонахъ горъ, 7—9.000', 11. VIII. 1895, въ пл. (Коржинскій!), тамъ же 28. V. 1899 зацвѣт. (Литвиновъ!).

Въ Туркестанѣ О: — Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань; S: — Заравшанъ; Алайскій хребеть (О. А. и Б. А. Федченко!!).

Виѣ Туркестана — Арmenія, Малая Азія, Закавказье, Персія, также въ предгорьяхъ Алтая, Кашмиръ.

80. *Gypsophila* L.

1. Листья яйцевидно-продолговатые; стебли высокие, сильно ветвистые. Все растение больше крупное, съ раскидистымъ соцветиемъ. . . . . *G. trichotoma* Wend.  
Листья линейные или продолговато-линейные; все растение меньше крупное . . . . . 2.  
2. Листья продолговатолинейные. Чашечки меньше крупных . . . . . *G. cephalotes* Schrenk.  
Листья узколинейные. Чашечки больше крупных *G. Gmelini* Bge.

214. *Gypsophila Gmelini* Bge. in *Led.*, Fl. alt. II. 128.—  
1830. — *Led.*, Fl. ross. I. 293.

*Var. caespitosa* Turcz. Fl. baic.-dah. I. 199.

II. Ущелье Боркутая, на травянистыхъ склонахъ, 6—7.000', въ цв. 11. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!!).

Въ Туркестанѣ въ горахъ: О: — Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань, S: — Памироалай.

Въ Туркестана — Монголія, Даурія.

215. *Gypsophila trichotoma* Wenderoth. in Ind. sem. h. marburg. 1835. № 3.—*Led.*, Fl. ross. I. 297—*Boiss.*, Fl. or. I., 541.  
II. Уянъ-токай на Таласѣ, VIII. (А. Регель!).

Въ Туркестанѣ не рѣдко въ степяхъ и предгорьяхъ—N, O, S.

Въ Туркестана — Крымъ, Кавказъ, Персія, съверная Монголія.

216. *Gypsophila cephalotes* Schrenk. *Gypsophila fastigiata* L. β *Cephalotes* Schrenk. *Fischer et Meyer*, Descr. pl. nov. I. 92.—(distincta forsitan species). 1841.—*Led.*, Fl. ross. I. 299.

1896. *Gypsophila cephalotes*, *Комаровъ* Зеравшанъ, № 251.

1896. " " v. *colorata* n. var., *Комаровъ* Зеравшанъ № 251 β.

II. Караколь, VIII. 1876 (А. Регель!). Переялъ Кумбель (А. Регель!).

IV. Чаткаль, VI. 1880, близъ Идрисъ-пей-гамбара, 25. VI. 1880, въ цв. (А. Регель!) — собрано въроятно *Musoю*; эти экземпляры относятся къ установленной *В. Л. Комаровы* разновидности var. *colorata* V. Ком., которая однако слишкомъ мало отличается отъ типа).

(208)

VII. По р. Афлатуну, въ еловомъ лѣсу, 1. VII. 1898 въ цв. (*Литвиновъ!* — очень высокая форма).

VIII. Терекъ и Узуль-ахматъ 9.000', 29. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

IX. Сусамырскій хребеть, вершины, 10—12.000', 8. VII. 1881, въ цв.; южный склонъ Александровскаго хребта надъ западнымъ концомъ долины Сусамыра, 9—12.000', 17. VII. 1881 (*Фетисовъ!*, одинъ изъ этихъ экземпляровъ съ интереснымъ уродствомъ — фасциацией).

Въ Туркестанѣ — О: — Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань; S — Зеравшанъ (*О. Федченко!*, *В. Комаровъ!*).

Въ Туркестана не встрѣчается.

Приимѣніе. Изъ рода *Gypsophila* указывается для нашей области еще:

1877. *Gypsophila*, A. Regel Reisebr. 367 (Бородай).

81. *Saponaria* L.

217. *Saponaria Sewerzowi* Rgl. et Schmalh. in E. Regel Descript. pl. nov. fasc. V. in „Acta Horti Petrop.“ V. 246.—1877.

Растеніе это описано по экземплярамъ Съверцова (!) съ горъ Кхарлы-тау (т. е. съ горъ къ югу отъ Ходжента). Поэтому указание *В. Л. Комарова* (Мат. фл. Турк. Нагор. № 272), будто растеніе это собрано *Съверцовымъ* въ системѣ Ташкентскаго Карагату, — не точно.

До сихъ поръ растеніе это известно лишь изъ S. Кхарлы-тау; Гиссарь, Кабадіанъ (А. Регель!), Шуробъ (Гейеръ!).

Въ Туркестана не встрѣчается.

Изъ р. *Saponaria* въ Туркестанѣ встречаются еще:

*Saponaria parvula* Bge. . . . . — — — W (Endem.).

" *Griffithiana* Boiss. — — S —

" *dichotoma* Komar. — — S — (Endem.).

82. *Vaccaria* Medik.

218. *Vaccaria parviflora* Moench. Meth. plant. hort. bot. Marburg., p. 63 — 1794.

*Saponaria Vaccaria* L. Sp. pl. ed. I-a (1753.) p. 409.  
— *Boiss.*, Fl. or. I. 525. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 217.

(209)

*Vaccaria vulgaris* Host. Fl. austr. I. 518. — *Led.*, Fl. ross. I. 302.

1878. *Vaccaria vulgaris*, A. Regel Reisebr. 194.

Туземи. назв.: харбакъ — въ Самаркандѣ; бауры-куртъ, гыда — въ Зеравшанской долинѣ.

II. Выходъ Карабуры изъ горъ (A. Regel!).

III. Отъ Боролдая до Арыса (*Съверцовъ!*). Боролдай (A. Regel!). Бекляр-бекъ 20. V. 1878 (A. Кушаковичъ!).

IV. Ташкентъ, 25. V. 1882 (*Маевъ!*), около дорогъ, возлѣ арыка (*Краузел!*), долина Чимгана: 9. VII. 1901 (E. Хомутова!), между Ходжакентомъ и Чимганомъ, 4.000', 20. VI. 81 въ пл. (A. Regel!). въ долинѣ р. Пскемъ, близъ кишлака того-же имени, сорная трава на поляхъ, 3.000', 22. VII. 1897 въ цв. (B. A. Федченко!). Чимганъ (E. Хомутова!).

VIII. Кукумеренъ, южный склонъ Сусамырского хребта, 4.000', 8. VIII. 1881 (A. Фетисовъ!).

XI. Андик. у. Чарвакъ, въ посѣвахъ, 5. VI. 1899 въ цв. (*Литвиновъ!*); Арсланбобъ, 4. VI. 1899 въ цв. (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ распространено очень широко въ культурной полосѣ. Въ Туркестана (типическая форма *parviflora* Moench., а также *v. grandiflora*) почти вся Европа, Аравія, Малая Азія, Сирія, Персія, Кавказъ, Индія, Тибетъ, Монголія, Китайский Туркестанъ.

### 83. *Silene* L.

1. Растенія однолѣтнія . . . . .
2. Растенія многолѣтнія . . . . .
2. Нити тычинокъ пушистые . . . . .
3. Нити тычинокъ голые . . . . .
3. Чашечка сильно вздутая голая . . . . .
- Чашечка вовсе не вздутая или же слабо взду-  
тая, пушистая . . . . .
4. Цвѣтки въ простыхъ или сложныхъ диха-  
зіяхъ, или же стебель 1—2 цвѣтовый . . . . .
- Цвѣтки въ простой или сложной кисти . . . . .
5. Чашечка голая, кожистая, длинно-цилиндри-  
ческая, булавчатая . . . . .
- Чашечка перепончатая, большою частью пу-  
шистая . . . . .
6. Цвѣтки сидѣть на простыхъ вѣточкахъ, об-  
щая ось соцвѣтія всегда имѣть неуко-  
роченные междуузлія . . . . .

- 2.
- 3.
- S. conica* L.
- S. conoidea* L.
- S. venosa* Aschers.
- 4.

*S. depressa* MB.

5.

*S. longicalycina* Komar.

6.

Цвѣтки сидѣть мутовками въ простой или сложной метелкѣ, рѣже въ скатой головкѣ

11.

7. Цвѣтоноски при основаніи съ двумя пред-  
листьями . . . . .

*S. tenuis* W.

Продлистья около средины цвѣтоноsekъ . . . . .

8.

8. Лепестки цѣльные или двураздѣльные . . . . .

9.

Лепестки четырехраздѣльные . . . . .

10.

9. Чашечка голая . . . . .

11.

Чашечка пушистая . . . . .

*S. odoratissima* Bge.

10. Чашечка короткотрубчатая, плодоножка ме-  
нѣе длинная . . . . .

*S. lithophila* Kar. et Kir

Чашечка длиннотрубчатая, плодоножка больше

*S. sarawschanica* Rgl. et Schmalh.

11. Цвѣтоноски при основаніи съ двумя пред-  
листьями . . . . .

*S. turkestanica* Rgl. et Schm

Продлистья сидѣть около средины цвѣтоноsekъ

*S. supina* MB.

219. *Silene venosa* (Gilib.) Aschers. Fl. Prov. Brandenb. I. 86. *Cucubalus Behen* L., Spec. pl. (ed. I-a) p. 414 excl. var. 3. — 1753.

*Cucubalus venosus* Gilib. Fl. Lithuan. II. 165. (1781). —

*Silene inflata* Sm., Fl. brit. 467. (1800). — *Led.*, Fl. ross. I. 304. — Boiss., Fl. or. I. 628. — Hook., Fl. br. Ind. I. 218.

1877. *Silene Behen*, A. Regel Gartenfl. 13.

1883. " *inflata*, Franchet Mission Capus 239.

Туземи. назв.: шинникъ-чопъ; носиль-дакъ.

I. Аксу 30. VI. 1880, Джиламышъ 5—9.000', 27. VI. 1880, Колтторъ 7.000', 6. VII. 1882, Аламединъ 6—7.000', 30. V. 1880 (Фетисовъ!).

II. При подъемѣ къ перевалу Кумбель и Караколь (A. Regel!).

IV. Спускъ съ перевала отъ Кумсана къ Нанаю 31. VIII. 1902 (B. A. Федченко!); въ низовьяхъ Майдантала, спускъ съ перевала Ториакъ-бель, прерія (B. A. Федченко!). Съемессасъ, на незадерненныхъ южныхъ склонахъ, 9. VIII. 1902 (B. A. Федченко!). Кизыль-куни 21. VIII. (Капю!), Сайлыкъ 4—6.000'

VIII. 76 (A. Regel!), отъ Нанаю до Пскема 21. VII. 1897 и Майданталь, ур. Куургенъ-туръ, 5. VIII. 1897 (B. A. Федченко!), Чимганъ, Красная гора 21. VII. 1897 (O. A. Федченко!); Кони-

терекъ въ Ташкентскомъ Алатау, 16. VI. 80 (A. Regel!) — собрано *Musoю!*; Чимганъ 901 (ки. Мещерская!), тамъ же 9. VII. 1901 (E. Хомутова!).

V. Кумдаванъ 9. V. 1880 въ цв. (*Musa!*), Окуръ у Аксу, правый берегъ Ангрена, 1. VI. 1880 (A. Регель! — собрано *Мусою!*).

VII. Качкараты, 14. VIII. 1902 въ цв. (казакъ И. Яковлевъ!). VIII. Узунъ-ахматъ, западный конецъ, 7.000', 28. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

IV. Южный склонъ Сусамырского хребта, 7—10.000', 5. VII. 1881, 9—10.000', 25. VII. 1881, южный склонъ Александровского хребта надъ западнымъ концомъ долины Сусамыръ 17. VII. 1881 и долина Сусамыръ, 6.600', 19. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

X. За переваломъ Кенколъ, на травянистыхъ склонахъ, 8—10.000', 14. VIII. 1895 (С. Коржинский!).

Въ Туркестанъ — О: Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань; S: Памироалай.

Виѣ Туркестана — Европа, Южный Алтай, Сѣверная Африка, Малая Азія, Кавказъ, Сирія, Персія, Сибирь, Гималаи; С. Америка (введеніо).

**220. *Silene conica* L. Spec. pl. (ed. I-a) (1753) p. 418.—  
Led., Fl. ross. I. 314. — Boiss., Fl. or. I. 578.**

1902. *Silene conica*, О. А. Федченко, Списокъ № 198. I. Пиштекъ 18. V. 1880 въ цв. (*Фетисовъ!*).

IV. Саларъ 1400', 14. IV. 1871 (О. А. Федченко!).

VI. Моголь-тау, 5. VIII. 1903. засохшее растеніе (*Невъескій!*).

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ S: Зеравшанъ.

Виѣ Туркестана — Средняя и Южная Европа, Сѣверная Африка, Крымъ, Кавказъ, Малая Азія, Южная Россія.

**221. *Silene conoidea* L. Sp. pl. (ed. I-a) p. 418. — 1753.  
Led., Fl. ross. I. 314. — Boiss., Fl. or. I. 580. — Hook., Fl. br. Ind. I. 218.**

Туземи. назв.: нахутаки-кути — (записано О. А. Федченко).

V. Джантъ-булакъ 20. IV. (*Сѣверцовъ!*). VI. Моголь-тау (*Сѣверцовъ!*).

VII. Каракурганъ 21. V. 1878 (*Скорняковъ!*). Въ Туркестанѣ встрѣчается въ S: Зеравшанъ, Алай-скій хребетъ, Шугнанъ (О. А. и Б. А. Федченко!).

Виѣ Туркестана — Испанія, Южная Франція, Афганистанъ, Сирія, Персія, Кавказъ, Малая Азія, Гималаи, Пенджабъ, Западный Тибетъ, Китай, Китайскій Туркестанъ.

**222. *Silene longicalycina* Komarov. В. Комаровъ, Матер. по фл. Турк. нагор. I. Басс. Зеравш. № 268. — 1896.**

IV. По течению р. Аидаулъгашъ, 23. VI. 1897, 8—9.000', въ цв. (Б. А. Федченко!).

Извѣстно еще въ S: на Заравшанѣ.  
Виѣ Туркестана не найдено.

**223. *Silene depressa* M.B. Fl. taur. cauc. I. p. 336. —  
1808. — Led., Fl. ross. I. 321. — Boiss., Fl. or. I. 622.**

I. Аксу 6.000', 30. VI. 1880 (*Фетисовъ!*). III. Боролдай (*Сѣверцовъ!*) — форма съ болѣе развитымъ стеблемъ.

IV. Близъ ледника Карабулакъ 4. VIII. 1897, 10.000', въ верховьяхъ Майданала (Б. А. Федченко!), близъ кипп. Пекемъ 22. VII. 1897 (Б. А. Федченко!), близъ кипп. Нанай 21. VII. 1897 (Б. А. Федченко!), на горѣ Большой Чимганъ VIII. 1897 (О. А. Федченко!), тамъ же 6—7.000', 21. VI. 1881 (А. Регель!), отъ Ходжакента до Чимгана, 20. VI. 1881, 4000' (А. Регель!); по Чаткалу, 5—6.000', VIII. 1876 (А. Регель!), Джиль-арыкъ и Сайлыкъ, VIII. 1876 (А. Регель!), Большой Чимганъ 1902 (Е. Холмутова!).

V. Кендыръ-аузъ, 18. V. 1880, бутоны (А. Регель! — собрано *Мусою!*).

IX. Южный склонъ Сусамырского хребта надъ западнымъ концомъ долины Сусамыра, 9—12.000', 17. VII. 1881 въ цв. (А. Фетисовъ!).

Въ Туркестанѣ въ горахъ широко распространенъ.  
Виѣ Туркестана известно лишь на Кавказѣ.

**224. *Silene turkestanica* Rgl. et Schmalh. Э. Регель,  
Опис. нов. вид., № 34 in A. II. Федченко, Путеш. въ Туркест., вып. 18, стр. 13. (1881—2).**

1873. *Silene turkestanica*, A. Regel, l. c. I. 436.  
1881. " " Э. Регель, Опис. нов. вид.

№ 34 in A. II. Федченко Путеш. въ Туркест., вып. 18.  
IV. Близъ Ташкента (*Краузэ!*). Въ долинѣ Чимгана, въ кустарникахъ, подъ песчанымъ переваломъ и у самаго пе-

ревала, 6—7.000', 16. и 17. VII. 1897 въ цв. и пл. (О. А. и Б. А. Федченко!).

VIII. Узунъ-ахматъ, южный склонъ Сусамырского хребта, 4.000', 27. VII. 1881 въ пл. (Фетисовъ!).

X. Манағильды 6—7.000', 4. VI. 1880 въ пл. (А. Регель!)

XI. Тараңъ-базаръ: на травянистыхъ холмахъ 3. VIII. 1895 и склонахъ горъ 4. VIII. 1895 въ пл. (С. Коржинский!).

*S. turkestanica* Rgl. представляется, повидимому, особый, эндемический для нашей области видъ (если не считать линии неопределенного указания „ad. fl. Syr-darja — Golike“). Въ монографии Williams'a *S. turkestanica* отождествляется съ *S. incurvisolia*, но это совершенно невѣрно. Гораздо ближе *S. turkestanica* къ *S. sibirica* и въ особенности къ *S. Falkoneriana* Benth., но повидимому отличима и отъ послѣдней.

225. *Silene tenuis* Willd. Enum. Hort. Berol. p. 474. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 219.

*S. graminifolia* Otth. in DC. Prodr. I. 368. — 1824. — *Led.*, Fl. ross. I. 307.

1878. *Silene graminifolia*, *S. viscinoides* A. Regel Reisebr. 192.

1896. *Silene graminifolia* Комаровъ Зеравшанъ № 265.

I. Аламединъ, 30. V. 1880 и Кольторъ, 10.000', 7. VII. 1882 (Фетисовъ!).

IV. Каракызмакъ у перевала Карабура (А. Регель!), въ верховьяхъ р. Майданталъ, у ледниковъ 28. VII. и 1. VIII. 1897 въ цв. (Б. А. Федченко!); на Чаткаль возлъ Идрисъ-ней-гамбара 29. VIII. 1902 въ пл. и на Санталашъ возлъ Бенимайнака, 14. VIII. 1902 въ цв. (Б. А. Федченко!).

VIII. Терекъ, 10.—12.000', 30. VII. 1881 (Фетисовъ!).

IX. Южный склонъ Александровского хребта надъ западнымъ концомъ долины Сусамыръ, 17. VII. 1881 и 5. VII. 1881, 7—10.000' (Фетисовъ!), съверный склонъ Сусамырского хребта, Сандыкъ, 7—11.500', 3. VII. (Фетисовъ!).

Встрѣчается преимущественно въ высокогорной области. Вирочемъ у пасъ (какъ и на Алтай, по Крылову), спускается иногда (Чаткаль, Санталашъ!) ниже лѣнаго предѣла. Въ такихъ случаяхъ стебель является болѣе сильно развитымъ.

Въ Туркестанѣ въ горахъ — О: Джунгарскій Алатау, Тянъ-Шань; С: Памироалай.

Въ Туркестана — Западный Гималай, Западный Тибеть, горы Сибири, аркт. Сибирь, Монголія.

226. *Silene sarawschanica* Rgl. et Schmalh. Э. Регель Опис. нов. вид. № 14 in A. II. Федченко Путеш. въ Туркестанѣ, вып. 18, стр. 35. — (1881.)

1883. *Silene sarawschanica*, Franchet Mission Capus 239.

IV. Кизылъ-кушъ („Kohistan“, прибавляется *Франше*, но это уже очевидная ошибка), 21. VIII. (Капю).

Я не видѣлъ образцовъ растенія, собраннаго въ нашей области Капю, но полагаю, что въ опредѣленіе *Франше* вкрадлась ошибка, такъ какъ никакъ болѣе *S. sarawschanica* въ Тянъ-Шанѣ найдена не была. Прибавляю, что въ монографии Williams'a эта же видъ совершенно пропущены.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ С: Заравшанъ (О. Федченко! Комаровъ!, Капю!) и больше ни откуда не известно.

227. *Silene lithophila* Kar. et Kir. Enumer. pl. songor. № 158. — 1842. — *Led.*, Fl. ross. I. 776.

1878. *Silene lithophila*, A. Regel Reisebr. 200.

II. Караколъ, у подножія перевала Кумбель (А. Регель — Reisebr. I. c.); Каракія VIII. 1876 въ цв. и пл. (А. Регель! in herb.).

228. *Silene Semenovii* Regel et Herder. Enumer. pl. Semen. № 147. („Bull. de la Soc. des Natur. de Moscou“). — 1866. — № 3.

V. Окуръ бл. Ангрена, V. 80 въ цв. (А. Регель!). Госсай на лѣвомъ берегу Ангрена, 15. VII. 1880 въ цв. (Муса!).

Встрѣчается еще въ О: — Центральный Тянъ-Шань.

Въ Туркестана не известно.

229. *Silene odoratissima* Bge. in *Led.* Fl. alt. II., p. 148. — *Led.*, Fl. ross. I. 312. — *S. radians* Kar. et Kir. Enumer. pl. songor. № 161. — 1842. — *Led.*, Fl. ross. I. 777.

III. Бородай, въ пл. (Съверцовъ!).

Встрѣчается въ пустыняхъ отъ Норь-зайсана и Иртыша до Закасп. области.

**230. *Silene supina* MB. Fl. taur. cauc. I. 336. — 1808.***Led.*, Fl. ross. I. 322. — *Boiss.*, Fl. or. I. 614.1878. *Silene supina*, A. Regel Reisebr. 180, 198.

I. Ст. Сугаты въ долинѣ р. Чу, 22. VI. 80 (A. Regel).

II. Малый Таласть, Каракоку (A. Regel!). Куюкъ, 19. V.

1878 (*Кушакевичъ!*), тамъ же V. 1881 въ цв. (*Муса!*).III. Между Тюлькебашомъ и Яекичу, у ист. Арыса, V. 1881 (*Муса!*), Боролдай-Арысъ и Боролдай-Бугунь (*Съверцовъ!*)IV. Выше Бричъ-муллы, Чаткаль, 4—6000' (A. Regel!), Чаткаль, бл. Аракъ-су 5. VII. 1899 въ цв. (*Литвиновъ!*).V. Чарсу, Ташкентскій Алатау, 9. VI. 1880 (A. Regel!), Джанбулакъ 20. IV. (*Съверцовъ!*). Талдыбулакъ (Ангренъ) V. 1880 (A. Regel!), Госсай 15. VII. 1880 (*Муса!*), Ангренъ 17. V. 1880 (A. Regel!), Мазаръ-бабай-Тогдаръ, 12. VII. 1880 (A. Regel!).VI. Моголь-тау V. 1878 (*Скорняковъ!*).IX. Съверный склонъ Сусамырского хребта 7—10.000', 5. VII. 1881, и вершины 9.000', 7. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

X. Манагильды, 4. VI. 1880, 7000' A. Regel!.

XI. Майли-сай, 2. VI. 1878 (A. Кушакевичъ!), на склонахъ близъ Арсланбобъ, 9. VI. 1899 въ цв. (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ распространено очень широко въ предгорьяхъ и горахъ.

Въ Туркестана — Ю. Россія, Крымъ, Кавказъ, Персія.

*Примѣчаніе.* Нѣкоторыя показанія остаются не разъясненными:1) 1877. *Silene*, A. Regel Reisebr. 367 — Боролдай.2) 1877. *Sileneen*, A. Regel Reisebr. 367 — Боролдай.3) 1877. *Sileneen*, A. Regel Gartenfl. 12 — подъ пер.

Каракія.

4) 1878. *Sileneen*, A. Regel Reisebr. 181 — выше Бричъ-муллы по Чирчику.5) 1878. *Silene-Arten*, A. Regel Reisebr. 184 — Кенсай.6) 1878. *Sileneen*, A. Regel Reisebr. 188 — Терсъ.**84. *Melandrium* Röhl.**

1. Столбиковъ 3 . . . . . 2.  
Столбиковъ 5 . . . . . 4.
2. Зубцы чашечки короткие, тупые . . . . . *M. viscosum* Celak.  
Зубцы чашечки острые, шиловидные . . . . . 3.
3. Стебель прямостоячій, листья элліптические или линейно-ланцетные, плодоножка очень короткая . . . . . *M. noctiflorum* Fries.  
Стебель обыкновенно лежачій или восходящій, листья широкояйцевидные; плодоножка втрое короче коробочки. *M. ovalifolium* Rgl. et Schmalh.
4. Лепестки короче или едва длиннѣе чашечки, плодоножка голая, короткая . . . . . *M. apetalum* Fenzl.  
Лепестки значительно длиннѣе чашечки, плодоножка въ 1½ разъ короче завязи, бѣломохнатая . . . . . *M. longicarpophorum* Komar.

**231. *Melandrium longicarpophorum* Komar.** B. Комаровъ,  
Мат. по фл. турк. наг. Басс. Заравш. № 272. — 1896.  
IV. По р. Афлатуну, притоку Чаткала, 30. VI. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*).

VII. Горы близъ озера Сары-чилекъ, 7.000', 27. VI. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*).

Указано было исключительно для субальпийскихъ степей верховьевъ Заравшана (Комаровъ!).

**232. *Melandrium apetalum* (L.) Fenzl.** *Led.*, Fl. ross. I. 326. — 1842.

*Lycchnis apetala* L. Sp. pl. (ed. 1a) p. 437. 1753.—  
*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 222.

I. Джиламышъ, 25. VI. 1880; Арассаиль, 9—11.000', 5' VI. 1880 (*Фетисовъ!*).

IV. У ледниковъ въ верховьяхъ Майдантала, 1. VIII. 1897, 10—11.000', въ цв. и у ледника Акъ-турнай, 27. VII. 1897, 10—11.000', въ цв. (Б. А. Федченко!!); по р. Афлатуну, притоку Чаткала, 30. VI. 1899 (форма болѣе высокая, сильно пушистая, напоминающая *M. triste* Bge. — *Литвиновъ!*); пер. Афлатунъ, 30. VII. 1899, пл. (*Литвиновъ!*).

IX. Съверный склонъ Сусамырского хребта, 8—11.000', 8. VII. 1881; вершины Сусамырского хребта, перевалъ Кумбель, 10—12.000', 5. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

(217)

Въ Туркестанѣ О:—Джуңгарскій Алатау, Тянь-Шань; S:—Шамироалай.

Виѣ Туркестана—арктическая область; горы Сѣв. Европы, Азіи и Америки, Монголія.

**233. *Melandrium noctiflorum* (L.) Fries.** in Botan. Notis. (1842) p. 170.

*Silene noctiflora* L. Spec. pl. (ed. 1-a) p. 419.—**1753.**—*Led.*, Fl. ross. I. 314.—*Boiss.*, Fl. or. I. 581.

XI. Тараңъ-базарь, лѣса въ ущельяхъ, 3. VIII. 1895 (*C. Коржинскій!*), Арсланбобъ, въ пл.  $\frac{1}{2}$  VI. 1899 (*Литвиновъ!*).

Виѣ Туркестана—средняя и сѣверная Европа, Крымъ, Кавказъ, Персія, Малая Азія.

**234. *Melandrium viscosum* (L.) Celak.** in Lotos 1868 (sec. Beek, Fl. Nied. Oest. 379).

*Cucubalus viscosus* L. Sp. pl. (ed. 1a) 414.—**1753.**—*Silene viscosa* Pers. Syn. I. 497.—*Led.*, Fl. ross. I. 313.—*Boiss.*, Fl. or. I. 582.

v. *quadrilobum* (Turcz.) B. Fedtsch.

*Silene viscosa* v. *quadriloba* Trautv. Enum. pl. Song. Schrenk. № 212.

*Silene quadriloba* Turcz. in Karel. et Kiril. Enum. pl. Song. № 159.—*Led.*, Fl. ross. I. 777.

IX. Южный склонъ горъ Сусамыръ-тау, 7—10.000', 5. VII. 1881, въ цв.; долина Сусамыръ, 7.000', 2. VII. 1881, въ цв. и съ пл. (*Фетисовъ*).

Виѣ Туркестана (видъ): средняя Европа, Малая Азія, Крымъ, Кавказъ, Персія.

**235. *Melandrium ovalifolium* Rgl. et Schmalh.** in Э. Регель, Описание новыхъ видовъ, № 38 in A. Федченко, Путеш. въ Туркестанѣ, вып. 18. (1881).

II. Въ долинѣ р. Кумынъ-тагъ, 10. VIII. 1897, въ пл. (B. A. Федченко!!).

IV. Мазаръ Бабай-тогдаръ близъ Ташикента на Актау, 12. VII. 1880 (*Мусат!*); въ окр. кишлака Искемъ, 22. VII. 1897, пл. (B. A. Федченко!!).

VII. При спускѣ съ перевала Акъ-чиочекъ къ р. Афлатунъ, на сырыхъ мѣстахъ въ кустарникѣ у ручья, въ цв., 24. VIII. 1902 (B. A. Федченко!!).

XI. Андик. у Арсланбоба, лѣса, 14. VI. 1899 (*Литвиновъ!*), Арсланбобъ, листв. лѣса, 10. VIII. 1895, въ цв. (*C. Коржинскій!*), по р. Караваңгуръ, 30. V. 1899 (*Литвиновъ!*).

Виѣ Туркестана встрѣчается еще въ О:—Тянь-Шань и S:—Зеравшанъ (O. Федченко!, B. Комаровъ!).

Виѣ Туркестана—не извѣстно.

### 85. *Lychnis* L.

**236. *Lychnis coronaria* (L.) Lam.** Encycl. méth. III. 643.—*Led.*, Fl. ross. I. 331.—*Boiss.*, Fl. or. I. 658.

*Agrostemma coronaria*, L. Sp. pl. (ed. 1a) p. 436.—**1753.**

1878. *Silene coronaria*, A. Regel Reisebr. 174.  
IV. Сайлыкъ, 4—6.000', VIII. 1876, въ пл. (A. Regel!), Чирчикъ, 9. VII., постыди. цв. (*Сѣверцовъ!*), окрести. Кумсаны, VI. 1872, въ цв., 3.000' (*Короликовъ!*), въ кустарникахъ на восточномъ склонѣ перевала между Кумсаномъ и Нанаємъ, въ пл. 31. VII. 1902, 3.000' (B. A. Федченко!!).

У насъ встречается лишь въ очень ограниченомъ районѣ и больше пока иш откуда (изъ Туркестана) не извѣстно.

Виѣ Туркестана—юж. Европа, Крымъ, Кавказъ, М. Азія.

*Приимѣніе.* Въ статьѣ С. А. Лидского (Горные окрестности Ташикента, въ „Турк. Вѣдом.“ 1887 г., № 48) указывается еще *Viscaria vulgaris*, которая будто бы растетъ на склонахъ горъ Токале. Это показаніе никакъ не подтверждено и является весьма сомнительнымъ. Настоящая *Viscaria vulgaris* Rohl. до сихъ поръ не была находима южнѣе течения р. Иинъ (Карелинъ по Щеглеву!).

### 86. *Acanthophyllum* C. A. Mey.

1. Соцѣѣтіе—густые головки на концахъ вѣтвей *A. pungens* Boiss.  
Соцѣѣтіе—раскидистая метелка . . . . . *A. paniculatum* Rgl.

237. *Acanthophyllum pungens* (Bge) Boiss. Fl. or. I, 561. (1867). — *Golenkin*, *Acanthophyllum*, № 3. *A. spinosum* C. A. Mey. Ind. caucas. p. 210. — 1831. — *Led.*, Fl. ross. I, 333. *Saponaria pungens* Bge. in *Led.*, Fl. alt. II, p. 133. — 1830. — *Led.*, le. fl. ross. t. 4. — 1829.

1893. *Acanthophyllum pungens*  $\delta$  *glabriusculum* и  $\delta$  *glabrum*, *Golenkin* *Acanthophyllum* № 3.

Туземное назв. кусаякъ — на Балхашъ; Акъ-текень — въ Кызылкумахъ.

IV. Алатау, въ окрестностяхъ Бричъ-муллы, 3.000', V. 1872, въ цв. (*Королковъ!*) — по гербарному экземпляру трудно сказать съ достовѣрностью, были ли вънчики бѣлыми, какъ думалъ *Регель*, Караганъ, 27. V. 1882 (*Маевъ!*).

VI. Моголь-тау, 23. V. (*Съверцовъ!*) тамъ же; 15. VI и 5. VIII. 1903 (*Невъскій!*).

Въ Туркестанѣ распространено широко: N, O, S и W.

Въ Туркестана — Афганистанъ, Белуджистанъ; съверо-западная Монголія.

238. *Acanthophyllum paniculatum* Rgl. in E. Regel et Herder, Enumer. plant. in region. cis—et transiliensis a cl. Semenovio lect. ann. 1857, № 155 et tab. II. („Bull. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou“ 1866).

1877. *Acanthophyllum paniculatum*, E. Regel Deser. pl. nov. fasc. VI. („Acta Horti Petr.“ V. 249).

1893. *Acanthophyllum paniculatum* *Golenkin* *Acanthophyllum* № 17.

IV. Въ долинѣ р. Чирчикъ (*Краузъ!*).  
VIII. Узунъ-Ахматъ, въ горахъ Сусамыръ, 27. VII. 1881, 4.000' (*Фетисовъ!*).

*Var. gypsophiloides* (Rgl.) *Golenk.* *Acanthophyllum* № 17 β.  
*A. gypsophiloides* Rgl. in *Э. Регель*, Описан. нов. вид. № 39 въ S. II. *Федченко* Путеш. въ Туркест., вып. 18. (1881).

1877. *Acanthophyllum gypsophiloides* E. Regel Deser. pl. nov. fasc. VI. („Acta Horti Petrop.“ V. 249).

1878. *Acanthophyllum gypsophiloides*, A. Regel Resebr. 180. 1881—2. „ „ „ E. Regel in A. II. *Федченко* I. c.

1883. *Acanthophyllum gypsophiloides* Franchet Mission Capus 238.

1902. *Acanthophyllum paniculatum* v. *gypsophiloides*, O. A. *Федченко*, Списокъ № 214.

Тузем. назв.: акъ-чутай — въ Ферганѣ; сообщено г. Меликъ-Саркисяномъ.

II. Баркаракъ, на сѣв. склонѣ Таласскаго Алатау, 9. VIII. 1897, 7—8.000', въ цв. (Б. А. *Федченко*!).

III. Боролдай, з. VI. 1876, въ цв. и пл. (А. *Регель*!).

IV. Паркустъ, при выходѣ Чирчика изъ горъ, 18. VII. 1881 (А. *Регель*!); въ степи между Ташкентомъ и Сыръ-Дарьей,

19. V. 1871, 700—1.400' (O. A. *Федченко*!), Ташкентъ, V. 1880 (А. *Регель*!), Караганъ (*Маевъ!*), Бакракъ, долина Чирчика, 8—9.000', VIII. 1876, въ пл. (А. *Регель*!), по верхнему Чаткалу, 2. VII. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*), выше Бричъ-муллы по Чирчику, 4—6.000', въ цв. (А. *Регель*!), по р. Карагорумъ,

28. VIII., въ цв. (*Капю!*), Ташкентъ, III. 1872 (*Королковъ!*), Идрисъ-пей-гамбаръ, 29.VIII. 1902, въ цв.; въ долинѣ р. Искемъ отъ кишлака Нанай до кишл. Пекемъ 1. VIII. 1902 и отъ кишл. Искемъ до р. Аидаулыганъ з. VIII. 1902, въ цв. (Б. А. *Федченко*!).

VI. Моголь тау з. VIII. 1903 (*Невъскій*!).

VII. Май-булакъ близъ Намангана, въ цв., 20. VI. 1870 (*Краузъ!*).

XI. Чарвакъ, по дорогѣ, 5. VI. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*).

А. *gypsophiloides* былъ выдѣленъ Э. Регелемъ въ особый видъ, очевидно, безъ достаточныхъ причинъ, такъ какъ отличія отъ *A. paniculatum* черезчуръ незначительны. На это обстоятельство было обращено вниманіе двумя ботаниками, изслѣдовавшими наше растеніе послѣ Э. Регеля. Однако, у обоихъ вкрались иѣкоторыя источности.

Одни, М. И. Голенкинъ, авторъ весьма полезнаго „Ver-

zeichniss“а видовъ рода *Acanthophyllum*, присоединяетъ

*A. gypsophiloides* въ качествѣ разновидности (?) къ *A. paniculatum* и утверждаетъ, что она бываетъ „*glaberrimum vel lente puberulum*“, очевидно, желая сказать „*sub lente puberulum*“...

В. Л. Комаровъ говоритъ: „*опроки заявленію Голенкина*, зеравшанская форма этого вида не *всегда гладкая*“. Очевидно,

вместо „*гладкая*“ должно значиться *голая*; но кромѣ того, мы видѣли уже, что и Голенкинъ не отрицаетъ того, что она

бываетъ слегка пушистая...  
(221)

У туземцевъ это растеніе имѣть употребленіе, какъ мыльный корень.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — Тянь-Шань и С: — Заравшанъ, Фергана.

## XIV. Alsineae.

### 87. *Sagina* L.

**239. *Sagina Linnaei* Presl.** Reliqu. Haenk. II. p. 14.—**1831.** *Led.*, Fl. ross. I. 339.—*Boiss.*, Fl. or. I. 663.

*Spergula saginoides* L. Sp. pl. (ed. 1a) p. 441.—**1753.** I. Переваль Кумбель, 9.000' (*A. Regel!*).

IV. По р. Андаузыганъ, 7—8.000', въ цв. 23. VII. 1897. (Б. А. Федченко!!), по р. Чирчикъ, 4—6.000', 1876 (*A. Regel!*).

Въ Туркестанѣ собрано еще въ О: — Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань; С: — Памироалай; Заравшанъ (*B. Кошаровъ!*).

Въ Туркестана — горы Европы, Сибири, Сѣверной Америки; Кавказъ, арктическая область, Мавритания, Малая Азія, Персія, Манджурія, Корея, Китай, Японія, Формоза, Мексика.

### 88. *Alsine* L.

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Однолѣтнія растенія . . . . .  | 4. <i>A. tenuifolia</i> Crantz. |
| Многолѣтнія растенія . . . . .  | 2.                              |
| 2. Вѣнички такой же длины, какъ чашечка или<br>лишь немнога длинище ея . . . . .                            | 3.                              |
| Вѣнички въ 2—3 раза длиниче чашечки .   | <i>A. juniperina</i> Wahlb.     |
| 3. Чашелистики заостренные; верхняя часть ра-<br>стенія обыкновенно железисто-пушистая .                    | <i>A. verna</i> .               |
| Чашелистики туные . . . . .   | <i>A. biflora</i> Wahlb.        |
| 4. Чашечка при основаніи не твердѣющая .  | <i>A. tenuifolia</i> Crantz.    |
| Доли чашечки при основаніи вносятъствіи<br>становятся очень твердыми, соцѣйтъе очень<br>скученное . . . . . | <i>A. Meyeri</i> Boiss.         |

**240. *Alsine tenuifolia* (L.) Crantz.** Institut. II. p. 407.—**1766.** —*Led.*, Fl. ross. I. 342.—*Boiss.*, Fl. or. I. 685.

*Arenaria tenuifolia* L., Sp. pl. (ed. 1a) p. 424.—**1753.** III. Бородай, 1876 (*A. Regel!*).

IV. Чимганъ, 21. VI. 1881, 6—7.000' (*A. Regel!*).

V. Кендырь-аузъ, переваль на Ангренъ, 18. VI. 1880 (*A. Regel!* — собрано *Мусою!*).

Въ Туркестанѣ изрѣдка въ предгорьяхъ: О, С, В.

Въ Туркестана — Европа, сѣверная Африка, Крымъ, Кавказъ, Малая Азія, Персія, Сирія, Афганистанъ.

**241. *Alsine Meyeri* Boiss.** Diagnos. pl. nov. or. Ser. I. 8. p. 96.—**1849.** —*Boiss.*, Fl. or. I. 682.

*A. globulosa* C. A. Mey. Ind. Cauc. p. 219.—*Led.*, Fl. ross. I. 344 (nomen a Labill. praeoccupatum, ideoque a cl. Boissiero mutatum).

*Arenaria Meyeri*, Hook., Fl. br. Ind. I. 236.  
VI. Моголь-тау, 23. V. 1877 (*Сѣверцовъ!*).

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — ст. Сугаты въ дол. р. Чу, 22. VI. 1880 (*A. Regel!*), С: Заравшанъ (*B. Кошаровъ!*), Бальджуанъ (*A. Regel!*).

Въ Туркестана — Малая Азія, Сирія, Кавказъ, Афганистанъ, Персія, Синай, Пенджабъ.

**242. *Alsinie verna* (L.) Wahlenb.** Fl. Lapp. p. 129.—**1812.** —*Bartl.* und *Wendl.* Beitr. II. 63.—*Led.*, Fl. ross. I. 347.—*Boiss.*, Fl. or. I. 676. (**1825.**)

*Arenaria verna*, L. Mant. 72.—**1767.**  
I. Джиламышъ, 22. VI. 1880 (*Фетисовъ!*).

II. Переваль Кумынъ-тагъ, 11. VIII. 97, 10.500' (Б. А. Федченко!!).

IV. Чимганъ, 5—7.000', 21. VI. 1881 (*A. Regel!*).  
IX. Сѣверный склонъ Сусамырского хребта, у р. Сандыкъ, 9—11.500', 3. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

Въ Туркестанѣ встрѣчается только въ горахъ О: — Джунгарскій Алатау и Тянь-шань; С: — Памироалай.

Въ Туркестана: Европа, сѣверная Африка, Кавказъ, Сибирь; сѣверная Монголія.

**243. *Alsine juniperina* (L.) Wahlenb.** Fl. Lapp. p. 129.—**1812.** —*Fenzl.* Verbr. d. Alsin. in tab. ad p. 18 (ex *Fenzl.*, *Led.*, Fl. ross. I. 351). —*Boiss.*, Fl. or. I. 677.

*Arenaria juniperina* L. Mant. I. 72.—**1763.** (nec. Mant. II. nec. Syst. ed. XIII).

1878. *Alsine Villarsii*  $\beta$  *subglabra*, *A. Regel* Reisebr. 192, 201.

I. Аламединъ, 25. V., Аксу, 30. VI. 1880, Джиламышъ 5—6.000', 27—28. VI. 1880, Арассанъ 5. VI. 1880, 9—11.000' (*Фетисовъ!*).

II. Кумышъ-тагъ, 10.000', 11. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!), Каракия (А. Регель!).

IV. Куургент-туръ, 7.000', 5. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!), Каракызымацъ у пер. Карабура (А. Регель!).

IX. Съверный склонъ Сусамырского хребта, 9.500 — 10.500', въ VII. 1881 (Фетисовъ!).

Въ Туркестанѣ широко распространено, въ различныхъ формахъ, въ горахъ: О: — Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань; С. — Памироалай.

Виѣ Туркестана — Греція, Кавказъ, Крымъ, Малая Азія, Сирія, Персія.

**244. *Alsine biflora* (L.) Wahlenb. Fl. lappon. p. 128.—1812.  
Led., Fl. ross. I. 355.**

*Stellaria biflora* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 422. — 1753.

1878. *Alsine biflora*, A. Regel Reisebr. 202.

I. Колыторъ, 10.000', 7. VII. 1882 (Фетисовъ!).

II. Кумбель (А. Регель!).

VII. На перевалѣ Афлатунъ, 30. VI. 1899, въ пл.; горы близъ озера Сары-чилекъ, 9.000', 27. VI. 1899 (Литвиновъ!).

IX. Съверный склонъ Сусамырского хребта у р. Сан-дакъ, 9 — 11.500', 3. VII. 1881 (Фетисовъ!).

XI. На перевалѣ Кенколъ, 9.500 — 10.000', 16 — 17. VI. 1899, въ цв. и съ пл. (Литвиновъ!).

Въ Туркестанѣ въ горахъ О: — Джунгарскій Алатау, Тянь-шань.

Виѣ Туркестана — Арктическая Европа и арктическая Сибирь, Аянъ и Прибайкальскія горы; съверная Монголія; Шпицбергенъ, Гренландія.

### 89. *Lepyrodiclis* Fenzl.

Лепестки бѣлые, продолговатоланцетные . . . . *L. holosteoides* F. et M.  
Лепестки розоватые, узколинейные . . . . *L. stellaroides* Schrenk.

**245. *Lepyrodiclis holosteoides* (C. A. Mey.) Fisch. et Mey.**  
Enumer. pl. nov. Schrenk, p. 93 (in nota). — 1841. — *Led.*, Fl. ross. I. 359 (здесь *Fenzl* цитируетъ свою *Alsin.* monogr. inedit.) — *Boiss.*, Fl. or. I. 668.

*Gouffea holosteoides* C. A. Mey. Ind. cauc. p. 217. — 1831.

*Arenaria holosteoides* Edgew. in Hook., Fl. br. Ind. I. 241.

1902. *Lepyrodiclis holosteoides*, O. A. Федченко Списокъ № 218.

Туземн. назв.: чатыръ (киргиз.).

III. Чимкентъ (*Съзерцовъ!*).

IV. Въ садахъ, 8. V. (*Краузе!*); между Ташкентомъ и Келесомъ, 22. IV. 1871, 1.300'; сады на Саларѣ, 1.400', 9. IV. 1871 (О. Федченко!); Ташкентъ, IV. 1880 и IV. 1882 (А. Регель!); Ташкентъ, 1899 (Е. Хомутова!).

V. Карасу, 9. IV. 1880 (А. Регель!).

VI. Моголь-тау (*Скорняковъ!*).

VII. Каракурганъ, 20. V. 1878 (*Скорняковъ!*).

XI. По р. Уюнкуръ-су, тѣнистые склоны у ручья, 14. VIII. 1895, 6.500' (*C. Коржинскій!*).

Въ нашей области встречается не рѣдко; почти всегда, какъ сорное растеніе. По Туркестану распространено широко — О, С, В.

Виѣ Туркестана — Малая Азія, Закавказье, Персія, Белуджистанъ, Съверо-западная Индія, Китайскій Туркестанъ.

**246. *Lepyrodiclis stellaroides* Schrenk in Fisch. et Mey.**  
Enumer. pl. nov. p. 93. — 1841. — *Led.*, Fl. ross. I. 359. — *Boiss.*, Fl. or. I. 669.

I. Аламединъ, 25. V. (Федченко!).

III. Карагау, 11. V. 5.000 (*Съзерцовъ!*).

V. Кендыръ-аузъ, 18. V; Ангренъ, 17. V. 1880 (А. Регель!).

XI. Кенколъ, въ еловыхъ лѣсахъ, 8 — 9.000', 13. VII. 1895 (*C. Коржинскій!*), Арсланбобъ, 3. VI. 1899, въ цв. (Литвиновъ!) — экземпляры не вполнѣ типичные — нѣсколько отличаются по болѣе длиннымъ цветоножкамъ, меньшему опушенню къ *L. holosteoides*). По р. Уюнкуръ-су, тѣнистые склоны у ручья, 6.500', 14. VIII. 1895 (*C. Коржинскій!*), бл. Узгента, 4.000', 28. V. 1880, въ цв. (А. Регель!).

По Туркестану распространено широко: — О, С, В; виѣ Туркестана указано для Персіи и Афганистана. Въ общемъ чрезвычайно близко къ предыдущему виду и скорѣе представляеть одну изъ формъ его.

90. *Arenaria* L.

1. Растения многолетние с узкими шиловидно-линейными листьями и более крупными венчиками . . . . . *A. Griffithi* Boiss.  
Растения с ланцентными или овальными листьями. 2.
2. Растения однолетние . . . . . *A. serpyllifolia* L.  
Растения многолетние . . . . . *A. rotundifolia* M.B.

247. *Arenaria Griffithi* Boiss. Diagnos. ser. II. fasc. 1 p. 89. — 1854. — *Boiss.*, Fl. or. I. 697. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 237.

1877. *Arenaria Meyeri*, *E. Regel* Descr. pl. nov. fasc. V. (Acta H. Petr. V. 250).

1878. *Arenaria Meyeri*, *A. Regel* Reisebr. 181.

1878. *Alsineen*, *A. Regel* Reisebr. 188.

1883. *Arenaria Meyeri*, *Franchet* Mission Capus 241.

IV. Горы Алатау и Акъ-тагъ-тай (*Короликовъ!*), Чимганъ, 5—8.500', 21. VI. 1881 (*A. Regel!*), Идриссъ-пей-гамбаръ 25. VI. 1880 (*A. Regel!* — собрано *Мусою!*), Бакракъ на Чаткалъ, VIII. 1876 (*A. Regel!*), въ верховьяхъ ручья Аидаульганъ, въ субальпийской зонѣ, 8—9.000', 23. VII. 1897, въ цв. (Б. А. Федченко!), на травянистыхъ склонахъ у ледника Карабулакъ въ верховьяхъ р. Майданталъ, 3. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!) у золотыхъ пріисковъ на Терсъ (*A. Regel!*), Она (=Анда) — Ульганъ 22 августа — *Капю!*, по р. Санталашу VIII. 1902, въ цв. (Б. А. Федченко!), Большой Чимганъ 18. VII. 1900; Чимганъ, 1902 (*E. Хомутова!*)

V. Кендырь-аузъ 20. V. 1880 (*A. Regel!*) — вѣроятно *Мусою*.

VII. По р. Афлатунъ, у впаденія р. Уялмачаты, 25. VIII. 1902, въ цв. (Б. А. Федченко!).

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ горахъ — О и С.

Въ Туркестана найдено въ Афганистанѣ и Западномъ Тибете.

248. *Arenaria rotundifolia* M. B. Fl. taur. cauc. I. 843. — 1808. — *Led.*, Fl. ross. I. 369. — *Boiss.*, Fl. or. I. 700.

1878. *Arenaria rotundifolia* *A. Regel* Reisebr. 181, 192.

IV. По Чаткалу выше Бричъ-мұллы, 4—6.000'; Каракызымақъ у. перевала Карабура VIII. 1876 (*A. Regel!*); по р. Аидаульганъ, выше сліянія двухъ ручьевъ, 8—9.000', 23.

VII. 1897 (Б. А. Федченко!), у ледника Акъ-туриакъ, 10—11.500', 27. VII. 1897 (Б. А. Федченко!), на перевалѣ Афлатунъ, 30. VI. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*).

VII. На галькѣ въ долинѣ р. Афлатуна, у впаденія р. Уялма-чаты, 25. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!).

Въ Туркестанѣ S — Шугнанъ (*A. Regel!*), Заравшанъ (*O. Федченко!* и др.), Дарвазъ (*A. Regel!*).

Въ Туркестана — Балкайский полуостровъ, Малая Азія, Кавказъ.

249. *Arenaria serpyllifolia* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 423.—1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 368. — *Boiss.*, Fl. or. I. 701.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 239.

I. Аламединъ 3.500' — 5.500', 25 — 6. V. 1880 (*Фетисовъ!*).

II. По р. Кумышъ-тагъ, 10 VIII. 1897 (Б. А. Федченко!). У перевала Каракія (*A. Regel!*), Айгралекъ въ верховьяхъ Таласа (*A. Regel!*).

IV. Около кишл. Пскемъ, 22. VII. 1907, озеро Урунгачъ близъ кишл. Пскемъ, 2. VIII. 1902 (Б. Федченко!). Чаткаль, 4—6.000' (*A. Regel!*), Ходжакентъ 19. IV. 1881; Сыръдарья близъ Ташкента (?), IV. 1880 (*A. Regel!*), близъ кишл. Нанай, 21. VII. 1897 (Б. А. Федченко!).

VI. Моголь-тау, 23. V. (*Скорняковъ!*); правый берегъ Сыръ-Дары бл. Ходжента 14. IV. 1880 (*A. Regel!*).

XI. Арсланбобъ, 3. VI. 1899 (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области обычное сорное растеніе.

Въ Туркестанѣ не рѣдко въ предгорьяхъ: О, С.

Въ Туркестана — Европа, Сѣверная Америка, Сибирь, Малая Азія, Кавказъ, Персія, Афганистанъ, Индія.

*Приложеніе.* Изъ р. *Arenaria* для нашей области указывается еще *A. g r a m i n i f o l i a* Schrad. (1902 *O. A. Федченко*, Списокъ № 220 — между Орскомъ и Ташкентомъ V. 1870); но я полагаю, что растеніе это было собрано ближе къ Орску, въ предѣловъ нашей области, тѣмъ болѣе, что тамъ (между Орскомъ и Карабутакомъ) оно было собрано въ 1876 г. Альб. Регелемъ.

Изъ рода *Arenaria* въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды:

*A. longifolia* M.B. . N O — —

A. Meyeri Fenzl. . . N O — —  
 (=A. subulata Led.).

Едва ли не тождественно съ A. Griffitti Boiss.

### 91. *Thylacospermum* Fenzl.

250. *Thylacospermum rupifragum* (Karel. et Kir.) Schrenk  
in *Fisch. et Mey.*, *Enumer. alt. pl. nov.* p. 53. — 1842. — *Hook.*,  
*Fl. br. Ind.* I. 243.

*Arenaria* (subgenus *Dicranilla*) *rupifraga*  
Fenzl. in *Led.*, *Fl. ross.* I. 780.

*Bryomorpha rupifraga* Karel. et Kir. *Enum. pl.*  
*Songr.* № 174. — 1842.

*Periandra caespitosa* Cambess. in *Jacquem Voy.*  
*Bot.* 27, tab. 29. (*Flourensia*):

I. Александровский хребетъ, 9 — 10.000', 4. VI. 1880  
(Фетисовъ!).

Одно изъ любопытнѣйшихъ растеній высокогорной флоры  
нашей области и вообще Туркестана. Встрѣчается въ О: —  
Джунгарскій Алатау: (*Шренкъ*, *Карелинъ* и *Кирилловъ*!),  
переваль съ Касана на Хоргостъ; пер. Талды; пер. Кулденъ-  
даванъ (*A. Регель*!); Чичканъ въ хр. Борохоро. 12 — 13. VII.  
1899 (*Я. Корольковъ*!); Тянь-Шань: Зайлійскій Алатау:  
на перевалѣ Мунджюкѣ у истоковъ р. Талгаръ, 7. VII. 1896  
и подъ пер. Кашкаланъ, 23. VI. 1896 (*Бромтерусъ*!); у озера  
Иссыкъ-куль 11. VII. (Фетисовъ!), ущелье Талгаръ (*A. Регель*!).

Внѣ Туркестана известно изъ Западнаго Тибета, гдѣ  
это растеніе было открыто *Жакеномтоимъ* собственно раньше,  
чѣмъ было оно собрано въ Туркестанѣ *Карелиныи* и  
*Шренко*.

### 92. *Moehringia* L.

251. *Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl. *Verb. Alsin.* tab. ad.  
18. (1833) — *Led.* *Fl. ross.* I. 371.

*Arenaria lateriflora* L. *Sp. pl.* (ed. 1-a) p. 423. — 1753.  
XI. Въ еловомъ лѣсу по р. Кара-үнгуръ, 6.000', 30. V.  
1899 (Литвиновъ!).

Въ нашей области рѣдкое лѣсное растеніе.

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — Джунгарскій  
Алатау и Тянь-Шань.

Изъ р. *Moehringia* въ Туркестанѣ встрѣчается еще  
одинъ видъ:

*M. trinervia* (L) Clairv. — О (Джунгарскій Алатау).

Въ гербаріи Императорскаго Ботан. Сада имѣются еще  
образцы какой то *Moehringia*, собранные близъ Вѣриаго  
*A. Регель* (!), но я не увѣренъ, относятся ли они къ *M.*  
*trinervia*, или же представляютъ видъ новый, неописанный.

Прибавлю еще, что показаніе *M. trinervia* (L.) Clairv.  
для Самарканда (*О. Федченко* Списокъ раст. собр. въ 1869—71)  
не подтверждается: экземпляры изъ Самарканда, какъ замѣ-  
чено *В. Комаровыи* (in sched. herb. Petrop.) относятся къ  
*Arenaria serpyllifolia* L.

### 93. *Holosteum* L.

252. *Holosteum umbellatum* L. *Sp. pl. ed. 1-a* 88. — 1758.—  
*Led.*, *Fl. ross.* I. 373. — *Boiss.*, *Fl. or. I.* 709. — *Hook.*, *Fl. br.*  
*Ind.* I. 227. :

1902. *Holosteum umbellatum*, *О. А. Федченко* Списокъ  
№ 225.

I. Предгорья Александровскаго хребта, 15. IV. 1879  
(Фетисовъ!).

III. Чимкентъ (Съверцовъ!).

IV. Ташкентъ, 3. III., степь на Боссу, 16. III., окрест-  
ности Ташкента 19. III. 1871 (*О. А. Федченко*!), Ташкентъ  
1899 (Хошумотовъ!), Куйлюкъ бл. Ташкента, 1. IV. 1880 (*A. Регель*!).  
Ташкентъ, 2 — 30. IV. 1882 (*A. Регель*!); въ садахъ (*Краузъ*!);  
горы Карагату (Маевъ!).

V. Близъ р. Карасу между Ташкентомъ и Ходжентомъ,  
9. IV. 1880 (*A. Регель*!).

VI. Моголь-тау (Съверцовъ!).

Весеннее растеніе, широко распространенное въ степяхъ  
и предгорьяхъ нашей области. Таксономическое значеніе  
различныхъ признаковъ у представителей р. *Holosteum* L.  
является не достаточно установленнымъ, поэтому пред-  
ставляется невозможнымъ отличать вполнѣ достовѣрно  
*H. liniflorum* отъ *H. umbellatum*. Если виды эти отличаются  
между собой достаточно постоянно, то можетъ быть, наша  
туркестанская форма составить совершенно самостоятельный  
видъ, но болѣе правдоподобнымъ является предположеніе

*Bentham'a* и *Hooker'a* (*Genera plantarum* I. p. 148), соединяющихъ разнообразныя формы *Holosteum* въ одинъ видъ.

Въ Туркестанѣ широко распространено: О, С; В.

Внѣ Туркестана встрѣчается въ Европѣ, Сѣверной Америкѣ, на Кавказѣ, въ Крыму, Сиріи, Палестинѣ, Персіи, Кашмирѣ.

#### 94. *Stellaria* L.

1. Листья широкие, овальные или широко-ланцетные . . . . . 2.

Листья узкие, линейные или узколанцетные . . . . . 4.

2. Всѣ или по крайней мѣрѣ нижніе листья чешковые . . . . .

Листья обыкновенно сидячіе . . . . .

3. Растеніе съ основанія дихотомически вѣтвистое, стебли круглые, чашелистики острые, одинаковой длины съ лепестками . . . . .

Растенія съ угловатыми стеблями, менѣе сильно развѣтвленными; чашелистики туповатые, вдвое короче лепестковъ . . . . .

4. Прицвѣтки всѣ или по крайней мѣрѣ верхніе зеленые, листовидные . . . . .

Прицвѣтки всѣ пленчатые . . . . .

5. Лепестки длиннѣе чашелистиковъ . . . . .

Лепестки короче чашелистиковъ . . . . .

253. *Stellaria media* (L.) Cyrill. Char. Comm. p. 36.—1784.  
(ex *Gurke*, pl. Eur.).—*Led.*, Fl. ross. I. 377.—*Boiss.*, Fl. or. I. 707.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 230.

III. Чимкентъ, янв.—февр., въ цв. (*Сѣверцовъ!*).

IV. Ташкентъ, IV. 1882 (*A. Регель!*); по садамъ, 3. V. (*Краузел!*); Бричъ-мулла, 19. VII. 1897. (*О. А. и Б. А. Федченко!*); Ташкентъ 1899 (*Холмутовъ!*).

XI. Арсланбобъ, 26. V. 1899 (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области изрѣдка, какъ сорное растеніе. Въ Туркестанѣ—Бальджуанъ, Кулябъ, Дарвазъ; Самаркандъ. Космополитъ.

254. *Stellaria dichotoma* L. Sp. pl. (ed. 1a) p. 421.—1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 378.

III. Карагузъ, 11. V. (*Сѣверцовъ!*).

Рѣдко въ предгорьяхъ. Въ Туркестанѣ N:—Омскъ и S:—Заравшанъ (*О. Федченко!*).

Внѣ Туркестана—сѣверный Китай, западная Маньчжурия, Монголія, южная Сибирь; указывается также для Урала.

255. *Stellaria rigida* (Bge.) Rgl. Descr. pl. nov. fasc. V. in „Acta Horti Petr.“ V. 251.—1877.

*S. dichotoma* L. v. *rigida* Bge., Enum. alt. p. 34.—*Led.*, Fl. ross. I. 380.

XI. Переярль Кугартъ, на каменистыхъ склонахъ, 10.000', въ цв. и пл., 6. VIII. 1895 (*С. Коржинскій!*).

Въ нашей области—рѣдкое высокогорное растеніе. Таковъ и вообще характеръ распространенія этого растенія въ Туркестанѣ.

Внѣ Туркестана—южный Алтай.

256. *Stellaria humifusa* Rottb. Skribt. Vidensk. Selsk. Kjøbenhavn. X. 447.—1770.—*Led.*, Fl. ross. I. 384.

1878. *Stellaria humifusa* A. Regel Reisebr. 281.

IV. По Чаткалу выше Бричъ-муллы, 4—6.000'; Кокшарь 6—7.000' (*A. Регель!*); Карабура, Идрисъ-пей-гамбаръ, по сырьемъ лугамъ у р. Андаульганъ, 23. VII. 1897 и 7. VIII. 1902, въ цв., 8—9.000' (*Б. А. Федченко!*).

V. Отурбель, V. 1880 (*A. Регель!*—собр. *Musa*).

Въ нашей области изрѣдка по лугамъ вдоль ручьевъ, преимущественно въ субальпійской полосѣ. Въ Туркестанѣ: О:—Тянъ-Шань; С:—Алайскій хребт. (*О. А. Федченко!*), Заалайскій хр. (*Скорняковъ!*), Заравшанъ (*В. Комаровъ!*).

Внѣ Туркестана—въ арктической области.

257. *Stellaria graminea* L. Sp. pl. (ed. 1a) p. 422.—1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 391.—*Boiss.*, Fl. or. I. 707.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 233.

I. Аламединъ, 5—9.000', 23—5. V. 1880 (*Фетисовъ!*).

IX. Сѣверный склонъ Сусамырского хребта, 7—10.000'; 4—5. VII. 1881 и вершины его, 10—12.000', 5. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

Въ нашей области не часто, какъ и вообще въ Туркестанѣ: N:—Карагузъ въ Карагату (*A. Регель!*), О:—Джунгарскій Алатау, Тянъ-Шань; S:—Алайскій хребетъ.

Внѣ Туркестана—Европа, Сибирь, Крымъ, Кавказъ, Монголія, Западный Тибетъ.

258. *Stellaria brachypetala* Bge. in *Led.*, Fl. alt. II. 161.—  
1830.—*Led.*, Fl. ross. I. 390.

I. Кольторъ, 7. VII. 1882, 10.000' (*Фетисовъ!*).

Высокогорное растеніе. Такой же характеръ распространенія и вообще въ Туркестанѣ: О: — Зайлайскій Алатау, Кунгей Алатау (*Бротерусъ!*), Музартъ (*A. Регель!*); С: — Памиръ (*Кушакевичъ!*).

Виѣ Туркестана — Алтай.

*Приимчаніе.* Изъ р. *Stellaria* въ Туркестанѣ встрѣчается еще цѣлый рядъ видовъ:

S. Bungeana Fenzl.	N	—	—	—
S. Potanini Krylow.	—	O	—	—
S. amblyosepala Schrenk.				(Endem.).
S. crassifolia Ehrh.	N	0	—	—
S. longipes Goldie.	—	0	—	—
S. palustris Ehrh.	—	0	—	—
S. uliginosa Murray	—	0	—	—
S. umbellata Turcz.	—	0	—	—
S. petraea Bge.	—	0	—	—

## 95. *Cerastium* L.

1. Столбиковъ обыкновенно 3.	<i>C. trigynum</i> Vill.
Столбиковъ обыкновенно 5.	2.
2. Зубцы коробочки на верхушкѣ отвороченные	3.
Зубцы коробочки на верхушкѣ прямые	6.
3. Растеніе однолѣтнее	<i>C. perfoliatum</i> L.
Растенія многолѣтнія.	4.
4. Цвѣтоноски у плодовъ вверхъ стоячія	<i>C. falcatum</i> Bge.
Цвѣтоноски у плодовъ отогнутыя	5.
5. Растеніе болѣе крупное, съ широкими продолговатоovalными листьями	<i>C. dauricum</i> Fisch.
Высокогорное некрупное растеніе, съ болѣе узколанцетными листьями.	<i>C. lithospermifolium</i> Fisch.
6. Растенія однолѣтнія	7.
Растенія многолѣтнія.	9.
7. Цвѣтоноски длиниче чашечки	<i>C. semidecandrum</i> L.
Цвѣтоноски короче чашечки.	8.
8. Соцвѣtie болѣе сжатое, чашечка не вздутая; коробочка въ 2—3 раза длиниче чашечки	<i>C. dichotomum</i> L.
Соцвѣtie менѣе сжатое, чашечка вздутая; коробочка въ 1½ раза длиниче чашечки.	<i>C. inflatum</i> Link.

9. Лепестки приблизительно одинаковой длины съ чашелистиками. . . . . *C. vulgatum* L.  
Лепестки въ 2—3 раза длиниче чашелистиковъ . . . . . 10.  
10. Цвѣтоноски по отцвѣтаніи сильно отогнутыя. *C. alpinum* L.  
Цвѣтоноски по отцвѣтаніи вверхъ стоячія, на верхушкѣ слегка согнутыя . . . . . *C. arvense* L.

259. *Cerastium trigynum* Vill. Prosp. p. 48.—1779.—Vill., Hist. pl. Dauph. III. 645.—1789.—*Led.*, Fl. ross. I. 396.—*Boiss.* Fl. or. I. 715.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 227.

*Stellaria cerastoidea* L. Sp. pl. (ed. 1a) p. 422.—1753.

1878. *Cerastium trigynum* A. Regel Reisebr. 202.

1883. " " (typica и var. *viscidula*), *Franchet* Mission Capus 240.

I. Вершины Александровскаго хребта, 12—12.500', 17. VII. 1881; переваль Карагай-булакъ, 9.500'—10.500', 6. VII. 1882; Кольторъ, 10.000', 7. VII. 1882; Джиламышъ, 6—8000', 27. VI. 1880 и 10.000', 22. VI. 1880 (*Фетисовъ!*).

II. Кумбель (*A. Регель!*); переваль Кумышъ-тагъ, 10.500', 11. VIII. 1897, въ цв. (*Б. А. Федченко!*).

IV. Она (=Анда) Ульгантъ 200 м. (?!), 22 авг. (*Капю* — п. в.), тамъ же, 7—8—9.000', конецъ июля — нач. авг. 1876 (*Королковъ!*), тамъ же, VIII. 1902 (*Б. А. Федченко!*); близъ перевала Куль-апу, 10.000', 10. VIII. 1902, въ цв. (*Б. А. Федченко!*), перевала Майдантала: у перевала Тюсъ-ашу, 31. VII. 1897, 12.000', въ цв. во множествѣ; у ледника Сарбазы, 4. VIII. 1897 (*Б. А. Федченко!*), у ледника Акъ-турпакъ на травянистыхъ склонахъ, 27. VII. 1897, 11.000', (*Б. А. Федченко!*); перевальная Санталаша: по Иша-гульды, 15. VIII. 1902 въ цв. и по Чаракъ-саю, въ цв., 16. VIII. 1902 (*Б. А. Федченко!*); Большой Чимганъ, 8. VIII. 1897 (*Пьянковская-Баженова!*) и 19. VIII. 1897 (*Филипповъ!*); Акъ-тагъ-тай, 8—11.000', VII. 1872 (*Королковъ!*); Тянъ-Шань, 8—1200(0)' (*Кушакевичъ!*), Идрисъ-ней-гамбаръ, 25. VI. 1880 (*A. Регель!* — собрано *Мусою*); Чимганъ, 1902 (*E. Хомутова!*), Чимганъ, 1901 (кн. *Мещерская!*).

VI. Истоки Аигрена, Аршанъ-булакъ, 20. VI. 1880 (*A. Регель!* — собрано *Мусою*).

VII. У перевала Афлатунъ, 30. VI. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*).

IX. Съверный склонъ Сусамырского хребта надъ западнымъ концомъ долины Сусамыра, 8—10.000', 18. VII. 1881; ур. Сандыкъ, 9—11.500', 3. VII. 1881, вершины 10—12.000', 5. VII. 1881, вершины у перевала Кумбель 10—12.000', 5. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. Арсланбобъ, на каменистыхъ склонахъ горъ 7—9.000', 11. VIII. 1895; по р. Кугартъ, каменистые склоны, 10.000', 6. VIII. 1895; у перевала Кенколъ, каменистая почва, 12.000', 13. VIII. 1895 въ цв. (*С. Коржинский!*), горы надъ Арсланбобомъ, 7. VI. 1899 въ цв. (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области одно изъ самыхъ характерныхъ растений для щебневыхъ и каменистыхъ полей альпийской области. Встрѣчается въ высокогорной области всего Туркестана; О:—Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань; S:—Памироалай.

Виѣ Туркестана — Лабрадоръ, Гренландія, арктическая Европа, альпы средней и южной Европы, Гималаи, горы Сибири, Кавказъ, Персія, Афганистанъ, Монголія.

**260. *Cerastium maximum* L. v. *falcatum* (Bge.) Rgl. Pl. Radd. № 348.**

*Cerastium falcatum* Bge., Enum. alt. p. 37.—*Led.*, Fl. ross. I. 398.

I. Аламединъ, 5—9.000', 23—5. V. 1880 (*Фетисовъ!*), Алаарча, 7.000', 13. V. (*Фетисовъ!*).

III. Боролдай (*A. Регель!*), между Арысомъ и Бугунью 24. V. (*Съверцовъ!*).

IX. Съверный склонъ Сусамырского хребта, у р. Сандыкъ, 9—11.500', 3. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. Манагильды, 4. VI. 1880 (*A. Регель!*).

Въ нашей области не часто. Въ Туркестанѣ: N:—Семипалатинская обл., О:—Джунгарскій Алатау и Тянь-Шань.

Распространеніе вида: Сибирь, Монголія, арктическая Америка.

**261. *Cerastium lithospermifolium* Fisch. in „Mém. de la Soc. Impéiale des Natural. de Moscou“ III. 81.—*Led.*, Fl. ross. I. 399.**

II. На щебнѣ у перевала Кумышъ-тагъ, 11.500', въ цв. 11. VIII. 1897 (*Б. А. Федченко!!*).

IV. На розсыпяхъ у перевала Тюсь-ану, 12—12.500', 27. VII. 1897, въ цв. (*Б. А. Федченко!!*).

VIII. Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 10—12.000', 30. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

IX. Вершины Сусамырского хребта, 9.500'—12.500', 8. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

Въ нашей области, какъ и во всемъ Туркестанѣ, это одно изъ наиболѣе характерныхъ растений высокогорной полосы. Доходитъ до верхняго предѣла цвѣтковыхъ растений.

Въ Туркестанѣ: О:—Джунгарскій Алатау, Тянь-шань; S:—Памироалай.

Виѣ Туркестана — Алтай, Саяны, Монголія.

**262. *Cerastium davuricum* Fisch. in *Spreng.*, Pugill. plant. min. cogn. II. 65.—1815.—*Led.*, Fl. ross. I. 401.—*Boiss.*, Fl. or. I. 717.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 227.**

1877. *Cerastium davuricum* ♂ pilosum, *E. Regel Descr. pl. nov. fasc. V. („Acta Horti Petrop.“ V. 251).*

1878. *Cerastium davuricum* ♂ pilosum *A. Regel Reisebr. 201. II. Каракія, IX. 1876 (A. Regel!).*

IX. Съверный склонъ Сусамырского хребта, 8—9.000', 19. VII. 1881; Кобукъ, южный склонъ Сусамырского хребта, 7.000', 6. VII. 1881, въ цв. (*Фетисовъ!*).

XI. Арсланбобъ, лѣсъ, 26. V. 1899 въ цв.; субальп. луга по р. Уракъ-су, бл. перевала Кенколъ, 8.000', 29. V. 1899 (*Литвиновъ!*), у перевала Кугартъ, на травянистыхъ склонахъ горъ, 7—8.000', 5. VIII. 1895 (*Коржинский!*), за переваломъ Кенколъ, на травянистомъ склонѣ, 8—9.000', 14. VIII. 1895, въ цв. (*Коржинский!*).

Наше растеніе относится къ var. pilosum Rgl. l. c.  
Въ Туркестанѣ: О:—Джунгарскій Алатау, Тянь-шань; S:—Алайскій хребеть.

Виѣ Туркестана — Кавказъ, Персія, Уралъ, Сибирь, Гималаи, съверная Монголія.

**263. *Cerastium perfoliatum* L. Sp. pl. (ed. 1a) p. 437.—1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 402.—*Boiss.*, Fl. or. I. 719.**

?1882. *Cerastium A. Regel Gartenfl. 114.*

1902. " *perfoliatum*, *O. A. Федченко*, Списокъ № 236.

III. Чимкентъ, янв.—февр., въ цвѣту (*Съверцовъ!*).

IV. Саларъ, 28. III., близъ ключа на Саларѣ, 1. IV.;

Ташкентъ, сады на Боссеу, 11. IV. 1871 (*O. A. Федченко!!*),

Ташкентъ, 5—15—30. IV. 1882 въ цв. и съ пл. (*A. Regel!*), тамъ же, 20. III. въ цв. (*Маевъ!*), тамъ же, III. 1872, съ пл. (*Короликовъ!*), тамъ же, въ садахъ, въ цв. (*Krauzel!*), тамъ же 1899 г. (*Хомутовъ!*); бл. Ташкента, бывшая грекажная станиця, 25. VIII. 1901, отцв. и въ пл. (*E. Вальневъ!*).

V. Карасу между Ташкентомъ и Ходжентомъ, 9. IV. 1880, въ цв. и съ пл. (*A. Regel!*).

#### VI. Бискентъ (*A. Regel!*).

Въ нашей области нерѣдкое весенне растеніе культурной полосы юга и запада района.

Въ Туркестанѣ встречается еще въ S: — Самарканда (*O. Федченко!*), W: — Асхабадъ (*Литвиновъ!*).

Внѣ Туркестана — южная Россія, Кавказъ, Болгарія, Испанія, Малая Азія, Сирія.

**264. Cerastium inflatum Link.** in *Desf. Cat. Horti Paris.* p. 462. — *Boiss., Fl. or. I. 721.*

IV. Въ садахъ (*Krauzel!*).

Въ нашей области очень рѣдкое сорное растеніе. Въ Туркестанѣ встречается еще въ S: — Заравшанъ (*B. Комаровъ!*).

Внѣ Туркестана — Белуджистанъ, Катаонія, Аравія, Персія.

**265. Cerastium dichotomum L.** Sp. pl. (ed. 1a) p. 438.—1753. — *Led., Fl. ross. I. 402. — Boiss., Fl. or. I. 721.*

IV. Горы бл. Чимгана, 6—7.000', 21. VI. 1881 (*A. Regel!*),

V. Отъ Ангрена къ Кокану, V. 1880, въ пл. (*A. Regel!*, собрано *Мусою*); Отурбель, на съверномъ склонѣ горъ между Ангреномъ и Коканомъ, V. 1880, въ пл. (*A. Regel!*, собрано *Мусою*).

Въ нашей области рѣдкое растеніе. Въ Туркестанѣ — встречается въ О: — по р. Коксу, 4—5000', Куянкузъ (*A. Regel!*); S: — Гиссарь (*A. Regel!*), Ходжентъ, Кулябъ, Курганъ-тобе (*A. Regel!*), Могіанъ (*Комаровъ!*), Заравшанъ (*O. Федченко!*).

Внѣ Туркестана — Испанія, Съверная Африка, Малая Азія, Сирія, Месопотамія, Персія.

**266. Cerastium semidecandrum L.** Sp. pl. (ed. 1a) p. 438.—1753. — *Led., Fl. ross. I. 405. — Boiss., Fl. or. I. 723.*

VI. Моголь-тау, 29. IV., отцв. (*Съверцовъ!*),

Въ нашей области собраны были однажды образцы, похожіе на представителей этого вида, но въ виду недостаточности собранного материала, я не решаюсь утверждать вполнѣ опредѣленно, что это дѣйствительно *C. semidecandrum* L.

Для Туркестана мы имѣемъ еще указанія *O. A. Федченко* (S: Катты-курганъ и Ургутское ущелье,—опредѣленія *Э. Рейеля*).

Внѣ Туркестана — Европа, Крымъ, Кавказъ.

**267. Cerastium vulgatum L.** Sp. pl. (ed. 2a) p. 627.—1763.—*Led., Fl. ross. I. 408. — Boiss., Fl. or. I. 726. — Hook., Fl. br. Ind. I. 228.*

*C. viscosum* S. herb.

*C. caespitosum* Gilib. Fl. Lithuan. V. 159.—1781.

*Stellaria trivialis* Link. Diss. Botan. Suerm. p. 62.—1795.

*Cerastium viscosum* DC. Fl. Fr. IV. 776.—1805.

*C. vulgare* Hartm. Handb. Scand. Fl. (ed. 1a) p. 182.—1820.

*C. triviale* Link. Enum. h. Berol. I. 433.—1821.

1878. *Cerastium vulgatum*  $\beta$  *glandulosum*, A. Regel Reisebr. 201.

I. Александровскій хребеть, 4. VI. 1880, 9—10.000', въ цв.; Кольторъ, съв. склонъ, 10—12.000', 7—8. VII. 1882; перевалъ Карагай-булакъ, 9.500—10.500', 6. VII. 1882; Аксу 6.000', 30. VI. 1880; ущелье Аламединъ, 3—9.000', 23—25. V. 1880, ущ. Джиламышъ, 10.000', 22. VI. 1880 (*Фетисовъ!*).

II. Каракія (*A. Regel!*).

VII. На перевалъ Афлатунъ 30. VI. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*), по ручью Афлатунъ, у впаденія р. Уялмачаты, 25. VIII. 1902 (*Б. А. Федченко!* — сильно опущенная форма).

VIII. Перевалъ Терекъ, въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 30. VII. 1881, 10—12.000' (*Фетисовъ!*).

IX. Сусамырскій хребеть, съверный склонъ у р. Сандыкъ, 9—11.500', 3. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. У перевала Кенколъ, 9.000', 17. VI. 1899, въ цв., 7.000', 16. VI. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области преимущественно въ полосѣ хвойныхъ, но заходить и въ альпийскую. Въ Туркестанѣ всюду

въ горахъ: О:—Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань, Памироалай.

Въ Туркестана — Европа, Сибирь, Кавказъ, Сѣверная Америка, Гималаи, Индія, Монголія.

268. *Cerastium alpinum* L. Sp. pl. (ed. 1a) p. 438.—1753.—  
*Led.*, Fl. ross. I, 411.—*Boiss.*, Fl. or. I, 728.

1878. *Cerastium alpinum*, A. Regel Reisebr. 202.

I. Колыторъ, 7. VII. 1882, въ цв. (*Фетисовъ!*).

II. Кумбель, 9.000', IX. 1876 (A. Регель!).

Въ нашей области — не часто въ высокогорной полосѣ. Въ Туркестанѣ — въ высокогорной полосѣ хребтовъ; О:— Джунгарскаго Алатау, Тянь-Шаня и S:— Памироалая.

Въ Туркестана — горы Европы и Сибири, арктическая Америка, Монголія.

269. *Cerastium arvense* L. Sp. pl. (ed 1a) p. 438.—1753.—  
*Led.*, Fl. ross. I, 412.—*Boiss.*, Fl. or. I, 728.

IV. Верховья р. Майданала, у ледниковъ, 28. VII. 1897, въ цв. и у ледника Карабулакъ, 3. VIII. 1897, въ цв. 10—11.000' (Б. А. Федченко!).

VII. У перевала Афлатунъ, 30. VI. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*).

IX. Сѣверный склонъ Сусамырскаго хребта, 7—9.000', 4. VII. 1881, въ цв.

Въ Туркестанѣ — N:—Акмол., Семипал. обл.; О:—Джунгарскій Алатау; S:—Памироалай.

Въ Туркестана — Европа, Кавказъ, Сибирь, Сѣверная и Южная Америка, Монголія, сѣверный Китай.

*Приимѣніе 1-е.* Изъ р. *Cerastium* для Туркестана указанъ еще рядъ видовъ.

*C. minutum* Komarov . . . . . — — S — (Endem.).

*C. obtusifolium* Kar. et Kir. . . . . — O — —

*C. viscosum* L. . . . . — — S — —

*Приимѣніе 2-е.* Для Туркестана указанъ еще представитель р. *Malachium* Fr.:

*M. aquaticum* (L.) Fr. N — — —

*Приимѣніе 3-е.* Невыясненными остаются слѣдующія указания для нашей области:

(238)

1878. *Alsineen*, A. Regel Reisebr. 188 (По р. Терсъ).

1878. *Alsineen*, A. Regel Reisebr. 193 (истоки сѣверного Каракызмака).

## XV. Lineae.

### 96. *Linum* L.

1. Вѣнчики желтые, мелкие . . . . . *L. corymbulosum* Rehb.  
Вѣнчики фиолетовые, голубые, рѣже бѣловатые или розовые, всегда болѣе крупные, чѣмъ у предыдущаго вида . . . . . 2.

2. Чашелистики по краю съ длинными железистыми рѣбристками . . . . . *L. heterosepalum* Rgl.  
Чашелистики по краю голые . . . . . 3.

3. Чашелистики болѣе широкіе, туповатые, растеніе многолѣтнє . . . . . *L. perenne* L.  
Чашелистики заостренные, растеніе однолѣтнє *L. usitatissimum* L.

270. *Linum corymbulosum* Rehb. Fl. excurs. p. 884.  
(1380—2.) — *Led.*, Fl. ross. I, 422. — *Boiss.*, Fl. or. I, 852.  
*L. strictum* L. *β. corymbulosum* Blanch. in Lond. Journ. bot. VI, p. 597. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I, 411.

II. У выхода р. Карабуры изъ горъ, VIII. 1876 въ пл. (A. Регель!), тамъ же, по сырьмъ, мѣстамъ у арыковъ, 1.800—2.000', въ цв. и съ пл. 9. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!).

XI. Степь между Коканомъ и Базаръ-курганомъ, 21. V. 1899 (*Литвиновъ!*), по горамъ на сырьхъ мѣстахъ (*Краузъ!*), Арсланбобъ, песчаные склоны у рѣчки, 10. VIII. 1895 въ пл. (С. Коржинскій!).

Въ Туркестанѣ — О: Кульджа (A. Регель!); S: Зеравшанъ, Алайск. хреб. (О. Федченко! и др.), Бальджуанъ, Дарвазъ, Кулябъ; W: низовья Сырь-дары (Борщовъ!).

Въ Туркестана — Италия, Далмация, Истрія, Абиссинія, М. Азія, Сирія, Персія, Афганистанъ, Индія, Зап. Тибетъ.

*Linum usitatissimum* L. Sp. pl. (ed. I-a) p. 277.—1753.—  
*Led.*, Fl. ross. I, 425. — *Boiss.*, Fl. or. I, 860. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I, 410.

1872. *Linum usitatissimum*, *Krauze* Замѣтки 268.

1878. *Leinsaat*, A. Regel Reisebr. 177.

1881. *Sygyr*, Middendorff 241.

1892. Бѣлый карагарскій ленъ („хивинскій“), *Масъ* 8.

(239)

1895. Ленъ, Калмыковъ 57.  
 1896. *Linum usitatissimum*, Коржинскій Очерки 51.  
 1898. Зыгирь, Шахназаровъ 351.  
 Туземи. назв.: зыгирь.  
 IV. Посевное растеніе въ Ташкентскомъ уѣздѣ (Калмыковъ, Масъ, Шахназаровъ), передъ Ходжакентомъ (А. Регель!), въ сел. Каврай 18. VI. 1881 (А. Регель!), въ Чимганѣ 1899—1900 (Е. Холмутова!).  
 VII и XI. Въ Ферганѣ разводится на поляхъ (Краузе, Миддендорфъ, Коржинскій, Б. А. Федченко!).  
 Разводится на сѣмена въ культурной полосѣ Туркестана.  
**271. *Linum perenne* L. Sp. pl. ed. I-a p. 277. — 1753.**  
 — *Led.*, Fl. ross. I. 426. — *Boiss.*, Fl. or. I. 865. — *Hook.*  
*Fl. br. Ind.* I. 411.  
 1882. *Linum*, A. Regel, Gartenfl. 364.  
 1883. *Linum perenne*, Franchet Mission Capus 243.  
 I. Аламединъ, 5—9.000', 23. V. 1880 (Фетисовъ!).  
 IV. Долина Чирчика, Сайлыкъ, 4—6.000', VIII. 1876 (А. Регель!), на Большомъ Чимганѣ 19. VIII. 1897 (Филипповъ! по поручению О. А. Федченко!); Красная гора въ Чимганѣ 21. и 24. VII. 1897 (О. А. Федченко!), Чимганѣ 1899—1901 (Е. Холмутова!).  
 V. Госсай на лѣвомъ берегу Ангрена, 15. VII. 1880 (*Mysal*!), Окуръ близъ Аксу, VI. 1880 (А. Регель!).  
 VII. Афлатунъ 1. IX. 1881. (*Капю* — п. в.).  
 IX. Вершины Сусамырского хребта, надъ западнымъ концомъ долины Сусамыра, 12.000', 21. VII. 1881 (Фетисовъ!), сѣверный склонъ Сусамырского хребта, у р. Сандыкъ 9—11.500', 3. VII. 1881 и 7—9.000', 4. VI. 1881 (Фетисовъ!).  
 X. Алабуга, 7—8.000', 4. VI. 1880 и Манагильды, 6—7.000', 4. VI. 1880 (А. Регель!).  
 Въ Туркестанѣ — въ горахъ О: Джунгарский Алатау, Тянь-Шань и S: Памироалай.  
 Въ Туркестана — Персия, Белуджистанъ, горы Европы, Сибирь, Зап. Тибетъ, Монголія, Китай, Китайской Туркестанъ, Индія.  
**272. *Linum heterosepalum* Rgl. in E. Regel Descr. pl. nov. fasc. I № 8 in „Acta Horti Petrop.“ I. p. 433. — 1873. — (sine indicatione loci natalis et collectoris).**

1878. *Linum heterosepalum*, A. Regel Reisebr. 200.  
 I. Арассанъ 6—7.000', 7—11.000' 8. V. 1880, Аламединъ  
 II. Караколь, у подошвы перевала Кумбель (А. Регель!).  
 25. IV. 1880 въ цв., Аксу 30. VI. 1880, 6.000' въ цв. (Фетисовъ!).  
 IV. Гора Большой Чимганъ, 5—7.000', 21. VI. 1881  
 (А. Регель!).  
 Въ Туркестанѣ — О: Заилійскій Алатау: Кокджонъ въ долинѣ Большого Кебина, 13. VI. 1896, на лугахъ (Бромерусъ!); Каракастекъ (М. Кушакевичъ!), Иссикъ-куль предг. Музартъ (А. Регель!). Джунгарскій Алатау: близъ Конала (Лудвигъ!); оз. Сайрамъ (Фетисовъ!); S: Зеравшанъ (О. Федченко!, В. Коларовъ!). Алайскій хреб.: бл. Шагимарданъ (О. Федченко!). Дарвазъ: бл. Сарысанга, VI. 1883 (А. Регель!).

Приимѣчаніе. Не выясненнымъ остается:  
 1877. *Linum*, A. Regel Reisebr. 366 (Arystandy).

## XVI. Malvaceae.

### 97. *Lavatera* L.

- 273. *Lavatera thuringiaca* L. Sp. pl. (ed. I-a) p. 691. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 430. — *Boiss.*, Fl. or. I. 823.**  
 Туземи. назв.: „тукузъ-тюбе“ (записано Невъскими въ Каратегинѣ).  
 XI. По горамъ Майли, 16. VII. въ цв. (Краузе!); Таранъ-базаръ, лѣса въ ущельи, 3. VIII. 1895 въ пл. (*C. Коржинскій!*); по р. Кугартъ, склоны горъ, 5—6.500', 4. VIII. 1895 въ цв. и пл. (*C. Коржинскій!*).  
 Въ нашей области исключительно въ Андижанскихъ лѣсахъ. Въ Туркестанѣ вообще рѣдко: О: Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань; S: Каратегинъ (Невъскій!), Кулябъ (А. Регель!).  
 Въ Туркестана — Средняя Европа, Сибирь, Балканскій полуостровъ, Крымъ, Кавказъ, Малая Азія, Монголія (близъ границы съ Семипалатинской областью).

### 98. *Althaea* L.

1. Подчашіе 8—9 раздѣльное; сѣмянки на спинкѣ  
 округлые . . . . . 2.  
 (241)

- Подчаше 6 раздельное; съмки на спикъ съ глубокимъ желобкомъ; соцвѣтіе длинное, вѣнички крупные . . . . . 4.
2. Верхніе стеблевые листья продолговато-яйцевидные, очень мало надрѣзаны; цвѣтоноски короче чашечки . . . . .  
Листья раздѣльные и довольно глубоко надрѣзные . . . . .
3. Сѣровойлочное растеніе . . . . .  
Зеленоватое короткощершавое растеніе съ раздѣльными листьями . . . . .
4. Длина лепестковъ равна ихъ ширинѣ . . . . .  
Длина лепестковъ болѣе ихъ ширини . . . . . 5.
5. Вѣнички бѣлые . . . . .  
Вѣнички розовые или лиловатые . . . . .

*A. officinalis* L.*A. armeniaca* Ten.*A. cannabina* L.*A. rosea* L.

5.

*A. nudiflora* Lindl.*A. pallida* W. K.

274. *Althaea officinalis* L. Sp. pl. (ed. I-a) p. 686. —  
1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 431. — *Boiss.*, Fl. or. I. 825. —  
*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 319.

IV. Между Ташкентомъ и Той-тюбе, 7. VII. 1881 въ цв. (*A. Регель!*).

Въ нашей области — въ одной только мѣстности, при томъ собранные здѣсь экземпляры отчасти напоминаютъ слѣдующій видъ.

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ О: — Джасыль-куль (*Кушакевичъ!*), Токмакъ (*A. Регель!*), С: — Зеравшанъ (*O. Федченко!*), В: Приаральскій край (ex herb. *Fischer!*)

Въ Туркестана — Средняя и Южная Европа, Кавказъ, Сирія, Персія, Афганистанъ, Монголія, Кашмиръ.

275. *Althaea armeniaca* Ten. Ind. horti Neap. 1837. —  
*Boiss.*, Fl. or. I. 825.

*A. taurinensis* C. A. Mey. Ind. Cauc. 207 (non DC.) —  
*Led.*, Fl. ross. I. 431.

1878. *Althaea armeniaca*, *A. Regel* Reisebr. 173.  
1902. *Althaea taurinensis*, *O. A. Федченко* Списокъ № 248.  
II. Пиштекъ, 2000', 24. V. 1880 въ цв. (*Фетисовъ!*)  
IV. Ногай-курганъ, 1.300', 5. IX. 1869 (*O. A. Федченко!*),  
Паркусъ, 4—6000', 1876 г. (*A. Регель!*); Искандеръ, 15. VII.  
1877 въ цв. (*A. Регель!*).

- XI. По р. Каракуль, 13. VIII. 1895 въ цв. (*C. Коржинскій!*), Джелабадъ, около рисовыхъ полей, 1. VIII. 1895 въ цв. (*C. Коржинскій!*).

(242)

Въ нашей области изрѣдка въ предгорьяхъ. Въ Туркестанѣ О: — Джунгарскій Алатау; С: Алайскій хребеть, Зеравшанъ.

Въ Туркестана — Кавказъ, Малая Азія, Сирія.

276. *Althaea cannabina* L. Sp. pl. (ed. I-a) p. 686. —  
1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 432. — *Boiss.*, Fl. or. I. 825.

1872. *Althaea officinalis*, *Krauze* Замѣтки 268.

1902. „ *cannabina*, *O. A. Федченко* Списокъ № 247.  
Туземн. назв.: „Ра-даванъ“ (персид. въ Кафириганѣ) и „Шиміучъ“ (въ Каратегинѣ, записано *Невѣсеки*!).

VI. Киплакъ Самгаръ, 30. V. 1878 (*Скорняковъ!*).

- XI. По р. Кизыль-уңгуръ, окр. полей, 12. VIII. 95 въ цв. (*C. Коржинскій!*), д. Чарвакъ, сухие склоны, 9. VIII. 1895 въ цв. (*C. Коржинскій!*); по р. Майли (*Krauze!*).

Въ своей статьѣ (I. c.). *Krauze* указываетъ для долины Майли *A. officinalis*, но въ Туркестанскомъ гербаріи Императорскаго Бот. Сада хранится собранное *Krauze* растеніе съ его определениемъ („*A. officinalis*“), несомнѣнно относящееся къ *A. cannabina*; мѣстонахожденіе этого растенія *Krauze* обозначило лишь слѣдующими словами: „очень много по горамъ, 10. VI.“; рукою *Э. Регель* приписано здѣсь „*Taschkent*“, но это по моему мнѣнію болѣе, чѣмъ сомнительно.

Въ нашей области изрѣдка въ предгорьяхъ. Въ Туркестанѣ — С: Алайскій хребеть, ю. Фергана, Гиссарь.

- Althaea rosea* (L.) Cav. Dissert. II. 91. t. XXVIII.  
f. 1. — *Alcea rosea* L. Sp. pl. (ed. I-a) p. 687. — 1753. —  
*Boiss.*, Fl. or. I. 831.

1874. Гюль-хайри, *Кирьевскій* 54 (Изъ „Туркест. Вѣд.“ 1872 № 11).

1876. Махровая мальва, *A. Регель* Садов. въ Ташк.  
1890. Кара-гуль, *Маевъ* 19.  
1896. *Althaea rosea*, *Коржинскій* Очерки 54.  
Туземн. назв.: Гюль-хайри; кара-гуль.  
IV. Разводится въ Ташкентскихъ садахъ (*A. Регель*, *Кирьевскій*, *Маевъ*).

- VII. Разводится преимущественно въ окр. Намангана (*C. Коржинскій!*).

Одно изъ любимыхъ садовыхъ растений туземцевъ. Встрѣчается съ яркокрасными, розовыми или же почти чер-

(243)

ными вънчиками. По преимуществу разводится форма съ махровыми цветами (*Nore pleno*).

Родиной считается Балканский полуостровъ. Впрочемъ, существует предположение, что видъ этот представляеть линь садовую форму слѣдующаго.

277. *Althaea pallida* Waldst. et Kit. Pl. rarior. Hungar. I. 46, t. 47.—*Led.*, Fl. ross. I. 432.—*Alcea pallida*, Boiss. Fl. or. I. 832.

IV. Сайлыкъ, VIII. 1876 (A. Регель!), въ долинѣ р. Айдаулъгансъ, на каменистыхъ розсыпяхъ 23. VII. 1897 въ цв. и VIII. 1902 въ цв. (Б. А. Федченко!!).

Въ нашей области довольно рѣдко. Много найдено растущимъ вмѣстѣ со слѣдующимъ видомъ, но въ значительно меньшемъ количествѣ. Въ Туркестанѣ, впрочемъ, распространено довольно широко въ горахъ и предгорьяхъ: S: — Памироалай.

Виѣ Туркестана — Южная Россія, Ю.-В. Европа, Кавказъ, Малая Азія.

278. *Althaea nudiflora* Lindl. in „Transact. hortic. Soc.“ VII. (1830.) p. 251. — *Trautv.*, Enum. pl. Song. № 250.

*Alcea nudiflora*, Boiss., Fl. or. I. 833 in observ. ad A. Hohenackeri Boiss. et Huet.

*Althaea Froloviana* Fisch., *Led.*, Fl. ross. I. 433 in observ. ad A. scifoliam Cav.

? 1876. *Althaea* изъ мѣстной флоры, A. Регель Садов. въ Ташкентѣ.

1877. Weissblütige *Althaea*, A. Regel Reisebr. 367.

? 1877. *Althaea*, A. Regel Reisebr. 367, 368.

1878. *Althaea scifolia*, A. Regel Reisebr. 169, 176, 178.

1883. " " *Franchet Mission Capus* 243.

1896. " *nudiflora*, Коржинскій Очерки 38.

1899. Дикая штокъ роза, Гейеръ Турк. скит. 146.

1899. („Вѣлѣли цветы дикой ржи“) Гейеръ ibid. 201.

Туземи. назв.: Гуль-хайри; галмазъ.

I. Аксу, 30. VI. 1880 (Фетисовъ!).

II. По р. Баркаракъ, ниже нашей стоянки у подошвы Манаса, 9. VIII. 1897 въ цв. (Б. Федченко!!).

III. Боролдай, Бугунъ, Джилтетасъ, Чимкентъ, Бекларъ-бекъ (A. Регель!), Чимганъ, 15. VIII. 1897 (О. А. Федченко!); между Искандеромъ и Ходжакентомъ 15. VII. 1897 (О. А. и Б. А. Федченко!!).

IV. Ойа; Ташкентъ VIII. 1876; гора Кава близъ Ходжакента (A. Регель!); разводится въ садахъ въ Ташкентѣ (A. Регель!); Ташкентъ, 500 м., въ степи 14 февр. (Капю — п. в.); на склонахъ горъ большими зарослями, отъ кишл. Псекемъ къ перевалу Курумъ-юль, 22. VII. 1897 въ цв.; по р. Айдаулъгансъ 23. VII. 1897 и 3. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!), Кумсанъ VI. 1872, 3000' (Корольковъ!); Идрисъ-пей-гамбаръ, 29. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!); Чимганъ 1899—1902; Кумсанъ 19—20. VII. 1901; Большой Чимганъ 18. VII. 1900; по дорогѣ въ Кумсанъ, 19. VII. 1900 (Е. Холмутова!); возлѣ кишл. Акъ-кивакъ въ долинѣ р. Чирчикъ 30. VII. 1902; подъемъ отъ Кумсана къ перевалу и на Нанай 31. VII. 1902; отъ Псекема къ Съемессасу и Съемессасъ; Урунгачъ VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

VII. По р. Закъ-сай, 30. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

IX. Кобукъ, южный склонъ Сусамырского хребта, 7.000', 6. VII. 1881; южный склонъ 9—10.000', 25. VII. 1881 (Фетисовъ!).

XI. Травные луга на высотѣ 3.500'—5.000', отъ Джелабада до Тараинъ-базара, д. Чорвакъ VIII. 1895 (С. Коржинский!). очень много по горамъ 1870 (Краузэ!).

Въ нашей области — часто въ нижнихъ зонахъ горъ.

Въ Туркестанѣ — О: Джунгарскій Алатау, Тянъ-Шань; S: — Памироалай.

Виѣ Туркестана — Алтай.

### 99. *Malva* L.

Вънчики лиловокрасные, во много разъ пре-  
вышаютъ чашечку.

*M. silvestris* L.

Вънчики блѣдоватые, мелкие.

*M. rotundifolia* L.

279. *Malva silvestris* L. Sp. pl. (ed. 1-а) p. 689 — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 435. — *Boiss.*, Fl. or. I. 819. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 320.

1878. *Malva silvestris* A. Regel Reisebr. 173.

IV. Паркузъ (A. Регель!).

Въ Reisebriefe (l. c.) названа эта мѣстность Каркузъ, но на этикетѣ гербарія мѣстность написана Parkus, хотя и рукою не самого А. Регеля; но въ такой формѣ (Parkus) мы встрѣчали название этой мѣстности (у другихъ растеній) въ гербаріи, на оригиналныхъ этикетахъ, писанныхъ Альб. Регелемъ, такъ что Каркузъ, очевидно, опечатка.

Въ нашей области рѣдко. Въ Туркестанѣ — О, S.

Виѣ Туркестана — Европа, Сѣверная Америка, Сибирь, Кавказъ, Персія, Гималаи, Сирія, Малая Азія.

280. *Malva rotundifolia* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 688. ex parte — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 435. — *Boiss.*, Fl. or. I. 820. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 320.

*M. neglecta* Wallr. in Sylloge pl. Ratisb. I. (1824) p. 140.

1902. *Malva rotundifolia*, O. A. Федченко Списокъ № 252.

Туземн. назв.: Тенге-джапракъ (киргиз.); рихдаванъ, кальгачъ-кульча.

I. Аламединъ, 3.500 — 5'500', 25 — 26. V. 1880, въ цв. и съ пл. (А. Фетисовъ!).

II. Карабура (Галасъ — А. Регель!).

III. Между Арысомъ и Бугунью; Бугунъ (*Сѣверцовъ!*).

IV. Между Ташкентомъ и Келесомъ, садъ, 22. IV. 1871 (O. A. Федченко!), 8. V. (*Краузе!*), Ташкентъ VIII. 1876 (A. Регель!), Ташкентъ, 1882 (*Маевъ!*), Искандеръ, сорный мѣста въ долинѣ Чирчика, 15. VII. 1897 (B. A. и O. Федченко!!).

VI. Моголь-тау, 25. IV. въ цв. и съ пл. (*Сѣверцовъ!*).

XI. Арсланбобъ, 9. VI. 1899 (*Литвиновъ!*); Исбасканъ, 30. V. 1878 (A. Кушакевичъ!), по р. Каравангуръ, каменистые склоны и розыни, 5 — 6.000', 13. VIII. 1895 въ цв. (C. Коржинскій!).

Сорное растеніе, известное изъ всего Туркестана. Въ горы высоко не поднимается.

Виѣ Туркестана — Европа, Кавказъ, Персія, Афганистанъ, Синая, Индія.

Приимѣчаніе. Въ Туркестанѣ встречаются еще изъ рода *Malva*:

*M. borealis* Wallm. . . — O S —

*M. aegyptia* L. . . . — — W —

*M. parviflora* L. . . . — — W —

*M. verticillata* L. . . . — — W —

### 100. *Hibiscus* L.

281. *Hibiscus trionum* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 697. — 1753. — *Boiss.*, Fl. or. 840. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 334.

*H. ternatus* Cav. Dissert. III. 172. — *Led.*, Fl. ross. I. 438. 1878. *Hibiscus ternatus*, A. Regel Reisebr. 169.

Туземн. назв.: „Гуза-каганъ“, т. е. горный хлопокъ, записано Невѣскимъ въ Каратегинѣ.

IV. Ташкентъ, VIII. 1872 (*Короликовъ!*), тамъ же, VIII. 1876 (A. Регель!); безъ обозначенія мѣстности (*Краузе!*), Каратай (*Маевъ!*).

XI. Кетмень-тюбе, перевалъ Мартъ—вершина перевала Кумбель 2-ї, 11 авг. 1884. (*Сорокинъ!* № 213).

Въ нашей области — сорное растеніе культурной зоны. Въ Туркестанѣ — O, S, W.

Виѣ Туркестана — южная Европа, Крымъ, Кавказъ, Персія, Афганистанъ, Вавилонъ, Монголія, Гималаи.

*Hibiscus cannabinus* L. Syst. (ed. X.) p. 1149 — *Boiss.*, Fl. or. I. 840, in observ. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 339.

1896. *Hibiscus cannabinus*, Коржинскій Очерки 55.

1902. " " " O. A. Федченко Списокъ № 254.

Туземн. назв.: Канапъ.

IV. Разводится въ Ташкентѣ, 5. IX. 1869 (O. A. Федченко!).

VII. Разводится въ Наманганскомъ уѣздѣ (B. A. Федченко!, C. Коржинскій!).

XI. Разводится въ Адиженскомъ уѣздѣ (C. Коржинскій!).

*Hibiscus esculentus* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 696. — 1753. — *Boiss.*, Fl. or. I. 840 in observ. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 343.

1890. Бамія или Гомбо, *Hibiscus esculentus*, *Маевъ* 120.

IV. Разводится (*Маевъ*).

*Hibiscus syriacus* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 695. — 1753. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 344.

1876. *Hibiscus syriacus*, A. Regel Садоводство въ Ташкентѣ.

IV. Разводится въ Ташкентѣ (A. Регель).

**101. Gossypium L.**

*Gossypium herbaceum* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 693. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 438. — *Boiss.*, Fl. or. I. 840 in adnot. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 346.

1867. Хлопокъ, *Съверцовъ* Поездка 125, 126, 130.

1872. *Gossypium herbaceum*, Гуза, *Краузе* Замѣтки 271.

1876. Хлопчатникъ, А. Регель Садоводство въ Ташкентѣ.

1878. Niedrige Baumwollensorten, A. Regel Reisebr. 167.

1881. Gusa, *Middendorff* 243.

1895. Хлопокъ мѣстный, *Казанскій* 34.

1896. *Gossypium herbaceum*, *Коржинскій* Очерки 37, 53.

Туземн. назв.: Гуза (туземный хлопокъ).

III. Разводится на Бадамъ и Машатѣ, подъ Чимкентомъ и въ Манкентѣ (*Съверцовъ*).

IV. Разводится въ окр. Ташкента (А. Регель, *Краузе*, *Съверцовъ*, О. А. и Б. А. Федченко!!).

VII. Разводится (*Миддендорфъ*, *Казанскій*).

XI. Разводится въ Джелабадѣ, 2.500', въ небольшомъ количествѣ; мѣстами доходитъ даже до 3.500' (*Коржинскій*, *Миддендорфъ*).

Въ нашей области культивируется издревле и понынѣ еще не вытесненъ следующимъ видомъ. По словамъ Съверцова, хлопокъ можно разводить и въ Алматахъ (городъ Вѣрный) и даже въ Гурьевѣ на Каспийскомъ морѣ.

*Gossypium hirsutum* L. Sp. pl. (ed. 2-a) p. 475.—1763.

*G. herbaceum* v. *hirsutum*, *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 347.

1890. Хлопокъ *Маевъ* 110 и слѣд.

1892. Хлопокъ, *Маевъ* 11, 16.

1895. Хлопокъ, *Колмаковъ* 56.

1895. Хлопчатникъ, Гейеръ Ташкентъ Гава, 111 и слѣд.

1896. *Gossypium hirsutum*, „Upland“, *Коржинскій* Очерки 53.

Туземн. назв.: Гуза (американский хлопокъ).

IV. Разводится въ Ташкентѣ (*Маевъ*, *Колмаковъ*).

VII. Разводится (Б. А. Федченко!!).

XI. Разводится до 2.500' — 3.500' (*Коржинскій*, *Гейеръ*).

Вмѣсть съ предыдущимъ видомъ представляеть важнѣйшее культурное растеніе Фергана. Изъ сортовъ наиболѣе важны *Upland*, *Oziez*, извѣстенъ также *Piter king*.

## 102. Abutilon.

**282. Abutilon Avicennae Gaertn.** Carp. II, 251. — *Led.*, Fl. ross. I. 439. — *Boiss.*, Fl. or. I. 836. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 327.

*Sida Abutilon* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 685. — 1753.

1878. *Abutilon Avicennae*, A. Regel Reisebr. 169.

IV. Ташкентъ VII. 1876, въ пл. (A. Regel!).

Полусорное растеніе, какъ вообще въ Туркестанѣ: О. С. Виѣ Туркестана — Индія, южная Европа, Персія, Съверная Америка, съверная Африка, Монголія.

*Приимчаніе.* Изъ сем. *Tiliaceae* въ Туркестанѣ дико не растетъ ни одного вида (Борщовъ о липѣ: „но ту сторону р. Урала иѣть рѣшительно ни одного дерева“), но въ Ташкентѣ изрѣдка разводится *T. parvifolia* Ehrh. (A. Regel), Садоводство въ Ташкентѣ).

## XVII. Hypericinaeae.

### 103. Hypericum L.

1. Чашелистики по краю безъ железокъ или рѣзничекъ . . . . . *H. perforatum* L.

Чашелистики по краю съ железками или рѣзничками . . . . .

2. Соцвѣтіе — узкая метельчатая кисть, все растеніе совершенно голое . . . . .

Соцвѣтіе — широкій скатый щитокъ, все растеніе обыкновенно покрыто множествомъ бугорковъ . . . . .

*H. hyssopifolium* Vill.

*H. scabrum* L.

**283. Hypericum perforatum** L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 785. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 447. — *Boiss.*, Fl. or. I. 809. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 255.

1883. *Hypericum perforatum*, *Franchet Mission Capus* 244.

Туземн. назв.: Чай-утъ, употребляется, какъ чай въ Каратегинѣ (записано *Невѣскимъ*!).

I. Аксу 5 — 6.000', 30. VII. 1880; Аламединъ, 25. V. 1880 (Фетисовъ).

IV. Кинилакъ Акъ-кавакъ, 30. VII. 1902; озеро Урунчагъ,

.2 VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!); Каракызы 21 авг. 1881 (Капю —

н. в.), Ташкентъ VII. 1876 (A. Regel!), Ташкентъ (Куман-

кевичъ!), Ташкентъ VII. 1882 (*Маевъ!*), Чимганъ 10. VIII., 16 и 17. VII. 1897 (*O. A. Федченко!*), Чимганъ 1900 — 1901 (*E. Хомутова!*). Акташское горное лѣсничество, 14. IV. 1901 (*E. Вальневъ!*). Красная гора въ Чимганѣ 30. VII. 1897 (*O. A. Федченко!*).

V. Гашулага 17. V. 1880 (*A. Регель!*).

VI. Моголь-тау 29. IV. (*Съверцовъ!*).

По р. Кугартъ, камен. склоны, 6.500 — 7.000', 5. VIII. 1895; Таранъ-базаръ, травянистые холмы, 3. VIII. 1895, въ пл. (*C. Коржинский!*).

XI. Майли (*Krauze!*); Майли-сай и Сары-біе-сай 2. VI. 1878, Кокандъ-кишлакъ 30. V. 1878 (*Кушакевичъ!*). Арсланбобъ, 4. VI. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ распространено очень широко: N, O, S, W.

Въ Туркестана — вся Европа, Персия, Сирія, Кавказъ, Малая Азія, Гималаи, Монголія.

**284. Hypericum scabrum L.** Amoen. Alad. IV. 287. — *Led.* Fl. ross. I. 450. — *Boiss.*, Fl. or. I. 796.

I. Ала-арча 13. V., 6 — 7.000' (*Фетисовъ!*).

Кромѣ обычныхъ шероховатыхъ экземпляровъ изъ этой же мѣстности имѣются образцы почти совершенно гладкіе — вѣроятно, ихъ слѣдуетъ выдѣлить въ особую форму:

*V. glabrum* m.: tota planta laeviuscula.

II. Айшара, IX. 1876 (*A. Регель!*).

III. Боролдай, 23. V. (*Съверцовъ!*); Аксу между Чимкентомъ и Ауліе-ата; 17. V. 1896 (*Бромтерусъ!*). Пер. Беклярбекъ 20. V. 1878 (*A. Кушакевичъ!*).

IV. Сайлыкъ, 4 — 6.000', въ пл. (*A. Регель!*); Андаульгантъ, по склону г. Кизыль-ташъ, въ цв., 23. VII. 1897, 8 — 10.000' (*B. A. Федченко!!*); Чимганъ: истоки ручья и выше къ Большому Чимгану, 16. VII, Песочный переваль 17. VII., Красная гора 24. VII., стоянка 4. VIII, Большой Чимганъ 8. VIII. 1897 (*O. A. Федченко!*), гора Чимганъ, 5 — 7.000', 20. VI. 1881 и близъ лазарета 20. VI. 1881 (*A. Регель!*). Тянъ-Шань, 8 — 12.000' (*Кушакевичъ!*), Большой Чимганъ, 1902; Чимганъ 29. VI. 1900, 15. VII. 1901 (*E. Хомутова!*).

IX. Караколъ, притокъ Сусамыра, 7.000', 1. VII. 1881 (*Фетисовъ!*); южный склонъ горъ Сусамыръ-тау, 5 — 7.500' 8. VIII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. По горамъ 23. V. 1871 (*Krauze!*); по р. Кугартъ, на камен. склонѣ, 6.500' — 7.000', 5. VIII. 1895, въ цв. и пл. (*C. Коржинский!*); Арсланбобъ, 3. VI. 1897, въ цв. (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ обычное горное растеніе: О: — Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Тянъ-Шань. С: — Между Самарканомъ и Келифомъ (*Маевъ!*), Уратюбе-Зааминъ (*A. Регель!*), Балъджуашъ (*A. Регель!*). В: — Карагату, Балакчата, Кулачекъ (*A. Регель!*).

Въ Туркестана — Малая Азія, Персія, Закавказье.

**285. Hypericum hyssopifolium Vill.** Hist. pl. Dauph. vol. I. p. 329 (1786); vol. III. p. 505 (1789); — *Led.*, Fl. ross. I. 451. — *Boiss.*, Fl. or. I. 799.

*V. elongatum* (*Led.*) *Boiss.* Fl. or. I. 799.

*H. elongatum* *Led.*, Fl. alt. III. 367.

III. Бугунь, 11. V. (*Съверцовъ!*).

IV. Пскемъ 22. VII. 1897, въ цв. и пл. (*B. A. Федченко!!*); Ходжакентъ 20. V. (*Krauze* — п. в.; въ Туркестанскомъ гербаріи хранится лишь этикетка); Чимганъ, 16. VII. 1897 (*O. A. и B. A. Федченко!!*).

XI. Арсланбобъ, 3. VI. 1899, въ цв. (*Литвиновъ!*).

Въ нашей области изрѣдка въ предгорьяхъ и полосѣ лиственнаго лѣса.

Въ Туркестанѣ еще: О — Чингильды (*Фетисовъ!*), Кизыль-куре, 5. VI. 1873 (*Кушакевичъ!*) и др. мѣстн., но вообще рѣдко; В: — Закасп. обл.

Въ Туркестана (видъ) — южная Европа, Малая Азія, Сирія, Закавказье.

**286. Hypericum hirsutum L.** Sp. pl. (ed. 1-a) p. 786. — *1753.* — *Led.*, Fl. ross. I. 449. — *Boiss.*, Fl. or. I. 798.

VII. На травянистыхъ склонахъ между кустарниками близъ впаденія р. Уялмы-чата въ р. Афлатунъ, 26. VIII. 1902, въ цв. и съ пл. (*B. A. Федченко!!*).

Въ нашей области очень рѣдкое растеніе полосы хвойныхъ лѣсовъ. Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: — Тянъ-Шань: Бутаковка бл. Вѣриаго, 15. VI. 1875; Джасылькуль, 19. VII. 1873 (*Кушакевичъ!*); Джунгарскій Алатау: Талки, Боргаты (*A. Регель!*).

Въ Туркестана — європейская и средняя Европа, Крымъ, Кавказъ.

**XVIII. Acerineae.****104. Acer L.**

1. Листья перистораздельные . . . . . *A. Negundo* L.  
Листья надрезные или почти цельные . . . . . 2.  
2. Листья семинервные, крупные, длиновидно  
3—5 и 7 раздельные . . . . . *A. laetum* CAM.  
Листья менее крупные, съ тремя болѣе или  
меньше ясными долями . . . . . *A. Semenowii* Rgl.

**287. Acer Semenowii** Rgl. et Herd. Enumer. pl. Semen. № 183. („Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.“ 1866. II. p. 550, tab. XII).

*A. Ginnala* v. *Semenowii* Pax Aceraceae (Engler, Pflanzenreich № 5).

1877. *Acer Semenowii*, *A. Regel* Gartenfl. 8, 10, 14.  
1878. „ *tataricum* v. *Semenowii*, *A. Regel* Reisebr. 174, 199, 204, 205.  
1878. *Acer tataricum* *A. Regel* Reisebr. 180.  
1878. *Tatarischer Ahorn*, *A. Regel* Reisebr. 181, 182. 193.  
1882. *Acer Semenowii*, *A. Regel* Gartenfl. 360.  
?1882. *Baumförmiger Ahorn*, *A. Regel* Gartenfl. 361.  
1883. *Acer Semenowii* Franchet Mission Capis 246.  
1885. Кленъ „шаугать“, Лисневский 22.  
1895. Некленъ, Казанскій 12.  
1896. *Acer Semenowii*, Комаровъ Зеравшанъ, послѣ № 354.  
1896. „ „ Коржинскій Очерки 40.  
1897. „ „ О. Федченко въ Отчетѣ 18.  
1898. „ „ Б. Федченко Поездка 407.  
1899. Горный кленъ (*Acer campestre*), Гейеръ Туркест. скит. 197, 200.

1900. *Acer Semenowii* „зарангъ“, Оттендорфъ 60.  
Туземн. назв.: Зарангъ; шаугать.  
I. Ущ. Аксу 6.000', 30. VI. 1880 (Фетисовъ!), выходъ Айшмары изъ горъ IX. 1876 (А. Регель!).  
II. Малый Таласъ, Аучи-аузъ; по р. съв. Карабуръ (А. Регель!).  
IV. Отъ Куллана до Нана, по берегамъ р. Пекемъ, 1.220', 18. VII 1881 (Капю), отъ Нана до Искема (Гейеръ), Нана 20. VII. 1897 (Б. А. Федченко!!), Чимганъ 5—6.000', VII —

VIII. 1897 (плоды къ 19. VIII. не созрѣли) (О. А. Федченко!), между Ходжакентомъ и Чимганомъ, 4.000' 20. VI. 1881 (А. Регель!); горы надъ Сайлыкомъ VIII. 1876 (А. Регель!), Карагату (Маевъ!), Чаткалъ (Казанскій); Чаткалъ: у моста; противъ Чаураза; у поворота; выше Бричъ-муллы, 4—6.000' (А. Регель!); Чаткальская волость (Лисневскій); между Кумсаномъ и Нанаэмъ 31. VII. 1902; озеро Урунгачъ и отъ сел. Искемъ къ р. Андаульганъ 3. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

VI. Тюре-курганъ, 18. V. 1878 (Скорняковъ!).  
VII. Афлатунъ-сай, Чаначъ, Кассанъ-сай, Сумаръ, Инукъ-сай (Лисневскій); по р. Закъ-сай, по р. Касанъ-сай и у подъема къ перевалу Кушартъ, 30—31. VIII. 1902, зрѣлые плоды (Б. А. Федченко!!).

XI. Чорвакъ, Арсланбобъ и другія мѣстности, 4—6.000' (Коржинскій!); по р. Кугартъ, 5—6.500', 4. VIII. 25. съ пл. (С. Коржинскій! — форма съ менѣе крупными листьями, почти не лопастными); по р. Яссы, въ среднемъ и верхнемъ течениіи (А. Регель!).

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ О: — Джунгарскій Алатау: Касть (А. Регель!); Тянъ-Шань: горы близъ Вѣриаго, Буамское ущ., Текесь, Ханахай (А. Регель!). W: — Карагату: Карагузъ, Джиль-карату и Учъ-тюбе (А. Регель!); S: — Алайск. хреб. бл. Гульни (О. А. и Б. А. Федченко!!; Бражецикъ!).

***Acer Negundo* L.** Sp. pl. (ed. 1-а) p. 1056. — **1753.**  
1876. *Acer Negundo*, *A. Regel* Садоводство Ташк.

1878. „ „ *A. Regel* Reisebr. 166.  
1890. „ „ *Маевъ* 20.

IV. Разводится въ Ташкентѣ (А. Регель, Маевъ).

***Acer platanoides* L.** Sp. pl. (ed. 1-а) p. 1055. — **1753.** — *Led.*, Fl. ross. I. 456. — *Boiss.*, Fl. or. I. 948.

1876. *Acer platanoides*, *A. Regel* Садоводство въ Ташк.  
IV. Разводится въ Ташкентѣ (А. Регель!).

***Acer pseudoplatanus* L.** Sp. pl. (ed. 1-а) p. 1054. — **1753.** — *Led.*, Fl. ross. I. 454. — *Boiss.*, Fl. or. I. 947.

1876. *Acer pseudoplatanus*, *A. Regel* Садоводство въ Ташкентѣ.

IV. Разводится въ Ташкентѣ (А. Регель!).

288. *Acer laetum* C. A. Mey. Ind. Caucas. p. 206. —

1831. — *Boiss.*, Fl. or. I. 949.

A. *Lobelii*, Led., Fl. ross. I. 456.

A. *pictum*, Hook., Fl. br. Ind. I. 696.

1882. *Acer plantanoides*, A. Regel Gartenfl. 360, 361.

1885. Кленъ, Акъ-чичекъ, Лисневскій 23.

1896. *Acer Lobelii*, Коржинскій Очерки 40.

1900. „ *Ginnala*, Окъ-чичакъ, Оттендорфъ 60.

Туземн. назв.: Акъ-чичекъ (въ другихъ частяхъ Туркестана: фаркъ, фарфаракъ, зарангъ—записано О. А. Федченко).

VII. Афлатунъ-сай, 5—6.200' (Лисневскій), у перевала Малый Кушартъ, 31. VIII. 1902 и по р. Афлатунъ ниже р. Уялма-чаты, 23. VIII. въ пл. (Б. А. Федченко!!).

XI. Р. Яссы, въ среднемъ и верхнемъ течениі, 28. V. 1880 (A. Regel!), въ Андижанскихъ горахъ (Оттендорфъ), близъ Арсланбоба и въ другихъ мѣстахъ, поднимаясь съ 4.000' до 7.400', выше другихъ лиственныхъ деревьевъ (С. Коржинскій!), Карасу, на югъ отъ Кетмень-тюбе (Фетисовъ № 25), по р. Кугартъ, лѣсистые склоны горъ, 4. VIII. 1895 (Коржинскій!); Тараңъ-базаръ, лѣса въ ущельяхъ, 3. VIII. 1895 (Коржинскій!).

Въ Туркестанѣ встрѣчается съ достовѣрностью еще въ S: Зеравшанъ, Гиссаръ, Каратегинъ, Бальджуанъ и Кулябъ (A. Regel!); въ Туркестанскомъ гербаріи хранится еще экз. этого вида изъ О: Борборогусунъ (A. Regel!), но это мѣстонахожденіе не подтверждено никакъ и иѣсколько сомнительно.

Виѣ Туркестана — Кавказъ, Персія, Индія.

*Прилѣчаніе 1-е.* Въ литературѣ имѣется еще иѣсколько указаний на нахожденіе кленовъ въ предѣлахъ нашей области. Указанія эти однако недостаточно опредѣлены, такъ какъ не дается видовыхъ названий. Вотъ эти указанія:

1872. Кленъ, Сѣверцовъ вертик. и горизонт. распр. 15 (вершины Чирчика и южнѣе).

1875. Кленъ, Каулибарсъ Тянъ-Шань, 350 (по р. Карасу — лѣвый притокъ Нарына), 367 (хребеть Джасы-тау), 373 (по Карасу, ущелье р. Караколь, заросль версть на 10 отъ нижнаго выхода на долину), 437 (Карасу).

1881. Ahorn, *Middendorff* XLVI (Восточная часть Андижанского уѣзда по Сыру и Каракульдѣ, Яссы до Куршаба, въ горахъ до ур. Унь-Курайрымъ, р. Кугартъ, Нарынъ и на юномъ склонѣ горъ, пограничныхъ съ Семирѣчью), XLVII (Наманган. у.).

1883. Erable, *Capus* Climat et vég. 206 (Афлатунъ до 4.500').

1885. Кленъ, Сорокинъ 129 (дол. р. Шаръ-караима).

1890. Кленъ, Маевъ 62, 64.

1895. Кленъ, Гейеръ Ташкентъ. Гава 128 (Дашман-ская дача). —

*Прилѣчаніе 2-е.* Въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды Acer:

A. *cinerascens* Boiss. (teste Graf Schwerin). W: Гляурское ущелье 1890 (Ти.мофеевъ!) и Гиссарскія горы бл. кишл. Сиръ-абъ (Маевъ!).

A. *monspessulanum* L. — S — W —

A. *pubescens* Franchet — S — (Endem.).

A. *Regelii* Pax. . . . — S (Заравш.) (Endem.).

A. *turkestanicum* Pax. — S (Мумынаб.) (Endem.).

## XIX. Hippocastaneae.

### 104. *Aesculus* L.

*Aesculus Hippocastanum* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 344. — *Led.*, Fl. ross. I. 458. — *Boiss.*, Fl. or. I. 946. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 675 (observ.).

1876. *Aesculus*, A. Regel Садоводство Ташкент.

1892. Конскій капитанъ, Маевъ 16.

IV. Разводится въ Ташкентѣ (Маевъ, A. Regel).

## XX. Ampelideae.

### *Vitis* L.

289. *Vitis vinifera* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 202. — 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 458. — *Boiss.*, Fl. or. I. 955. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 652.

1867. Виноградъ, Сѣверцовъ Поездка 126, 130, 172.

1872. *Vitis vinifera*, Краузе Замѣтки 271.  
 1872. Дикий виноградъ, Съверцовъ вертик. и гориз.  
 распр. 15.  
 1873. Дикий виноградъ, Съверцовъ Путешеств. 78.  
 1876. Виноградъ, А. Регель Садоводство Ташкент.  
 1876. Wein, A. Regel Gartenfl. 320.  
 1877. " A. Regel Gartenfl. 8.  
 1878. Weinstock, A. Regel Reisebr. 166, 179.  
 1878. Berühmter Wein, A. Regel Reisebr. 177.  
 1878. Rebe, A. Regel Reisebr. 182.  
 1881. Weinreben, Middendorff 306, XLVII.  
 1883. Vigne, Capus Climat et végét. 212.  
 1883. Vitis vinifera, Franchet Mission Capus 247.  
 1885. Виноградъ, Лисневскій 36.  
 1890. Виноградъ, Маевъ 18, 29.  
 1892. " Маевъ 36.  
 1895. " Калмыковъ 59.  
 1896. Vitis vinifera, Коржинский Очерки 40, 52.  
 1899. Виноградники, Гейеръ, Турк. скит. 177, 184.  
 1899. Дикий виноградъ, Гейеръ, Турк. скит. 197.

Туземн. наз.: Узюмъ, изюмъ.

III. Бугунь, Боролдай, Котургень-су, дико (*Съверцовъ!*), между Арысомъ, Боролдаемъ и Бадамомъ разводится (*Съверцовъ!*); разводится даже на съверномъ склонѣ Карагату — съверная граница въ мѣстн. Чулакъ.

IV. Сайлыкъ, по ручью, 4—5.000', дико, конецъ мая 1881 (*Мусса!*); Тянь-Шань, 2.500—8.000' (*Кушакевичъ!*); у поворота Чаткала, дико, съ черными и бѣлыми ягодами, 5—6.000', VIII. 1876 (A. Регель!); Ходжакентъ, разводится и дасть хорошее вино (A. Регель!); въ Ташкентѣ разводится (A. Регель, Краузе!, Съверцовъ, Маевъ, Калмыковъ); въ долинѣ Уйгума-Угама (*Съверцовъ!*), въ вершинахъ Чирчика (*Съверцовъ!*); Бричъ-мулла, разводимое (Гейеръ, A. Регель), тамъ же, дико (O. A. и B. A. Федченко!!, Лисневскій!), по берегамъ р. Пскемъ, 1.250 м., 24 апрѣля (?) и 19 авг. (*Капю!*), по дорогѣ къ Пскему (Гейеръ), отъ Наная до Пскема, дико (Гейеръ, B. A. Федченко!!).

VII. Наманган. у. до 3.300' (Лисневскій!).

XI. Разводится до 3—3.500' (Коржинский, Лисневскій), въ уроч. Тегенекъ, 18 дес., въ нижнемъ теченіи р. Карасу (Миддендорфъ); Майли-су, 4.500'—5.000', дико (Коржинский).

Изъ многочисленныхъ сортовъ винограда въ Ташкентѣ особенно выдаются: чиликъ, чарасъ, хусайне (A. Регель!).

Дико въ Туркестанѣ — S: Гиссарь, Дарвазъ, Карагенинъ (Невъскій!, A. Регель!). Разводится въ О: Кульджа (Ларіоновъ!), S: Фергана (!!), Зеравшанъ (O. и B. A. Федченко!!), Бухара (!!), W: Хива, довольно рѣдко въ ханствахъ только у богатыхъ, на зиму закрываютъ рисовой соломой и землей (Корольковъ и Краузе!).

Разводится также отъ Испаніи до Кит. Туркестана.

Дико въ Сѣв. Персіи, Закавказье и Малой Азіи.

*Ampelopsis quinquefolia* (L.) Michx. Fl. bor. amer. I. 160. — 1803.

*Hedera quinquefolia* L., Sp. pl. (ed. 1-a p. 202). — 1753. *Parthenocissus quinquefolia*, Planchon in DC. Monogr. Phaner. V. 448.

1876. *Ampelopsis*, A. Регель Садов. въ Ташкентѣ.

1890. *Ampelopsis quinquefolia*, Маевъ.

IV. Разводится въ Ташкентѣ, введенено русскими (Маевъ, A. Регель).

Приимѣчаніе 1-е. Изъ сем. Ampelidaeae въ Туркестанѣ встрѣчается еще *Cissus aegyptiaca* Bge.: исключительно въ S: Зеравшанъ (O. Федченко!), Гиссарь, Бальджуанъ, Дарвазъ, Шугнанъ (A. Регель); въ Шугнанѣ собрано и наименование!); въ Гиссарѣ собрано Маевыны!, Карагенинъ (Невъскій!) — Туземн. назв.: „Ливтакъ“ (перс.), „казанть-такъ“ (тадж.).

Приимѣчаніе 2-е. Въ статьѣ С. А. Лидского (Горные окрестности Ташкента въ „Туркест. Вѣдом.“ 1887 г., № 48) говорится между прочимъ что на скалахъ въ мѣстности къ востоку отъ Караг-китая встрѣчается „какой-то мѣстный видъ Ampelopsis, съ цѣльными, неразрѣзными листвами“. Но описание это, разумѣется, *Cissus aegyptiaca* Bge., но указаніе это никакъ не подтверждено и потому остается сомнительнымъ.

## XXI. Geraniaceae.

106. *Geranium* L.

1. Растения однолетние . . . . .  
Растения многолетние . . . . .  
2. Лепестки съ длининъмъ узкимъ ноготкомъ,  
листья почти сложные, тонкоразсеченные  
Листья не до основания разсеченные.  
3. Створки плода морщинистыя; листья въ очер-  
тании пяти-угольные . . . . .  
Створки плода гладкія; листья въ очертаніи  
округлые . . . . .  
4. Сѣмена съчато-морщинистыя; лепестки  
цѣльные . . . . .  
Сѣмена гладкія; лепестки выемчатые . . .  
5. Растения съ клубнемъ . . . . .  
Растения съ болѣе или менѣе толстымъ корис-  
вищемъ . . . . .  
6. Вѣнички болѣе крупные, листья разрѣзные  
на довольно узкія долики . . . . .  
Вѣнички менѣе крупные, долики листьевъ  
болѣе широкія, ромбическія, надрѣзныя . . .  
**290. *Geranium tuberosum* L.** Sp. pl. (ed. 1-а) p. 680. —  
**1753.** — *Led.*, Fl. ross. I. 460. — *Boiss.*, Fl. or. I. 872.  
1902. *Geranium tuberosum*, *O. A. Федченко* Списокъ № 265.  
I. Аламединъ, 26—27. V. 1880, 3—5.000'; предгорья  
Александровскаго хребта 15—25. IV. 1879 (*Фетисовъ!*).  
III. Бородай, 2.500—2.600', IV. 1872 (*Корольковъ!*), Чим-  
кентъ, I.—II. въ цв. (*Съверцовъ!*).  
IV. Ташкентъ (*Кушакевичъ!*), на Саларъ въ саду 10. V.  
(*Краузъ!*), между Ташкентомъ и Келесомъ 1.300', 22. IV.  
1871 (*O. A. Федченко!*).  
Въ Туркестанѣ встрѣчается въ О: Тянъ-Шань —  
Джасылъ-куль (*M. Кушакевичъ!*), Джунгарскій Алатау  
(*A. Регель!*), Тарбагатай, S: Гиссаръ, Кулибъ, Бальджуанъ  
(*A. Регель!*), Зеравшанъ (*O. Федченко, Комаровъ!*); W: Карап-  
кумы (*Борщовъ!*); N: Аркать, Кокбекты.  
Виѣ Туркестана — Южная Европа, съверная Африка,  
Малая Азія, Кавказъ, Сирія, Персія.  
**291. *Geranium collinum* Stephan.** in Willd. Sp. pl. III. p.  
705. — *Led.*, Fl. ross. I. 467. — *Boiss.*, Fl. or. I. 874. — *Hook.*  
Fl. br. Ind. I. 429.

1878. *Geranium collinum*, hochwuchsige Form, *A. Regel*  
Reisebr. 192.  
1878. *Geranium collinum*, γ saxatile, *A. Regel* Reisebr. 193.  
1878. " " β glandulosum, *A. Regel* Reisebr. 200.  
1878. *Geranium collinum*, hochalpine var. *A. Regel*  
Reisebr. 202.  
1878. *Geranium collinum*, *A. Regel* Reisebr. 204.  
1883. " " α glandulosum, *Franchet* Mis-  
sion Capus 245.  
Туземи. назв.: Чирмауки; тогозъ-дебе (записано  
*O. A. Федченко*); Тогузъ-деве (киргиз. въ Алтыкъ-мазарѣ);  
чинаракъ (тадж. въ Джанлагайѣ); докбай (узб. въ Бахчѣ)  
— записаны *Невъскими*.  
Слѣдующія показанія я затрудняюсь отнести къ той  
или иной разновидности:  
II. Айшиара и съверный склонъ Карабуры (*A. Регель* — п. в.).  
IV. Каракызынакъ (*A. Регель* — п. в.).  
*Var. eglandulosum* Led. Fl. ross. I. 468.  
II. Караколь, VIII. 1876 (*A. Регель*); между Манасомъ и  
Карабурой 9. VIII. 1897 (*B. A. Федченко!*).  
IV. Чимганъ 1899—1901 (*E. Хомутова!*); Чимганъ 26. VII.  
1897 (*O. A. Федченко!*); Тянъ-Шань 2.500—8.000' (*Кушакевичъ!*).  
XI. Майлисай 2. VI. 1878 (*A. Кушакевичъ!*); Арсланбобъ  
14. VI. 1890 въ цв. и 27. V. въ цв. (*Литвинова!*); горы  
надъ Арсланбобомъ, 7. VI. 1899 зацв. (*Литвинова!*).  
*Eglandulosum*  $\infty$  *glandulosum* m.  
Въ долинѣ Кумышъ-таянъ собрано очень интересная  
форма, у которой только нѣкоторыя цветоножки имѣютъ  
железистые волоски (*A. Арсеньева!*).  
Въ Джелабадѣ, на болот. поляхъ 1. VIII. 1895, *C. П. Корженевскій* собралъ также весьма интересную промежуточ-  
ную форму, по слабо желез. опушенню цветоножекъ отно-  
сящую все же къ *var. glandulosum*, но по окраскѣ вѣничка,  
характеру листьевъ болѣе напоминающую *var. eglandulosum*.  
*Var. glandulosum* Led. Fl. ross. I. 467.  
I. Арассанъ, 7—9.000', 8. VI. 1880, Аламединъ (*Фетисовъ!*);  
волость Кенколъ (Таласъ) VIII. 1876; Караколь (Таласъ)  
(259)

IX. 1876 въ пл., Каракия (*A. Regel!*); собранные *A. Regel* и образцы очень напоминаютъ форму var. *hirsutum* Trautv.

IV. Тянь-Шань, 8—1.200(0)', (*Кушакевич!*), 10. V. (*Краузер!*); спускъ съ пер. Торнакъ-беля къ Майданталу, 4. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!); Торнакъ-бель 2.500 м. (*Капю!*); Чимганъ 1901 (*E. Хомутова!*); Большой Чимганъ 1902 (*E. Хомутова!*)

VII. Качкараты 14. VIII. 1902 (казакъ *Яковлев!*).

VIII. Терекъ и Узунъ-ахматъ, 9.000', 29. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

IX. Сѣверный склонъ надъ западнымъ концомъ долины Сусамыръ, 8—10.000', 18. VII. 1881; долина Сусамыръ, 7.000', 7. VII. 1881; Кобукъ, южный склонъ Сусамырского хребта, 7.000', 6. VII. 1881; сѣверный склонъ Сусамырского хребта, 7—9.000', 4. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

X. Манагильды до Алабуги, 6—7.000', 4. VI. 1880 (*A. Regel!*).

XI. Ареланбобъ, лиственные лѣса, 10. VIII. 1895 (*C. Коржинский!*); у перевала Кугартъ, травяные склоны, 5. VIII. 1895 въ цв. (*C. Коржинский!*).

*Var. alpinum* Rgl. Deser. pl. nov. turk. fasc. V. in „Acta Horti Petr.“ V. p. 253.

I. Джиламышъ, 9.000', 26. VI. 1880 въ цв. (*Фетисовъ!*); Арассанъ, 9—11.000', 15. VI. 1880 (*Фетисовъ!*).

II. Кумбель (*A. Regel!*).

IV. Карабура (*A. Regel!*); въ верховьяхъ Майдан-тала, у ледника Сарбазы, 4. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!!); по Аидаульгани 3. VIII. 1897 (Б. А. Федченко!!); здѣсь же переходная форма, соотвѣтствующая var. *intermedium* Rgl.

VIII. Переваль Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 10—12.000', 30. VII. 1881 (*Фетисовъ!*); Большой Чимганъ: 8. VIII. 1897 (*Пьянновская-Баженова!*), 18. VII. 1900 (*E. Хомутова!*), 1901 (ки. *Мещерская!*).

Растенія съ Большого Чимгана не вполнѣ типичны и представляютъ скорѣе переходную форму между var. *alpinum* и var. *glandulosum*.

IX. Сѣверный склонъ Сусамырского хребта: 7—9.000', 4. VI. 1881; у р. Сандыкъ, 9—11.500', 3. VII. 1881 и надъ западнымъ концомъ долины Сусамыра 18. VII. 1881;

вершины Сусамырского хребта, 19. VII. 1881, 9—11.000' (*Фетисовъ!*).

XI. Баубашъ-ата, каменистые склоны, 11. VIII. 1895, 7—10.000' (*C. Коржинский!*).

*Var. viscosum* Rgl. (Deser. pl. nov. turk. fasc. V. in „Acta Horti Petr.“ V. p. 253.)

IX. Караколь, притокъ Сусамыра, 7.000', 1. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

*Var. candidum* (Komar.) B. Fedtsch.

*G. candidum* Komarov, Мат. по фл. Турк. нагорья. I. Бассейнъ Зеравшанъ № 336. — 1896.

IV. Большой Чимганъ 1902 (*E. Хомутова!*).

XI. Кенколъ, слов. лѣсъ, 8—9.000', въ цв. 13. VIII 1895 (*C. Коржинский!*); безъ обозн. мѣста (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ var. *candidum* m. встрѣчается. рѣдко. О: у истоковъ р. Наринъ, 25. VII. 1896 (*Бротересъ!*); С: Зеравшанъ (*B. Комаровъ!*).

Въ Туркестанѣ въ разныхъ формахъ *G. collinum* встрѣчается всюду, кромѣ пустынь: N., O., S., W.

Внѣ Туркестана — Кавказъ, Персія, Афганистанъ, Индія, Монголія и Сибирь — къ западу отъ Енісея.

292. *Geranium rectum* Trautv. Enum. pl. songor. № 261. („Bull. de la Soc. Impér. des Natur. de Moscou.“ — 1860. — II. p. 459). — *Hook.*, Fl. Ind. I. 429.

1877. *Geranium erectum*  $\beta$  *vilosulum*, E. Regel Deser. pl. nov. fasc. V. („Acta Horti Petr.“ V. 253).

1878. *Geranium rectum*  $\beta$  *vilosulum*, A. Regel Reisebr. 189.

I. Карагай-булакъ, 9.000', 6. VII. 1882; Джиламышъ 10—11.000', 26. VI. 1880; Исыгаты, 10.000', 15. V. 1881; Аламединъ, 3—5.000', 26—27. V. 1880 (*Фетисовъ!*); пер. Кольторъ 12.000', 7. VII. 1882; Арассанъ, 7—9.000', 8. VI. 1880 (*Фетисовъ!*).

II. Верховья Таласа, у постѣдняго аула на р. Су-ашу (*A. Regel!*; въ гербаріи имѣется линій экземпляръ съ этикеткой: Aigiraleh am Oberen Talas, Tschotkal (sic!), VIII. 1876, A. Regel!).

VIII. Узунъ-ахматъ, западная сторона, 7.000', 28. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

IX. Съверни́й склонъ Сусамырскаго хребта, 8—9.000', 19. VII. 1881; Караколь, притокъ р. Сусамыра, 7.000', 7. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. По р. Кугартъ, лѣсистые склоны горъ, 4. VIII. 1898 (*С. Коржинский!*); Арсланбобъ, 25—26. V. 1899 въ цв. (*Литвиновъ!*); въ ущельѣ р. Афлатунъ у впаденія р. Уялматы, 22 и 25. VIII. 1902 (*Б. А. Федченко!!*).

Въ Туркестанѣ — Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань.  
Виѣ Туркестана — Кашмиръ.

**293. *Geranium pusillum* L.** Syst. (ed. X.) p. 1144: — *Led.*, Fl. ross. I. 470. — *Boiss.*, Fl. or. I. 880. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 432.

IV. Саларъ, въ садахъ, V. 1870 (*Краузе!*).

VII. Въ долинѣ р. Афлатунъ, при устьи р. Уялматы, на галькѣ, 26. VIII. 1902 въ цв. и пл. (*Б. А. Федченко!!*).

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ S: Зеравшантъ (*O. Федченко!*); Гиссарь, Балъджуанъ (*A. Регель!*).

Виѣ Туркестана — Европа, Сирія, Крымъ, Кавказъ, Гималаи.

**294. *Geranium rotundifolium* L.** Sp. pl. (ed. 1-а) p. 683.  
— **1753.** — *Led.*, Fl. ross. I. 470. — *Boiss.*, Fl. or. I. 880. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 432.

III. Бородай VI. 1876 (*A. Регель!*).

IV. Сыръ-дарья близъ Ташкента (?) — (*A. Регель!*).

VI. Сыръ-дарья, правый берегъ, близъ Ходжента (*A. Регель!*); Моголь-тау, 29. IV. (*Съверцовъ!*), тамъ же 4. III. (*Кушакевичъ!*); перевалъ къ Джанъ-булану, 19. IV. (*Съверцовъ!*).

Въ Туркестанѣ не рѣдко — О, С, В.

Виѣ Туркестана — Европа, съверная Африка, Кавказъ, Палестина, Персія, Афганистанъ, Индія, Белуджистанъ.

Показаніе (*Boissier*) для Сибири основано на неточныхъ данныхъ.

**295. *Geranium divaricatum* Ehrh.** Beitr. VII. 164. — *Led.*, Fl. ross. I. 473. — *Boiss.*, Fl. or. I. 881.  
I. Аламединъ, 26—27. V. 1880 (*Фетисовъ!*).  
IV. Ташкент. у., Акташское лѣсничество, 14. VI. 1901 (*E. Валневъ!*).

XI. Узгентъ, 4.000', 28. V. 1880 въ пл. (*A. Регель!*); Сарыбіс-саї, 2. VI. 1878 (*A. Кушакевичъ!*); перевалъ Уюнкуръ-су, тѣнистые склоны у ручья, 6.500', 14. VIII. 1895 въ цв. и пл. (*Коржинский!*); Арсланбобъ, 23. V. 1899 въ цв. и пл. (*Литвиновъ!*).

Въ Туркестанѣ — О: Тянь-Шань (*Кушакевичъ!, Фетисовъ!, Съверцовъ!, Кубарсы!*), Куюнкузъ, пер. Кетменъ — (*A. Регель!*), Уртасъ-сары (*Фетисовъ!*); S: Зеравшантъ (*Комаровъ!*), Шагимарданъ (*Скорняковъ!*), Горы Газы - майликъ (*A. Регель!*).

Виѣ Туркестана — Европа, Крымъ, Кавказъ, съверная Персія, Малая Азія, Алтай.

**296. *Geranium Robertianum* L.** Sp. pl. (ed. 1-а) p. 681.— **1753.** — *Led.*, Fl. ross. I. 473. — *Boiss.*, Fl. or. I. 883. — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 432.

IV. Тянь-Шань, 8—12000' (*Кушакевичъ!*), Нанай, въ Акъ-сарай-саї, 20. VII. 1897 (*Б. А. Федченко!!*), Чимганъ 1900 (*E. Хомутова!*).

Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ О: Вѣрный и горы по Аксаку (*Съверцовъ!*).

Виѣ Туркестана — Европа, о-въ Мадера, Малая Азія, Крымъ, Кавказъ, Индія.

*Примѣчаніе 1-е.* Слѣдующее показаніе остается невыясненнымъ: 1882. Weissbl. Geranium, *A. Regel* Gartenfl. 363 (Алабуга).

Быть можетъ, это *G. albibulum* Ledb., но вѣроятнѣе — *G. collinum* Steph. v. *candidum* (Komar.) B. Fedtsch. Въ гербаріи я не нашелъ *Geranium* съ бѣлыми цветами изъ указанной местности. Настоящей *G. albibulum* Led. встрѣчается въ Сибири, а также въ Джунгарскомъ Алатау и Тянь-Шанѣ.

*Примѣчаніе 2-е.* Кроме упомянутыхъ, въ Туркестанѣ встрѣчается еще цѣлый рядъ видовъ:

<i>G. pseudosibiricum</i> I. Meu.	N	O	—	—
<i>G. sibiricum</i> L.	—	O	S	—
<i>G. pratense</i> L.	—	N	O?	—
<i>G. silvaticum</i> L.	N	—	—	—

G. Kotschyi Boiss.	— — — W —
G. affine Led.	— O — —
G. palustre L.	N — — —
?G. davuricum DC.	
G. molle L.	
G. dissectum L.	

**107. Erodium L.**

1. Растение покрыто прижатымъ бѣлымъ пушистымъ. Листья 3—5 раздѣльные съ городчатыми долями . . . . . *E. oxyrrhynchum* M. B.  
Растенія съ шершавымъ стеблемъ . . . . . 2.  
2. Листья продолговатые, перистораздѣльные,  
доли ихъ узкія, тонкія . . . . . *E. cicutarium* L'Herit.  
Листья яйцевиднаго или почти трехъуголь-  
наго очертанія, доли ихъ болѣе широкія . . . *E. ciconium* W.

**297. Erodium ciconium (L.) Willd.** Sp. pl. III. 629. — *Led.*, Fl. ross. I. 476.—*Boiss.*, Fl. or. I. 891.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 434.,  
*Geranium ciconium* L. Amoen. Acad. IV. 282. — Sp. pl. (ed. 2a) p. 952.

I. Станція Куюкъ, 19. V. 1878 (*Кушакевичъ!*).

Въ нашей области очень рѣдко въ предгорьяхъ.

Въ Туркестанѣ: S: — Самарканѣдь (*O. Федченко!*), Чиназъ (*A. Регель!*), Курганъ-тюбе (*A. Регель!*).

Въ Туркестана — южная Европа, Малая Азія, Сирія, Месопотамія, Индія, Палестина.

**298. Erodium cicutarium (L.) L'Herit** in Ait. Hort. Kew. II. 414.—*Led.*, Fl. ross. I. 476.—*Boiss.*, Fl. or. I. 890.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 434.

*Geranium cicutarium* L. Sp. pl. (ed. 1a) p. 680  
x parte.—**1753.**

1902. *Erodium cicutarium*, *O. Федченко*, Списокъ № 271.  
I. Предгорья Александровскаго хребта, 15—25. IV.

1879; Нинишъ 2.000' 10. V. 1880 (*Фетисовъ!*).  
III. Горы Машатъ между Ауліе-ата и Чимкентомъ 27. VII.

1880 (*A. Регель!*).  
IV. Ташкентъ, сады на Боссу, 11. IV. 1871 (*O. Федченко!*), по садамъ между посѣвами, 6. V. 1870 (*Краузе!*).

VI. Моголь-тау, 29. IV. (*Сѣверцовъ!*), тамъ же 4. III. (*Кушакевичъ!*), правый берегъ Сыръ-Дары близъ Ходжента,

14. IV. 1880 (*A. Регель!*), ст. Джанбулакъ, 24. V. 1878 (*A. Кушакевичъ!*).

Въ нашей области не рѣдко въ предгорьяхъ.

Въ Туркестанѣ — О: — Тянъ-Шань: между Малымъ Нарыномъ и Уланомъ (*Шарнгорстъ!*), Курдай (*Фетисовъ!*), Джунгарскій Алатау: Иренхабирга, Джоку (*A. Регель!*); S: — Самарканѣдь (*O. А. Федченко!*, *A. Регель!*), Гиссаръ, Кульбъ, Курганъ-тюбе, Дарвазъ (*A. Регель!*). Алайскій хребетъ: Беляули (*Кушакевичъ!*), Шугнанъ (*O. и B. Федченко!*).

Въ Туркестана — Европа, съверная Африка, Сибирь, Белуджистанъ, Афганистанъ, Аравія, Персія, Малая Азія, Кавказъ, Индія.

**299. Erodium oxyrrhynchum** M. B. Fl. taur. cauc. II. 133.—

**1808.—*Led.*, Fl. ross. I. 477.—*Boiss.*, Fl. or. I. 896.**

*E. Hohenackeri* *Led.*, Fl. ross. I. 478.

*E. bryoniaefolium* *Boiss.* Diagn. pl. nov. Ser. I. fasc. 1 p. 61.—*Boiss.*, Fl. or. I. 896.

Туземн. назв. [Майды-губъ; куланъ-гуйрюкъ (киргиз.), записано *O. А. Федченко*].

VI. Моголь-тау, V. 1878 (*Скорняковъ!*).

Въ нашей области найдено только на крайнемъ югѣ, но въ Туркестанѣ вообще распространено широко: О: — Кульджа (*A. Регель!*), Вѣренск. у. (*A. Кушакевичъ!*); S: — Анижанъ (*Кушакевичъ!*); Опъ (*Ашурабаевъ!*), Зеравшанъ (*O. Федченко!*, *Коларовъ!*); Гиссаръ, Кабадіанъ, Курганъ-тюбе, Вахигъ (*A. Регель!*), W: — Кызылъ-кумы (*O. Федченко!*), Репетекъ (*A. Регель!*), о-въ Бинъ-куль, 25. V. 1849 (*Бутаковъ!*). Учъ-хаджи (*A. Регель!*), о-въ Бинъ-куль, 25. V. 1849 (*Бутаковъ!*).

Въ Туркестана — Египетъ, Синай, Персія, Кавказъ, Афганистанъ, Белуджистанъ.

*Приимѣніе.* Въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды *Erodium*:

*E. Stephanianum* Willd. . . . . N — — —

*E. laciniatum* Cav.  $\varnothing$  *pulverulentum* (Desf.) *Boiss.* (= *E. pulchellum* Kar. et Kir.) . . . . . — — — W —

*E. tibeticum* Egdw. . . . . — — — S — —

*E. Semenovi* Rgl. et Herd. . . . . — O — —

## XXII. Balsamineae.

### 108. Impatiens.

300. *Impatiens parviflora* DC. Prodrom. I. 687.—1824.—  
*Led.*, Fl. ross. I. 481.—*Boiss.*, Fl. or. I. 868.

I. *brachycantha* Karel. et Kir. Enum. pl. song.  
№ 205.—*Led.*, Fl. ross. I. 482.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 481.

1878. *Impatiens parviflora*, A. Regel Reisebr. 175.

Туземн. назв.: хина; хиной-каганъ (записано Невескии въ Даганѣ); падша-сурхакъ (тадж.), аяги-кизылъ (узб.) (записано О. А. Федченко).

I. Аксу, 5.500'—7.000', 30. VI. 1880 (*Фетисовъ!*); Арас-санъ, 7—9.000', 7. VI. 1880 (*Фетисовъ!*).

III. Боролдай (A. Regel!).

IV. Между Чимганомъ и Бричъ-муллою, 19. VII. 1897,  
въ цв. и въ Бричъ-муллоу, 19. VII. 1897 (О. А. и Б. А. Фед-  
ченко!!); Нанай, VIII. 1902 (Б. А. Федченко!), Сайлакъ, 3—5.000',  
въ горахъ (A. Regel!), въ юонъ (*Краузе!*).

VII. Въ долинѣ р. Афлатунъ, у впаденія р. Уялма-чаты,  
22. VIII. 1892 и выше, къ перевалу, почти до начала аль-  
пийской зоны, 26. VIII. 1902, въ цв. (Б. А. Федченко!!).

IX. Кобукъ и другія мѣстности южнаго склона Суса-  
мурскаго хребта, 7—10.000', 6—25. VII. 1881 (*Фетисовъ!*).

XI. Среднее теченіе р. Ясы, 4.000', 28. V. 1880 (A. Re-  
gel!), Майли-сай, 2. VI. 1878 (*Кушакевичъ!*), по р. Кугартъ,  
4. VIII. 1895 (С. Коржинский!).

Въ нашей области встрѣчается нерѣдко по сырьимъ  
мѣстамъ возлѣ ручьевъ въ полосѣ лиственныхъ лѣсовъ,  
рѣже — въ полосѣ хвойныхъ, гдѣ придерживается скорѣе  
корынхъ мѣсть. Отличія формы съ болѣе короткимъ шпор-  
цемъ (*I. brachycantha* Kar. et Kir.) кажутся мнѣ слишкомъ  
незначительными.

Въ Туркестанѣ встрѣчается часто въ горахъ: N: — Ка-  
ратая (A. Regel!); O: — Джунгарскій Алатау, Тинь-Шань;  
S: — Гиссаръ, Балъджуанъ (A. Regel!), Алайскій хребетъ,  
Зеравшанъ (O. Федченко!).

Внѣ Туркестана — южные отроги Алтая и Гималаи.

*Impatiens balsamina* L. Sp. pl. (ed. 1a) p. 938.—1753.—*Hook.*,  
Fl. br. Ind. I. 453.

*Balsamina hortensis* Desp. in Dict. Sc. Nat. III. 485.  
1876. Бальзаминъ, A. Regel, Садоводство въ Ташкентѣ.  
1878. Balzaminen, A. Regel Reisebr. 167.  
1890. Бальзаминъ, Маевъ, 19.

Туземн. назв.: хина [„хине-съдбаркъ“ — записано  
Короликовымъ и Краузе въ Хивѣ].

IV. Разводится въ Ташкентѣ (Маевъ, A. Regel).

Приимѣніе. Изъ сем. *Oxalidaceae* въ Туркестанѣ встрѣ-  
чается только *Oxalis corniculata* L.: S: — Дарвазъ;  
Калаихумъ, 4.5000', 26. II. 1883 (A. Regel!); правый берегъ  
Пянджа близъ Калаихума, 11. IX. 1881, въ пл. (A. Regel!).

## XXIII. Simarubaceae.

*Ailanthus glandulosa* Desf. in Act. Acad. Paris. (1786) p. 263.  
tab. 8. (ex Beck). — *Hook.*, Fl. br. Ind. I. 518.

1876. *Ailanthus*, A. Regel Садовод. въ Ташкентѣ.  
1878. *Ailanthus glandulosa* A. Regel Reisebr. 166.

1890. " " " Маевъ, 20.  
IV. Разводится въ Ташкентѣ, введенно русскими (A. Re-  
gel!, Маевъ, О. А. и Б. А. Федченко!).

## XXIV. Zygophylleae.

### 109. Sarcozygium Bge.

301. *Sarcozygium xanthoxylon* Bge. Ueber eine neue Gat-  
tung aus der Familie der Zigophylleen („Linnae“ Bd. VII.  
p. 7—8 t. 1). 1843.

*Zygophyllum xanthoxylum* Baill. Hist. d. pl.  
IV. 417.—*Maxim.* Fl. mongol. № 293.—Fl. Tangut. № 185.

*Sarcozygium tripteris* Bge. in sched.; *Maxim.* Ind.  
Mongol. 480.

VI. Моголь-тау, Камышъ-курганъ, 25. V. 1878, въ пл.  
(Скорняковъ!).

Въ нашей области встрѣчается исключительно въ одной  
мѣстности, и это — единственное мѣстонахожденіе въ рус-  
ской литературѣ.

скихъ владѣніяхъ. Въ Туркестанскомъ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада хранятся образцы, собранные А. Регелемъ на р. Алго къ N.W. отъ Турфана, А. Красновымъ въ южныхъ предгорьяхъ Тянь-Шаня между переваломъ Бедель и г. Учъ-турфаномъ; А. Каульбарсомъ на р. Тоюнъ; въ Академіи Наукъ хранятся образцы, собранные бар. О. Р. Остен-Сакеномъ на р. Суукты — но всѣ эти мѣстности лежатъ уже въ предѣлахъ китайскихъ владѣній и растеніе это нами для Россіи приводится впервые.

Очень распространено въ пустынѣ Гоби отъ торгового тракта и хребта Хань-хай до гор. Турфана и Алашаня, и въ пустынѣ къ сѣверу отъ китайского Тянь-Шаня къ южному Алтаю.

Родъ *Sarcocystium* Bge. иѣкоторыми учеными (*Baill.* Hist. pl. IV. 417.—*Maxim.* Fl. mongol. № 293.—*Engler* in Engl. u. Prantl Nat. Pflanzenfam III. 4. p.) присоединенъ къ р. *Zygophyllum* L., гдѣ во всякомъ случаѣ составляетъ особую секцію.

## II0. *Miltianthus* Bge.

302. *Miltianthus portulacoides* (Cham.) Bge. Reliqu. Lehmann. № 266.—1851.—*Boiss.*, Fl. or. I. 916.

*Zygophyllum portulacoides* Cham. in Linnaea V. 50.

VI. Моголь-тау, 14. VII. (*Съверцовъ!*).

Въ нашей области — на крайнемъ югѣ.

Несмотря на то, что р. *Miltianthus* установленъ столь солиднымъ систематикомъ, какъ Бунге, и принимается до послѣдняго времени за самостоятельный родъ (*Boissier*, *Engler*), мнѣ кажется, едва ли достаточно одного отрицательнаго признака (отсутствіе лепестковъ) для выдѣленія этого растенія въ особый родъ.

Въ Туркестанѣ найдено еще Леманомъ въ сѣверной Бухарѣ, затѣмъ Корольковымъ и Краузѣ во время Хивинскаго похода: у Хала-ата, 22. IV. 1873 на песчаной почвѣ, и въ Манамъ-джанъ, 9. IV. 1873 около солончаковъ, въ изобиліи.

Болѣе нигдѣ не известно.

## III. *Tribulus* L.

303. *Tribulus terrestris* L. Sp. pl. (ed. 1-а) p. 378.—1753.—*Led.*, Pl. ross. I. 486.—*Boiss.*, Fl. or. I. 902.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 423.

1878. *Tribulus terrestris*, A. Regel Reisebr. 169.

1902. " " O. A. Федченко Списокъ № 279.  
Туземн. назв.: Чакыръ-тканъ.

IV. Ауль Ніазбекъ въ долинѣ Чирчика, 30. VII. 1902; Искандеръ, 15. VII. 1897 и 30. VII. 1902 (O. A. и B. A. Федченко!!), Ташкентъ (A. Regel!), степь между Сыръ-дарьею и Ташкентомъ, 19. V. 1871 (O. A. Федченко!), Чимганъ, 5.000', 1899—1900 (E. Холмутова!); ст. Ніазбашъ, 27. VIII. 1897 (O. A. и B. A. Федченко!!).

XI. Майли, около керосинового завода (Краузѣ!).

Нерѣдкое растеніе сорныхъ мѣсть и вообще культурной полосы. Таковъ же характеръ распространенія этого растенія и во всемъ Туркестанѣ.

Въ Туркестана — южная Европа, сѣвери. и южн. Африка, Индія, Кавказъ, Персія, Белуджистанъ, Америка (занесено), южная Сибирь, Монголія, Сѣверный Китай, Японія, Австралия.

## II2. *Biebersteinia* DC.

304. *Biebersteinia multifida* DC. Prodr. I. 708.—1842.—*Led.*, Fl. ross. I. 487.—*Boiss.*, Fl. or. I. 899 (Geraniaceae).

III. Карагату (Краузѣ!); Бугунъ и р. Бабачи (*Съверцовъ!*).  
VI. Джанъ-булакъ, 12. IV. 1880, съ незр. пл. (A. Regel!).

*Примѣчаніе.*: Въ Туркестанѣ встрѣчается еще В. одога Steph.: О: — Джунгарскій Алатау (кромѣ Шренка!, собрано еще A. Regelемъ у перевала Касанъ).

## II3. *Zygophyllum* L.

Кустарникъ. Листья простые . . . . . Z. *atriplicoides* F. et M.  
Травянистое растеніе. Листья однажды перистосложные . . . . . Z. *Fabago* L.

305. *Zygophyllum Fabago* L. Sp. pl. (ed. 1-а) p. 387.—1753.—*Led.*, Fl. ross. I. 485.—*Boiss.*, Fl. or. I. 913.  
1878. *Zygophyllum Fabago*, A. Regel Reisebr. 169.

IV. Горы Карагатай (*Маевъ!*), Ташкентъ, III. 1872 (*Королевъ!*), тамъ же (*A. Регель!*).

VI. Моголь-тау, 23. V. (*Съверцовъ!*).

Широко распространено по всему Туркестану, кромъ высокихъ горъ.

Виѣ Туркестана — Кавказъ, Персія, Сирія, Монголія, Крымъ, Съверная Америка, Іспанія, Малая Азія, Палестина, Афганістанъ, Белуджистанъ.

**306. *Zygophyllum atriplicoides* Fisch. et Mey. in Fischer Zygophyllaceae p. 12.—1834.—Ind. hort. Petr. I. 41.—1835. *LED.*, Fl. ross. I. 486.—*Boiss.*, Fl. or. I. 911.**

*Z. eurypteron* *Boiss.* et *Buhse* Aufz. p. 49.—*Boiss.*, Fl. or. I. 912.

1882. Grossfruchtiger *Zygopetalum*, *A. Regel* Gartenfl. 364.

1885. *Zygophyllum* кустарный, *Лисневскій* 39.

VII. Въ окр. аула Сары-калычъ (бывш.) Чустекаго уѣзда (*Лисневскій* — п. в.).

VIII. Кетмень-тюбе, въ соляныхъ горахъ, V. 1878 (*Съверцовъ!*).

X. Алабуга (*A. Регель* — п. в.).

XI. По р. Карасу, на каменистыхъ южныхъ склонахъ, 6.000' (*Фетисовъ* № 26).

Въ нашей области не часто; на съверѣ Ферганы, гдѣ очевидно благопріятствуютъ климатическимъ условия.

Кустарникъ этотъ является однимъ изъ характернѣйшихъ представителей южного элемента флоры: ни на съверныхъ склонахъ Таласскаго Алатау, ни въ центральномъ Тянъ-Шанѣ, видъ этотъ не встрѣчается.

Въ Туркестанѣ исключительно въ S: — Дарвазъ: между Токай и Хирговать, на р. Пянджъ, 5—6.000', III—IV. 1883, въ цв. (*Myca!*), на южной сторонѣ дол. Ванджа, 7.000', 13. IX. 1881 (*A. Регель!*); Кулябъ къ югу отъ Саята на Пянджъ, 6. IV. 1883 (*A. Регель!*), въ горахъ Карагатай бл. Диланкура ниже слияния Кизиль-су и Акесу, 8. IV. 1883, 3—4.000', въ цв. (*A. Регель!*); Курганъ-тюбе ущ. Сангтуда, лѣвый берегъ Вахша, 2—3.000', V. 1883 (*Myca!*); Могіанъ,

Зеравшанъ (*O. Федченко!*, *B. Комаровъ!*, *A. Регель!*); Алайскій хреб., между Шагимарданомъ и Караказукомъ (*O. Федченко!*); Бухара, пески Айваджъ-тахта-куве (*H. Гейеръ!*), Самарк. обл. близъ Санзара (*Съверцовъ!*); W: — Закасп. обл., Козельная (*Литвиновъ!*), Кизиль-арватъ (*Беккеръ!* *Кунцелъ!*).

Виѣ Туркестана — въ Закавказье, Персія, Сирія, Белуджистанѣ и Афганістанѣ.

Въ нашей области — рѣдко; принадлежить къ числу характерныхъ южныхъ формъ.

Въ Туркестанѣ исключительно въ S: — Зеравшанъ (*O. Федченко!*, *B. Комаровъ!*), Могіанъ (*B. Комаровъ!*), Джизакъ, Ура-тюбе, Тамерлановы ворота (*A. Регель!*); Бухара: Мумынавадъ; Кулябъ; Кафириагачъ; Чигликъ; горы Карагатай (*A. Регель!*).

Виѣ Туркестана — Сирія, Персія.

*Приимѣчаніе 1-е.* Невыясненными остаются слѣдующія указанія для нашей области:

1877. *Zygophyllum*, *A. Regel* Reisebr. 367 (Боролдай).

1885. " *Сорокинъ* 127 (Среди альпійской растительности по р. Турчень-су, притоку Нарына).

*Приимѣчаніе 2-е.* Въ Туркестанѣ встрѣчается еще цѣлый рядъ видовъ *Zygophyllum*; большей частью, это растеніе пустынь.

<i>Z. brachypterum</i> Kar. et Kir.	..	N	—	S	—	—
<i>Z. Eichwaldi</i> CAM.	..	—	—	—	W	—
<i>Z. latifolium</i> Schrenk	..	—	—	N	—	—
<i>Z. ovigerum</i> F. et M.	..	—	—	—	W (Endem.)	—
<i>Z. macrophyllum</i> Rgl. et Schm.	..	—	—	—	W (Endem.)	—
<i>Z. macropterum</i> CAM.	..	N	O	S	W	—
<i>Z. minutum</i> Cham.	..	—	—	—	S	W (Endem.)
<i>Z. coccineum</i> Schr.	..	N	—	—	—	—
<i>Z. Rosovii</i> Bge.	..	—	O	S	—	—
<i>Z. subtrijugum</i> CAM.	..	N	—	—	—	—
<i>Z. furcatum</i> CAM.	..	N	—	—	—	—
<i>Z. stenopterum</i> Schrenk.	..	N	—	—	—	—
<i>Z. turcomanicum</i> Fisch.	..	—	—	—	W (Endem.)	—
<i>Z. Karelini</i> Fisch. et Mey.	..	—	—	—	W (Endem.)	—
(= <i>Z. Lehmannianum</i> Bge).						

**XXV. Rutaceae.****II4. Peganum L.**

307. *Peganum Harmala* L. Sp. pl. (ed. 1-a) p. 444. 1753.—*Led.*, Fl. Ross. I. 489.—*Boiss.*, Fl. or. I. 917.—*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 486.

1878. *Peganum Harmala*, A. Regel Reisebr. 169.

Туземи. назв.: Хазараспашь; иссырыкъ (запис. Пухляковы!). Въ г. Кокандъ миѣ сообщили название этого растенія „спрокъ“ и сказали, что оно кладется въ табакъ.

IV. Ташкентъ (A. Regel!), тамъ же по арыкамъ (Маевъ!), Ташкентъ, III. 1872, въ цв. и пл. (Корольковъ!), по садамъ, 30. IV. (Краузе!); въ степи между Ташкентомъ и Той-тюбе, 1.000—1.500'; VI. 1872 (Корольковъ!); бл. Карасу, Ташкент. у., безъ цв. и пл., 25. VIII. 1892 (B. Пухляковъ!).

VI. Моголь-тау, 25. IV. (Съверцовъ!); Карасу между Ташкентомъ и Ходжентомъ, 16. V. 1880 (A. Regel!). Кишил. Самгаръ, 30. V. 1878 (Скорняковъ!).

Въ Туркестанѣ встречается въ О, С, В — очень часто.

Внѣ Туркестана — южная Европа, съверная Африка, Аравія, Малая Азія, Сирія, Египетъ, Кавказъ, Персія, Индія, Монголія, Афганістанъ.

**II5. Haplophyllum Juss.**

1 Гнѣзда плода раскрываются со внутренней стороны . . . . . 2.

Гнѣзда плода не раскрываются . . . . . 3.

2. Доли завязи съ бугорчатымъ придаткомъ у вершины . . . . .

Доли завязи безъ придатка у вершины . . . . .

3. Листья продолговатые, чашелистники линейные, рѣзничатые . . . . .

Листья болѣе крупные, широколанцетные; чашелистники широкоovalные, заостренные . . . . .

**308. Haplophyllum lasianthum** Bge. Reliq. Lehman. № 278.

1851. p. 239. — *Boiss.*, Fl. or. I. 936.

1902. *Haplophyllum lasianthum*, O. A. Федченко Списокъ № 284.

Туземи. назв.: Сарбасъ (киргиз.).

IV. Между Ташкентомъ и Келесомъ, 1.300', садъ, 22. IV. 1871 (O. A. Федченко!); Арейдованъ 1880 г., Ташкентъ V. 1880 (A. Regel!); Ташкентъ (Краузе!).

VI. Моголь-тау 9. 8. IV. (Съверцовъ!); Моголь-тау (Скорняковъ!); Джанъ-булакъ, 24. V. (Кушакевичъ!).

XI. Майли-сай, 2. VI. 1878 (Кушакевичъ!), Исбасканъ 30. V. (Кушакевичъ!).

Въ Туркестанѣ распространено въ степной зонѣ S: — Голодная степь (Муса!), Зеравшанъ (O. A. и B. A. Федченко!! и др.), Бухара (A. Regel!); Фергана: Ошъ, Андижанъ (Кушакевичъ!), Исфара (O. Федченко!).

Внѣ Туркестана неизвѣстно.

*Haplophyllum versicolor* Bge. (H. Bungei Trautv., Incred. Fl. Ross. № 1132), собрано O. A. Федченко (?) между Орскомъ и Ташкентомъ, но надо думать, что виѣ предѣловъ нашей области.

**309. Haplophyllum Sieversii** Fisch. Enumer. pl. nov. a Schrenk lect p. 89. — 1841. *Led.*, Fl. Ross. I. 491.

*Ruta frutescens*, Siev. reliqu. (ex Fisch.).

*Aplophyllum perforatum* Karel. et Kir. Enumer. pl. alt. № 199.

*Aplophyllum Sieversii* Karel. et Kir. Enumer. pl. Songor. № 207.

*Haplophyllum acutifolium*, Boiss., Fl. or. I. 942. (ex parte).

1878. *Haplophyllum Sieversii*, A. Regel Reisebr. 169.

1902. " " " O. A. Федченко Списокъ № 282.

Туземи. назв.: Якъ-яндаусъ (тадж.), записано O. A. Федченко.

III. На Боролдаѣ (A. Regel!); Искандерь, 15. VII. 1897 (O. A. и B. A. Федченко!!); Чимганъ, 1899 — 1900 (E. Хомутова!); ауль Ніазбекъ 30. VII. 1902 (B. A. Федченко!).

IV. Окрестности Ташкента, 15. IV. 1871 (O. A. Федченко!) Ташкентъ нач. мая 1881 (A. Regel!); Чимганъ, стоянка, 3. VIII. 1897 (O. A. Федченко!), Ташкентъ и горы Карагату (Маевъ!); Ташкентъ, въ саду Хомутова, 12. VII. 1897 (O. A. и B. A. Федченко!!), близъ кишлака Пекемъ, 8. VIII. 1902; тамъ же въ ущ. Оби-галива, 2. VIII. 1902 (B. A. Федченко!!).

VI. Джанбулакъ 29. V. 1880 и Карасу, 16. V. 1880, между Ташкентомъ и Ходжентомъ (A. Regel! — собрано Мусою); Моголь-тау 29. IV. (Съверцовъ!).

Въ Туркестанѣ распространено очень широко въ предгорьяхъ и лѣсной зонѣ: О: — Джунгарскій Алатау, Тянь-Шань; С: — Памироалай; В: — Каракъ въ горахъ Каратау (*A. Regel!*).

Виѣ Туркестана — Чжунгарская степь. По Тянь-Шаню до Кунгеса.

310. *Haplophyllum latifolium* Kar. et Kir. Enumer. pl. alt. № 200. — *Led.*, Fl. ross. I. 491.

1878. *Haplophyllum latifolium*, *A. Regel* Reisebr. 198.

II. Сорное по р. Чутырь, малый Таласъ (*A. Regel* въ Reisebr. I. с.; въ Туркестанскомъ гербаріи также мѣстность на этикеткѣ обозначена такъ: „Sülpikor kl. Talas, VIII 1876“).

IV. Ташкентъ (*Краузе!*). Около Пскема 22. VII. 1897 (*B. A. Федченко!!*).

Въ Туркестанѣ еще въ О: — Каракастекъ 14. V. 1875 (*A. Кушакевичъ!*), Джунгарскій Алатау (*Карелинъ и Кириловъ!*); С: — Зеравшанъ (*B. Комаровъ!*), Алайскій хреб. Кульнартъ (*O. A. Федченко!*).

Мало отличается отъ предыдущаго вида.

Виѣ Туркестана неизвѣстно.

Невыясненнымъ остается слѣдующее указание:

1877. *Haplophyllum*, *A. Regel* Reisebr. 367. — Бородай.

*Приимѣчаніе.* Въ Туркестанѣ встрѣчаются еще слѣдующіе виды *Haplophyllum*:

*H. Buxbaumii* (Poir.) Boiss. . . . — — — W —

*H. hirsutum* Rgl. et Schmalh. . . . — — S W (Endem.)  
(С: — Зеравшанъ, Гольодная степь; В: — между Келесомъ и сухимъ Келесомъ — *O. A. Федченко*).

*H. obtusifolium* Led. . . . . — — S W (Endem.)  
(С: — Бальджуанъ — *A. Regel*; можетъ быть, это особый видъ; В: — по берегу Каспійского моря; Эмба — *Ворицковъ!*).

*H. pedicellatum* Bge. . . . . — — W —  
(W: — Закасп. обл., приводится *Коржинскимъ*).

*H. orbustum* Bge. . . . . — — W (Endem.)  
(W: — Амударъинск. отдѣль, предгорья между Сайробомъ и Лайлакаромъ, 2.000', 9. XI. 1881 *A. Regel*; у колодца Чагиль не далеко отъ Мерва, 28. VI. 1884; близъ колодца

Юлкуй, 6. VII. 1884 *A. Regel*; Кизыльт-кумы — *Леманъ!*).  
*H. versicolor* Bge.

### II6. *Tetradiclis* Stev.

311. *Tetradiclis salsa* Stev. in *MB. Fl. taur. cauc.* III. 648.  
— 1818. — *Led.*, Fl. ross. I. 492. — *Boiss.*, Fl. or. I. 918.

Туземн. назв.: Мичка-чубъ (записано *O. A. Федченко*).  
IV. Между Ташкентомъ и Келесомъ, 22. IV. 1871 (*O. A. Федченко!*<sup>1)</sup>).

Въ нашей области рѣдко въ степной части. Въ Туркестанѣ встрѣчается еще въ С: — окр. Катты-кургана, близъ арыка Наруна 28. IV. 1869 (*O. A. Федченко!*), Курганъ-тюбе по р. Вахшъ, 6'000', III. 1884 (*A. Regel!*).

Виѣ Туркестана — Египетъ, Месопотамія, Закавказье, Белуджистанъ, южная Россія.

*Ptelea trifoliata* L. Sp. pl. (ed. 1-а) p. 118. — 1753.

1876. *Ptelea trifoliata*, *A. Regel*, Садоводство въ Ташкентѣ.  
IV. Разводится въ Ташкентѣ (*A. Regel!*).

Изъ сем. Rutaceae для Туркестана приводится еще *Malacocarpus crithmifolius*. (= *Peganum crithmifolium* Retz., *P. Harmala* β *crithmifolium* DC.): W.

## XXVI. *Diosmeae*.

### II7. *Dictamnus* L.

312. *Dictamnus albus* L. Sp. pl. (ed. 1-а) p. 383. — 1753.—  
*Hook.*, Fl. br. Ind. I. 487.

*D. Fraxinella* Pers. Syn. I. 464. — *Led.*, Fl. ross. I. 495. — *Boiss.*, Fl. or. I. 920.

1878. *Dictamnus Fraxinella*, *A. Regel* Reisebr. 178.  
Туземн. назв.: Чильманда (въ Нанаѣ и Пскемѣ — записано *B. A. Федченко*); кіяль (записано въ Кехѣ, Ферган. обл., *O. A. Федченко*).

I. Аламединъ, 5 — 9.000', 23 — 25. V. 1880, зацвѣтаетъ (*Фетисовъ!*).

IV. Тянь-Шань, 2.500 — 8.000' (*Кушакевичъ!*); Чимганиъ, Красная гора, 21. VII. 1897 въ пл. (*O. A. Федченко!*), въ до-

<sup>1)</sup> Въ книгѣ *O. A. Федченко* (Списокъ и т. д.) пропущено по той же причинѣ, какъ и *Datisca cannabina* (см. выше стр. 443).

лии р. Пскемъ близъ кишл. Нанай въ ущельи Акъ-саръ-саи, 1. VIII. 1902 и бл., кишл. Пскемъ въ ущел. Обигалва, зрѣлые плоды, 5.000 (Б. А. Федченко!!), гора Кавагалва, близъ Ходжакента (А. Регель!), на р. Терсъ гора Адрашанъ, 10. V. въ цв. (*Krauze!*); Сайлакъ (А. Регель — въ гербаріи только этикетка, растенія же нѣть); Мазаръ близъ Ташкента, 12. VII. 1880 въ цв. (А. Регель — собрано *Mусою!*).

V. Аксу 18. V. 1880 въ пл. (А. Регель — собрано *Мусою!*), Окуръ близъ Аксу 1. VI. 1880 въ цв. (А. Регель — собрано *Мусою!*).

Въ нашей области не рѣдко въ предгорьяхъ и полосѣ лиственіаго лѣса и нижней зонѣ арчи.

Въ Туркестанѣ — О: — Джунгарскій Алатау, Тянъ-Шань; S: — Гиссаръ, Бальджуантъ (А. Регель!), Зеравшанъ (О. А. Федченко!); Фергана (Кехтъ О. А. Федченко!); Караванъ-куль 7. VII. 1878 (*Кушакевичъ!*).

Внѣ Туркестана — Европа, Сибирь, сѣверо-западн. Гималаи, Крымъ, Кавказъ, Малая Азія, Японія, Монголія.

## XXVII. Celastrineae.

### III8. Euonymus L.

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| Листья линейные . . . . .               | E. nanus M. B.             |
| Листья продолговато-ланцетные . . . . . | E. Semenovi Regel et Herd. |

313. *Euonymus nanus* M. B. Fl. taur. caucas. III. 160. —

1818. — *Led.*, Fl. ross. I. 499. — *Boiss.*, Fl. or. II. 9.

1878. *Euonymus nanus*; A. Regel Reisebr. 183.

1883. " " *Franchet Mission Capus* 249.

1883. " *Koormanni Lauche Wittm. Gartenzeit.* II. 112.

1885. *Euonymus* вѣчнозеленый, *Лисневский* 40 (замѣтка Н. И. Королькова).

IV. По р. Коксу бл. Бричъ-муллы, 3.000', VIII. 1876 (*Корольковъ!*); Чаткалъ, выше моста, 15. VIII. 1876, въ пл. (А. Регель!); Каракызы, 24. VIII. (*Капю* — п. в.), Кошкаръ, 6 — 7.000' VIII. 1870, (А. Регель!), Тянъ-Шань, 2.500' — 8.000' (*Кушакевичъ!*) близъ кишлака Пскемъ, на озерѣ Урунгачъ, 2. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!); между Нанаемъ и Пскемомъ,

въ ущельи, 21. VII. 1897 (Б. А. Федченко!!), бл. кишл. Нанай въ Акъ-саръ-саи 20. VII. 1897 (Б. А. Федченко!!).

VII. Въ Тянъ-Шанѣ (*Коопманъ* по *Лаухе*); въ ущельи р. Афлатунъ при впаденіи р. Уялма-чаты, 22 — 25. VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

Въ нашей области не часто, какъ вѣчнозеленый кустарникъ зоны хвойныхъ. Въ Туркестанѣ рѣдко: О: — Джиргалинъ (*Ларіоновъ* — п. в.), S: — Гульша, Арчаты (А. Регель!).

Внѣ Туркестана — Кавказъ, южная Россія (Бессарабская, Подольская губ.), Алашань, страна Тангутовъ.

314. *Euonymus Semenovi* Regel et Herder, Enum. pl. Semen. № 202 („*Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*“ 1866. II. p. 557).

E. europaeus β Semenowii E. Regel in „*Acta Horti Petrop.*“ IV. 2. p. 321.

1877. *Evonymus Semenowii*, A. Regel Gartenfl. 13.

1878. " " A. Regel Reisebr. 205.

1883. " " *europaeus*, Franchet Mission Capus 249.

1885. " sp. чія — *Лисневский* 40.

Туземн. назв.: Чія (киргиз. сіерь-бульдургенъ) и китайск. танценауръ записаны *Ларіоновыи*.

I. Выходъ Айшмары изъ горъ (А. Регель!).

II. Кумбель, 9.000', IX. 1876 въ пл. (А. Регель!).

VII. Ущелье р. Чаначъ и Афлатунъ (*Лисневский!*); Афлатунъ 3. IX: (*Капю!*), въ долинѣ р. Ходжа-ата и Афлатуна, въ лиственныхъ лѣсахъ, 22 — 23. VIII. 1902, въ пл. (Б. А. Федченко!!).

Въ Туркестанѣ встрѣчается въ О: — Тянъ-Шань: Малая Алматинка (А. Регель!, *Фетисовъ!*, *Кушакевичъ!*); гор. Караколь, Джауку, Джагастай, Кунгесъ, Ханахай (А. Регель!); на р. Беркѣ (*Ларіоновъ!*); Джунгарскій Алатау: Мал. Кебинъ, Боргаты (А. Регель!). S: — Акъ-бура (О. Федченко!).

Внѣ Туркестана неизвѣстно.

*Euonymus japonicus* L. fil. Suppl. 154. — *Thunb.* Fl. jap. 100.

1876. *Euonymus japonicus*, A. Regel. Садоводство въ Ташкентѣ.

1876. *Euonymus radicans*, A. Regel ibid.

IV. Разводится въ Ташкентѣ, введено русскими (А. Регель!).

## XXVIII. Rhamneae.

### 119. Zizyphus Juss.

315. *Zizyphus sativus* Gaertn. Fract. I. 202.  
*Z. vulgaris* Lam. Illustr. I. t. 185. f. 1, p. 316. —  
*Led.*, Fl. ross. I. 501. — *Boiss.*, Fl. or. II. 12. — *Hook.*, Fl.  
 br. Ind. I. 633.  
*Rhamnus Zizyphus* L. Sp. pl. (ed. I-a) p. 194. — 1753.  
 1876. *Zizyphus*, A. Регель Садоводство въ Ташкентѣ.  
 1878. *Zizyphus vulgaris*, A. Regel Reisebr. 166.  
 1883. Jujuvier, *Capus Climat et veg.* 212.  
 1885. *Zizyphus sativa*, Лисневскій 32 (примѣчаніе Н. И.  
 Королькова).  
 1890. *Zizyphus vulgaris*, Маевъ 26.

1896. " " Коржинскій Очерки 52.  
 Туземн. назв.: Джиланъ-джида; чилинъ.  
 IV. Дико по Чирчику и Угаму, 500—3.500' (Н. И. Корольковъ — н. в.); дико въ долинѣ р. Пекема (*Капю* — н. в.); разводится въ Ташкентѣ (Маевъ, A. Регель).  
 XI. Разводится (Коржинскій, Лисневскій).

Въ нашей области указано, какъ дикорастущее, вмѣстѣ съ другими фруктовыми деревьями, на Пекемѣ, но мнѣ тамъ не замѣчено. Въ всякомъ случаѣ, встрѣчается тамъ не часто. Въ Туркестанѣ разводится не рѣдко; какъ дикорастущее собрано въ S: Дарвазъ, Бальджуанъ, Гиссарь (A. Регель!), Керки (Маевъ!).

Внѣ Туркестана указано какъ дикорастущее въ Греціи. Македоніи, Закавказіи, Малой Азіи, Персіи.

Разводится на востокѣ.

### 120. Rhamnus L.

316. *Rhamnus cathartica* L. Sp. pl. (ed. I-a) p. 193. —  
 1753. — *Led.*, Fl. ross. I. 501. — *Boiss.*, Fl. or. II. 19.  
 1872. *Rhamnus cathartica*, Krauze Замѣтки 270.  
 1878. " " A. Regel Reisebr. 176, 205.  
 1881. Faulbäume, Middendorff XLIV.  
 1883. *Rhamnus cathartica*, Franchet Mission Capus 249.

1885. Кустарникъ изъ сем. крушиновыхъ, Лисневскій 41.  
 1896. *Rhamnus cathartica*, Коржинскій Очерки 39, 40.  
 1896. " " v. typica, Комаровъ Зеравшанъ,  
 послѣ № 362.  
 1899. Крушина, Гейтеръ Туркест. скит. 157.  
 I. Аксу, 6000', 30. VI. 1880 (Фетисовъ!); у подошвы  
 горы по р. Айшмаръ (A. Регель!).  
 IV. Сайлыкъ, 3.500'; Ойа; по р. Коксу, 4—5000' (A. Регель!); близъ Бричъ-муллы, 3.150' (Лисневскій!); въ бересовой  
 рощѣ у Песочного перевала близъ Чимгана (Гейтеръ!); въ  
 долинѣ р. Ишакъ-кунрюкъ VII. 1881 (Лейтнеръ!); близъ  
 кипп. Пекемъ, около озера Урунгачъ, 2. VIII. 1902, и на  
 спускѣ съ перевала отъ Кумсаны къ Сидзяку, 31. VII. 1902  
 (Б. А. Федченко!!), между Бричъ-муллой и Нанаэмъ, 19. VII.  
 1897 въ пл. (Б. А. Федченко!!).  
 VII. Афлатунъ (*Капю*!); Чоначъ и Алабуха (Миддендорфи!).  
 VIII. Узунъ-ахматъ, южный склонъ Сусамырского  
 хребта, на западномъ концѣ, 4.000', 27. VII. 1881 (Фетисовъ!).  
 XI. Арсланбобъ и др. мѣстности 4—6.000' (Коржинскій!);  
 Карасу 1883 (Фетисовъ!); Арсланбобъ 30. V. 1899 (Литвиновъ!).  
 Въ нашей области не часто и не поднимается въ горы  
 выше 6.000'. Въ Туркестанѣ распространено мало. N: Ак-  
 молинская и Семипалатинская обл.; O: Джунгарскій  
 Алатау; Коксу 1878 г.; Талки (A. Регель!); Тянь-Шань:  
 Алматинка бл. Вѣриаго (A. Регель!).  
 Внѣ Туркестана — Европа, южная Сибирь, сѣверная  
 Африка, Кавказъ, Понтъ, Афганистанъ.  
 Въ Туркестанѣ встрѣчается еще var. *seravschanica*  
 Komar. — исключительно на Зеравшанѣ.  
 317. *Rhamnus coriacea* (Rgl.) Komarov, Материалы по  
 флорѣ Туркестанскаго нагорья. I. Басс. Зеравшана, № 360.  
 (Труды СПБ. Общ. Естеств. т. LXVI.). — 1896.  
 Rh. *cathartica* L. v. *coriacea* Regel E., Descr. pl. nov.  
 fasc. IV. (Act. Horti Petrop. IV. 322). — 1876.  
 Туземн. назв.: Харчакка, записано (О. А. Федченко!).  
 IV. Пор. Чаткалу, скалы, 4—5. VII. 1899 въ пл. (Литвиновъ!).  
 XI. По р. Карасу, на утесахъ Улькунъ-беля, 16. VIII.  
 1895 (С. Коржинскій!).

Въ нашей области рѣдко. Въ Туркестанѣ еще въ S: Зеравшань (A. Регель!, B. Комаровъ!).

*Приимѣчаніе.* Въ Туркестанѣ встрѣчается еще одинъ видъ Rhamnus: Rh. laetevirens Komar. S: Зеравшань (B. Комаровъ!).

Кромѣ того, указывается Rh. spathulifolia F. et M. Наконецъ, въ Туркестанскомъ гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада имѣется этикетка съ надписью

«Rhamnus Frangula. Р. Богустанъ 6.000'; Лариновъ 1874» — по растенію при ней нѣтъ. Впрочемъ, Rh. Frangula указана для Тарбагатая и Джунгарскаго Алатау.

Есть еще пакетъ съ плодами, съ надписью «Rh. Pallasi, semina e Kangurt Baldschuaniae», но скорѣе эти плоды Rh. coriacea (Rgl.) Komar.

#### Paliurus aculeatus L.

1876. Paliurus aculeatus, A. Регель Садоводство въ Ташкентѣ.

IV. Разводится въ Ташкентѣ (A. Регель).

Въ нашей области, исключительно, какъ разводимое. Въ Туркестанѣ указано дикорастущимъ исключительно въ Гиссарѣ (Яkkatalъ) (Липскій).

Внѣ Туркестана — Кавказъ, Крымъ, Южная Европа, Болгарія, Румынія, Малая Азія, Сирія, Персія.

#### 121. Nitraria L.

318. Nitraria Schoberi L. Syst. (ed. X-a) p. 1044. — Led., Fl. ross. I. 505. — Boiss., Fl. or. I. 919 (въ сем. Zygophyllaceae).

1882. Nitraria, A. Regel Gartenfl. 364.

Туземн. назв.: Янтақъ-каичакъ, записано Невѣсскимъ въ Гиссарѣ.

VI. Кишлакъ Самгаръ, 30. V. 1878 въ пл. (Скорняковъ!).

V. Алабуга (A. Регель — п. в.).

Въ нашей области — рѣдкий кустарникъ. Въ Туркестанѣ распространено широко: N: Омскій уѣздъ (Игнатовъ!), Балхашъ (Никольскій!); O: Джунгарскій Алатау (A. Регель!); Тянъ-Шань: Атбashi (Фетисовъ!); Иссыкъ-куль

(A. Регель!, Семеновъ!); Кульджка S: — Гиссаръ (Невѣсский!), Памиръ (Кушакевичъ!), Шугнанъ (O. A. и B. A. Федченко!!); W: Хала-ата (Корольковъ и Краузъ!), Сыръ-дарья (Борщовъ!), Аксъ-чульпашъ, лѣвый берегъ Аравльскаго озера, 21. V. 1881 (A. Регель!).

Внѣ Туркестана — Южная Россія, Кавказъ, Восточная Сибирь, Монголія, Месопотамія, Крымъ, Персія, Белуджи-станъ, Австралія.

#### XXIX. Juglandaceae.

##### 122. Juglans L.

319. Juglans regia L. Sp. pl. (ed. I-a) p. 997. — 1753. — Led., Fl. ross. I. 507. — Boiss., Fl. or. 1872. Juglans régia, Краузъ, Замѣтки 266.  
1872. Грекскій орѣхъ, Сѣверцовъ, вертик. и гориз. распр. 14.  
1873. Грекскій орѣхъ, Сѣверцовъ Путешеств. 78.  
1876. " " A. Регель, Садоводство Ташкента.  
1877. Nussbäume, A. Regel Gartenfl. 8.  
1878. Juglans regia, A. Regel Reisebr. 166.  
1878. Wallnusse, A. Regel Reisebr. 181.  
1878. Nussbäume, A. Regel Reisebr. 180, 182.  
1878. Wallnusse, Max Middendorff Reisebriefe.  
1881. Nussbäume, Middendorff Ferghana XLIV, XLVI  
XLVII, XLVIII.  
1881. Nüsse, Middendorff Ferghana XLVI.  
1882. Juglans A. Regel Gartenfl. 361.  
1882. Nussbäume A. Regel Gartenfl. 360.  
1883. Noyer, Capus Climat et végét. 206, 212.  
1885. Грекскій орѣхъ, Лисневскій 21.  
1885. Орѣховые лѣса, Лисневскій 47, 53.  
1885. Грекскій орѣхъ, Сорокинъ 129.  
1890. Juglans régia, Маевъ 26.  
1890. Орѣхъ, Маевъ 63, 64, 69.  
1895. Орѣхъ, Гейлеръ Ташк. — Гава, 128 и др.  
1896. Juglans regia, Корженевскій Очерки 39, 40, 52.  
1897. Грекскій орѣхъ, О. Федченко въ отчетѣ 18.

1899. *Juglans regia* — оръхъ, Гейеръ Туркест. скит. 141, 146, 147, 165, 184, 185, 187, 191, 195, 197, 200.

1902. Грекий оръхъ, Б. Федченко Краткий Отчетъ.

Туземи. назв.: Джангакъ; джангалякъ.

IV. По р. Чаткаль, у поворота и противъ Чаураза, 5—6.000', VIII. 1876 (А. Регель!); верховья Чирчика, 9. VII. (Съверцовъ!); въ Тянь-Шань, отъ 2.500' до 8.000' (Кушакевичъ!); Ташкентъ, развод. (Съверцовъ, А. Регель, Маевъ); дол. Уйгума (-Угама), дико (Съверцовъ!); Богустаинъ (Короликовъ — п. в.); около Бричъ-муллы и выше; низовья Чаткала (Лисневский); въ долинѣ р. Пскемъ до 4.000', дико (Капю — п. в., Б. А. Федченко!!); долина Чимгана (О. Федченко!); близъ Ходжакента, къ Чимгану; Юсутчанъ; Чимганъ; отъ Бричъ-муллы до Богустаина; Нанай, склоны Акъ-саръ-сая; отъ Нанаи до Пскема (Гейеръ — п. в.); спускъ съ перевала отъ Кумсана и Нанаи 30. VII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

VI. Ходжентъ (Съверцовъ — п. в.); по р. Афлатунъ, Ходжа-ата, Касанъ-сай, VIII. 1902 (Б. А. Федченко!!).

VII. Кишл. Варзыкъ (очевидно, культурное), 24. V. 1878 (Скорняковъ!); по р. Ходжа-ата, Турукъ, Манубалды — лучшие лѣса (Лисневский — п. в.); Афлатунъ, до 4.500' (Капю — п. в.); Чанаагъ-сай, Афлатунъ, Ходжа-атъ, 1.300'—6.000' (Лисневский — п. в.); Чуст. у. <sup>1)</sup> Алабуха и Чанаагъ (Миддендорфъ); нижнее течение рѣки Джана-салды, Чанаагъ, Попш-ата, Итакартъ, Угутуръ, Афлатунъ, Сарачелека, Окумъ, Ходжа-ата, Карасу, Минь-бугу. Турдукъ, Манубалды, Акъ-юль (Миддендорфъ — п. в.).

X. По р. Шаръ-каратма (Сорокинъ — п. в.).

XI. Въ изобилии дико въ горахъ (Краузе — п. в.); по р. Яссы (А. Регель — п. в.); отъ Узгенъ до к. Учъ-курганъ (Лисневский — п. в.); Дашибанская дача (Гейеръ — п. в.); Андижан. у. (Лисневский — п. в.); Арсланбобъ, 4—6.000, (Коржинский); берегъ Каракульджи, Яссы, Майли (Миддендорфъ); разводится (Коржинский).

Въ Туркестанъ дико встречается въ S: Гиссаръ, Дарвазъ, Мумынавадъ (А. Регель!); быть можетъ, дико въ долинѣ

<sup>1)</sup> Нынѣ Наманганской уѣзда.

Зеравшана. Разводится въ Ферганѣ, Самаркандѣ, Бухарѣ, Хивѣ, Кульджѣ.

*Juglans nigra* L. Sp. pl. (ed. 1-а) p. 997. — 1753.

1876. *Juglans nigra*, А. Регель Садовод. въ Ташкентѣ.

IV. Разводится въ Ташкентѣ (А. Регель).

### XXX. Anacardiaceae.

#### 123. Pistacia L.

320. *Pistacia vera* L. Sp. pl. (ed. I-а) p. 1025. — 1753 — Boiss., Fl. or. П. 5.

1872. Фисташка, Съверцовъ, Вертик. и гориз. распир. 15.

1872. *Pistacia vera*, Краузе Замѣтки 264.

1876. " " А. Регель Садоводство Ташкента.

1877. *Pistaciens*, А. Regel Gartenfl. 8.

1878. *Pistacia vera*, А. Regel Reisebr. 180.

1878. *Pistazien*, Max Middendorff Reisebriefe.

1881. *Pistazien*, Middendorff 306, XLVI, XLVII.

1883. *Pistachier*, Capus Climat et vѣg tation, 206, 212.

1885. *Pistacia vera*, Лисневский 32, 53.

1890. " " Маевъ 26, 65.

1896. " " Коржинскій Очерки 38, 40.

1899. Фисташка, Гейеръ Туркест. скит. 185, 188.

Туземи. назв.: П(и)ста.

IV. Спускъ съ перевала отъ Кумсана къ Нанаю 30. VII.

1902 (Б. А. Федченко!!); Чимганъ 1899—1900 (Е. Хомутова!); въ горахъ дико; въ садахъ иногда разводится (А. Регель!).

Чирчикъ, по горамъ, 9. VII. (Съверцовъ!); Тянь-Шань, 2.500'—8.000' (Кушакевичъ!); около и выше Бричъ-муллы по Чирчику (А. Регель!), верховья Чирчика и южнѣе (Съверцовъ), Нанаи (Гейеръ), въ долинѣ Пскема до 4.000' (Капю); на сухихъ склонахъ въ окр. Бричъ-муллы по лѣвому берегу р. Коксу, 19. VII. 1897 (О. А. и Б. А. Федченко!!), въ низовьяхъ р. Чаткаль при спускѣ съ пер. Шаврезъ по дорогѣ въ Бричъ-муллу и въ аулѣ Баястанъ и на горахъ Босъ-су (Лисневский).

VII. Бишгянгакъ; на невысокихъ горахъ западной части Наманганского уѣзда (Миддендорфъ); на западъ отъ кишл.

Касанъ (*Лисневский*); на правомъ берегу Нарына и къ востоку оть Паша-аты (*Миддендорфъ*).

XI. Изрѣдка на высотѣ 3.500'—5.000', на холмахъ между Джелабадомъ и Тараинъ-базаромъ и между устьемъ Карагалмы и д. Червакъ; бл. Арсланбоба, 4—6.000', на склонахъ (*С. Коржинский!*); Андиж. у. оть кр. Узгента до Учъ-кургана (*Лисневский*); по Сыръ-дарьѣ, Кара-кульджѣ, Яссы до Куршаба и въ горахъ до Ункурайрыма; р. Кугартъ и на южномъ склонѣ горъ, пограничномъ съ Семирѣчьемъ и на Нарынѣ; по обѣимъ сторонамъ Майли, оть хр. Мама вдолъ хр. Кубъ-псюкъ, все заросло фисташкой на 400 кв. верстъ (*Миддендорфъ* въ 1881 г.; интересно было бы сравнить современное состояніе этихъ зарослей); по р. Майли-су, 3.600', 11. VIII. 1895 (*С. Коржинский!*).

Въ Туркестанѣ встрѣчается очень рѣдко въ О: Буамское ущелье (*A. Регель!*); гораздо чаще въ С: — Дарвазъ, Курган-тюбе. Кулъябъ, Гиссаръ, Зеравшанъ (*A. Регель!*), Зеравшанъ (*О. Федченко!, Комаровъ!, Капю!, Леманъ!, Фергана (Ходоровский!)*).

Виѣ Туркестана встрѣчается въ Сиріи (по Линнею), на Атиливанѣ къ сѣв. оть Дамаск., въ Месопотамії (spont.?). Разводится въ Сиріи, Палестинѣ, Персіи, Ассиріи, Греціи.

*Приицаніе.* Изъ сем. Anacardiaceae въ Туркестанѣ встрѣчается еще *Rhus coriaria* L.: Кафириаганъ; мѣстн. назв. та-туть или та-тушь; употребляется какъ лѣкарственное растеніе противъ насморка (*Невѣскій!*); Гиссаръ, дико въ горахъ Каратагъ, VII. 1882 (*A. Регель!*); р. Зигди, 23. VIII. (*A. Регель!*); между Дюшамбе и Варзобомъ (*A. Регель!*).

Зеравшанъ: р. Фанъ 20. VIII (*A. Регель!*); Сангуручъ, ниже озеръ Куликаланъ, 20. VIII 1884 (*A. Регель!*).

Балъджуанъ: Файзабадъ (*A. Регель!*).

Указывается для Туркестана еще *Rh. Cotinus* L.: W: Закасп. обл.